жаловы на головную боль, преимущественно в затылочной области, подъем АД до 200/100 мм.рт.ст., жалобы беспокоят около 4 часов, самостоятельно приняла 50 мг капотена, 0,6 мг моксонидина, со слов без эффекта. Ухудшение самочувствия в течении нескольких недель, на фоне
приема базовой терапии- эдарби, альбарел, физиотенз
приема одзовой терапии- здарой, альоарей, физиотенз
АНАМНЕЗ (в т.чэпид., аллерг., гинекол по показаниям) В анамнезе: ИБС, гипертоническая болезнь,
Оперирована холецистэктомия в 2011 годах, травмы отрицает. Менопауза с 39 лет. Аллергию
отрицает. Эпиданамнез не отягощен, за пределы Москвы не выезжала более 20 лет, сезонные
прививки отрицает. ЕМИАС, МГФОМС: I11.9, I67.2, M15.0, K21.0, I70.8, D25.1.
ОБЪЕКТИВНО: общее состояние (удовл., с <u>р.тяжести,</u> тяжелое, терминальное). Сознание: <u>ясное,</u> оглушенное, сопор, кома. 15 Положение активное, пассивное, вынужденное
Кожные покровы: сухие, влажные, обычной окраски, бледные, гиперемия, цианоз, желтушность
Сыпь нет Зев чистый Миндалины не увеличены
Лимфоузлы не увеличены Пролежни нет Отеки нет t°C 36.6
Органы дыхания: ЧДД 16 в мин., одышка эксператорная, инспираторная, смешанная. Патологическое дыхание нет
Аускультативно: везикулярное, жесткое, бронхиалоное, пузрильное, ослаблено, отсутствует в по всем полям
Хрипы сухие (свистящие, жужжащие) в нет
Влажные (мелко-, средне-, крупнопузырчатые) в нет
Крепитация, шум трения плевры над нет
Перкуторный звук легочный, тимпанический, коробочный, притупленный, тупой над по всем полям
Кашель сухой, влажный, лающий, отсутствует. Мокрота нет
Органы кровообращения: пульс 70 в мин., ритмичный, аритмичный, наполнение удовлетворительное ЧСС 70 в мин.
дефицит пульса 0 АД $200/100$ привычное $140/80$ максимальное $220/120$ мм.рт.ст.
Тоны сердца звучные, приглушены, глухие. Шум <u>систолический</u> , диастолический на верхушке
проводится нет Шум трения перикарда. Акцент тона I на аорте
Органы пищеварения: Язык сухой, влажный, обложен чистый
Живот форма правильная мягкий, напряжен в не напряжен
Безболезненный, болезненный в во всех отделах Положительные симптомы (Образцова,
Ровзинга, Ситковского, Ортнера, Мерфи, Мейо-Робсона, Щеткина-Блюмберга, Вааля) отрицательные
Перистальтика выслушивается Печень не увеличена Селезенка не пальпируется
Рвота (частота) нет Стул (консистенция, частота) регулярный, оформлен
Нервная система: Поведение <u>спокойное,</u> беспокойное, возбужден. Контакт контактен
Чувствительность сохранена D = S Речь (внятная, дизартрия, афазия)
Зрачки OD = OS, <u>обычные,</u> широкие, узкие. Фотореакция живая Нистагм нет
Ассиметрия лица нет Менингеальные симптомы (ригидность затылочных мышц,
Кенига, Брудзинского) отрицательные Очаговые симптомы не выявлены
Координатные пробы выполняет правильно, в позе Ромберга устойчив
Мочеполовая система дизурии нет
Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон
Status locales Bec=74kr, Poct=152cm, MMT=32
Данные инструментальных исследований (ЭКГ, глюкометрия, пульсоксиметрия и пр.) Sp02 98 %; ЭКГ (20.02.21г. 01:33) ритм синусовый, правильный с ЧСС 70 в мин, ЭОС отклонена влево, ST-
изолиния, гипертрофия миокарда левого желудочка, неспецифические нарушения внутрижелудочкового
проведения. Данных за острую коронарную патологию нет.
Owner, and the company of the compan
Оказанная помощь и ее эффект (в т.ч. результаты инстр. иссл. в динамике) расспрос,
Sol. Ebrantili 5mg/ml-5ml + Sol. Natrii chloridi 0,9%-10ml в/в медленно под контролем АД в течении
3 минут введено 12,5 мг (7,5 мл) раствора, через 5 минут состояние удовлетворительное, АД 160/80
мм.рт.ст, ЧСС 70 в мин, пульс 70 в мин, ЧД 16 в мин, жалоб не предъявляет
Оставлен на месте, рекомендовано обратиться в поликлинику
Через 43 мин: Состояние удовлетворительное, АД 160/80 мм.рт.ст., ЧСС 70 в мин, пульс 70 в мин,
ЧД 16 в мин, температура 36,6
Рекомендации: Ведение дневника контроля АД. Регулярный прием базовой антигипертензивной терапии
Сигнальная карта: Нет
Расходные материалы: Салфетки спиртовые № <u>8</u> , Бахилы <u>1</u> , Перчатки <u>1</u> , Маска <u>1</u> , Шпатель <u>1</u> , Чехол
manus 1
д.терм 1,
Шприц $\overline{2}$,0 № $\underline{0}$ 5,0 № $\underline{0}$ 10,0 № $\underline{0}$ 20,0 № $\underline{1}$, Катетер. куб. $\underline{0}$ G Фикс. пластырь $\underline{0}$ Скариф $\underline{0}$ Тест
Шприц 2,0 № 0 5,0 № 0 10,0 № 0 20,0 № 1 , Катетер. куб. 0 G Фикс. пластырь 0 Скариф 0 Тест полоски 0 ,Пакет мед.отхлд. 1 Маска
Шприц 2,0 № 0 5,0 № 0 10,0 № 0 20,0 № 1 , Катетер. куб. 0 G Фикс. пластырь 0 Скариф 0 Тест полоски 0 ,Пакет мед.отхлд. 1 Маска для небулайзера 0
Шприц 2,0 № 0 5,0 № 0 10,0 № 0 20,0 № 1 , Катетер. куб. 0 G Фикс. пластырь 0 Скариф 0 Тест полоски 0 ,Пакет мед.отхлд. 1 Маска