

**ЖАЛОБЫ** на головную боль, преимущественно в затылочной области, подъем АД до 200/100 мм.рт.ст., жалобы беспокоят около 4 часов, самостоятельно приняла 50 мг каптогена, 0,6 мг моксонидина, со слов без эффекта. Ухудшение самочувствия в течении нескольких недель, со слов сиделки самостоятельно перестала принимать препараты базовой группы, чем способствовала плохо коррегируемой гипертензии

**АНАМНЕЗ** (в т.ч.-эпид., аллерг., гинекол по показаниям) В анамнезе: ИБС, гипертоническая болезнь, нейросенсорная тугоухость, хроническая ишемия мозга.Операции -халецисэктомия 10 лет назад, травмы отрицает. Менопауза с 50 лет. Аллергию отрицает. Эпиданамнез неотягощен, за пределы Москвы не выезжала более 20 лет, сезонные прививки отрицает. ЕМИАС, МГФОМС: не доступен

**ОБЪЕКТИВНО:** общее состояние (удовл., ср.тяжести, тяжелое, терминальное). Сознание: ясное, оглушенное, сопор, кома. 15  
Положение активное, пассивное, вынужденное  
Кожные покровы: сухие, влажные, обычной окраски, бледные, гиперемия, цианоз, желтушность  
Сыпь нет Зев чистый Миндалины не увеличены  
Лимфоузлы не увеличены Пролежни нет Отеки постозность голеней t°C 36.6  
**Органы дыхания:** ЧДД 18 в мин., одышка экспираторная, инспираторная, смешанная. Патологическое дыхание нет  
Аускультативно: везикулярное, жесткое, бронхиальное, пузрыльное, ослаблено, отсутствует в по всем полям  
Хрипы сухие (свистящие, жужжащие) в нет  
Влажные (мелко-, средне-, крупнопузырчатые) в нет  
Крепитация, шум трения плевры над нет  
Перкуторный звук легочный, тимпанический, коробочный, притупленный, тупой над по всем полям  
Кашель сухой, влажный, лающий, отсутствует. Мокрота нет  
**Органы кровообращения:** пульс 75 в мин., ритмичный, аритмичный, наполнение удовлетворительное ЧСС 75 в мин.  
дефицит пульса 0 АД 200/100 привычное 130/80 максимальное 220/120 мм.рт.ст.  
Тоны сердца звучные, приглушены, глухие. Шум систолический, диастолический на верхушке  
проводится нет Шум трения перикарда. Акцент тона I на аорте  
**Органы пищеварения:** Язык сухой, влажный, обложен чистый  
Живот форма правильная мягкий, напряжен в не напряжен  
Безболезненный, болезненный в во всех отделах Положительные симптомы (Образцова, Ровзинга,Ситковского, Ортнера, Мерфи, Мейо-Робсона, Щеткина-Блюмберга, Вааля) отрицательные  
Перистальтика выслушивается Печень не увеличена Селезенка не пальпируется  
Рвота (частота) нет Стул (консистенция, частота) регулярный, оформлен  
**Нервная система:** Поведение спокойное, беспокойное, возбужден. Контакт контактен  
Чувствительность сохранена D = S Речь (внятная, дизартрия, афазия)  
Зрачки OD = OS, обычные, широкие, узкие. Фотореакция живая Нистагм нет  
Асимметрия лица нет Менингеальные симптомы (ригидность затылочных мышц, Кенига, Брудзинского) отрицательные Очаговые симптомы не выявлены  
Координатные пробы выполняет правильно, замедленно  
Мочеполовая система дизурии нет  
Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон  
Status localis Вес=95кг, Рост=164см, ИМТ=35

Данные инструментальных исследований (ЭКГ, глюкометрия, пульсоксиметрия и пр.) ЭКГ (11.03.21г. 00:09) ритм синусовый, правильный с ЧСС 75 в мин, ЭОС отклонена влево, ST- изолиния, АВ блокада 2 ст, гипертрофия миокарда левого желудочка. ЭКГ для оценки динамики не предоставленно. Данных за острую коронарную патологию нет.

Оказанная помощь и ее эффект (в т.ч. результаты инстр. иссл. в динамике) расспрос,  
Sol.Urapidili 5mg/ml-5ml + Sol.Natrii chloridi 0,9%-10ml в/в медленно под контролем АД в течении 3 минут введено 12,5 мг (7,5 мл) раствора, через 5 минут состояние удовлетворительное, АД 195/95 мм.рт.ст, ЧСС 75 в мин, пульс 75 в мин, ЧД 16 в мин, продолжено введение оставшейся дозы, под контролем АД, в течении 3 мин, через 5 мин после введения АД 170/80 мм.рт.ст., ЧСС 72 в мин, пульс 72 в мин, ЧД 16 в мин. Состояние удовлетворительное, жалоб не предъявляет.  
Оставлен на месте, рекомендовано обратиться в поликлинику  
Через 41мин: Состояние удовлетворительное, АД 170/80 мм.рт.ст., ЧСС 72 в мин, пульс 72 в мин, ЧД 16 в мин, температура 36,6

Рекомендации: Ведение дневника контроля АД. Регулярный прием базовой антигипертензивной терапии  
Сигнальная карта: нет  
Расходные материалы: Салфетки спиртовые № 10 ,Бахилы 1 ,Перчатки 1 ,Маска 1 ,Шпатель 1 ,Чехол д.терм 1 ,  
Шприц 2,0 № 0 5,0 № 0 10,0 № 0 20,0 № 1 , Катетер. куб. 0 G Фикс. пластырь 0 Скариф 0 Тест полоски 0 ,Пакет мед.отхлд. 1 Маска  
для небулайзера 0  
игла бабочка- 1шт