ЖАЛОБЫ боль в грудной клетке слева, усиливается при незначительной нагрузке, купируется приемом нитроминта 2 дозы, жалобы беспокоят несколько часов, возникают периодически, одышку в покое, чувство нехватки воздуха, ухудшение самочувствия в течении недели с нарастания
вышеперечисленных жалоб. Вызвали 103, дважды проведена терапия, со слов без эффекта
АНАМНЕЗ (в т.чэпид., аллерг., гинекол по показаниям) В анамнезе: ИБС, стенокардия (изокет
спрей, изосорбит, мексикор) гипертоническая болезнь (лариста, амлодипин), сахарный диабет 2 типа (метформин, метглиб). Аллергии нет. Менопауза с 50 лет. Эпиданамнез не отягощен. За пределы Москвы не выезжала более 4 лет, сезонные прививки отрицает. ЕМИАС, МГФОМС- J18.9
(09.2017), I25.1,E11.7, I11.9, H90.3, I67.8, I48.0, I25.2(2009)
ОБЪЕКТИВНО: общее состояние (удовл., с <u>р.тяжести,</u> тяжелое, терминальное). Сознание: <u>ясное,</u> оглушенное, сопор, кома. 15 Положение <u>активное,</u> пассивное, вынужденное
Кожные покровы: сухие, влажные, обычной окраски, бледные, гиперемия, цианоз, желтушность Сыпь нет Зев чистый Миндалины не увеличены
Лимфоузлы не увеличены Пролежни нет Отеки нет t° С 36.6
Органы дыхания: ЧДД 18 в мин., одышка эксператорная, инспираторная, смешанная. Патологическое дыхание нет
Аускультативно: везикулярное, жесткое, бронхиалоное, пузрильное, ослаблено, отсутствует в по всем полям Хрипы сухие (свистящие, жужжащие) в нет
Влажные (мелко-, средне-, крупнопузырчатые) в нет
Крепитация, шум трения плевры над нет
Перкуторный звук легочный, тимпанический, коробочный, притупленный, тупой над по всем полям
Кашель сухой, влажный, лающий, <u>отсутствует</u> . Мокрота <u>нет</u> Органы кровообращения: пульс 80 в мин., ритмичный, аритмичный, наполнение удовлетворительное ЧСС 92 в мин.
дефицит пульса -12 АД 160/90 привычное 130/80 максимальное 190/90 мм.рт.ст.
Тоны сердца звучные, приглушены, глухие. Шум систолический, диастолический на верхушке
проводится нет Шум трения перикарда. Акцент тона І на Аорте
Органы пищеварения: Язык сухой, влажный, обложен чистый
Живот форма правильная мягкий, напряжен в не напряжен Безболезненный, болезненный в во всех отделах Положительные симптомы (Образцова,
Ровзинга, Ситковского, Ортнера, Мерфи, Мейо-Робсона, Щеткина-Блюмберга, Вааля) отрицательные
Перистальтика выслушивается Печень не увеличена Селезенка не пальпируется
Рвота (частота) нет Стул (консистенция, частота) регулярный, оформлен
Нервная система: Поведение <u>спокойное,</u> беспокойное, возбужден. Контакт контактен Чувствительность сохранена $D = S$ Речь (внятная, дизартрия, афазия)
Зрачки OD = OS, <u>обычные,</u> широкие, узкие. Фотореакция живая Нистагм нет
Ассиметрия лица нет Менингеальные симптомы (ригидность затылочных мышц,
Кенига, Брудзинского) нет Очаговые симптомы нет
Координатные пробы в позе Ромберга устойчив, пальценосовая проба- выполняет правильно Мочеполовая система дизурии нет
Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон
Status locales Bec=80kr, Poct=165cm, MMT=29
Данные инструментальных исследований (ЭКГ, глюкометрия, пульсоксиметрия и пр.) <u>сахар крови-7,3</u> ммоль/л; Sp02 98%; ЭКГ(16.02.21г. 11:14) фибрилляция предсердий с ЧЖС 80-92 в мин, ЭОС не отклонена, ST- изолиния. Диффузные изменения по нижней стенке.
OTATION CHA, DI A MOOTIMIAN. AMPROPOSITIO NOMENTANI NO MARINE CICIAC.
Оказанная помощь и ее эффект (в т.ч. результаты инстр. иссл. в динамике)pасспрос,Tab.Acidi acetylsalicylici 500 mg- 1/2 таб разжевать, внутрь. Изокетспрей 2 дозы сублингвально
Больная передана бригаде СМП в состоянии средней степени тяжести, АД 140/80мм.рт.ст., ЧСС 92 в
мин, пульс 80 в мин, ЧД 18 в мин
Рекомендации:
Сигнальная карта: Нет
Расходные материалы: Салфетки спиртовые N_2 , Бахилы 1, Перчатки 1, Маска 1, Шпатель 1, Чехол д.терм 1,
Шприц 2,0 № 0 5,0 № 0 10,0 № 0 20,0 № 0 , Катетер. куб. 0 G Фикс. пластырь 0 Скариф 1 Тест полоски 1 ,Пакет мед.отхлд. 1 Маска для небулайзера 0
T 10.00.01.100004877 T
Дата и номер наряда 16.02.21 102864755 Подпись Карту проверил