

Arithmétique — CM: 3

Par Lorenzo

20 septembre 2024

Définition 0.1. Soient $(G, *)$ et (H, \square) deux groupes.

On appelle morphisme de groupes toute application $f : G \rightarrow H$ vérifiant
 $\forall x, y \in G, f(x * y) = f(x) \square f(y)$

Proposition 0.1.

Si $f : G \rightarrow H$ est un morphisme de groupe, alors $f(e_G) = e_H$

Démonstration 0.1.

$$\begin{aligned} f(e_G) &= f(e_G * e_G) = f(e_G) \square f(e_G) \\ f(e_G) &= f(e_G) \square e_H \\ f(e_G) \square f(e_G) &= f(e_G) \square e_H \implies f(e_G) = e_H \end{aligned}$$

□

Proposition 0.2.

Si $f : G \rightarrow H$ est un morphisme de groupe, alors $\forall x \in G, f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$

Démonstration 0.2.

$$f(x^{-1}) = f(x^{-1}) \square f(x) \square f(x)^{-1} = f(x^{-1} * x) \square f(x)^{-1} = f(x)^{-1}$$

□

1 Anneaux et Corps

Définition 1.1. Un anneau est $(A, +, \times)$ où A est un ensemble, $+$ et \times sont deux l.c.i sur A vérifiant les axiomes suivants

- $(A, +)$ est un groupe abélien (on note 0_A l'élément neutre)
- \times est associative
- \times est distributive sur $+$

Remarques 1.1. On dit que $(A, +, \times)$ est un anneau commutatif si, de plus \times est commutative.

Un élément $x \in A$ est dit inversible dans A lorsqu'il admet un symétrique pour \times .

Proposition 1.1.

Soit $(A, +, \times)$ un anneau alors
 $\forall x \in A, 0_A \times x = 0_A$

Démonstration 1.1.

$$\begin{aligned} 0_A \times x &= (0_A + 0_A) \times x \\ &= 0_A \times x + 0_A \times x \implies 0_A = 0_A \times x \text{ (par soustraction de } 0_A \times x) \end{aligned}$$

□

Proposition 1.2.

Soient $x, y, z \in A$, Si $x \times z = y \times z$ et z est inversible alors $x = y$

Démonstration 1.2.

$$\begin{aligned} x \times z = y \times z &\implies (x \times z) \times z^{-1} = (y \times z) \times z^{-1} \\ &\implies x \times (z \times z^{-1}) = y \times (z \times z^{-1}) \\ &\implies x \times 1_A = y \times 1_A \\ &\implies x = y \end{aligned}$$

□

Définition 1.2. *Un corps est la donnée d'un triplet $(\mathbb{K}, +, \times)$ où \mathbb{K} est un ensemble, $+$ et \times sont deux l.c.i sur \mathbb{K} vérifiant les axiomes suivants:*

- $(\mathbb{K}, +, \times)$ est un anneau commutatif
- (\mathbb{K}^*, \times) est un groupe abélien (de neutre noté $1_{\mathbb{K}}$).

Remarques 1.2. *De manière équivalente, un corps est un anneau commutatif avec un élément neutre pour \times où tout élément non-nul est inversible.*

2 Arithmétique des entiers

2.1 Rappels sur \mathbb{N} et \mathbb{Z}

À vérifier, certains théorèmes manque de consistance

Théorème 2.1. *(propriétés de $+$ et \times sur \mathbb{N})*

- (a) $+$ et \times sont associative et commutative sur \mathbb{N}
- (b) 0 est élément neutre pour $+$ tandis que 1 est neutre pour \times
- (c) Il y a une distributivité de \times sur $+$
- (d) $\forall x, y, m \in \mathbb{N}, x + m = y + m \implies x = y$

Théorème 2.2. *(propriétés de \leq sur \mathbb{N})*

- 1) (relation d'ordre total) $\forall m, n, p \in \mathbb{N}$

- (a) $n \leq n$
- (b) $m \leq n \wedge n \leq m \iff m = n$
- (c) $m \leq n \wedge n \leq p \implies m \leq p$
- (d) $m \leq n \vee n \leq m$
- 2) Les opérations $+$ et \times sont compatibles avec la relation d'ordre
 $\forall n, m, p \in \mathbb{N}, n \leq m \implies (n + p \leq m + p) \wedge (n \times p \leq m \times p)$
- 3) $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq n$
- 4) $\forall n, m \in \mathbb{N}, \forall p \in \mathbb{N}^*, n \leq m \implies n \times p \leq m \times p$

Théorème 2.3.

- 1. Toute partie finie de \mathbb{N} admet un plus grand élément.
- 2. Toute partie non vide de \mathbb{N} admet un plus petit élément.
- 3. Toute partie non vide et majorée de \mathbb{N} admet un plus grand élément.
- 4. \mathbb{N} n'admet pas de plus grand élément.

Théorème 2.4. (propriétés de $+$ et \times sur \mathbb{Z})

- (a) $+$ et \times sont associative et commutative sur \mathbb{Z}
- (b) 0 est élément neutre pour $+$ tandis que 1 est neutre pour \times
- (c) Il y a une distributivité de \times sur $+$
- (d) Tout $m \in \mathbb{Z}$ admet un symétrique (élément inverse), $-m \in \mathbb{Z}$ pour $+$

Théorème 2.5. (propriétés de \leq sur \mathbb{Z})

- 1) \leq est une relation d'ordre totale sur \mathbb{Z} .
- 2) Soient $n, m, p \in \mathbb{Z}$
 - (a) $n \leq m \iff n + p \leq m + p$
 - (b) $\forall p \in \mathbb{Z}_+^*, n \leq m \iff np \leq mp$
 - (c) $\forall p \in \mathbb{Z}_-^*, n \leq m \iff mp \leq np$
 - (d) $\forall p \in \mathbb{Z}^*, m = n \iff mp = np$