

# Algebre Lineaire | CM: 2

Par Lorenzo

24 janvier 2025

## Remarques 0.1. .

- Le produit de deux matrices n'est pas commutatif.
- On peut multiplier deux matrices non nulle et obtenir une matrice nulle. Ainsi on dit que l'ensemble  $\mathcal{M}(\mathbb{K})$  possède des diviseurs de zéro.

## 0.1 Partitionnement par blocs

**Définition 0.1.** Les sous matrices permettent un partitionnement par blocs. Soit  $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ , on peut écrire  $A$  sous la forme:

$$A = \left( \begin{array}{c|c|c} A_{1,1} & \cdots & A_{1,p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{q,1} & \cdots & A_{q,p} \end{array} \right)$$

où pour chaque  $i \in \{1, \dots, r\}$ , les matrices  $A_{ik}$  ont le même nombre de lignes pour tout  $k \in \{1, \dots, m\}$ .

## 0.2 Inverse et puissance

**Définition 0.2.** Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ , on note  $A^0 = Id_n$  et pour  $k \in \mathbb{N}^*$ ,  $A^k$  est défini par récurrence par :  $A^k = AA^{k-1}$

### Propriétés 0.1.

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  et  $k \in \mathbb{N}^*$ , alors  $A^k = A \times A \times \cdots \times A$  ( $k$  fois). où le facteur  $A$  intervient  $k$  fois.

**Définition 0.3.** Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ , on dit que  $A$  est inversible s'il existe  $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  tel que  $AB = BA = Id_n$ . Dans ce cas, on note  $B = A^{-1}$ . On note  $\mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$  l'ensemble des matrices inversibles de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

**Remarques 0.2.** La notation  $\mathcal{GL}$  veut dire "Groupe Linéaire" et provient du fait que l'ensemble des matrices inversibles muni de la multiplication des matrices est un groupe.

### Proposition 0.1.

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ , si  $A$  est inversible, il existe une unique matrice  $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  telle que  $AB = BA = Id_n$ . Cette matrice s'appelle l'inverse de  $A$  et est notée  $A^{-1}$ .

**Démonstration 0.1.**

*S'il existe deux matrices  $B$  et  $B'$  telles que  $AB = BA = Id_n = AB' = B'A$  alors  $B' = B'Id_n = B'(AB) = (B'A)B = Id_nB = B$*

□

**Proposition 0.2.**

*Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ , s'il existe une matrice  $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  telle que  $AB = Id_n$ , alors  $A$  est inversible et  $B = A^{-1}$ . Il suffit donc de vérifier le produit d'un seul coté.*

**Proposition 0.3.**

*Soit  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ , si  $AB$  est inversible alors  $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ .*

**Démonstration 0.2.**

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1}A^{-1}) = AId_nA^{-1} = AA^{-1} = Id_n$$

□

**Proposition 0.4.**

*Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ,  $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  possède une unique solution  $X = A^{-1}B$*

**Démonstration 0.3.**

$$AX = B \implies A^{-1}(AX) = A^{-1}B \implies (A^{-1}A)X = A^{-1}B \implies X = A^{-1}B$$

□

**0.3 Système linéaire**

**Définition 0.4.** *Soit  $n, p \in \mathbb{N}^*$ . Un système linéaire de  $n$  équations linéaire à  $p$  inconnues (à coefficients dans  $\mathbb{K}$ ) s'écrit:*

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,p}x_p = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,p}x_p = b_2 \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \cdots + a_{n,p}x_p = b_n \end{cases}$$

*Les coefficients  $a_{i,j}$  et  $b_i$  pour  $i \in \{1, \dots, n\}$  et  $j \in \{1, \dots, p\}$  sont des éléments de  $\mathbb{K}$ . Les coefficients  $x_1, \dots, x_p$  sont les inconnues du système.*

*On appelle solution du système linéaire tout  $p$ -uplet  $(x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{K}^p$  tel que les équations du système sont vérifiées.*

**Définition 0.5.** *Un système linéaire de  $n$  équations à  $n$  inconnues est régulier ou de Cramer, s'il possède une unique solution. Un système linéaire de  $n$  équations linéaires à  $p$  inconnues est dit compatible quand il a au moins une solution.*

**Définition 0.6.** *Deux système linéaire  $(L1)$  et  $(L2)$  à  $p$  inconnues  $x_1, \dots, x_p$  sont équivalents si  $S(L1) = S(L2)$ .*

**Définition 0.7.** *Soit  $n, p \in \mathbb{N}^*$ ,  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  et  $\alpha, \lambda \in \mathbb{K}, \alpha \neq 0$*

1. Notons  $A'$  la matrice obtenue à partir de  $A$  en multipliant par  $\alpha$  la  $q$ ème ligne de  $A$ ,  $q \in \{1, \dots, n\}$ . Les autres lignes restant inchangées.
2. Notons  $A''$  (resp  $A'''$ ) la matrice obtenue à partir de  $A$  en échangeant les lignes  $q$  et  $k$  de  $A$  (resp. en ajoutant à la  $q$ ème ligne de  $A$  le produit de  $\lambda$  de la  $k$ ème ligne de  $A$ ).  $q, k \in \{1, \dots, n\}$ ,  $q \neq k$ ,  $n \geq 2$ , les autres lignes restant inchangées. On dit que les matrices  $A'$ ,  $A''$ ,  $A'''$  se déduisent de  $A$  par opération élémentaire sur les lignes.