

Science Decision | CM: 5

Par Lorenzo

03 octobre 2024

Soit $x \in X$ l'ensemble $\{y \in X \mid xRy\}$ est appelé classe d'équivalence de x notée C_x .

Example 0.1. " $=$ " sur \mathbb{N}

- $\forall a \in \mathbb{N}, a = a$ (*Réflexive*)
 - $\forall a, b \in \mathbb{N}, a = b \implies b = a$ (*Symétrique*)
 - $\forall a, b, c \in \mathbb{N}, a = b \wedge b = c \implies a = c$ (*Transitive*)
- " $=$ " est une relation d'équivalence sur \mathbb{N}
- $$C_2 = \{y \in \mathbb{N}, 2 = y\} = \{2\}$$

$\{C_x \mid x \in X\}$ est l'ensemble quotient de X par R noté X/R .

Proposition 0.1.

Soit R une relation d'équivalence sur X , X/R forme une partition de X , i.e.

- $\forall x, y \in X, C_x \cap C_y = \emptyset$ ou $C_x = C_y$
- $X = \bigcup_{x \in X} C_x$

Démonstration 0.1.

Nous allons montrer que

$$\forall x, y \in X, xRy \implies C_x = C_y$$

$$\forall x, y \in X, \neg xRy \implies C_x \cap C_y = \emptyset$$

Soient $x, y \in X$

so xRy soit $z \in C_x$ alors xRz

□

Remarques 0.1. Pour une relation binaire il est toujours vrai que $\forall x, y \in X, xRy \vee \neg xRy$