Démarche de base en séries temporelles (compléments du Chapitre 1)

Yves Aragon* Université Toulouse 1 Capitole

30 mars 2011

Exercice 1.1 (Opérateur retard) Calculer: (a) $(1-0.9 \,\mathrm{B})1$, (b) $(1-0.9 \,\mathrm{B})t$, (c) $\frac{1}{1-0.9 \,\mathrm{B}}t$, où 1 désigne la fonction constante, et t la fonction

Réponse

– (a) Opérateur retard appliqué à la fonction constante $t \mapsto 1 \,\forall t$,

$$(1-0.9 \,\mathrm{B})1 = 1-0.9 \,\mathrm{B}1 = 1-0.9 = 0.1$$

 et

$$(1 - B)1 = 0$$

tout simplement, l'accroissement d'une fonction constante est nul.

- (b) Opérateur retard appliqué à la fonction $t \mapsto t \ \forall t$

$$(1 - 0.9 \,\mathrm{B})t = t - 0.9 \,\mathrm{B}t = t - 0.9(t - 1) = 0.1t + 0.9$$

et

$$(1 - B)t = t - (t - 1) = 1.$$

- (c) Fraction rationnelle de l'opérateur retard :

$$\frac{1}{1 - 0.9 \,\mathrm{B}} 1 = (1 + 0.9 \,\mathrm{B} + (0.9)^2 \,\mathrm{B}^2 + \cdots) 1 = 1 + 0.9 + (0.9)^2 + \cdots = \frac{1}{1 - 0.9} = 10,$$

$$\frac{1}{1 - 0.9 \,\mathrm{B}} t = (1 + 0.9 \,\mathrm{B} + 0.9^2 \,\mathrm{B}^2 + \dots) t = t + 0.9(t - 1) + 0.9^2(t - 2) + \dots = t + 0.9(t - 2) + 0.9(t - 2) + 0.9(t - 2) + \dots = t + 0.9(t - 2) + 0.9(t - 2) + \dots = t + 0.9(t - 2) + 0.9(t - 2) + \dots = t + 0.9(t - 2) + 0.9(t - 2)$$

^{*}aragon@cict.fr

Exercice 1.2 (SARMA et opérateur retard)

Ecrire le modèle SARMA (1.2) à l'aide de l'opérateur retard.

$$y_t - 50 = 0.9(y_{t-12} - 50) + z_t - 0.7z_{t-1},$$
 (1.2)

où les z_t sont i.i.d. $\mathcal{N}(0,17.5)$.

Réponse. Modèle SARMA (1.2) exprimé à l'aide de l'opérateur retard :

$$y_t - 50 = 0.9 (B^{12}y_t - 50) + z_t - 0.7 Bz_t = 0.9 B^{12}(y_t - 50) + (1 - 0.7 B)z_t$$
 (1.3a)

$$(1 - 0.9 B12)(y_t - 50) = (1 - 0.7 B)z_t$$
 (1.3b)

$$y_t - 50 = \frac{1 - 0.7 \,\mathrm{B}}{1 - 0.9 \,\mathrm{B}^{12}} z_t \tag{1.3c}$$

$$y_t = 50 + \frac{1 - 0.7 \text{ B}}{1 - 0.9 \text{ B}^{12}} z_t.$$
 (1.3d)

Alternativement, comme $(1-0.9~\mathrm{B^{12}})50=0.1\times50=5$, en multipliant les deux côtés de (1.3d) par $1-0.9~\mathrm{B^{12}}$, on obtient :

$$(1 - 0.9 B^{12})y_t = 5 + (1 - 0.7 B)z_t.$$
 (1.4)

Pour obtenir ces différentes écritures du SARMA (1.2) nous avons exploité le fait, noté plus haut, que l'opérateur retard appliqué à une constante donne cette constante. Chacune de ces écritures a ses mérites et il est important de savoir passer de l'une à l'autre en fonction notamment de l'interlocuteur et des outils informatiques qui privilégient l'une ou l'autre.