

Name  $\rightarrow$  Bhavya Bhalla  
Roll No.  $\rightarrow$  102103345  
Batch  $\rightarrow$  3 C012

classmate  
Date \_\_\_\_\_  
Page \_\_\_\_\_

## Parameter Estimation

- 1) Let  $(X_1, X_2, \dots)$  be random sample of size  $n$  taken from normal population with parameter mean  $= \theta_1$  & variance  $= \theta_2$ . Find the maximum likelihood estimates of these two parameters.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$  } Sample of size  $= n$

$$L(X_1, X_2, \dots, X_n) = f(x_1) \cdot f(x_2) \cdot \dots \cdot f(x_n)$$

$$= \left( \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x_1-\mu)^2}{2\sigma^2}} \right) \cdot \left( \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x_2-\mu)^2}{2\sigma^2}} \right) \cdot \dots$$

Taking  $\ln$  on both sides, we get

$$\ln(L) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi\sigma^2) + \sum_{i=1}^n \left( -\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2} \right)$$

Taking derivative w.r.t  $\mu$

$$\frac{\partial \ln(L)}{\partial \mu} = 0 + \sum_{i=1}^n -\frac{(2(x_i - \mu))}{2\sigma^2} = 0$$

$$= \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) = 0$$

$$= n\bar{X} - n\mu = 0$$

$$\bar{X} = \mu$$

Hence  $\theta_1 = \bar{X}$  i.e. sample mean

$$\ln(L) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi\sigma^2) + \sum_{i=1}^n \left( -\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2} \right)$$

Taking derivative w.r.t  $\sigma^2$

$$\frac{\partial \ln(L)}{\partial \sigma^2} = \frac{-n}{\cancel{\sigma^2}} + \sum_{i=1}^n \frac{-(x_i - \mu)^2}{\cancel{\sigma^2}} = 0$$

$$-n + \sum_{i=1}^n \frac{-(x_i - \mu)^2}{\sigma^2} = 0$$

$$n = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{\sigma^2}$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

$$\text{Hence } \sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

- 2) Let  $X_1, X_2, \dots, X_n$  be random sample from  $B(m, \theta)$  distribution where  $\theta \in \Theta = (0, 1)$  is unknown & 'm' is +ve integer. Compute value of  $\theta$  using M.L.E. Binomial Distribution  $\rightarrow n_C^{x_i} \theta^{x_i} (1-\theta)^{n-x_i}$

$$L = \prod_{i=1}^n n_C^{x_i} \theta^{x_i} (1-\theta)^{n-x_i}$$

log on both sides

$$\log L = \sum_{i=1}^n \left( \log \left( n_C^{x_i} \right) + \log \theta^{x_i} + \log (1-\theta)^{n-x_i} \right)$$

$$\log L = \sum_{i=1}^n \log \left( n_C^{x_i} \right) + \log \theta \sum_{i=1}^n x_i + \log (1-\theta) \sum_{i=1}^n (n-x_i)$$

Differentiate w.r.t  $\theta$

$$\frac{d \log(L)}{d\theta} = 0$$

$$\frac{1}{\theta} \sum x_i - \frac{1}{1-\theta} \sum (n-x_i) = 0$$

$$\frac{1}{\theta} \sum x_i - \frac{n^2}{1-\theta} + \frac{1}{1-\theta} \sum x_i = 0$$

$$\frac{1}{\theta(1-\theta)} \sum x_i = \frac{n^2}{1-\theta}$$

$$\frac{\sum x_i}{\theta} = n^2$$

$$\boxed{\theta = \frac{\sum x_i}{n^2}} \quad \underline{\text{Ans}}$$