

CALCUL NUMERIC - SUBIECTE EXAMEN

1. Fie ecuația:

$$x^3 - 4x + 1 = 0 \quad (1)$$

- a) Să se afle intervalele de monotonie ale funcției $f(x) = x^3 - 4x + 1$.
- b) Să se afle un interval care să conțină o singură soluție pozitivă a ecuației.
- c) Să se calculeze x_0, x_1, x_2 , folosind metoda bisecției. Să se afle erorile relative conform formulei: $e_r = \frac{|x_k - x_{k-1}|}{|x_{k-1}|}, k = 1, 2$.

2. Fie ecuația:

$$x^2 + 2x - 1 = 0, \quad x \in [0.1, 2] \quad (2)$$

- a) Să se deducă conform metodei Newton-Raphson formula de calcul al elementului x_k din șirul aproximărilor $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$. Să se enunțe teorema de convergență Newton-Raphson.
- b) Să se studieze dacă sunt satisfăcute ipotezele teoremei de convergență în cazul ecuației (2) și să se aleagă $x_0 \in [0.1, 2]$, astfel încât să fie asigurat convergența metodei N-R.
- c) Să se calculeze x_1, x_2 și erorile relative conform formulei: $e_r = \frac{|x_k - x_{k-1}|}{|x_{k-1}|}$.

3. Să se rezolve conform metodelor Gauss fără pivotare, cu pivotare parțială și cu pivotare totală următoarele sisteme:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 = -5 \\ 2x_1 - 2x_2 = -6 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 5 \end{cases} \quad \begin{cases} 2x_1 - 2x_2 + x_3 = -3 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 1 \\ 3x_1 - x_2 - x_3 = 2 \end{cases} \quad (3)$$

4. Fie $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 8 & 5 \\ -4 & 0 & 10 \end{pmatrix}$

- a) Să se determine matricele L, U conform metodei de factorizare LU , folosind pe rând metodele de eliminare Gauss.
- b) Să se rezolve sistemul $Ax = b, b = (5, 18, 20)^T$ folosind factorizarea LU .

5. Fie $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 3 \\ 4 & 3 & 14 \end{pmatrix}$

- a) Să se verifice dacă A este simetrică și pozitiv definită.
- b) În caz afirmativ, să se determine factorizarea Cholesky.
- c) Să se rezolve sistemul $Ax = b, b = (10, 6, 11)^T$, folosind descompunerea LL^T .

6. Să se afle valorile proprii aproximative conform metodei Jacobi pentru matricea $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$

Pentru rezolvarea exercițiului se vor calcula doar două iterații. Pentru înmulțirea matricilor, puteți folosi calculul matricial prevăzut în Python.

7. Determinați teoretic polinomul de interpolare Lagrange, $P_2(x)$, asociat funcției f și nodurilor de interpolare x_1, x_2, x_3 conform :

- a) Metodei directă
- b) Metodei Lagrange
- c) Metodei Newton
- d) Metodei Newto cu DD

8. Să se afle polinomul de interpolare Lagrange $P_2(x)$ al funcției $f(x)$, conform metodelor Lagrange și Newton cu diferențe divizate, relativ la diviziunea $x = (x_1, x_2, x_3)$.

- a) $f(x) = \ln x, x = (1, e, e^2)$
- b) $f(x) = \sin(\frac{\pi x}{2}), x = (-1, 0, 1)$

9. Să se arate că polinomul Lagrange care interpoalează datele $(-2, 1), (-1, 4), (0, 11), (1, 16), (2, 13), (3, -4)$ este de gradul 3. Se va folosi metoda Newton DD.

10. Fie $P_3(x)$ polinomul de interpolare Lagrange asociat setului de date $(0, 0), (0.5, y), (1, 3), (2, 2)$. Să se afle y știind că, coeficientul lui x^3 în reprezentarea polinomului $P_3(x)$ este 6. Pentru reprezentarea polinomului $P_3(x)$ se va folosi metoda Lagrange.

11. Următorul tabel se referă la polinomul de grad necunoscut, $P_n(x)$

x	0	1	2
$P_n(x)$	2	-1	4

Să se determine coeficientul lui x^2 în reprezentarea $P_n(x)$ dacă toate diferențele divizate de ordinul 3 sunt 1.

12. Fiind dat tabelul diferențelor divizate

x_i	DD ordin 0	DD ordin 1	DD ordin 2
$x_1 = 0$	$f[x_1] = f(x_1)$		
$x_2 = 0, 4$	$f[x_2] = f(x_2)$	$f[x_1, x_2]$	
$x_3 = 0, 7$	$f[x_3] = f(x_3) = 6$	$f[x_2, x_3] = 10$	$f[x_1, x_2, x_3] = \frac{50}{7}$

să se scrie polinomul $P_2(x)$.

13. a) Să se scrie definiția funcției de interpolare liniară.
 b) Să se afle funcția de interpolare spline liniară S pentru funcția $f(x) = \ln x$ relativ la diviziunea $(1, e, e^2)$.
14. a) Să se scrie definiția funcției de interpolare pătratică.
 b) Să se afle funcția de interpolare spline pătratică S pentru funcția $f(x) = \ln x$ relativ la diviziunea $(1, e, e^2)$.
15. Fie f definită pe intervalul $[a, b]$ și datele $a = x_1 < x_2 < x_3 = b$. Funcția spline pătratică restricționată pe fiecare interval în parte reprezintă un polinom de gradul doi; $S_1(x) = a_1 + b_1(x - x_1) + c_1(x - x_1)^2$, $x \in [x_1, x_2)$, $S_2(x) = a_2 + b_2(x - x_2) + c_2(x - x_2)^2$, $x \in [x_2, x_3]$. Să se afle coeficienții $a_1, a_2, b_1, b_2, c_1, c_2$, dacă $S'(x_1) = f'(x_1)$.
16. Să se scrie definiția funcției de interpolare spline cubică. Să se determine funcția spline cubică naturală S care interpolează datele:
- a) $f(0) = 0, f(1) = 1, f(2) = 2$.
 b) $f(1) = 2, f(2) = 3, f(3) = 5$.
17. Să se determine funcția spline cubică cu constrângeri S care interpolează datele:
- a) $(1, 2), (2, 3), (3, 5), S'(1) = 2, S'(3) = 1$.
 b) $(0, 0), (1, 1), (2, 2), S'(0) = 1, S'(2) = 1$.

(Formulele de calcul pentru coeficienții a_j, b_j, c_j, d_j , vor fi date în foaia de examen)

Să se verifice că funcția spline cubică S calculată la punctele a) și b) satisface condițiile definiției unei funcții spline cubice.

18. Să se determine coeficienții B, C, D , astfel încât funcția

$$S(x) = \begin{cases} S_1(x) = 1 + 2x - x^3, x \in [0, 1) \\ S_2(x) = 2 + B(x - 1) + C(x - 1)^2 + D(x - 1)^3, x \in [1, 2] \end{cases}$$

să reprezinte o funcție spline naturală (i.e. $S''(a) = S''(b) = 0$, a, b fiind capetele intervalului de interpolare).

19. Fie funcția $S(x)$ o funcție spline cubică cu constrângeri la capete (i.e. $S'(a) = f'(a), S'(b) = f'(b)$, unde a, b sunt capetele intervalului de interpolare):

$$S(x) = \begin{cases} S_1(x) = 3(x - 1) + 2(x - 1)^2 - (x - 1)^3, x \in [1, 2) \\ S_2(x) = A + B(x - 2) + C(x - 2)^2 + D(x - 2)^3, x \in [2, 3] \end{cases}$$

Să se afle A, B, C, D , dacă $f'(1) = f'(3)$.

20. O funcție spline cubică cu constrângeri este definită prin

$$S(x) = \begin{cases} S_1(x) = 1 + Bx + 2x^2 - 2x^3, x \in [0, 1) \\ S_2(x) = 1 + b(x - 1) - 4(x - 1)^2 + 7(x - 1)^3, x \in [1, 2] \end{cases}$$

Să se afle $f'(0)$ și $f'(2)$.

21. O funcție spline cubică naturală este definită prin

$$S(x) = \begin{cases} S_1(x) = 1 + B(x-1) - D(x-1)^3, x \in [1, 2) \\ S_2(x) = 1 + b(x-2) - \frac{3}{4}(x-2)^2 + d(x-2)^3, x \in [2, 3] \end{cases}$$

Să se afle B, D, b, d , știind că S interpolează datele $(1, 1), (2, 1)$ și $(3, 0)$.

22. Să se deducă o formulă de aproximare a derivatei $f'(x)$ care folosește termenii $f(x-h), f(x+h), f(x+2h), f(x+3h)$. Care este ordinul de aproximare a formulei obținute? Ind.: Se scrie pentru fiecare termen dezvoltarea în serie Taylor până la ordinul 4. Se consideră combinația $Af(x-h) + Bf(x+h) + Cf(x+2h) + Df(x+3h)$ și se scriu 4 relații în raport cu A, B, C, D astfel încât coeficienții de pe lângă $f''(x), f'''(x), f^{(IV)}(x)$ să se anuleze, iar coeficientul termenului $f'(x)$ să fie egal cu 1. Se rezolvă sistemul în A, B, C, D și se extrage expresia derivatei $f'(x)$.
23. Să se deducă o formulă care aproximează $f'''(x)$ cu eroarea de aproximare $\mathcal{O}(h^2)$. Ind.: Se rezolvă similar cu exercițiul anterior.
24. Presupunem că $\varphi(h)$ este aproximarea derivatei $f'(x_0)$ de ordinul $\mathcal{O}(h)$ și $f'(x_0) = \varphi(h) + a_1h + a_2h^2 + a_3h^3 + \dots$, unde a_1, a_2, a_3 sunt constante. Să se folosească valorile $\varphi(h), \varphi(h/3), \varphi(h/9)$ pentru a se construi o formulă de aproximare de ordinul $\mathcal{O}(h^3)$.
25. Dacă se aplică formula trapezului calcului integralei $\int_0^2 f(x)dx$ se obține valoarea 5, iar dacă se aplică formula dreptunghiului, se obține 4. Ce valoare va da formula Simpson pentru calculul integralei.
26. Formula trapezului aplicată $\int_0^2 f(x)dx$ dă valoarea 4, iar formula lui Simpson dă valoarea 2. Care este valoarea $f(1)$.
27. Fiind date $f(0) = 1, f(0.5) = 2.5, f(1) = 2, f(0.25) = f(0.75) = \alpha$. Să se afle α dacă, folosind formula trapezului sumată cu $m = 4$, se obține $\int_0^1 f(x)dx \approx 1.75$.