

Appunti analisi 1

Biagio Altruda Mastrorilli

November 6, 2024

Introduzione assiomatica dei *numeri reali*

Esiste un insieme $\mathbb{R}$, munito di due leggi di composizione interna, il $+$ e il $\cdot$

$$+ : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

e di una relazione d'ordine $\leq$, che verificano assiomi algebrici, assiomi di ordinamento e l'assioma di completezza.

Assiomi Algebrici di $\mathbb{R}$

1. $\forall a, b \in \mathbb{R} : a + b = b + a$. (Commutatività della somma)
2. $\forall a, b, c \in \mathbb{R} : (a + b) + c = a + (b + c)$ (Associatività della somma)
3. $\exists 0 \in \mathbb{R}, \forall a \in \mathbb{R} : a + 0 = a$ (Esistenza di un elemento neutro della somma)
4. $\forall a \in \mathbb{R} \exists a' \in \mathbb{R} : a + a' = 0$ (Esistenza di un opposto)
5. $\forall a, b \in \mathbb{R} : a \cdot b = b \cdot a$ (Commutatività del prodotto)
6. $\forall a, b, c \in \mathbb{R} : (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ (Associatività del prodotto)
7. $\exists 1 \in \mathbb{R}, 1 \neq 0$ tale che $\forall a \in \mathbb{R} : a \cdot 1 = a$ (Esistenza di un elemento neutro del prodotto)
8. $\forall a \in \mathbb{R}, a \neq 0, \exists a'' \in \mathbb{R}$ tale che $a \cdot a'' = 1$ (Esistenza di un reciproco)
9. $\forall a, b, c \in \mathbb{R} : (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$ (Proprietà distributiva)

Osservazioni:

1. Si dimostra che esiste un unico elemento neutro per il $+$ ed esiste un solo elemento neutro per $\cdot$. Tali elementi si chiamano rispettivamente lo zero di $\mathbb{R}$ e l'unità di $\mathbb{R}$. Infatti per l'assioma 3) $\exists 0, 0 \in \mathbb{R} : \forall a \in \mathbb{R} : a + 0 = a$, se $\exists 0' \in \mathbb{R} : \forall a \in \mathbb{R} : a + 0' = a$, allora avremmo che $0' = 0 + 0' = 0$ ovvero $0 = 0'$. Analogamente per l'assioma 7) $\exists 1 \in \mathbb{R}, 1 \neq 0 : \forall a \in \mathbb{R}, a \cdot 1 = a$. Se fosse che $\exists 1', 1' \neq 0$ tale che $\forall a \in \mathbb{R}, a \cdot 1' = a$, allora $1' = 1 \cdot 1' = 1$. ■ Tale elemento si chiama l'uno di $\mathbb{R}$.

2. Si dimostra che se esiste un opposto di un numero reale, questo è unico. Ovvero per l'assioma 4) $\forall a \in \mathbb{R}, \exists a' \in \mathbb{R} : a + a' = 0$, tale a' è unico e si chiama l'opposto di a e si denota con $-a$. *Dimostrarlo*. Analogamente si verifica che esiste, ed è unico, il reciproco di un numero reale, ossia per l'assioma 8) $\forall a \in \mathbb{R}, a \neq 0, \exists a''$ tale che $a \cdot a'' = 1$. Tale a'' è unico e si chiama il reciproco di a , si denota con a^{-1} oppure $\frac{1}{a}$. *Dimostrarlo*.
3. In matematica si introducono le seguenti notazioni: se $a, b \in \mathbb{R}, a - b = a + (-b)$, se $a, b \in \mathbb{R}, b \neq 0, \frac{a}{b} = a \cdot b^{-1}$. **Assiomi di ordinamento di $\mathbb{R}$** $\leq$ è una relazione d'ordine su $\mathbb{R}$ compatibile con la struttura algebrica, ossia $\leq$ verifica i seguenti assiomi di ordinamento:
 4. $\forall a \in \mathbb{R} : a \leq a$ (Riflessibilità)
 5. $\forall a, b \in \mathbb{R}, a \leq b, b \leq a : a = b$ (Antisimmetria)
 6. $\forall a, b, c \in \mathbb{R}, a \leq b \leq c : a \leq c$ (Transitività)
 7. $\forall a, b \in \mathbb{R} : a \leq b$ oppure $b \leq a$. (L'ordine è totale)
 8. $\forall a, b, c \in \mathbb{R}, a \leq b : a + c \leq b + c$ (Compatibilità della $\leq$ con la $+$)
 9. $\forall a, b, c \in \mathbb{R}, a \leq b, 0 \leq c : a \cdot c \leq b \cdot c$ (Compatibilità della $\leq$ con $\cdot$)

Definizione: Gli elementi di $\mathbb{R}$ si chiamano numeri reali. I numeri reali $a \in \mathbb{R}$ tali che $0 \leq a$ si dicono non negativi. I numeri reali $a \in \mathbb{R}$ tali che $a \leq 0$ si dicono non positivi. I numeri reali non negativi e diversi da 0 si dicono positivi. I numeri reali non positivi e diversi da 0 si dicono negativi.

Notazione: Se $a \in \mathbb{R}, 0 \leq a, a \neq 0$ scriveremo $0 < a$. Se $a \in \mathbb{R}, a \leq 0, a \neq 0$ scriveremo $a < 0$.

Proposizione: $\forall a \in \mathbb{R}$ si ha che $a \cdot 0 = 0$. *Dimostrazione:* Sia $a \in \mathbb{R}$. Risulta che $a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$, da cui $a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$. Sommo ad entrambi i termini dell'uguaglianza l'opposto di $a \cdot 0$, e quindi:

$$-a \cdot 0 + a \cdot 0 = -a \cdot 0 + (a \cdot 0 + a \cdot 0) \implies$$

$$0 = -a \cdot 0 + a \cdot 0 + a \cdot 0 = 0 + a \cdot 0 = a \cdot 0$$

Proprietà (Legge dell'annullamento del prodotto): Se $a, b \in \mathbb{R}$, tali che $a \cdot b = 0$ allora $a = 0$ oppure $b = 0$.

Dimostrazione Siano $a, b \in \mathbb{R}$ tali che $a \cdot b = 0$. Supponiamo che $a \neq 0$, allora per l'assioma algebrico 8) esiste $a^{-1} \in \mathbb{R}$, tale che $a^{-1} \cdot a = 1$. Segue allora che

$$a \cdot b = 0 \implies a^{-1} \cdot (a \cdot b) = a^{-1} \cdot 0 = 0$$

$$b = 1 \cdot b = a^{-1} \cdot (a \cdot b) = a^{-1} \cdot 0$$

Analogamente se $b \neq 0$ si procede con lo stesso argomento arrivando a $a = 0$. ■

Osservazione:

1. Se $a \in \mathbb{R}, a \leq 0$, allora, $-a \leq 0$. Infatti se $0 \leq a$, sommando ad entrambi i termini della disequazione per $-a$, risulta che $-a+0 \leq -a+a$ ovvero $-a \leq 0$.
2. Se $a, b \in \mathbb{R}, a \leq b$, allora $0 \leq b-a$.
3. Se $a, b \in \mathbb{R}, a \leq b$, se $c \in \mathbb{R}, c \leq 0$ allora $b \cdot c \leq a \cdot c$.
4. $\forall a \in \mathbb{R} 0 \leq a \cdot a = a^2$. Segue che $0 \leq 1 \cdot 1 = 1$.

Definizione: Siano $A, B \subset \mathbb{R}, A \neq \emptyset, B \neq \emptyset$, si dice che A e B sono separati se $\forall a \in A, \forall b \in B: a \leq b$.

Assioma di Dedekind (Assioma di completezza): $\forall A, B \subset \mathbb{R}, A \neq \emptyset, B \neq \emptyset$, separati, $\exists c \in \mathbb{R}$ tale che $\forall a \in A, \forall b \in B: a \leq c \leq b$.

Definizione: c si dice elemento di separazione tra A e B .

Definizione: Se $A, B \subset \mathbb{R}, A \neq \emptyset, B \neq \emptyset$, separati, si dice che A e B sono contigui se esiste un unico elemento di separazione tra A e B .

Definizione: $\mathbb{R}$ munito delle leggi di composizione, della somma e del prodotto e della relazione di totale ordine $\leq$, che verificano gli assiomi algebrici, di ordinamento e di completezza si chiama insieme dei numeri reali. Si dice che $\mathbb{R}$ è un corpo commutativo totalmente ordinato, completo.

Definizione: Sia $x \in \mathbb{R}$. Poniamo

$$|x| := \begin{cases} x & \text{se } 0 \leq x \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Il numero reale $|x|$ si chiama valore assoluto, o modulo, di x .

Proposizione: Per ogni $x, y \in \mathbb{R}$ si ha:

1. $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
2. $0 \leq |x|$
3. $|-x| = |x|$
4. $|x| \leq y \Leftrightarrow -y \leq x \leq y$
5. $|x+y| \leq |x| + |y|$ (Disuguaglianza triangolare)
6. $||x| - |y|| \leq |x - y|$
7. $|xy| = |x||y|$
8. Se $x \neq 0$, si ha $|x^{-1}| = |x|^{-1}$ *Dimostrazione:* 4) $x, y \in \mathbb{R}, 0 \leq y, |x| \leq y$. Se $0 \leq x$, si ha che $x \leq y$. E inoltre $-y \leq 0 \leq |x| = x \leq y$. Se $x \leq 0$, si ha che $-x = |x| \leq y \implies -y \leq x \leq 0 \leq y$. Risulta che $-y \leq x \leq y$. Analogamente si dimostra che se $-y < x < y$ allora $|x| \leq y$. 5) Siano $x, y \in \mathbb{R}$, vogliamo provare che:

$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

Infatti si ha che $-|x| \leq x \leq |x|$ e anche $-|y| \leq y \leq |y|$. Sommo termine a termine, ottenendo:

$$-|x| - |y| \leq x + y \leq |x| + |y|$$

Ossia

$$-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|$$

Ma per la proprietà 4) si ha che

$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

6) Siano $x, y \in \mathbb{R}$. Vogliamo provare che

$$||x| - |y|| \leq |x - y|$$

Infatti si ha che

$$|x| = |x - y + y| \leq |x - y| + |y|$$

da cui

$$|x| - |y| \leq |x - y|$$

Inoltre

$$|y| = |y - x + x| \leq |y - x| + |x|$$

cioè $|y| \leq |x - y| + |x|$. Da cui

$$|y| - |x| \leq |x - y| \text{ ossia } -|x - y| \leq |x| - |y|$$

Segue che

$$-|x - y| \leq |x| - |y| \leq |x - y|$$

Concludendo con

$$||x| - |y|| \leq |x - y|$$

Definizione (Distanza): Sia E un insieme non vuoto, Si chiama metrica su E o distanza su E una funzione

$$d : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$$

che verifica le seguenti proprietà:

1. $\forall x, y \in E : 0 \leq d(x, y)$
2. $\forall x, y \in E : d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
3. $\forall x, y \in E : d(x, y) = d(y, x)$
4. $\forall x, y, z \in E : d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ (Disuguaglianza triangolare)

Definizione: Un insieme E munito di una distanza d si dice spazio metrico

Proposizione: $\forall x, y \in \mathbb{R} : d(x, y) := |x - y|$. Allora d è una distanza su $\mathbb{R}$ (la distanza euclidea).

Dimostrazione: Siano $x, y \in \mathbb{R}$. Risulta che $0 \leq d(x, y) = |x - y|$. Se $x, y \in \mathbb{R}$, $d(x, y) = 0 \implies |x - y| = 0 \Leftrightarrow x = y$. Se $x, y \in \mathbb{R}$, $d(x, y) = |x - y| = |y - x| = d(y, x)$. Se $x, y, z \in \mathbb{R} : d(x, z) = |x - z| = |x - y + y - z| \leq |x - y| + |y - z| = d(x, y) + d(y, z)$. ■

Definizione: La distanza $d(x, y) = |x - y|$ si dice distanza euclidea. L'insieme $\mathbb{R}$ si dice spazio metrico euclideo.

Osservazione (Interpretazione geometrica di $\mathbb{R}$): $\mathbb{R}$ è in corrispondenza biunivoca con la retta euclidea.

Definizione: Sia $A \subset \mathbb{R}$. Diremo che $b \in \mathbb{R}$ è un maggiorante per l'insieme A se:

$$\forall a \in A : a \leq b.$$

Denoteremo con il simbolo $\mathcal{M}_A$ l'insieme dei maggioranti per A .

Definizione: Sia $A \subset \mathbb{R}$. Diremo che $b \in \mathbb{R}$ è un minorante per A se:

$$\forall a \in A : b \leq a.$$

Denoteremo con il simbolo μ_A , l'insieme dei minoranti per A

Definizione: Sia $A \subset \mathbb{R}$. Si dice A è limitato superiormente se: $\mathcal{M}_A \neq \emptyset$. Si dice che A è limitato inferiormente se $\mu_A \neq \emptyset$. Si dice che A è limitato se è limitato sia superiormente sia inferiormente.

Definizione: Sia $A \subset \mathbb{R}$. Si dice che $M \in \mathbb{R}$ è un massimo per A se:

$$M \in A \cap \mathcal{M}_A,$$

ossia

$$\begin{cases} M \in A \\ \forall a \in A : a \leq M \end{cases}$$

Definizione: Sia $A \subset \mathbb{R}$. Si dice che $m \in \mathbb{R}$ è un minimo per A se:

$$m \in A \cap \mu_A,$$

ossia

$$\begin{cases} m \in A \\ \forall a \in A : m \leq a \end{cases}$$

Proposizione: Sia $A \subset \mathbb{R}$ se esiste un massimo per A , allora esso è unico. Se esiste un minimo per A , allora esso è unico. *Dimostrazione:* Siano $M_1, M_2 \in \mathbb{R}$ massimi per A . Allora risulta che

$$\begin{cases} M_1 \in A \\ \forall a \in A : a \leq M_1 \end{cases} \quad \text{e anche} \quad \begin{cases} M_2 \in A \\ \forall a \in A : a \leq M_2 \end{cases}$$

Essendo $M_1 \in A$, si ha che $M_1 \leq M_2$ ma anche $M_2 \in A$ quindi $M_2 \leq M_1$. Allora essendo $\leq$ una relazione d'ordine si ha che $M_1 = M_2$. Analogamente si mostra l'unicità del minimo. ■

Notazione: Sia $A \subset \mathbb{R}$ e sia $M \in A$ un massimo per A , denoteremo M con il simbolo $\max A$. Se esiste il minimo di A , lo denoteremo con $\min A$.

Proposizione: Sia $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, e, $B \subset \mathbb{R}$, $B \neq \emptyset$. Supponiamo che $A \subset B$ e che esistano il minimo sia di A , ξ_1 e il minimo di B , ξ_2 . Allora $\xi_2 \leq \xi_1$. Inoltre se $\exists \max A = \eta_1$ e $\exists \max B = \eta_2$, si ha che $\eta_1 \leq \eta_2$.

Dimostrazione: Per ipotesi $\exists \min A = \xi_1$ e $\exists \min B = \xi_2$, ossia

$$\xi_1 \in A \cap \mu_A \quad \xi_2 \in B \cap \mu_B$$

Vogliamo provare che $\xi_2 \leq \xi_1$. Poiché $A \subset B$ si ha che

$$\mu_B \subset \mu_A.$$

Segue che, $\xi_2 \in B \cap \mu_B$, ma $\mu_B \subset \mu_A$, e quindi $\xi_2 \in \mu_A$, ed essendo $\xi_1 \in A$, allora $\xi_2 \leq \xi_1$. Analogamente, se esistono il $\max A = \eta_1$ ed il $\max B = \eta_2$, si prova che $\eta_1 \leq \eta_2$. ■

Teorema (Teorema di esistenza dell'estremo superiore): Sia $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$. Supponiamo che $\mathcal{M}_A \neq \emptyset$. Allora esiste il $\min \mathcal{M}_A \in \mathbb{R}$.

Dimostrazione: Per ipotesi $A \neq \emptyset$ e $\mathcal{M}_A \neq \emptyset$, tali insiemi A e $\mathcal{M}_A$ sono separati, ossia: $\forall a \in A, \forall b \in \mathcal{M}_A : a \leq b$. Per l'assioma di completezza di Dedekind:

$$\exists c \in \mathbb{R} \text{ tale che } \forall a \in A, \forall b \in \mathcal{M}_A : a \leq c \leq b.$$

Proviamo che $c = \min \mathcal{M}_A$. Poiché $\forall a \in A, a \leq c$ risulta che $c \in \mathcal{M}_A$. Inoltre $\forall b \in \mathcal{M}_A, c \leq b$ risulta che $c \in \mu_{\mathcal{M}_A}$. Segue che $c \in \mathcal{M}_A \cap \mu_{\mathcal{M}_A}$ da cui $c = \min \mathcal{M}_A$. ■

Definizione: Sia $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, $\mathcal{M}_A \neq \emptyset$. Si chiama estremo superiore di A il numero reale $\min \mathcal{M}_A$, tale numero si denota con il simbolo $\sup A$. Se $A \neq \emptyset$ e $\mathcal{M}_A = \emptyset$ si scrive $\sup A = +\infty$.

Analogamente *Teorema* (Teorema di esistenza dell'estremo inferiore): Sia $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, supponiamo che $\mu_A \neq \emptyset$. Allora esiste $\max \mu_A \in \mathbb{R}$.

Definizione: Sia $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, $\mu_A \neq \emptyset$. Si chiama estremo inferiore di A il numero reale $\max \mu_A$, tale numero si denota con il simbolo $\inf A$. Se $A \neq \emptyset$ e $\mu_A = \emptyset$ si scrive $\inf A = -\infty$.

Esempio: 1. $A = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 1\}$. $\mathcal{M}_A = \{b \in \mathbb{R} \mid \forall x \in A : x \leq b\} = \{b \in \mathbb{R} \mid 1 \leq b\}$. $A \cap \mathcal{M}_A = \{1\} = \max A$.

1.

$B = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 1\}$. $\mathcal{M}_B = \{b \in \mathbb{R} \mid b \geq 1\}$ $B \cap \mathcal{M}_B = \emptyset$. B non ammette massimo. Per il teorema dell'estremo superiore, il $\sup B = \min \mathcal{M}_B$ esiste comunque. Risulta che $\mu_{\mathcal{M}_B} = \{y \in \mathbb{R} \mid y \leq 1\}$ da cui segue che $\mathcal{M}_B \cap \mu_{\mathcal{M}_B} = \{1\} = \sup B$.

Proposizione: Sia $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$. Supponiamo che $\mu_A \neq \emptyset$ e $\mathcal{M}_A \neq \emptyset$. Allora risulta che $\inf A \leq \sup A$. Inoltre $\inf A = \sup A \Leftrightarrow A$ ha un solo elemento.

Dimostrazione: Osserviamo che $\forall a \in A$:

$$\inf A \leq a \leq \sup A.$$

da cui $\inf A \leq \sup A$. Inoltre $\inf A = \sup A \Leftrightarrow A = \{a\}$, $a = \inf A = \sup A$.

Proposizione: Siano $A, B \subset \mathbb{R}$, $A, B \neq \emptyset$. Supponiamo che esistano $\inf$ e $\sup$ sia di A che di B . Se $A \subset B$, allora

$$\sup A \leq \sup B$$

$$\inf B \leq \inf A$$

Dimostrazione: Vogliamo dimostrare che $\sup A \leq \sup B$ ossia

$$\min \mathcal{M}_A \leq \min \mathcal{M}_B$$

dato che $A \subset B$, si ha che $\mathcal{M}_B \subset \mathcal{M}_A$. Applicando la ((proposizione)) riguardante il minimo di insiemi si ha che $\min \mathcal{M}_A \leq \min \mathcal{M}_B$ e quindi $\sup A \leq \sup B$. Analogamente per gli estremi inferiori: $\mathcal{M}_B \subset \mathcal{M}_A$, applicando la stessa proposizione si ha che $\max \mu_B \leq \max \mu_A$ cioè $\inf B \leq \inf A$.

Proposizione: Sia $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$. Supponiamo che $\exists \max A \in \mathbb{R}$, allora $\max A = \sup A$. Analogamente se $\exists \min A \in \mathbb{R}$, allora $\min A = \inf A$. *Dimostrazione:* Supponiamo che $\exists \max A = M \in \mathbb{R}$ allora $M \in A \cap \mathcal{M}_A$. Voglio verificare che M è il $\sup A$. Sia $y \in \mathcal{M}_A$. Dato che $M \in A$ si ha che $M \leq y$, segue che M è il più piccolo dei maggioranti di A ■. Analogo per l'estremo inferiore.

Caratterizzazioni dell'estremo superiore e inferiore *Proposizione:* Sia $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, $\mathcal{M}_A \neq \emptyset$, Sono fatti equivalenti:

1. $\xi = \sup A$
2. *i)* $\forall a \in A : a \leq \xi \in \mathbb{R}$ *ii)* $\forall y \in \mathbb{R}, y < \xi : \exists a \in A$ tale che $y < a$.

Dimostrazione: Proviamo che 1) $\implies$ 2). Per ipotesi $\xi = \sup A \in \mathbb{R}$. Segue che $\xi = \min \mathcal{M}_A$ per definizione di estremo superiore, ossia $\xi \in \mathcal{M}_A \cap \mu_{\mathcal{M}_A}$, ottenendo $\xi \in \mathcal{M}_A$. Otteniamo così il punto *i)* Sia $y \in \mathbb{R}, y < \xi$. Essendo ξ il più piccolo dei maggioranti di A , si ha che $y \notin \mathcal{M}_A$. Pertanto $\exists a \in A$ tale che $y < a$. Proviamo che 2) $\implies$ 1). Per ipotesi valgono *i)* e *ii)*. Dalla *i)* segue che $\xi \in \mathcal{M}_A$. Devo verificare che $\xi \in \mu_{\mathcal{M}_A}$. Se $y \in \mathcal{M}_A$ risulta che $\xi \leq y$. Se fosse $y < \xi$ per la *ii)* $\exists a \in A : y < a$ da cui $y \notin \mathcal{M}_A$ che è assurdo. Segue che $\xi \in \mathcal{M}_A \cap \mu_{\mathcal{M}_A}$ da cui $\xi = \min \mathcal{M}_A = \sup A$

Proposizione: Sia $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, $\mu_A \neq \emptyset$. Sono fatti equivalenti:

1. $\eta = \inf A$
2. *i)* $\forall a \in A, \eta \leq a, \eta \in \mathbb{R}$ *ii)* $\forall y \in \mathbb{R} : \eta < y : \exists a \in A$ tale che $a < y$.

Corollario (della caratterizzazione di $\sup$): Sia $A \subset \mathbb{R}$, $\mathcal{M}_A \neq \emptyset$. Sono fatti equivalenti:

1. $\xi = \sup A$.
2. *i)* $\forall a \in A : a \leq \xi \in \mathbb{R}$ *ii)* $\forall \varepsilon > 0, \exists a \in A$ tale che $\xi - \varepsilon < a$. *Dimostrazione:* Supponiamo vera 1) e dimostriamo 2). Per la caratterizzazione dell'estremo superiore di A risulta vera la *i)*. Sia $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$.

Poniamo $y = \xi - \varepsilon$. Risulta che $y < \xi$, per la *ii*) della caratterizzazione dell'estremo superiore $\exists a \in A : y < a$. Da cui segue che $\xi - \varepsilon < a$ ■. Supponiamo vera 2) e dimostriamo 1). Per la caratterizzazione dell'estremo superiore, basta provare che $\forall y \in \mathbb{R}, y < \xi, \exists a \in A : y < a$. Sia allora $y \in \mathbb{R}, y < \xi$. Poniamo $\varepsilon := \xi - y, \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. Per la *ii*) si ha che $\exists a \in A$ tale che $\xi - \varepsilon < a$. Concludiamo che $y = \xi - \varepsilon \implies y < a$ ■.

Corollario (della caratterizzazione di estremo inferiore): Sia $A \subset \mathbb{R}, \mu_A \neq \emptyset$. Sono fatti equivalenti:

1. $\eta = \inf A$.
2. *i*) $\forall a \in A : \eta \leq a, \eta \in \mathbb{R}$ *ii*) $\forall \varepsilon > 0, \exists a \in A$ tale che $a < \eta + \varepsilon$.

Proposizione (La dimostrazione è sul Buttazzo): Siano $A, B \subset \mathbb{R}, A, B \neq \emptyset, A, B$ separati. Sono fatti equivalenti:

1. A, B sono contigui, cioè $\exists! c \in \mathbb{R}$ tale che $\forall a \in A, \forall b \in B : a \leq c \leq b$.
2. $\sup A = \inf B$.

Osservazione: $A = \{x \in \mathbb{R} | x < 1\}, B = \{x \in \mathbb{R} | x > 1\}$. Vale che $\sup A = \inf B$ e sono contigui.

Proposizione: Siano $X, Y \subset \mathbb{R}, X \neq \emptyset, Y \neq \emptyset, X, Y$ separati. Sono fatti equivalenti:

1. X, Y sono contigui.
2. $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in X, \exists y \in Y$ tali che $y - x < \varepsilon$.

Dimostrazione: dimostriamo che 1) $\implies$ 2). Si ha che $\sup X = \inf Y$. Sia $\varepsilon > 0$. In corrispondenza di $\frac{\varepsilon}{2}$ per il corollario, $\exists x \in X$ tale che $\sup X - \frac{\varepsilon}{2} < x$. In corrispondenza di $\frac{\varepsilon}{2}$, $\exists y \in Y$ tale che $y < \inf Y + \frac{\varepsilon}{2}$. Segue che

$$y - x < \inf Y + \frac{\varepsilon}{2} - \sup X + \frac{\varepsilon}{2} = \inf Y + \frac{\varepsilon}{2} - \inf Y + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Concludiamo che $y - x < \varepsilon$. Dimostriamo che 2) $\implies$ 1). Per ipotesi $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in X, \exists y \in Y$ tale che $y - x < \varepsilon$. Al fine di dimostrare che $\sup X = \inf Y$ verifichiamo che $\forall \varepsilon > 0 : 0 \leq \inf Y - \sup X < \varepsilon$. (Posso scegliere $\bar{\varepsilon} = \inf Y - \sup X, \bar{\varepsilon} > 0 : 0 \leq \inf Y - \sup X < \bar{\varepsilon} = \inf Y - \sup X$.) Sia quindi $\varepsilon > 0$. Per 2), $\exists x \in X, \exists y \in Y$ tali che $y - x < \varepsilon$. Segue che $\inf Y - \sup X \leq y - x < \varepsilon$ da cui $\inf Y - \sup X < \varepsilon$ ■.

Definizione: Sia $I \subset \mathbb{R}$. Si dice che I è un intervallo se:

$$\forall a, b \in I, a \leq b, a \neq b : \{z \in \mathbb{R} | a < z < b\} \subset I$$

Notazione per intervalli di estremi $a, b \in \mathbb{R}$ e di semirette: Siano $a, b \in \mathbb{R}, a < b$. Denoteremo:

1. $]a, a[= \emptyset$,

2. $[a, a] = a$
3. $]a, b[= \{z \in \mathbb{R} \mid a < z < b\}$ (Intervallo aperto di estremi a, b).
4. $[a, b] = \{z \in \mathbb{R} \mid a \leq z \leq b\}$ (Intervallo chiuso di estremi a, b).
5. $]a, b] = \{z \in \mathbb{R} \mid a < z \leq b\}$ (Intervallo aperto a destra di estremi a, b).
6. $[a, b[= \{z \in \mathbb{R} \mid a \leq z < b\}$ (Intervallo aperto a sinistra di estremi a, b).
7. $[a, +\infty[= \{z \in \mathbb{R} \mid a \leq z\}$ (semiretta destra chiusa di estremo a).
8. $]a, +\infty[= \{z \in \mathbb{R} \mid a < z\}$ (semiretta destra aperta di estremo a).
9. $] - \infty, b] = \{z \in \mathbb{R} \mid z \leq b\}$ (semiretta sinistra chiusa di estremo b).
10. $] - \infty, b[= \{z \in \mathbb{R} \mid z < b\}$ (semiretta sinistra aperta di estremo b).
11. $] - \infty, +\infty[= \mathbb{R}$

Teorema (Caratterizzazione degli intervalli di $\mathbb{R}$): Sia $I \subset \mathbb{R}$. Sono fatti equivalenti:

1. I è un intervallo.
2. I è un intervallo di estremi reali, oppure I è una semiretta destra, oppure I è una semiretta sinistra, oppure $I = \emptyset$ oppure $I = \mathbb{R}$, oppure I è ridotto ad un solo elemento.

Dimostrazione: 2) $\implies$ 1) è ovvia. Dimostriamo 1) $\implies$ 2). Sia $I \subset \mathbb{R}$ un intervallo. Se I è vuoto o ridotto ad un solo elemento allora vale 2). Supponiamo I di non essere in uno di questi casi e che I sia limitato. Poniamo $a = \inf I \in \mathbb{R}$ e $b = \sup I \in \mathbb{R}$. Verifichiamo che

$$]a, b[\subset I \subset [a, b]$$

La seconda inclusione è ovvia, dimostriamo la prima. Sia $y \in]a, b[$. Allora $\inf I < y < \sup I$. Per le caratterizzazioni di estremo superiore e inferiore di I , $\exists x \in I$, tale che $y < x$, $\exists x' \in I$ tale che $x' < y$. Pertanto $x, x' \in I$, $y \in \mathbb{R}$, $x' < y < x$. Essendo I un intervallo si ha che $y \in I$. Supponiamo poi che I sia limitato solo inferiormente. Risulta che $a = \inf I \in \mathbb{R}$, $\sup I = +\infty$. Si dimostra che $]a, +\infty[\subset I \subset [a, +\infty[$. Analogamente se I è limitato solo superiormente. Se I non è limitato, allora $I = \mathbb{R}$ ■.

Definizione: Sia $A \subset \mathbb{R}$. Si dice che A è induttivo se:

1. $0 \in A$
2. $x \in A \implies x + 1 \in A$

Esempio: $A = [0, +\infty[$ è induttivo, dato che $0 \in A$ e $\forall x \in A : x+1 \in A$, perché se $0 \leq x$ allora $0 \leq 1 \leq x+1$ quindi $x+1 \in A$.

Definizione: Si dice insieme dei numeri naturali e si denota con il simbolo $\mathbb{N}$, l'intersezione di tutti i sottoinsiemi induttivi di $\mathbb{R}$.

Posto $\mathcal{F} = \{A \subset \mathbb{R} \mid A \text{ induttivo}\}$, si ha che $\mathcal{F} \neq \emptyset$. Per definizione, poniamo $\mathbb{N} = \cap_{A \in \mathcal{F}} A$. Ogni elemento di $\mathbb{N}$ è detto numero naturale.

Proposizione: $\mathbb{N}$ è induttivo.

Dimostrazione: Verifichiamo che $\mathbb{N}$ è induttivo. $\forall A \in \mathcal{F} : 0 \in A$, segue che $0 \in \cap_{A \in \mathcal{F}} A = \mathbb{N}$. Verifichiamo ora che $x \in \mathbb{N} \implies x+1 \in \mathbb{N}$. Quindi sia $n \in \mathbb{N}$. Risulta che $\forall A \in \mathcal{F} : n \in A$. Essendo A induttivo $n+1 \in A, \forall A \in \mathcal{F}$. Allora $n+1 \in \cap_{A \in \mathcal{F}} A = \mathbb{N}$. Pertanto $\mathbb{N}$ è induttivo ■.

Osservazione: Essendo $\mathbb{N}$ induttivo, si ha che $\mathbb{N} \subset [0, +\infty[$.

Principio d'induzione Sia $A \subset \mathbb{N}$, tale che:

1. $0 \in A$
2. $\forall n : (n \in A \implies n+1 \in A)$. Allora si ha che $A = \mathbb{N}$.

Dimostrazione: Per ipotesi $A \subset \mathbb{N}$. Inoltre essendo A induttivo, si ha che $A \in \mathcal{F}$, da cui $\mathbb{N} = \cap_{B \in \mathcal{F}} B \subset A$. Allora $A = \mathbb{N}$.

Definizione: Se $n \in \mathbb{N}$ allora $n+1$ si chiama il successivo di n .

Osservazione: Essendo $\mathbb{N}$ induttivo, ogni successivo di un naturale è un numero naturale.

Proposizione: Risulta che:

1. $\forall n, m \in \mathbb{N}, n+m \in \mathbb{N}$.
2. $\forall n, m \in \mathbb{N}, n \cdot m \in \mathbb{N}$.

Dimostrazione: Dimostriamo 1). Verifichiamo che $\forall n, m \in \mathbb{N} : n+m \in \mathbb{N}$. Sia quindi $m \in \mathbb{N}$. Consideriamo l'insieme $A_m = \{n \in \mathbb{N} \mid n+m \in \mathbb{N}\}$. Proviamo che $A_m = \mathbb{N}$. Dimostriamolo per induzione. Infatti risulta che $0 \in A_m$ poiché $0+m = m \in \mathbb{N}$. Inoltre sia $n \in A_m$, ossia $n+m \in \mathbb{N}$. Consideriamo $(n+1)+m = (n+m)+1$. Essendo $n+m \in \mathbb{N}$ e $\mathbb{N}$ induttivo, concludiamo che $(n+1)+m \in \mathbb{N}$ da cui $n+1 \in A_m$. Quindi A_m è induttivo e per il principio di induzione: $A_m = \mathbb{N}$.

Dimostriamo 2). Verifichiamo che $\forall n, m \in \mathbb{N} : n \cdot m \in \mathbb{N}$. Sia quindi $m \in \mathbb{N}$. Consideriamo l'insieme $B_m = \{n \in \mathbb{N} \mid n \cdot m \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{N}$. Vale che $0 \in B_m$ essendo $m \cdot 0 = 0 \in \mathbb{N}$. Verifichiamo che $n \in B_m \implies n+1 \in B_m$. Sia quindi $n \in B_m$. Valutiamo $(n+1)m = n \cdot m + m$. $n \cdot m \in \mathbb{N}$ ed essendo $m \in \mathbb{N}$ per come dimostrato sopra $n \cdot m + m \in \mathbb{N}$. Quindi $n+1 \in B_m$. Quindi B_m è induttivo e allora $B_m = \mathbb{N}$ ■.

Principio di induzione generalizzato Sia $A \subset \mathbb{N}$, sia $n_0 \in \mathbb{N}$. Supponiamo che:

1. $n_0 \in A$,
2. $\forall n, n_0 \leq n : n \in A \implies n+1 \in A$. Allora risulta che $\{n \in \mathbb{N} \mid n_0 \leq n\} \subset A$.

Dimostrazione: Poniamo $C = \{n \in \mathbb{N} \mid n + n_0 \in A\}$. Proveremo che C è induttivo. Ovviamente $0 \in C$, inoltre se $n \in C : n + 1 \in C$. Dato che se $n \in C$, $n + n_0 \in A$ da cui $(n + 1) + n_0 = (n + n_0) + 1 \in A$. Concludiamo che $C = \mathbb{N}$ da cui segue che $\{n \in \mathbb{N} \mid n_0 \leq n\} \subset A$ ■.

Osservazione: Se $A \subset \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq n_0\}$ e verifica le proprietà richieste dal principio di induzione generalizzato allora $A = \{n \in \mathbb{N} \mid n > n_0\}$.

Notazione: $]a, b[= (a, b)$

Teorema (Discretezza di $\mathbb{N}$): $\forall n \in \mathbb{N} : (n, n + 1) \cap \mathbb{N} = \emptyset$.

Dimostrazione: Sia $C = \{n \in \mathbb{N} \mid (n, n + 1) \cap \mathbb{N} = \emptyset\} \subset \mathbb{N}$. Proviamo che C è induttivo.

1. $0 \in C$? Sia $A = \mathbb{N} \setminus (0, 1) \subset \mathbb{N}$. Proviamo che A è induttivo. $0 \in \mathbb{N}$, $0 \notin (0, 1) \Rightarrow 0 \in A$. inoltre sia $n \in A$.

$$n \geq 0 \Rightarrow n + 1 \geq 1 \Rightarrow n + 1 \notin (0, 1) \Rightarrow n + 1 \in A$$

Quindi A è induttivo. Per il principio di induzione $A = \mathbb{N}$. Quindi $\mathbb{N} \setminus (0, 1) = \mathbb{N} \Leftrightarrow \mathbb{N} \cap (0, 1) = \emptyset$. Quindi $0 \in C$.

1. Sia $n \in C$. Mostriamo che $n + 1 \in C$.

$$n \in C \Leftrightarrow (n, n + 1) \cap \mathbb{N} = \emptyset$$

Poniamo

$$B = \mathbb{N} \setminus (n + 1, n + 2) \subset \mathbb{N}$$

Proviamo che B è induttivo. $0 \in B$ poiché $\forall n \in \mathbb{N} : n + 1 > 0$ e $0 \notin (n + 1, n + 2) \Rightarrow 0 \in B$. Sia $m \in \mathbb{N}$, suppongo $m \in B \Leftrightarrow m \in \mathbb{N} \setminus (n + 1, n + 2)$. Quindi $m \leq n + 1 \vee n \geq n + 2$. 2.1 $m < n + 1$. dato che $(n, n + 1) \cap \mathbb{N} = \emptyset$, si ha che $m \leq n$. Segue che $m + 1 < n + 1 \Rightarrow m + 1 \in B$. 2.2 $m = n + 1 \Rightarrow m + 1 = n + 2 \notin (n + 1, n + 2) \Rightarrow m + 1 \in B$. 2.3 $m \geq n + 2 \Rightarrow m + 1 \geq n + 3 \Rightarrow m + 1 \in B$. Segue che B è induttivo e che $B = \mathbb{N}$. Quindi $\mathbb{N} \cap (n + 1, n + 2) = \emptyset$, quindi C è induttivo e $C = \mathbb{N}$. Da cui $\mathbb{N} \cap (n, n + 1) = \emptyset$, $\forall n \in \mathbb{N}$ ■.

$\mathbb{N}$ si dice discreto, ossia verifica la proprietà $\forall n \in \mathbb{N} : \mathbb{N} \cap (n, n + 1) = \emptyset$.

Teorema: $\mathbb{N}$ non è limitato superiormente.

Dimostrazione: Vogliamo provare che $\mathcal{M}_{\mathbb{N}} = \emptyset$. Supponiamo per assurdo che $\mathcal{M}_{\mathbb{N}} \neq \emptyset$. Per il teorema di esistenza dell'estremo superiore, $\exists M = \sup \mathbb{N} \in \mathbb{R}$. Segue che $M \in \mathcal{M}_{\mathbb{N}}$, cioè $\forall n \in \mathbb{N} : n \leq M$. Essendo $\mathbb{N}$ induttivo, si ha che $\forall n \in \mathbb{N} : n + 1 \in \mathbb{N} \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}, n + 1 \leq M$. Pertanto vale che $\forall n \in \mathbb{N} : n \leq M - 1$, ma allora $M - 1$ è un maggiorante di $\mathbb{N}$, che è assurdo in quanto avevamo supposto che $\sup \mathbb{N} = M$. ■.

Proposizione (Proprietà archimedeica di $\mathbb{R}$ (I)):

$$\forall a \in \mathbb{R}, a > 0 : \exists n \in \mathbb{N} \text{ tale che } a < n.$$

Dimostrazione: Per il teorema precedente, si ha che $\mathcal{M}_{\mathbb{N}} = \emptyset$. Voglio dimostrare che $\forall a \in \mathbb{R}, a > 0, \exists n \in \mathbb{N}$ tale che $a < n$. Sia quindi $a \in \mathbb{R}, a > 0$. Se per assurdo che la tesi sia falsa, ovvero che $\forall n \in \mathbb{N}, a \geq n$. Pertanto si ha che $a \in \mathcal{M}_{\mathbb{N}}$, assurdo ■.

Proposizione (Proprietà archimedeica II):

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, a, b > 0, \exists n \in \mathbb{N} \text{ tale che } na > b.$$

Dimostrazione: Sia $a, b \in \mathbb{R}$, $a, b > 0$, $a > b$. Poiché $a \neq 0$, $\exists a^{-1} \in \mathbb{R}$. Consideriamo il numero reale $x = b \cdot a^{-1}$. Per la proprietà archimedeica (I), $\exists n \in \mathbb{N}$, tale che $n > x = ba^{-1}$. Pertanto essendo $a > 0$, risulta che $na > xa = (ba^{-1})a = b$ ■.

Corollario: Se $x \in \mathbb{R}$, $x \geq 0$, tale che $\forall n \in \mathbb{N}$, $n \neq 0$, $x \leq \frac{1}{n}$, allora $x = 0$.

Dimostrazione: Sia $x \geq 0$ tale che $\forall n \in \mathbb{N}$, $n \neq 0$, $x \leq \frac{1}{n}$. Se fosse che $x \neq 0$, allora $x > 0$. Per la proprietà archimedeica (I) applicata a $x^{-1} \in \mathbb{R}$, $\exists \bar{n} \in \mathbb{N}$, $\bar{n} \neq 0$, tale che $\bar{n} > x^{-1}$. Segue che

$$x > \frac{1}{\bar{n}}.$$

Quindi si ha che $\frac{1}{\bar{n}} < x \leq \frac{1}{\bar{n}}$, allora $\frac{1}{\bar{n}} < \frac{1}{\bar{n}}$, assurdo ■.

Corollario: Se $x \in \mathbb{R}$, $x > 0$, allora $\exists n \in \mathbb{N}$, $n \neq 0$ tale che $x > \frac{1}{n}$.

Dimostrazione: Sia $x \in \mathbb{R}$, $x > 0$. Per il corollario precedente, se $\forall n \in \mathbb{N}$, $n \neq 0$, $x \leq \frac{1}{n}$ allora $x = 0$. Essendo $x > 0$, $\exists n \in \mathbb{N}$, $n \neq 0$ tale che $x > \frac{1}{n}$ ■.

Definizione: $\mathbb{R}$ si dice un corpo, commutativo, archimedeo completo e totalmente ordinato.

Proposizione (Principio del minimo): Ogni sottoinsieme $A \subset \mathbb{N}$, $A \neq \emptyset$, ammette minimo.

Dimostrazione: Sia $A \subset \mathbb{N}$, $A \neq \emptyset$. Risulta che $0 \in \mu_A \neq \emptyset$. Per il teorema di esistenza dell'estremo inferiore in $\mathbb{R}$,

$$\exists \inf A = \max \mu_A = a \in \mathbb{R}.$$

Proveremo che $a = \min A$, cioè $a \in \mathbb{N}$. Poiché $0 < 1$, risulta che $a < a + 1$, per la caratterizzazione dell'estremo inferiore, $\exists n \in A$ tale che $a \leq n < a + 1$. Se $a = n$, la tesi sarebbe soddisfatta, ossia $\inf A \in \mathbb{N} \implies \inf A = \min A$. Se $a < n < n + 1$, allora per la caratterizzazione dell'estremo inferiore $\exists m \in A$ tale che $a \leq m < n$. Segue che $m < n < a + 1 \leq m + 1$ da cui $n \in]m, m + 1[$ che è assurdo in quanto $]m, m + 1[= \emptyset$. (Discretezza di $\mathbb{N}$). Concludiamo che $a = n$ ■.

Definizione: $\mathbb{N}$ si dice ben ordinato in quanto $\mathbb{N}$ verifica il principio del minimo.

Definizione: Si dice che $n \in \mathbb{N}$ è pari se $n = 2p$, con $p \in \mathbb{N}$. Si dice che $n \in \mathbb{N}$ è dispari se $n = 2m + 1$, con $m \in \mathbb{N}$.

Denoteremo con $\mathbb{P}$ l'insieme dei naturali pari e $\mathbb{D}$ l'insieme dei naturali dispari.

Proposizione:

1. $\mathbb{P} \cup \mathbb{D} = \mathbb{N}$
2. $\mathbb{P} \cap \mathbb{D} = \emptyset$.

Dimostrazione:

1. Verifichiamo che $A = \mathbb{P} \cup \mathbb{D} \subset \mathbb{N}$ soddisfa le ipotesi del principio di induzione. Osserviamo che $0 \in \mathbb{P} \subset A = \mathbb{P} \cup \mathbb{D}$. Proveremo anche che A è induttivo. Sia $n \in A = \mathbb{P} \cup \mathbb{D}$. Se $n = 2p$, con $p \in \mathbb{N}$, allora $n + 1 = 2p + 1 \in \mathbb{D} \subset A$. Se invece, $n = 2m + 1$, con $m \in \mathbb{N}$, allora $n + 1 = 2m + 1 + 1 = 2(m + 1)$, allora $n + 1 \in \mathbb{P} \subset A$. Segue che $\forall n \in \mathbb{N}$, $n \in A$, allora $n + 1 \in A$. Per il principio di induzione $A = \mathbb{P} \cup \mathbb{D} = \mathbb{N}$ ■.

2. Vogliamo provare che $\mathbb{P} \cap \mathbb{D} = \emptyset$. Sia per assurdo che $\exists n \in \mathbb{P} \cap \mathbb{D}$. Allora $n = 2p$, con $p \in \mathbb{N}$ ma anche $n = 2m + 1$, con $m \in \mathbb{N}$. Ovvero:

$$2p = 2m + 1 \implies 2(p - m) = 1.$$

Se $p = m$, $2 \cdot 0 = 0 = 1$, assurdo. Se $p < m$, allora $2(p - m) = 1$. Ma $p - m < 0$ cioè $1 = 2(p - m) < 0$, assurdo. Se $p > m$, allora per la discretezza di $\mathbb{N}$ si ha che $p - m \geq 1$. Risulta allora che $1 = 2(p - m) \geq 2$, assurdo ■. =

Teorema: Ogni sottoinsieme $A \subset \mathbb{N}$, $A \neq \emptyset$, $\mathcal{M}_A \neq \emptyset$ ammette massimo.

Dimostrazione: (Analogo al principio del minimo).

Numeri relativi (interi)

Definizione: Si dice $x \in \mathbb{R}$ è un numero relativo se $\exists n, m \in \mathbb{N} : x = m - n$. Si denotano con il simbolo $\mathbb{Z}$.

Proposizione: Valgono le seguenti proprietà:

1. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.
2. $\forall x, y \in \mathbb{Z} : x + y \in \mathbb{Z}, x \cdot y \in \mathbb{Z}, -x \in \mathbb{Z}$.

Dimostrazione:

1. $m \in \mathbb{N}$, allora $m = m - 0 \in \mathbb{Z}$.
2. Siano $x, y \in \mathbb{Z}$. Allora per definizione $x = m - n$, $y = p - q$, con $m, n, p, q \in \mathbb{N}$.
Quindi $x + y = m - n + p - q = (m + p) - (n + q) \in \mathbb{Z}$. Inoltre siano x, y come prima, $x \cdot y = (m - n) \cdot (p - q) = mp - mq - np + nq = (mp + nq) - (mq + np) \in \mathbb{Z}$.
Infine se $x \in \mathbb{Z}$, $x = m - n$, $m, n \in \mathbb{N}$, allora $-x = -(m - n) = n - m \in \mathbb{Z}$.

Teorema: Sia $A \subset \mathbb{Z}$, $A \neq \emptyset$, $\mu(A) \neq \emptyset$, allora A ammette minimo.

Teorema: $\mathbb{Z}$ non è limitato superiormente, $\mathbb{Z}$ non è limitato inferiormente.

Dimostrazione: La tesi segue osservando $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ e anche $-\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.

Teorema: Ogni sottoinsieme $A \subset \mathbb{Z}$, $A \neq \emptyset$, $\mathcal{M}_A \neq \emptyset$ ammette massimo.

Numeri razionali

Definizione: Si dice che $x \in \mathbb{R}$ è un numero razionale se $\exists m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}, n \neq 0$ tali che $x = m \cdot n^{-1} = \frac{m}{n}$. L'insieme dei numeri razionali si denota con $\mathbb{Q}$. Si dice che $x \in \mathbb{R}$ è un numero irrazionale se $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Proposizione: Valgono le seguenti proprietà:

1. $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$
2. $\forall x, y \in \mathbb{Q}, x + y \in \mathbb{Q}, xy \in \mathbb{Q}, -x \in \mathbb{Q}$
3. $\forall x \in \mathbb{Q}, x \neq 0 : x^{-1} \in \mathbb{Q}$

Dimostrazione:

1. Sia $x \in \mathbb{Z}$, in particolare $x = \frac{x}{1} \in \mathbb{Q}$.
2. Siano $x, y \in \mathbb{Q}$. Per definizione $\exists m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0, \exists p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}, q \neq 0$, tali che $x = mn^{-1}, y = pq^{-1}$. Segue che $x + y = mn^{-1} + pq^{-1} = \frac{mq + pn}{nq} \in \mathbb{Q}$. Inoltre $xy = (mn^{-1})(pq^{-1}) = \frac{m}{n} \cdot \frac{p}{q} = (mp)(nq)^{-1} \in \mathbb{Q}$. Infine si ha che se $x \in \mathbb{Q}$ allora $-x \in \mathbb{Q}$. Infatti se $x = mn^{-1}$, come prima, allora $-x = -m(n^{-1}) = (-m)n^{-1} \in \mathbb{Q}$.

3.

Teorema: $\mathbb{Q}$ è denso in $\mathbb{R}$. Ovvero: se $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, allora $\exists q \in \mathbb{Q}$, tale che $a < q < b$.

Dimostrazione: Ci sono 3 casi da considerare:

1. Siano $a, b \in \mathbb{R} : 0 \leq a < b$; Per l'assioma di Archimede vale che $\exists n \in \mathbb{N} : n(b-a) > 1 \implies n > \frac{1}{b-a}$,

Segue che $nb - na > 1$, da cui $nb > na + 1$. Consideriamo l'insieme:

$$C = \{p \in \mathbb{N} \mid na < p\}$$

che è non vuoto per la proprietà archimedea. Inoltre $C \subset \mathbb{N}$. Essendo $C \subset \mathbb{N}$, non vuoto, per il principio del minimo $\exists \min C = m \in \mathbb{N}$. Segue che $na < m$, $na + 1 < nb$, essendo inoltre $m = \min C$, risulta che $m - 1 < na$ da cui $m \leq na + 1$. Concludiamo che $na < m \leq na + 1 < nb$ e quindi $na < m < nb$. Moltiplicando per il reciproco di n si ha che $a < mn^{-1} < b$. Posto $q = mn^{-1}$, si ha che $q \in \mathbb{Q}$ e $a < q < b$.

2. Siano $a, b \in \mathbb{R} : a < 0 < b$; Il caso è banale dato che $0 \in \mathbb{Q}$.

1. $a < b < 0$. Si procede applicando il punto 1) al caso equivalente $0 < -b < -a$. Otterremo così $-q$ che è il numero razionale cercato ■.

Proposizione: $\nexists x \in \mathbb{Q} \mid x^2 = 2$.

Dimostrazione: Supponiamo per assurdo che $\exists x \in \mathbb{Q} \mid x^2 = 2$. Allora $x = \frac{m}{n}$ con $m \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N}^*$, e senza perdita di generalità sono primi tra di loro. Essendo $x^2 = 2 \implies \frac{m^2}{n^2} = 2$. Cioè $m^2 = 2n^2$, segue che m è pari. In particolare il quadrato di un numero pari è pari. Quindi $m^2 = 2n^2 \implies (2s)^2 = 2n^2 \implies 4s^2 = 2n^2$. Ovvero $2s^2 = n^2$. Quindi anche n^2 è pari, e conseguentemente anche n . Ma allora sia m che n sono pari che contraddice l'ipotesi di averli scelti coprimi.

Teorema(incompletezza di $\mathbb{Q}$): $\mathbb{Q}$ non verifica l'assioma di Dedekind ($\mathbb{Q}$ non è completo).

Dimostrazione: Basta trovare un insieme limitato, non vuoto, che non ammette estremo superiore (o inferiore) in $\mathbb{Q}$. Sia quindi $A = \{x \in \mathbb{Q} : x \geq 0, x^2 < 2\}$. 1 appartiene ad A , quindi è non vuoto, $2 \in \mathcal{M}_A$ infatti:

$$x^2 < 2 \implies x^2 < 4 \implies x^2 - 4 < 0 \implies (x-2)(x+2) < 0 \implies x < 2.$$

Quindi A è superiormente limitato. Supponiamo che $\exists \lambda \in \mathbb{Q} : \lambda = \sup A$, in particolare vale $\lambda \geq 1$. Ci sono 3 casi distinti:

$$1. \lambda^2 < 2 \qquad 2. \lambda^2 = 2 \qquad 3. \lambda^2 > 2.$$

1. Per il principio di Archimede $\exists n \in \mathbb{N} : n > \max \left\{ 1, \frac{2\lambda+1}{2-\lambda^2} \right\}$. Vale che $\lambda + \frac{1}{n} \in \mathbb{Q}$, vediamo se appartiene ad A . Sarebbe a dire:

$$\left(\lambda + \frac{1}{n}\right)^2 = \lambda^2 + \frac{2\lambda}{n} + \frac{1}{n^2} < \lambda^2 + \frac{2\lambda}{n} + \frac{1}{n} = \lambda^2 + \frac{2\lambda+1}{n}.$$

Se fosse minore di 2 avremmo:

$$\lambda^2 + \frac{2\lambda+1}{n} < 2 \Rightarrow \left(\lambda + \frac{1}{n}\right)^2 < 2 \Rightarrow \left(\lambda + \frac{1}{n}\right) \in A.$$

Ma λ era l'estremo superiore di A . Otteniamo un assurdo. 2. Senza perdita di generalità posso scrivere $\lambda = \frac{m}{n}$ con $m, n \in \mathbb{Q}$ e coprimi. Se fosse che $\lambda^2 = 2$ avrei:

$$\frac{m^2}{n^2} = 2 \Rightarrow m^2 = 2n^2 \Rightarrow \exists p \in \mathbb{N} : m = 2p.$$

$$\frac{4p^2}{n^2} = 2 \Rightarrow 2p^2 = n^2.$$

Cioè sia m che n sono pari, ma li avevamo assunti coprimi, abbiamo ottenuto un assurdo. 3. Ancora per il principio di Archimede scriviamo $\exists n \in \mathbb{N} : n > \max\left\{\frac{1}{\lambda}, \frac{2\lambda}{\lambda^2-2}\right\}$. Vale che $\lambda - \frac{1}{n} \in \mathbb{Q}$.

$$\left(\lambda - \frac{1}{n}\right)^2 = \lambda^2 - \frac{2\lambda}{n} + \frac{1}{n^2} > \lambda^2 - \frac{2\lambda}{n} > \lambda^2 - 2\lambda \frac{\lambda^2-2}{2\lambda} = \lambda^2 - \lambda^2 + 2 = 2$$

Dimostriamo adesso che $\lambda - \frac{1}{n}$ è un maggiorante di A . Ricordando che $x \in A$ implica $x \geq 0$ e usando che $\lambda - \frac{1}{n}$ è positivo si ha che per ogni $x \in A$:

$$\lambda - \frac{1}{n} > x \Leftrightarrow \left(\lambda - \frac{1}{n}\right)^2 > x^2.$$

che è vero per quanto detto sopra:

$$\left(\lambda - \frac{1}{n}\right)^2 > 2 > x^2$$

Abbiamo quindi dimostrato che $\lambda - \frac{1}{n}$ è un maggiorante di A , in contraddizione al fatto che $\lambda = \sup A$. Concludendo, $\nexists \lambda \in \mathbb{Q}$ tale che $\lambda = \sup A$. ■

Definizione: Sia $x \in \mathbb{R}$. Sia $n \in \mathbb{N}$, $n \neq 0$. Si chiama potenza n -esima di x il numero reale:

$$x^n = \begin{cases} x^n & \text{se } n \in \mathbb{N}^+ \\ 1 & \text{se } n = 0 \\ \frac{1}{x^{|n|}} & \text{se } n \in -\mathbb{N}^+ \end{cases}$$

Proposizione: $\forall x \in \mathbb{R}$, $x \neq 0$, $\forall n, m \in \mathbb{Z}$:

1. $(x^m)^n = x^{mn}$
2. $x^{n+m} = x^n \cdot x^m$
3. $(x \cdot y)^n = x^n \cdot y^n$.

Proposizione:

1. Sia $y \in \mathbb{R}, 0 < y \leq 1$. Si ha che: $\forall n \in \mathbb{N}, n \neq 0 : y^n \leq y$.
2. Sia $y \in \mathbb{R}, y \geq 1$. Si ha che $\forall n \in \mathbb{N}, n \neq 0 : y^n \geq y$.

Dimostrazione:

1. Sia $y \in \mathbb{R}, 0 < y \leq 1 \implies \forall n \in \mathbb{N}, n \neq 0 : y^n \leq y$. $P(n) = \forall n \in \mathbb{N}, n \neq 0 : y^n \leq y$, il predicato che dimostreremo per induzione. Proviamo la base induttiva, sia quindi $n = 1$. Allora $y^1 = y$, verificata. Per il passo induttivo assumiamo che se $y^n \leq y$, dobbiamo dimostrare: $y^{n+1} \leq y$. Essendo $y^{n+1} = y \cdot y^n$ abbiamo che $y \cdot y^n \leq y^2$, che ci permette di concludere.
2. Sia $y \in \mathbb{R}, y \geq 1$. $P(n) = \forall n \in \mathbb{N}, n \neq 0 : y^n \geq y$. Dimostriamo il predicato per induzione. Il passo base, $P(1)$, è verificato in quanto $y^1 \geq y$. Dimostriamo il caso $P(n+1)$. Per ipotesi $y^n \geq y$. Ma $y^{n+1} = y^n y \geq y \cdot y$ per ipotesi. Abbiamo verificato il passo induttivo ■.

Proposizione: Siano $x, y \in \mathbb{R}, 0 < x < y$. Allora $\forall n \in \mathbb{N}, n \neq 0 : x^n < y^n$.

Dimostrazione: Dimostriamolo per induzione sul predicato $P(n) = \forall n \in \mathbb{N}, n \neq 0, x < y \implies xy^n < y^n$. $P(1)$ è banale in quanto $x^1 < y^1$ per ipotesi. Dimostriamo il caso $P(n+1)$:

$$x^{n+1} < y^{n+1} \implies x^n < y^n.$$

Ma $x < y$ per ipotesi e $x^n < y^n$ per ipotesi induttiva. Quindi $P(n+1)$ è vera ■.

Teorema (della radice n -esima): $\forall y \in \mathbb{R}^*, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2$, esiste una ed una sola $x \in \mathbb{R}$ positiva tale che $x^n = y$.

Definizione: Sia $y \in \mathbb{R}^*$, sia $\mathbb{N} \in \mathbb{N}, n \geq 2$. Si chiama radice n -esima di y l'unica x reale positiva tale che $x^n = y$. ($x = \sqrt[n]{y}$ oppure $x = y^{\frac{1}{n}}$).

Dimostrazione (Del teorema):

Fissiamo $y \in \mathbb{R}, y > 0, n \in \mathbb{N}, n \geq 2$. Proviamo che se $\exists x \in \mathbb{R}, x > 0$, tale che $x^n = y$ allora x è unica. Se per assurdo $x_1, x_2 \in \mathbb{R}, x_1, x_2 > 0$ e tali che $x_1^n = y, x_2^n = y$ allora $x_1 = x_2$. D'altra parte se $x_1 < x_2$ allora si avrebbe che $x_1^n < x_2^n \implies y < y$, che è assurdo. Viceversa se $x_2 < x_1$, allora si avrebbe che $x_2^n < x_1^n \implies y < y$, che è assurdo. Quindi se esiste una x come richiesta, è unica. Per quanto riguarda l'esistenza della radice ennesima, invece, consideriamo l'insieme:

$$A = \{z \in \mathbb{R} \mid z > 0, z^n \leq y\}.$$

Proviamo che:

1. $A \neq \emptyset$
2. A è limitato superiormente, ($\mathcal{M}_A \neq \emptyset$). A tal fine distinguiamo due casi: $0 < y \leq 1, y > 1$. Supponiamo che $0 < y \leq 1$. Allora si ha che $y^n \leq y$. Pertanto $y \in A$, da cui $A \neq \emptyset$. Inoltre si ha che $1 \in \mathcal{M}_A$. Se fosse che $1 \notin \mathcal{M}_A$. Allora $\exists z \in A$ tale che $z > 1$, da cui $z^n > 1$, ma essendo $z \in A, 1 \geq y \geq z^n > 1$ che è assurdo. Se invece, $y > 1$. Allora $1^n = 1 < y$, quindi $1 \in A$, e quindi A è non vuoto. Inoltre $y \in \mathcal{M}_A$, infatti, se $y \notin A, \exists z \in A$ tale

che $z > y$. Ma allora $y^n < z^n$ ma $z^n \leq y$ che è assurdo. Per il teorema di esistenza dell'estremo superiore esiste $x = \sup A \in \mathbb{R}$. Verifichiamo che $x^n = y$. Basta provare che $\forall \varepsilon > 0 : |x^n - y| \leq \varepsilon$. Sia quindi $\varepsilon > 0$. Poniamo

$$\varepsilon' = \min\left(x, \frac{\varepsilon}{2^n n x^{n-1}}\right).$$

Proveremo che $(x - \varepsilon')^n < x^n < (x + \varepsilon')^n$. Che segue direttamente dall'osservare che $0 \leq x - \varepsilon' < x < x + \varepsilon'$, e dalla proposizione precedente. Verifichiamo inoltre che $(x - \varepsilon')^n < y < (x + \varepsilon')^n$. Per provare la disuguaglianza di destra basta osservare che $(x + \varepsilon')^n \notin A$, dato che $x = \sup A$. Segue che $y < (x + \varepsilon')^n$. Per l'altra disuguaglianza, per la caratterizzazione dell'estremo superiore, essendo $x - \varepsilon' < x$, $\exists \bar{x} \in A$, tale che $0 < x - \varepsilon' < \bar{x} < x$. Segue che $(x - \varepsilon')^n < \bar{x}^n \leq y$, perché $\bar{x} \in A$. Pertanto si ha che $(x - \varepsilon')^n < y < (x + \varepsilon')^n$. Concludiamo che

$$0 \leq |x^n - y| \leq |(x + \varepsilon')^n - (x - \varepsilon')^n| = |(x + \varepsilon') - (x - \varepsilon')| \cdot |(x + \varepsilon')^{n-1} + \dots + (x - \varepsilon')^{n-1}| \implies$$

Maggioro i termini misti con $2x$.

$$|2\varepsilon'| \cdot |(x + \varepsilon')^{n-1} + \dots + (x - \varepsilon')^{n-1}| \leq 2\varepsilon' \cdot (2x)^{n-1} n = 2^n x^{n-1} n \varepsilon' \leq \frac{\varepsilon}{2^n x^{n-1} n} \cdot 2^n x^{n-1} n = \varepsilon.$$

Segue che $0 \leq |x^n - y| \leq \varepsilon$, e per l'arbitrarietà di ε : $|x^n - y| = 0 \iff y = x^n$ ■.

Osservazione: Il teorema appena dimostrato è uno strumento matematico che ci garantisce dati $y \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ l'esistenza e unicità di una soluzione positiva dell'equazione $x^n = y$.

Teorema(Densità di $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$): Per ogni $a, b \in \mathbb{R}$, con $a < b$, $\exists c \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ tale che $a < c < b$.

Dimostrazione: Sia $y = 2$. Sia $n = 2$. Considero, l'equazione $x^2 = 2$. Per il teorema di esistenza e unicità della radice n -esima, $\exists! x \in \mathbb{R}$, $x > 0$ tale che $x^2 = 2$. Tale x è denotata con $\sqrt{2}$. Inoltre si ha che $z = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Pertanto $\exists! x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, tale che $x^2 = 2$. Siano $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Per gli assiomi di $\mathbb{R}$ si ha che $a - \sqrt{2} < b - \sqrt{2}$. Siano $a' = a - \sqrt{2} \in \mathbb{R}$, $b' = b - \sqrt{2} \in \mathbb{R}$, risulta che $a' < b'$. Per il teorema di densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$, $\exists q \in \mathbb{Q}$ tale che $a' < q < b' \implies a - \sqrt{2} < q < b - \sqrt{2}$. Concludiamo che $a - \sqrt{2} + \sqrt{2} < q + \sqrt{2} < b - \sqrt{2} + \sqrt{2} \implies a < q + \sqrt{2} < b$. Risulta che $c = q + \sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ e $a < c < b$.

Proposizione(Proprietà della radice n -esima):

1. $\forall y_1, y_2 \in \mathbb{R}, 0 < y_1, 0 < y_2, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2$ si ha che $\sqrt[n]{y_1 y_2} = \sqrt[n]{y_1} \sqrt[n]{y_2}$.
Dimostrazione: Siano $y_1, y_2 \in \mathbb{R}, y_1, y_2 > 0, n \in \mathbb{N}, n \geq 2$. Per il teorema di esistenza e unicità della radice n -esima, $\exists! x_1 > 0, \exists! x_2 > 0$ tali che $x_1^n = y_1$ e $x_2^n = y_2$. Pertanto $(x_1 x_2)^n = x_1^n x_2^n = y_1 y_2$. Segue che $x_1 x_2 = \sqrt[n]{y_1 y_2}$, da cui segue che $\sqrt[n]{y_1} \sqrt[n]{y_2} = \sqrt[n]{y_1 y_2}$.
2. $\forall y \in \mathbb{R}, y > 0, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2, \forall m \in \mathbb{Z}: \sqrt[n]{y^m} = (\sqrt[n]{y})^m$.
3. $\forall y \in \mathbb{R}, y > 0, \forall h \in \mathbb{N}, h \geq 2, \forall k \in \mathbb{N}, k \geq 2: \sqrt[h]{\sqrt[k]{y}} = \sqrt[hk]{y}$.
4. $\forall y \in \mathbb{R}, y > 0, \forall m_1, m_2 \in \mathbb{Z}, \forall n_1, n_2 \in \mathbb{N}, n_1, n_2 \neq 0, n_1 \geq 2, n_2 \geq 2: \frac{m_1}{n_1} = \frac{m_2}{n_2} \iff m_1 n_2 = m_2 n_1$. Allora $\sqrt[n_1]{y^{m_1}} = \sqrt[n_2]{y^{m_2}}$.

5. $\forall y \in \mathbb{R}, y > 0, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2: \sqrt[n]{y^n} = y$. Dimostrazione: Sia $y \in \mathbb{R}, y > 0$, sia $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$. Posto $x = \sqrt[n]{y^n}$, si ha che $x^n = y^n$. Segue che $x = y$, da cui segue che $\sqrt[n]{y^n} = y$.
6. $\forall y \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2$ tali che $y^n \geq 0$: $\sqrt[n]{y^n} = |y|$.
7. $\forall y_1, y_2 \in \mathbb{R}, y_1 > 0, y_2 > 0, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2, y_1 < y_2$: $\sqrt[n]{y_1} \leq \sqrt[n]{y_2}$.

Definizione(Potenza razionale): Sia $y \in \mathbb{R}, y > 0$. Sia $q \in \mathbb{Q}, q = \frac{m}{n}, m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}, n \neq 0$. Si chiama potenza razionali di y di esponente q il numero reale: $y^q = \sqrt[n]{y^m}$.

Osservazione: Il teorema appena dimostrato è uno strumento matematico che ci garantisce dati $y \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$ l'esistenza e unicità di una soluzione positiva dell'equazione $x^n = y$.

Teorema(Densità di $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$): Per ogni $a, b \in \mathbb{R}$, con $a < b$, $\exists c \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ tale che $a < c < b$.

Dimostrazione: Sia $y = 2$. Sia $n = 2$. Considero, l'equazione $x^2 = 2$. Per il teorema di esistenza e unicità della radice n -esima, $\exists! x \in \mathbb{R}, x > 0$ tale che $x^2 = 2$. Tale x è denotata con $\sqrt{2}$. Inoltre si ha che $z = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Pertanto $\exists! x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, tale che $x^2 = 2$. Siano $a, b \in \mathbb{R}, a < b$. Per gli assiomi di $\mathbb{R}$ si ha che $a - \sqrt{2} < b - \sqrt{2}$. Siano $a' = a - \sqrt{2} \in \mathbb{R}, b' = b - \sqrt{2} \in \mathbb{R}$, risulta che $a' < b'$. Per il teorema di densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$, $\exists q \in \mathbb{Q}$ tale che $a' < q < b' \implies a - \sqrt{2} < q < b - \sqrt{2}$. Concludiamo che $a - \sqrt{2} + \sqrt{2} < q + \sqrt{2} < b - \sqrt{2} + \sqrt{2} \implies a < q + \sqrt{2} < b$. Risulta che $c = q + \sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ e $a < c < b$.

Proposizione(Proprietà della radice n -esima):

1. $\forall y_1, y_2 \in \mathbb{R}, 0 < y_1, 0 < y_2, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2$ si ha che $\sqrt[n]{y_1 y_2} = \sqrt[n]{y_1} \sqrt[n]{y_2}$.
Dimostrazione: Siano $y_1, y_2 \in \mathbb{R}, y_1, y_2 > 0, n \in \mathbb{N}, n \geq 2$. Per il teorema di esistenza e unicità della radice n -esima, $\exists! x_1 > 0, \exists! x_2 > 0$ tali che $x_1^n = y_1$ e $x_2^n = y_2$. Pertanto $(x_1 x_2)^n = x_1^n x_2^n = y_1 y_2$. Segue che $x_1 x_2 = \sqrt[n]{y_1 y_2}$, da cui segue che $\sqrt[n]{y_1} \sqrt[n]{y_2} = \sqrt[n]{y_1 y_2}$.
2. $\forall y \in \mathbb{R}, y > 0, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2, \forall m \in \mathbb{Z}: \sqrt[n]{y^m} = (\sqrt[n]{y})^m$.
3. $\forall y \in \mathbb{R}, y > 0, \forall h \in \mathbb{N}, h \geq 2, \forall k \in \mathbb{N}, k \geq 2: \sqrt[h]{\sqrt[k]{y}} = \sqrt[hk]{y}$.
4. $\forall y \in \mathbb{R}, y > 0, \forall m_1, m_2 \in \mathbb{Z}, \forall n_1, n_2 \in \mathbb{N}, n_1, n_2 \neq 0, n_1 \geq 2, n_2 \geq 2: \frac{m_1}{n_1} = \frac{m_2}{n_2} \iff m_1 n_2 = m_2 n_1$. Allora $\sqrt[n_1]{y^{m_1}} = \sqrt[n_2]{y^{m_2}}$.
5. $\forall y \in \mathbb{R}, y > 0, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2: \sqrt[n]{y^n} = y$. Dimostrazione: Sia $y \in \mathbb{R}, y > 0$, sia $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$. Posto $x = \sqrt[n]{y^n}$, si ha che $x^n = y^n$. Segue che $x = y$, da cui segue che $\sqrt[n]{y^n} = y$.
6. $\forall y \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2$ tali che $y^n \geq 0$: $\sqrt[n]{y^n} = |y|$.
7. $\forall y_1, y_2 \in \mathbb{R}, y_1 > 0, y_2 > 0, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2, y_1 < y_2$: $\sqrt[n]{y_1} \leq \sqrt[n]{y_2}$.

Definizione(Potenza razionale): Sia $y \in \mathbb{R}, y > 0$. Sia $q \in \mathbb{Q}, q = \frac{m}{n}, m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}, n \neq 0$. Si chiama potenza razionali di y di esponente q il numero reale: $y^q = \sqrt[n]{y^m}$.

Proposizione: Per le potenze razionali valgono le seguenti proprietà:

1. $\forall y_1, y_2 \in \mathbb{R}, y_1, y_2 > 0, \forall q \in \mathbb{Q}$ si ha che: $(y_1 \cdot y_2)^q = y_1^q \cdot y_2^q$
2. $\forall y \in \mathbb{R}, y > 0, q_1, q_2 \in \mathbb{Q}$ si ha che: $(y^{q_1})^{q_2} = y^{q_1 q_2}$
3. $\forall y \in \mathbb{R}, y > 0, \forall q \in \mathbb{Q}$ si ha che: $y^{-q} = \frac{1}{y^q}$
4. $\forall y \in \mathbb{R}, y > 0, \forall q_1, q_2 \in \mathbb{Q}$ si ha che: $y^{q_1 - q_2} = \frac{y^{q_1}}{y^{q_2}}$.

Proposizione: Sia $a \in \mathbb{R}, a > 0$. Allora valgono le seguenti implicazioni:

1. $a > 1 \implies \forall q_1, q_2 \in \mathbb{Q}, q_1 < q_2 : a^{q_1} < a^{q_2}$.
2. $0 < a \leq 1 \implies \forall q_1, q_2 \in \mathbb{Q}, q_1 < q_2 : a^{q_2} < a^{q_1}$.

Dimostrazione:

1. Sia $a > 1$. Siano $q_1, q_2 \in \mathbb{Q}, q_1 < q_2$. Allora $q_1 = \frac{m_1}{n}, q_2 = \frac{m_2}{n}$, con $n \in \mathbb{N}^*$ e $m_1, m_2 \in \mathbb{Z}$. i) $0 < m_1 < m_2$. Poiché $a^{m_1} < a^{m_2}$ si ha che $a^{q_1} = \sqrt[n]{a^{m_1}} < \sqrt[n]{a^{m_2}} = a^{q_2}$. ii) $m_1 < 0 < m_2$. Vale che $a^{m_1} < 1 = a^0 < a^{m_2}$. Segue che $a^{q_1} < a^{q_2}$. iii) $m_1 < m_2 < 0$. Si ha che $0 < -m_2 < -m_1$ da cui $a^{-m_2} < a^{-m_1}$, e pertanto $\sqrt[n]{a^{-m_2}} < \sqrt[n]{a^{-m_1}} \implies a^{-q_2} < a^{-q_1}$ che è equivalente a $a^{q_1} < a^{q_2}$.
2. Supponiamo che $0 < a < 1$. Allora $a^{-1} > 1$, da cui vale la dimostrazione del punto precedente, applicandola al numero reale a^{-1} . Pertanto si ha $\forall q_1, q_2 \in \mathbb{Q}, q_1 < q_2 : (a^{-1})^{q_1} < (a^{-1})^{q_2}$. Equivalentemente si ha $a^{-q_1} < a^{-q_2}$, ossia $a^{q_2} < a^{q_1}$ ■.

Teorema: Sia $a \in \mathbb{R}, a > 0, a \neq 1$. Sia $q \in \mathbb{Q}$. Allora:

1. $a > 1 \implies a^q = \sup \{a^{q'} \mid q' \in \mathbb{Q}, q' < q\} = \inf \{a^{q'} \mid q' \in \mathbb{Q}, q < q'\}$.
2. $0 < a < 1 \implies a^q = \sup \{a^{q''} \mid q'' \in \mathbb{Q}, q < q''\} = \inf \{a^{q''} \mid q'' \in \mathbb{Q}, q'' < q\}$.

Teorema (Radici reali): Sia $a \in \mathbb{R}, a > 0, x \in \mathbb{R}$. Poniamo $A = \{a^{q'} \mid q' \in \mathbb{Q}, q' < x\}$.

E sia anche $B = \{a^{q''} \mid q'' \in \mathbb{Q}, x < q''\}$. Allora A e B sono non vuoti e contigui. Inoltre si ha:

1. $a > 1 \implies \sup A = \inf B$.
2. $0 < a < 1 \implies \sup B = \inf A$.

Dimostrazione: Supponiamo $a > 1$, l'altro caso è analogo. Sia $x \in \mathbb{R}$. Allora Osserviamo che A e B sono non vuoti e separati, poiché:

$$\forall q_1, a_2 \in \mathbb{Q}, q_1 < x < q_2 : a^{q_1} < a^{q_2}.$$

Proviamo che A e B sono contigui. Ovvero che $\sup A = \inf B$. Siano quindi $\alpha = \sup A$ e $\beta = \inf B$. Chiaramente α e β sono numeri reali. Supponiamo per assurdo che $\alpha < \beta$. Allora per usando il teorema precedente proveremo che $\exists q \in \mathbb{Q}$ tale che $\alpha < a^q < \beta$. Se esistesse tale $q \in \mathbb{Q}$ allora allora la tesi del teorema sarebbe soddisfatta. Infatti essendo $\mathbb{R}$ totalmente ordinato, ricadiamo in 3 casi:

1. $q < x$. Ma allora $a^q \in A$, che è assurdo.
2. $x < q$. Ma allora $a^q \in B$, che è assurdo.
3. $x = q$. Se così fosse allora, dal teorema precedente, $a^q = \sup A = \inf B = \alpha = \beta$.

In tutti e 3 i casi perveniamo ad una contraddizione, da cui segue che $\alpha = \beta$.

Se invece $\exists q \in \mathbb{Q}$ tale che $\alpha < a^q < \beta$. Poiché $\alpha < \beta$, allora $\frac{\beta}{\alpha} > 1$. Per la proprietà archimedeica e la disuguaglianza di Bernoulli, si ha che $\exists n \in \mathbb{N}, n \neq 0$ tale che $\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^n > a$. Dato che:

$$\frac{\beta}{\alpha} = 1 + \left(\frac{\beta}{\alpha} - 1\right). \text{ Allora } \exists n \in \mathbb{N}, n \neq 0 : \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^n = \left(1 + \left(\frac{\beta}{\alpha} - 1\right)\right)^n > 1 + n\left(\frac{\beta}{\alpha} - 1\right) > a.$$

Definiamo $C = \{m \in \mathbb{Z} \mid a^m \leq \alpha^n\}$. C è non vuoto e $\mathcal{M}_C \neq \emptyset$. Per il principio del massimo intero in $\mathbb{Z}$, per cui $\exists m \in \mathbb{Z}, m = \max C$. m verifica: $a^m \leq \alpha^n$. Concludiamo che:

$$a^{m+1} = a^m a \leq \alpha^n a < \beta^n$$

inoltre essendo $m = \max C$ si ha che $\alpha^n < a^{m+1}$. Concludiamo che $\alpha^n < a^{m+1} < \beta^n \implies \alpha < a^{\frac{m+1}{n}} < \beta$. Posto $q \in \mathbb{Q}, q = \frac{m+1}{n}$, si ha che $\alpha < a^q < \beta$. Che è assurdo, in quanto avremmo trovato un numero razionale che separa α e β ■.

Definizione: Sia $a \in \mathbb{R}, a > 0$. Sia $x \in \mathbb{R}$. Si chiama potenza reale di base a ed esponente x e si denota con a^x , il numero reale definito come:

1.

$$a > 1 \implies a^x = \sup \{a^{q'} \mid q' \in \mathbb{Q}, q' < x\} = \inf \{a^{q''} \mid q'' \in \mathbb{Q}, x < q''\}$$

1.

$$0 < a < 1 \implies a^x = \sup \{a^{q''} \mid q'' \in \mathbb{Q}, x < q''\} = \sup \{a^{q'} \mid q' \in \mathbb{Q}, q' < x\}.$$

Proposizione: Sia $a \in \mathbb{R}, a > 0$. Allora valgono le seguenti proprietà:

1. $\forall x, y \in \mathbb{R} : a^{x+y} = a^x a^y$
2. $\forall x, y \in \mathbb{R} : (a^x)^y = a^{xy}$
3. $\forall x \in \mathbb{R} : a^{-x} = \frac{1}{a^x}$
4. Se $a > 1$ allora $\forall x, y \in \mathbb{R}, x < y : a^x < a^y$.
5. Se $0 < a < 1$ allora $\forall x, y \in \mathbb{R}, x < y : a^y < a^x$.

Definizione: Siano $a, b \in \mathbb{R}, a, b > 0, a \neq 1$. Si chiama logaritmo di base a ed argomento b il numero reale denotato con $\log_a b$ definito nel seguente modo:

$$x = \log_a b \in \mathbb{R} \text{ tale che } a^x = b.$$

Definizione: Siano X, Y insiemi, $X, Y \neq \emptyset$. Sia $R \subset X \times Y$. Si dice che R è una relazione funzionale tra X ed Y se:

$$\forall x \in X, \exists! y \in Y \text{ tale che } (x, y) \in R.$$

Definizione: Siano X, Y insiemi non vuoti. Si dice che f è una funzione da X in Y , se f è una terna ordinata della forma:

$$f = (X, Y, R)$$

dove R è una relazione funzionale da X in Y .

Notazione: Siano X, Y insiemi non vuoti. Sia $f = (X, Y, R)$ una funzione con $R \subset X \times Y$ una relazione funzionale. Tale f si denota anche con il simbolo:

$$f : X \rightarrow Y$$

la legge che $\forall x \in X$ associa l'unico $y \in Y$ tale che $f(x) = y$, ossia $(x, y) \in R$. con R una relazione funzionale tra X ed Y .

Si chiama valore immagine di x tramite f e si denota con $f(x)$, l'unico $y \in Y$ tale che $y = f(x)$.

Definizione: Siano X, Y insiemi non vuoti. Sia $f : X \rightarrow Y$ una funzione. Si chiama dominio o campo di esistenza di f l'insieme X . Si chiama insieme di arrivo di f l'insieme Y .

Definizione: Si chiama insieme immagine di $f : X \rightarrow Y$ e si denota con $f(X)$, l'insieme:

$$f(X) = \{y \in Y \mid \exists x \in X : f(x) = y\}.$$

Denotata con R_f la relazione funzionale associata ad f , si ha che

$$f(X) = \{y \in Y \mid \exists x \in X : (x, y) \in R_f\}.$$

Definizione: Siano X, Y insiemi non vuoti. Sia $f : X \rightarrow Y$ una funzione. Si chiama grafico di f insieme:

$$G_f = \{(x, y) \in X \times Y \mid y = f(x)\} = \{(x, f(x)) \mid x \in X\} \subset X \times Y.$$

Esempi: Sia X , un insieme non vuoto. Si chiama relazione diagonale:

$$\Delta_X = \{(x, y) \in X \times X \mid y = x\}.$$

Si chiama funzione identica la terna ordinata $i_x = (X, X, \Delta_X)$. Tale i_x si può denotare con il simbolo:

$$i_x : X \rightarrow X$$

$\forall x \in X \exists! y \in Y$ tale che $y = i_x(x) = x$. Ulteriormente si scrive

$$i_X : x \in X \mapsto i_X(x) = x, \quad \forall x \in X.$$

Sia X insieme non vuoto. Sia Y un insieme non vuoto. Sia anche $c \in Y$. Si chiama funzione costante di valore c la terna ordinata $f = (X, Y, R)$ dove

$$R \subset X \times Y, \quad x \in X \mid \exists! y \in Y, y = c \text{ tale che } (x, y) \in R.$$

è una legge che ad ogni $x \in X$ associa univocamente il valore $c \in Y$.

$$f : X \rightarrow Y$$

$$\forall x \in X, f(x) = c$$

Siano X insiemi non vuoto. Sia $A \subset X$, $A \neq \emptyset$. Si chiama funzione iniezione canonica di A in X e si denota

$$j_A : A \rightarrow X$$

la funzione che $\forall x \in A$ associa $j_A(x) = x$. Pertanto

$$j_A : A \rightarrow X$$

$$j_A : x \in A \mapsto j_A(x) = x \in X$$

Inoltre $j_A = (A, X, R)$ dove la relazione funzionale $R = \{(x, y) \in A \times X | y = j_A(x) = x\}$.

Osservazione: Siano X_1, X_2, Y_1, Y_2 insiemi non vuoti. Siano $f_1 = (X_1, Y_1, R_1)$ e $f_2 = (X_2, Y_2, R_2)$ due funzioni. Si dice che $f_1 = f_2$ se e solo se $X_1 = X_2$, $Y_1 = Y_2$, $R_1 = R_2$.

Definizione: Siano X, Y insiemi non vuoti. Sia $f : X \rightarrow Y$ una funzione. Sia $A \subset X$. Si chiama immagine diretta di A tramite f , l'insieme:

$$f(A) = \{y \in Y | \exists x \in A : y = f(x)\}.$$

Proposizione: Siano X, Y insiemi non vuoti. Siano $A, B \subset X$. Sia anche $f : X \rightarrow Y$ una funzione. Allora risultano vere le seguenti proprietà:

1. $f(A) = \emptyset \iff A = \emptyset$.
2. $A \subset B \implies f(A) \subset f(B) \subset f(X)$.
3. $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$.
4. $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$.

Osservazione: nella proprietà 4) non vale in generale l'uguaglianza, per mostrarlo cerchiamo un controesempio. Allora se $A \cap B = \emptyset$ sia $f : X \rightarrow Y$ la funzione che vale costantemente c . Ma allora $f(A) \cap f(B) = \{c\} \neq f(A \cap B) = \emptyset$ ■.

Definizione: Siano X, Y insiemi non vuoti. Sia $f : X \rightarrow Y$ una funzione. Consideriamo $C \subset Y$. Si chiama immagine reciproca di C tramite f l'insieme:

$$f^{-1}(C) = \{x \in X | f(x) \in C\}.$$

Proposizione: Siano X, Y insiemi non vuoti. Sia $f : X \rightarrow Y$ una funzione. Siano anche $C, D \subset Y$. Allora valgono le seguenti proprietà:

1. $f^{-1}(C) \neq \emptyset \iff C \cap f(X) \neq \emptyset$
2. $C \subset D \implies f^{-1}(C) \subset f^{-1}(D)$

3. $f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$
4. $f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$.
5. $f^{-1}(Y \setminus C) = f^{-1}(\mathcal{C}_Y(C)) = \mathcal{C}_X(f^{-1}(C)) = X \setminus f^{-1}(C)$.

Esempi: Sia X insieme non vuoto. Sia $A \subset X$ non vuoto. Sia $\bar{x} \in X$. Sia $j_A : A \rightarrow X$ l'ingezione canonica di A . Poniamo $C = \{\bar{x}\}$. Calcoliamo $j_A^{-1}(C)$. Risulta che

$$j_A^{-1}(C) = \begin{cases} \{\bar{x}\} & \text{se } \bar{x} \in A, \\ \emptyset & \text{se } \bar{x} \notin A. \end{cases}$$

Siano X, Y insiemi non vuoti. Sia $f : X \rightarrow Y$ di costante valore $c \in Y$. Sia $B \subset Y$. Allora

$$f^{-1}(B) = \begin{cases} X & \text{se } c \in B, \\ \emptyset & \text{se } c \notin B. \end{cases}$$

Proposizione: Siano X, Y insiemi non vuoti. Sia $f : X \rightarrow Y$ una funzione. Allora valgono le seguenti proprietà:

1. Se $A \subset X$, allora $A \subset f^{-1}(f(A))$,
2. Se $B \subset Y$, allora $f(f^{-1}(B)) \subset B$.

Definizione: Siano X, Y insiemi non vuoti. Sia $f : X \rightarrow Y$ una funzione. Si dice che f è iniettiva o ingettiva, se:

$$\forall x_1, x_2 \in X, f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2.$$

Equivalentemente f si dice ingettiva se:

$$\forall x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2).$$

Osservazione:

$$f \text{ è ingettiva} \iff \forall y \in Y : f^{-1}(y) = \begin{cases} \emptyset \\ \exists! x \in X : f(x) = y. \end{cases}$$

Definizione: Siano X, Y insiemi non vuoti. Sia $f : X \rightarrow Y$ una funzione. f si dice surgettiva se:

$$f(X) = Y$$

Definizione: Siano X, Y insiemi non vuoti. Sia $f : X \rightarrow Y$ una funzione. f si dice bigettiva o invertibile se f è sia ingettiva che surgettiva.

Proposizione: Siano X, Y insiemi non vuoti. Sia $f : X \rightarrow Y$ una funzione. Allora vale: f bigettiva $\iff \forall y \in Y \exists! x \in X$ tale che $y = f(x)$.

Dimostrazione: ($\implies$). Assumiamo f è bigettiva, dobbiamo dimostrare che $\forall y \in Y \exists! x \in X$ tale che $y = f(x)$. Sia $y \in Y$. Essendo f surgettiva, si ha $y = f(x)$, da cui $y \in f(X)$. Pertanto $\exists x \in X$ tale che $y = f(x)$. Poiché f è

ingettiva tale $x \in X$ è unico. Infatti se fosse che $\exists x_1 \in X$ tale che $f(x_1) = y$ allora $f(x) = y = f(x_1)$, da cui per l'ingettività $x_1 = x$ ■.

Definizione: Siano X, Y insiemi non vuoti. Sia $f : X \rightarrow Y$ una funzione bigettiva. Si dice funzione inversa di f , e si denota col simbolo f^{-1} , la funzione da Y a X tale che

$$\forall y \in Y \text{ associa l'unico } x \in X : f(x) = y.$$

Pertanto $f^{-1} : Y \rightarrow X$. $f^{-1}(y) \rightarrow x \in X$ tale che $f(x) = y$. Scriveremo $f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y$.

Definizione: Siano X, Y, Z insiemi non vuoti. Sia $f : X \rightarrow Y$ e sia $g : Y \rightarrow Z$, due funzioni. Si chiama funzione composta di f e g la funzione denotata col simbolo $g \circ f$, definita come:

$$\forall x \in X, (g \circ f)(x) = g(f(x))$$

è quindi una funzione da $X \rightarrow Z$.

Osservazione: Se X, Y, Z sono insiemi non vuoti, e W insieme non vuoto, se $f : X \rightarrow W$, $g : Y \rightarrow Z$ e si ha che $f(X) \subset Y$ allora si può ancora definire la composizione $g \circ f$. E rispetta la stessa relazione funzionale. E risulta definita come prima, ovvero:

$$\forall x \in X, (g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Proposizione: Siano X, Y insiemi non vuoti. Allora si ha che

$$f \text{ è bigettiva allora : } \begin{cases} f \circ f^{-1} = i_Y \\ f^{-1} \circ f = i_X. \end{cases}$$

Teorema: Siano X, Y insiemi non vuoti. Siano $f : X \rightarrow Y$ e $g : Y \rightarrow Z$ bigettive. Allora la funzione $g \circ f : X \rightarrow Z$ è invertibile e si ha:

$$(g \circ f)^{-1} : Z \rightarrow X, \quad (g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$$

Proposizione: Siano X, Y insiemi non vuoti. Siano $f : X \rightarrow Y$ una funzione. Allora sono fatti equivalenti:

1. f è ingettiva
2. $\forall A \subset X : A = f^{-1}(f(A))$. E anche
3. f è surgettiva
4. $\forall B \subset Y : B = f(f^{-1}(B))$.

Definizione: Siano X, Y insiemi non vuoti. Si dice che X e Y sono equipotenti se:

$$\exists f : X \rightarrow Y \text{ una funzione}$$

tale che f è bigettiva. In tal caso si dice che X e Y hanno la stessa cardinalità, e si scrive, $\text{card}(X) = \text{card}(Y)$. (O anche $|X| = |Y|$)

Definizione: Siano X, Y insiemi non vuoti. Si dice che X ha cardinalità minore o uguale a Y se

$$\exists f : X \rightarrow Y \text{ una funzione}$$

tale che f è iniettiva. E si scrive $|X| \leq |Y|$.

Definizione: Sia E insieme. Denoteremo con il simbolo $\mathcal{P}(E)$ l'insieme delle parti di E .

Osservazione: Sia E un insieme. La relazione $R = \{(A, B) \in \mathcal{P}(E) \times \mathcal{P}(E) \mid |A| = |B|\}$ è una relazione di equivalenza su $\mathcal{P}(E)$.

Definizione: Sia E un insieme non vuoto. Si dice che E è finito se $\exists n \in \mathbb{N}$, $n \neq 0$ ed $\exists f : E \rightarrow \{1, \dots, n\}$ bigettiva. In tal caso scriveremo che $|E| = n$. Se E è vuoto. Si pone $|E| = 0$.

Definizione: Si dice che E insieme, è infinito se non è finito.

Proposizione: Valgono le seguenti proprietà:

1. Se E, F sono insiemi finiti, allora $E \cup F$ e $E \cap F$ sono insiemi finiti, e si ha che $|E| + |F| = |E \cup F| + |E \cap F|$.
2. Se E, F sono insiemi finiti, allora $E \times F$ è un insieme finito e $|E \times F| = |E||F|$.
3. Se E è un insieme finito, allora ogni suo sottoinsieme è finito.

Definizione: Si dice che E è numerabile se $\exists f : E \rightarrow \mathbb{N}$ bigettiva. Ossia che E è equipotente ad $\mathbb{N}$.

Proposizione: Valgono le seguenti proprietà:

1. Se E è un insieme numerabile e $A \subset E$. Allora A è finito oppure A è al più numerabile.
2. Se E, F sono insiemi numerabili. Allora $E \cup F$ è numerabile e anche $E \times F$.

Proposizione: $\mathbb{N} \setminus \{0\}$ ($\mathbb{N}^*$) è numerabile.

Dimostrazione: Sia $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^*$ tale che $n \rightarrow n + 1$. f è bigettiva. Allora $|\mathbb{N}| = |\mathbb{N}^*|$ ■.

Proposizione: $\mathbb{Z}$ è numerabile.

Dimostrazione: Sia $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ tale che:

$$f(n) = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \\ 2n - 1 & \text{se } n \in \mathbb{N} \\ 2n & \text{se } n \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N} \end{cases}$$

f è una funzione bigettiva ■.

Proposizione: $\mathbb{Q}$ è numerabile.

Dimostrazione: Utilizzando l'assioma della scelta, consideriamo $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$, tale che $\forall q \in \mathbb{Q} : f(q) = m \cdot n^{-1}$, $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{Z}^*$. f è bigettiva e quindi $|\mathbb{Q}| = |\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*| = |\mathbb{N}|$.

Teorema(Cantor): Per ogni insieme E si ha che $|E| < \mathcal{P}(E)$.

Dimostrazione: Sia $f : E \rightarrow \mathcal{P}(E)$, tale che $f(x) = \{x\}$, $\forall x \in E$. f è iniettiva, quindi $|E| \leq |\mathcal{P}(E)|$. Sia $g : E \rightarrow \mathcal{P}(E)$, una funzione. Verifichiamo che g non può essere surgettiva. Ossia $g(E) \neq \mathcal{P}(E)$. Basta provare che $\mathcal{P}(E) \not\subset g(E)$. Consideriamo $F = \{x \in E \mid x \notin g(x)\}$. Tale $F \subset \mathcal{P}(E)$, ma $F \notin g(E)$. Se fosse che $\exists a \in E$ tale che $g(a) = F$ arriveremmo ad una contraddizione. Infatti,

1. $a \in F$, ma allora $a \notin g(a) = F$, assurdo.
2. $a \notin F$, ma allora $a \in g(a) = F$, assurdo. Che dimostra che non ci possono essere funzioni surgettive da $|E|$ a $|\mathcal{P}(E)|$ ■.

Corollario: $|\mathbb{N}| < |\mathcal{P}(\mathbb{N})|$.

Proposizione: $|\mathbb{R}| =]0, 1[= |[0, 1]|$.

Dimostrazione: Basta dimostrare che $|\mathbb{R}| \leq |[0, 1]| =]0, 1[$. Sia $f :]0, 1[\rightarrow \mathbb{R}$, tale che $\forall x \in]0, 1[, f(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x-1} \in \mathbb{R}$. f è bigettiva ■.

Teorema: L'intervallo $[0, 1[$ non è numerabile.

Dimostrazione: Se per assurdo $[0, 1[$ fosse numerabile, pertanto $|[0, 1[| = |\mathbb{N}|$. Ovvero $\exists f : [0, 1[\rightarrow \mathbb{N}$ bigettiva. Denoteremo con S l'insieme degli allineamenti decimali di cifre comprese tra 0 e 9 che non sono definitivamente 9. Tale S è in bigezione con l'intervallo $[0, 1[$. Pertanto anche S è numerabile. Vorrei costruire un $\bar{x} \in [0, 1[$ che non appartiene ad S , tale che possiamo mettere S in bigezione con l'insieme $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}^*\}$, con x_n un allineamento decimale. $x_n = 0, a_1^{(n)} a_2^{(n)} \dots a_n^{(n)} \dots \in [0, 1[$, con $a_j^{(n)} \in \{1, \dots, 9\}$. Proviamo che $\exists \bar{x} \in [0, 1[$ tale che $\bar{x} \notin S$. Sia quindi $\bar{x} = 0, b_1 b_2 b_3, \dots$ dove:

$$b_i = \begin{cases} 5 & \text{se } a_i^i = \{0, 1, 2, 3, 4\} \\ 4 & \text{se } a_i^i = \{5, 6, 7, 8, 9\}. \end{cases}$$

Si ha che $\bar{x} \notin S$, perché differisce da ogni elemento di S in almeno una posizione, quella sulla diagonale. Quindi $|[0, 1[| > |\mathbb{N}|$ ■.

Teorema: L'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$ è equipotente a $\mathcal{P}(\mathbb{N})$. Ovvero $|\mathbb{R}| = |\mathcal{P}(\mathbb{N})| = 2^{\aleph_0}$. Dove $\aleph_0 = |\mathbb{N}|$.

Definizione: $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$, detto $\mathbb{R}$ ampliato o esteso. $\mathbb{R}$ si può dotare di una struttura algebrica estendendo le usuali leggi di composizione e ordine su $\mathbb{R}$, anche se solo parzialmente.

Iniziamo ad estendere il totale ordinamento di $\mathbb{R}$. Porremo,

$$\forall x \in \mathbb{R}, -\infty < x < +\infty$$

detto ordinamento esteso.

Semialgebrizzazione di $\overline{\mathbb{R}}$. La struttura algebrica assiomatica di $\mathbb{R}$ può essere parzialmente estesa a $\overline{\mathbb{R}}$, ponendo per definizione:

$$\begin{cases} \forall x \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \{+\infty\} : -\infty + x = x + (-\infty) = -\infty \\ \forall x \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \{-\infty\} : +\infty + x = x + (+\infty) = +\infty \\ \forall x \in]0, +\infty] : -\infty \cdot x = x \cdot (-\infty) = -\infty & +\infty \cdot x = x \cdot (+\infty) = +\infty \\ \forall x \in [-\infty, 0[: -\infty \cdot x = x \cdot (-\infty) = +\infty & +\infty \cdot x = x \cdot (+\infty) = -\infty. \end{cases}$$

Mentre non si possono definire:

1. $+\infty - \infty$
2. $0 \cdot (+\infty)$, come anche $0 \cdot (-\infty)$
3. Il reciproco di 0.

Vale l'esistenza dell'elemento neutro di somma e prodotto:

$$\forall x \in \overline{\mathbb{R}} : x + 0 = x, \text{ e anche } x \cdot 1 = x, x \cdot (-1) = -x.$$

Definizione: Sia $x_0 \in \mathbb{R}$, e $r \in \mathbb{R}_0^+$. Si chiama intorno sferico di centro x_0 e raggio r l'intervallo $]x_0 - r, x_0 + r[$. Denotato con $B_r(x_0)$ o $I_r(x_0)$.

Osservazione: Se $x \in I_r(x_0) : x_0 - r < x - x_0 < x_0 + r \implies |x - x_0| < r$.

Definizione: Sia $x_0 \in \mathbb{R}$. Si dice che U è un intorno di x_0 in $\mathbb{R}$ se:

$$\exists r > 0 :]x_0 - r, x_0 + r[\subset U.$$

Definizione: Sia $x_0 = +\infty \in \overline{\mathbb{R}}$. Si chiama intorno di $+\infty$ in $\mathbb{R}$ un qualunque insieme $U \in \mathbb{R}$ tale che $\exists a \in \mathbb{R}]a, +\infty[\subset U$.

Osservazione: Se $x_0 = +\infty$, un intorno di $+\infty$ in $\overline{\mathbb{R}}$. Ogni insieme $A \subset \overline{\mathbb{R}}$ tale che $A = U \cup \{+\infty\}$ con U intorno di $+\infty$. In maniera analoga si definisce intorno di $-\infty$.

Notazione: Sia $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$, si denota con $\mathcal{J}_{x_0}$ l'insieme degli intorni di x_0 .

Proposizione(Principio di separazione degli intorni): Sia $p_1, p_2 \in \mathbb{R}, p_1 \neq p_2$. Allora $\exists V_1 \subset \mathcal{J}_{p_1}, \exists V_2 \subset \mathcal{J}_{p_2}$ tali che $V_1 \cap V_2 = \emptyset$.

Dimostrazione: Per ipotesi $p_1 \neq p_2$. Supponiamo $p_1 < p_2$.

1. $p_1, p_2 \in \mathbb{R}$. Poniamo $r = \frac{p_2 - p_1}{2} > 0$. Posto $V_1 =]p_1 - r, p_1 + r[$ e $V_2 =]p_2 - r, p_2 + r[$, chiaramente $V_1 \cap V_2 = \emptyset$.
2. Se $p_1 = -\infty$ e $p_2 \in \mathbb{R}$. Sia $V_1 =]-\infty, b[$, con $b \in \mathbb{R}$ e $b < p_2$. Sia $V_2 =]p_2 - r, p_2 + r[$ con $r = \frac{p_2 - b}{2}$, otteniamo che $V_1 \cap V_2 = \emptyset$.
3. $p_1 \in \mathbb{R}$ e $p_2 = +\infty$. Sia $V_2 =]b, +\infty[$, con $b \in \mathbb{R}, p_1, b$. Sia $V_1 =]p_1 - r, p_2 + r[$ con $r = \frac{b - p_1}{2}$, otteniamo che $V_1 \cap V_2 = \emptyset$ ■.

Proposizione: sia $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$. Siano $V_1 \subset \mathcal{J}_{x_0}, V_2 \subset \mathcal{J}_{x_0}$, allora $V_1 \cap V_2 \subset \mathcal{J}_{x_0}$.

Definizione: Sia $A \subset \mathbb{R}$. Sia $x_0 \in \mathbb{R}$. Si dice che x_0 è interno all'insieme A se $\exists U \subset \mathcal{J}_{x_0}$ tale che $U \subset A$.

L'insieme dei punti interni di A si denota con $\dot{A}$ (interno di A).

Definizione: Sia $A \subset \mathbb{R}$. Si dice che x_0 è punto esterno di A se x_0 è interno al complementare di A , ovvero $\exists U \subset \mathcal{J}_{x_0}$ tale che $U \subset \mathbb{R} \setminus \{A\}$.

Definizione: Sia $A \subset \mathbb{R}$. Si dice che $x_0 \in \mathbb{R}$ è un punto di frontiera di A se x_0 non è né interno né esterno ad A . L'insieme dei punti di frontiera si denota con ∂A (frontiera di A).

Definizione: Sia $A \subset \mathbb{R}$. Sia $\bar{x} \in \overline{\mathbb{R}}$. Si dice che $\bar{x}$ è punto di accumulazione per A in $\overline{\mathbb{R}}$ se $\forall U \in \mathcal{J}_{\bar{x}}$ si ha che $U \cap A \setminus \{\bar{x}\} \neq \emptyset$.

L'insieme dei punti di accumulazione di A si denota con $\mathcal{D}(A) \subset \overline{\mathbb{R}}$.

Definizione: Sia $A \subset \mathbb{R}$, sia $\bar{x} \in \overline{\mathbb{R}}$. Si dice che $\bar{x}$ è punto di aderenza per A in $\overline{\mathbb{R}}$ se $\forall U \subset \mathcal{J}_{\bar{x}}, U \cap A \neq \emptyset$. L'insieme dei punti di aderenza di A si denota con il simbolo $\bar{A}$. Questo insieme si dice anche chiusura di A .

Proposizione:

1. Sia $A \subset \mathbb{R}$, sia $\bar{x} \in \overline{\mathbb{R}}$. Supponiamo che $\bar{x} \in B_r(A)$. Ogni intorno di $\bar{x}$ contiene infiniti punti di A , ovvero $\forall U \subset \mathcal{J}_{\bar{x}}, \exists B \subset \mathbb{R} : B \subset U \cap A$. Con B insieme non finito.
2. Sia $A \subset \mathbb{R}, A \neq \emptyset$. Allora $\sup A \in \overline{\mathbb{R}}, \inf A \in \overline{\mathbb{R}}$ sono punti di aderenza per A .

Definizione: Si chiama successione di numeri reali ogni funzione definita in $\mathbb{N}$ a valore in $\mathbb{R}$. Con $(\mathbb{N}, \mathbb{R}, \mathbb{R})$ terna della successione.

Notazione: Si usa convenzionalmente sostituire alla notazione $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ una notazione del tipo: $f : n \in \mathbb{N} \rightarrow f(n) = a_n \in \mathbb{R}$ la funzione f si indica $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow \{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$.

Definizione: Sia $A \subset \mathbb{R}$. Si dice successione numerica di elementi di A ogni funzione

$$f : \mathbb{N} \rightarrow A.$$

Tale successione si denota col simbolo $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, dove $\forall n \in \mathbb{N}, f(n) = a_n \in A$.

Definizione: Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di numeri reali. Si dice che $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è monotona crescente se:

$$\forall n, m \in \mathbb{N}, n < m : a_n \leq a_m.$$

Si dice, invece, che $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è monotona decrescente se:

$$\forall n, m \in \mathbb{N}, n < m : a_m \leq a_n.$$

Inoltre si dice che $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è strettamente monotona crescente (rispettivamente strettamente monotona decrescente) se:

$$\forall n, m \in \mathbb{N}, n < m : a_n < a_m \quad (a_m < a_n \text{ rispettivamente}).$$

Proposizione: Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di numeri reali. I seguenti fatti sono equivalenti:

1. $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è monotona crescente (decrescente).
2. $\forall n \in \mathbb{N} : a_n \leq a_{n+1} (a_{n+1} \leq a_n)$.

Dimostrazione: 1) $\implies$ 2). Segue direttamente dalla definizione di monotonia. Dato che $\forall n \in \mathbb{N}, m = n + 1 \implies n < m \implies a_n \leq a_{n+1}$. 2) $\implies$ 1). Supponiamo che $\forall n \in \mathbb{N}, a_n \leq a_{n+1}$. Proviamo che $\forall n, m \in \mathbb{N} n < m : a_n \leq a_m$. Fissiamo $n, m \in \mathbb{N}$, con $n < m$. Poniamo $k = m - n \in \mathbb{N}, k \geq 1$. Vogliamo provare che $a_n \leq a_{n+k}$. Se $k = 1$, allora $a_n \leq a_{n+1}$ per ipotesi. Procediamo per induzione

su k . Abbiamo già verificato $k = 1$. Supponiamo che $a_n \leq a_{n+k}$ e dimostriamo per $k + 1$. Allora:

$$a_n \leq a_{n+k} \leq a_{(n+k)+1} = a_{n+(k+1)}.$$

Da cui $a_n \leq a_{n+(k+1)}$. Segue che $\forall k \in \mathbb{N}, k \geq 1, a_n \leq a_{n+k}$, concludiamo che $a_n \leq a_m$ ■.

Proposizione: Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di numeri reali. I seguenti fatti sono equivalenti:

1. $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è strettamente monotona crescente (decescente).
2. $\forall n \in \mathbb{N} : a_n < a_{n+1}$ ($a_{n+1} < a_n$).

Dimostrazione: Analoga alla precedente.

Esempi: $(1)_{n \in \mathbb{N}}, f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} : \forall n \in \mathbb{N}, f(n) = 1$. Il grafico di f : $G_f = \{(n, f(n)) | n \in \mathbb{N}\} = \{(n, 1) | n \in \mathbb{N}\}$. $\forall n \in \mathbb{N}, a_n = a_{n+1} \implies a_n \leq a_{n+1}$ e anche $a_{n+1} \leq a_n$. Quindi $(1)_{n \in \mathbb{N}}$ è sia monotona crescente che monotona decrescente, ma non strettamente.

$(\frac{1}{n+1})_{n \in \mathbb{N}}, f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} : \forall n \in \mathbb{N}, f(n) = \frac{1}{n+1}$. Questa è una successione strettamente monotona decrescente, ossia:

$$\forall n, m \in \mathbb{N}, n < m : a_m < a_n \iff \forall n, m \in \mathbb{N}, n < m : \frac{1}{m+1} < \frac{1}{n+1} \iff \forall n \in \mathbb{N}, \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}.$$

Definizione: Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ successione di numeri reali. Sia $l \in \overline{\mathbb{R}}$. Si dice che la successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tende a l per n tendente a $+\infty$ se:

$$\forall V \in \mathcal{J}_l, \exists \nu \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N}, n \geq \nu \implies a_n \in V.$$

In tal caso si scrive:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = l.$$

Definizione: Sia $P(n)$ una proprietà indicizzata da $n \in \mathbb{N}$. Si dice che $P(n)$ è vera definitivamente se: $\exists \nu \in \mathbb{N}$ tale che $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq \nu, P(n)$ è vera.

Osservazione: Diremo che $(a_n)_n$ tende a l , per n che tende a $+\infty$, si esprime dicendo:

$$\forall V \in \mathcal{J}_l : a_n \in V \text{ definitivamente.}$$

Definizione: Sia $P(n)$ una proprietà indicizzata da $n \in \mathbb{N}$. Si dice che $P(n)$ è vera frequentemente se: $P(n)$ è vera per infiniti indici. Ovvero:

$$\forall k \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N}, n \geq k \text{ tale che } P(n) \text{ è vera.}$$

Osservazione: $P(n)$ è vera definitivamente allora $P(n)$ è vera frequentemente.

Dimostrazione: $P(n)$ vera definitivamente vuol dire che $\exists \nu \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N}, n \geq \nu : P(n)$ è vera. Vogliamo provare che $\forall k \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N}, n \geq k$ tale che $P(n)$ è vera. Sia $k \in \mathbb{N}$, esiste $n \in \mathbb{N}$, tale che $n \geq \max\{k, \nu\}$ tale che $P(n)$ è vera ■.

Teorema(unicità del limite di successioni): Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ successione di numeri reali. Se $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ammette un limite per n che tende a $+\infty$, allora questo limite è unico.

Dimostrazione: Per assurdo, se $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ammettesse due limiti distinti, $l_1, l_2 \in \overline{\mathbb{R}}$ tali che $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = l_1$ e l_2 . Poiché $l_1 \neq l_2$, per il principio di separazione degli interni, $\exists V_1 \in \mathcal{J}_{l_1}, \exists V_2 \in \mathcal{J}_{l_2}$ tali che $V_1 \cap V_2 = \emptyset$. Poiché $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tende ad l_1 , in corrispondenza di V_1 , $\exists \nu_1 \in \mathbb{N}$ tale che $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq \nu_1$ (definitivamente) si ha che $a_n \in V_1$. Vale l'analogo per l_2 , quindi in corrispondenza di V_2 , $\exists \nu_2 \in \mathbb{N}$ tale che $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq \nu_2$ (definitivamente) si ha che $a_n \in V_2$. Segue che posto $\nu_3 = \max\{\nu_1, \nu_2\}$, si ha $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq \nu_3 : a_n \in V_1 \cap V_2 \neq \emptyset$, che produce una contraddizione in quanto avevamo supposto che $V_1 \cap V_2 = \emptyset$ ■.

Esempio: La successione $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}, f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} : \forall n \in \mathbb{N}, f(n) = (-1)^n$. Ovvero $a_n = (-1)^n, \forall n \in \mathbb{N}$. Questa successione non ammette limite, perché esistono interni di 1 o -1 per i quali a_n non gli appartiene, definitivamente.

Definizione: Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di numeri reali. Sia $l \in \mathbb{R}$. supponiamo che $\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = l \in \mathbb{R}$, allora:

$$\begin{cases} l \in \overline{\mathbb{R}} & \text{si dice che } a_n \text{ converge ad } l \\ l = +\infty & \text{si dice che } a_n \text{ diverge positivamente, e si scrive: } \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty \\ l = -\infty & \text{si dice che } a_n \text{ diverge negativamente, e si scrive } \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = -\infty. \end{cases}$$

1) : $l \in \mathbb{R}, \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = l$ vuol dire che

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \nu \in \mathbb{N} \text{ tale che } \forall n \in \mathbb{N}, n \geq \nu : |a_n - l| < \varepsilon,$$

ovvero:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \nu \in \mathbb{N} \text{ tale che } \forall n \in \mathbb{N}, n \geq \nu : a_n \in]l - \varepsilon, l + \varepsilon[.$$

2) : $l = +\infty (-\infty), \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty (-\infty)$ vuol dire che

$$\forall k \in \mathbb{R}, k > 0 \exists \nu \in \mathbb{N} \text{ tale che } \forall n \in \mathbb{N}, n \geq \nu : a_n > k (a_n < -k)$$

ovvero:

$$\forall V =]k, +\infty[(V =]-\infty, -k[) \exists \nu \in \mathbb{N} \text{ tale che } \forall n \in \mathbb{N}, n \geq \nu : a_n \in]k, +\infty[(a_n \in]-\infty, -k[).$$

Definizione: Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di numeri reali. Si dice che $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è limitata superiormente (inferiormente) se:

$$\exists M > 0 \text{ tale che } a_n \leq M (a_n \geq -M) \forall n \in \mathbb{N}.$$

Si dice che $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è limitata se è limitata sia superiormente che inferiormente. Ossia che:

$$\exists M > 0 \text{ tale che } \forall n \in \mathbb{N}, |a_n| \leq M.$$

Esempi: $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ è limitata da $M = 1$. $(2)_{n \in \mathbb{N}}$ è limitata da, per esempio $M = 3$. $b_n = \left(\frac{1}{n+1}\right)_{n \in \mathbb{N}}$, allora $b_n \leq 1$ e anche $b_n > 0$. Allora: $|b_n| = \frac{1}{n+1} \leq 1$. Mentre $(n)_{n \in \mathbb{N}}$ non è limitata superiormente.

Proposizione: Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di numeri reali convergente. Allora $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è limitata.

Dimostrazione: Sia $l \in \mathbb{R}$ tale che $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = l$. Pertanto $\forall \varepsilon > 0 \exists \nu \in \mathbb{N}$ tale che $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq \nu : |a_n - l| < \varepsilon$. Cioè $l - \varepsilon < a_n < l + \varepsilon$. Scelto $\varepsilon = 1$, $\exists \nu \in \mathbb{N}$, tale che $\forall n > \nu, l - 1 < a_n < l + 1$. Consideriamo $M = \max \{a_0, a_1, \dots, a_{\nu-1}, l + 1\}$, e sia $N = \min \{a_0, a_1, \dots, a_{\nu-1}, l - 1\}$. Segue che $\forall n \in \mathbb{N}, N \leq a_n \leq M$. Quindi $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è limitata.

Definizione: Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di numeri reali. Si chiama estremo superiore della successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, e si denota con $\sup_{n \in \mathbb{N}}(a_n)$, l'estremo superiore dell'insieme: $\{a_n | n \in \mathbb{N}\}$. Mentre si chiama estremo inferiore della successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, e si denota con $\inf_{n \in \mathbb{N}}(a_n)$, l'estremo inferiore dell'insieme: $\{a_n | n \in \mathbb{N}\}$.

Definizione: Una successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ si dice infinitesima se $\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$.

Osservazione: Se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \in \mathbb{R} \iff \exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n - l = 0$, ossia la successione $(a_n - l)_{n \in \mathbb{N}}$ è infinitesima.

Teorema: Siano $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ successioni di numeri reali. Supponiamo che $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \overline{\mathbb{R}}$ e $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b \in \overline{\mathbb{R}}$. Allora la successione: $(a_n + b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ammette limite $a + b$ purché tale $a + b$ non produca una forma indeterminata in $\overline{\mathbb{R}}$. Risulta in tal caso che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

Dimostrazione: Supponiamo che $a, b \in \mathbb{R}$. Verifichiamo che $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = a + b \in \mathbb{R}$. Pertanto vogliamo provare che

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \nu \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N}, n \geq \nu : |a_n + b_n - (a + b)| < \varepsilon.$$

Ovvero:

$$a + b - \varepsilon < a_n + b_n < a + b + \varepsilon.$$

Sia $\varepsilon > 0$. Poiché $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ e $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, in corrispondenza di $\frac{\varepsilon}{2} > 0$:

$$\exists \nu_1 \in \mathbb{N} \text{ tale che } \forall n \in \mathbb{N}, n \geq \nu_1 : a - \frac{\varepsilon}{2} < a_n < a + \frac{\varepsilon}{2}$$

E anche

$$\exists \nu_2 \in \mathbb{N} \text{ tale che } \forall n \in \mathbb{N}, n \geq \nu_2 : b - \frac{\varepsilon}{2} < b_n < b + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Posto $\nu_3 = \max \{\nu_1, \nu_2\}$, si ha che

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq \nu_3 : a - \frac{\varepsilon}{2} < a_n < a + \frac{\varepsilon}{2}, b - \frac{\varepsilon}{2} < b_n < b + \frac{\varepsilon}{2} \implies$$

E sommando membro a membro:

$$a + b - \varepsilon < a_n + b_n < a + b + \varepsilon$$

Allora $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = a + b$ ■.

Osservazione: Se $a = +\infty, b = -\infty$ oppure $a = -\infty, b = +\infty$, non possiamo dedurre alcuna informazione sul comportamento della successione $(a_n + b_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Proposizione: Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di numeri reali. Sia $l \in \mathbb{R}$, supponiamo che $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$. Allora $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |l|$.

Dimostrazione: Vogliamo provare che $\forall \varepsilon > 0, \exists \nu \in \mathbb{N}$, tale che $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq \nu : ||a_n| - |l|| < \varepsilon$. Sia $\varepsilon > 0$. Per ipotesi $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \in \mathbb{R}$, in corrispondenza di $\varepsilon > 0$:

$$\exists \nu \in \mathbb{N} \text{ tale che } \forall n \in \mathbb{N}, n \geq \nu : |a_n - l| < \varepsilon.$$

Segue che $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq \nu$:

$$||a_n| - |l|| \leq |a_n - l| < \varepsilon,$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq \nu : ||a_n| - |l|| < \varepsilon \blacksquare.$$

Osservazione: Il viceversa della proposizione è falso, ad esempio sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} = ((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$. Allora la successione $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ non ammette limite, ma $(|(-1)^n|)_{n \in \mathbb{N}} = (1)_{n \in \mathbb{N}}$ converge ad 1.

Proposizione: Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di numeri reali. Allora risulta vera la seguente equivalenza:

1. $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$
2. $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$.

Dimostrazione: Basta verificare che $2) \implies 1)$. Supponiamo che $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$ e proviamo che

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \nu \in \mathbb{N} \text{ tale che } \forall n \in \mathbb{N}, n \geq \nu : |a_n| < \varepsilon.$$

Sia quindi $\varepsilon > 0$. Poiché $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$, in corrispondenza di $\varepsilon > 0$:

$$\exists \nu \in \mathbb{N} \text{ tale che } \forall n \in \mathbb{N}, n \geq \nu : |a_n| = ||a_n|| < \varepsilon \blacksquare.$$

Esempio: Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} = \left(\frac{(-1)^n}{n}\right)_{n \in \mathbb{N} \wedge n \geq 1}$. Poiché $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, allora la successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è infinitesima, dato che $\frac{|(-1)^n|}{n} = \frac{1}{n}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1$. Riconosciamo che $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, ossia

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \nu \in \mathbb{N} \text{ tale che } \forall n \in \mathbb{N}, n \geq \nu : \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

Sia $\varepsilon > 0$. Per la proprietà archimedeica applicata a ε^{-1} : $\exists \nu \in \mathbb{N}$ tale che $\nu > \varepsilon^{-1} = \frac{1}{\varepsilon}$. Allora $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq \nu : n > \frac{1}{\varepsilon} \iff \frac{1}{n} < \varepsilon$. Concludiamo che $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$.

Teorema(permanenza del segno per successioni): Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di numeri reali. Supponiamo che $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \in \mathbb{R}$. Allora valgono le seguenti implicazioni:

1. $l > 0 \implies a_n > 0$ definitivamente
2. $l < 0 \implies a_n < 0$ definitivamente.

Dimostrazione:

1. Supponiamo che $l > 0, l \in \mathbb{R}$, verifichiamo che $a_n > 0$ definitivamente. Ovvero che

$$\exists \nu \in \mathbb{N} \text{ tale che } \forall n \in \mathbb{N}, n \geq \nu : a_n > 0.$$

Per ipotesi si ha che $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l > 0$. Pertanto

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \nu \in \mathbb{N} \text{ tale che } \forall n \in \mathbb{N}, n \geq \nu : |a_n - l| < \varepsilon.$$

Sia $\varepsilon > 0$ tale che $l - \varepsilon > 0$. In corrispondenza di questo ε :

$$\exists \nu \in \mathbb{N} \text{ tale che } \forall n \in \mathbb{N}, n \geq \nu : 0 < l - \varepsilon < a_n < l + \varepsilon.$$

Segue che $a_n > 0$ definitivamente.

2. Supponiamo che $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l = +\infty$. Ossia

$$\forall k > 0 \exists \nu \in \mathbb{N} \text{ tale che } \forall n \in \mathbb{N}, n \geq \nu : a_n > k.$$

Sia, ad esempio, $k = 1$. In corrispondenza di tale k , $\exists \nu \in \mathbb{N}$ tale che $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq \nu$ tale che $a_n > 1 > 0$ ■.

Il caso $l < 0$ si dimostra allo stesso modo.

Controesempio: $l = 0$. $\left(\frac{(-1)^n}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ tende a $l = 0$ ma i termini di $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ cambiano segno.

Corollario: Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di numeri reali. Supponiamo che $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \in \mathbb{R}$. Allora valgono le seguenti implicazioni:

1. $a_n \geq 0$ definitivamente, allora $l \geq 0$
2. $a_n \leq 0$ definitivamente, allora $l \leq 0$.

Dimostrazione: Dimostriamo 1). Supponiamo che $a_n \geq 0$ definitivamente. Se per assurdo $l < 0$, allora dal teorema della permanenza del segno segue che $a_n < 0$ definitivamente, che è assurdo, in quanto, definitivamente $0 \leq a_n < 0 \implies 0 < 0$ ■.

Proposizione(criterio del confronto per successioni convergenti):

Siano $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ successioni di numeri reali. Siano $a, b \in \mathbb{R}$. Supponiamo che $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ e $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$. Allora, valgono le seguenti implicazioni:

1. $a < b \implies a_n < b_n$ definitivamente
2. $a_n \leq b_n$ definitivamente $\implies a \leq b$.

Dimostrazione:

1. Supponiamo che $a < b$, ossia $b - a > 0$. Consideriamo la successione $(a_n - b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è convergente e $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + (-b_n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} (-b_n) = a - b < 0$. Quindi, per il teorema della permanenza del segno, si ha che $a_n - b_n < 0$ definitivamente. Ossia $a_n < b_n$ definitivamente.

2. Supponiamo che $a_n \leq b_n$ definitivamente e proviamo che $a \leq b$. Se per assurdo fosse $b < a$ allora, per il punto 1) avremmo che $b_n < a_n$ definitivamente, assurdo ■.

Proposizione(criterio del confronto per successioni divergenti): Supponiamo che $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ siano successioni di numeri reali. Supponiamo anche che

1. $a_n \leq b_n$ definitivamente
2. $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ Allora $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$. Inoltre, se:
3. $a_n \leq b_n$ definitivamente
4. $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = -\infty$ Allora $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$.

Dimostrazione: Dimostriamo il primo caso. Supponiamo che valgano 1) e 2) e verifichiamo che $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$. Ossia $\forall k > 0 \exists \nu \in \mathbb{N}$ tale che $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq \nu : b_n > k$. Sia $k > 0$. Poiché $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, in corrispondenza di tale k :

$$\exists \nu \in \mathbb{N}, \text{ tale che } \forall n \in \mathbb{N}, n \geq \nu : a_n > k.$$

Poiché $a_n \leq b_n$ definitivamente, si ha che: $\exists \tilde{\nu} \in \mathbb{N}$ tale che $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq \tilde{\nu} : k < a_n < b_n$, quindi $b_n > k$ definitivamente. Si dimostra in maniera analoga l'altro caso ■.

Teorema(convergenza obbligata (o dei carabinieri) per successioni): Siano $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}}, (c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ successioni di numeri reali. Supponiamo che:

1. $a_n \leq b_n \leq c_n$ definitivamente
2. $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = l \in \mathbb{R}$. Allora:

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = l.$$

Dimostrazione: Vogliamo provare che $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = l \in \mathbb{R}$, ossia $\forall \varepsilon > 0 \exists \nu \in \mathbb{N}$ tale che $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq \nu : |b_n - l| < \varepsilon \implies l - \varepsilon < b_n < l + \varepsilon$. Fissiamo $\varepsilon > 0$. Poiché $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = l$, in corrispondenza di $\varepsilon > 0$

$$\exists \nu \in \mathbb{N} \text{ tale che } l - \varepsilon < a_n < l + \varepsilon \wedge l - \varepsilon < b_n < l + \varepsilon.$$

Poiché $a_n < b_n < c_n$ definitivamente, si ha, definitivamente, che

$$l - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < l + \varepsilon.$$

Ossia $l - \varepsilon < b_n < l + \varepsilon$ definitivamente ■.