乳果糖口服溶液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【说明书修订日期】

2025年04月30日

【特殊标记】

OTC甲类

【药品名称】

乳果糖口服溶液

【英文名称】

Lactulose Oral Solution

【汉语拼音】

Ruguotang Koufurongye

【成份】

每100毫升口服溶液含乳果糖67克，半乳糖：≤10克，乳糖：≤6克。本品不含任何辅料。

【性状】

本品为无色至淡棕黄色澄明黏稠液体。

【作用类别】

本品为缓泻药类非处方药药品。

【适应症】

慢性功能性便秘。

【规格】

每毫升含乳果糖667毫克(15毫升:10克)

【用法用量】

口服，成人起始量：每日15-30毫升(每日1-2袋)(相当于10-20克乳果糖)，维持量：每日7.5～15毫升(每日1/2-1袋)(相当于5-10克乳果糖)。

【不良反应】

乳果糖几乎不被吸收，中等剂量的乳果糖可能出现轻微的腹痛和烧灼感。剂量过大可引起腹部不适、胃肠胀气、厌食、恶心、呕吐及腹痛、腹泻以及电解质紊乱等。治疗初期容易发生。
治疗肝性脑病时，有报道极少数病例发生高钠血症。

【禁忌】

1.患有急性炎症性肠病(溃疡性结肠炎、克罗恩病)，肠梗阻或者亚阻塞综合症、消化道穿孔或者消化道穿孔风险、阑尾炎、不明原因的腹痛、急腹痛及同时使用其他导泻剂者禁用。
2.本品含有可吸收的糖，半乳糖血症患者禁用。

3.对乳果糖及其组分过敏者禁用。
4.对乳糖或半乳糖不耐受者、果糖不耐受者、乳糖酶缺乏、或葡萄糖/半乳糖吸收不良综合症患者禁用。
5.尿毒症患者禁用。

【注意事项】

1.儿童用量请咨询医师。婴幼儿及常染色体隐性遗传性果糖不耐受的儿童服用本品时应慎重。
2.使用时应注意调整剂量，避免出现剧烈腹泻。
3.妊娠期头3个月慎用。妊娠3个月以上及哺乳期妇女应在医师指导下使用。
4.老人及有其他疾病者应在医师指导下使用，并定期检查电解质水平。
5.本品如用于乳果糖缺乏症患者，需注意本品中乳糖的含量。
6.如果在治疗二三天后，便秘症状无改善或反复出现，请咨询医生。
7.服用本品期间，排便反射可能被改变。
8.患有胃心综合症(勒姆里尔德综合征)的患者，服用本品前请咨询医师，如该类患者在服用本品时出现腹胀或者胀气，应减少剂量或停止服用本品。
9.固定剂量长期服用或滥用本品，将导致腹泻和电解质失衡。
10.瓶盖打开后，应在三个月内用完。
11.对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
12.本品性状发生改变时禁止使用。
13.请将本品放在儿童不能接触的地方。
14.儿童必须在成人监护下使用。
15.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】

1.乳果糖可能加剧由其他药物引起的钾的流失(如噻嗪类、类固醇和两性霉素B)，与强心甙合用时，可因为钾丢失而加强强心甙的作用。
2.随着剂量的增加，结肠内的pH值会下降，因此在结肠内依赖pH值释放的药物(如5-ASA)可能会失活。
3.如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】

乳果糖在结肠中被消化道菌丛转化成有机酸，导致肠道内pH值下降，并通过保留水分，增加粪便体积。上述作用刺激结肠蠕动，保持大便通畅，缓解便秘，同时恢复结肠的生理节律。

【贮藏】

避光，10-25℃保存。请将本品放在儿童不能接触的地方。

【包装】

聚酯/铝/聚乙烯口服液体药用复合膜，15毫升/袋，6袋/盒。

【有效期】

24个月

【执行标准】

YBH04652025

【批准文号】

国药准字H20253657

【药品上市许可持有人】

名　称：云鹏医药集团有限公司
注册地址：山西省临汾市襄汾县医药工业园区云鹏大道19号

【生产企业】

企业名称：云鹏医药集团有限公司
生产地址：山西襄汾医药工业园区云鹏大道19号
邮政编码：041500
咨询热线：400-7654188
电话号码：0357-3010622
传真号码：0357-3018036
如有问题可与生产企业联系