浓维磷糖浆说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【说明书修订日期】

核准日期：2007年03月12日
修改日期：2011年08月18日

【警告】

对本品过敏者禁用

【药品名称】

浓维磷糖浆

【注册商标】

国桥

【英文名称】

Concentrated Divitamins and Sodium Phosphate Syrup

【汉语拼音】

Nong Weilin Tangjiang

【成份】

本品为复方制剂，其组份为每500ml中含50%甘油磷酸钠10.5g，咖啡因1.5g，维生素B_1 0.3g，磷酸0.27g，烟酸0.03g。

【性状】

本品为棕黄色至深棕色的黏稠液体，味甜。

【适应症】

用于植物神经功能紊乱引起的头晕目眩、精神疲倦以及低磷血症。

【规格】

复方

【用法用量】

口服。一次10ml，一日3次。

【不良反应】

本品复方中咖啡因服用过量可引起恶心、头痛或失眠。长期过多服用，可出现头痛、紧张、激动和焦虑。咖啡因的致死量为10g。

【禁忌】

1.对甘油磷酸钠过敏者禁用。
2.胃溃疡患者禁用。
3.严重肾功能不全患者禁用。

4.休克和失水患者禁用。

【注意事项】

1.本品中咖啡因能促进血浆内肾素的活性，儿茶酚胺的释放也增加，但破坏亦快，不一定出现血压升高。
2.本品对前列腺素受体是弱激动强拮抗。
3.本品能使血糖微升。
4.长期大量服用本品，有耐受性和习惯性。
5.本品含咖啡因，运动员慎用。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

不推荐使用。

【儿童用药】

未进行该项实验且无可靠参考文献。

【老年用药】

未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药物相互作用】

1.异烟肼和甲丙氨酯能促使咖啡因增效，提高后者脑组织内浓度55%，肝和肾内浓度则有所下降。
2.口服避孕药有可能减慢咖啡因的清除率。
3.同时服用钙盐、氢氧化铝或氧化镁等能减少磷的吸收。
4.与肾上腺皮质激素，尤其是盐皮质激素、促肾上腺皮质激素、雄激素等合用，可增加水钠潴留。
5.维生素D能增加口服磷的吸收，合用时易发生高磷血症。

【药物过量】

见不良反应。

【药理毒理】

本品中咖啡因能提高细胞内环磷腺苷(cAMP)含量。小剂量能增强大脑皮层兴奋过程、振奋精神，解除疲劳。大剂量有兴奋延脑中枢作用。维生素B_1结合三磷酸腺苷形成维生素B_1焦磷酸盐，是碳水化合物代谢时所必需的辅酶。维生素B_1能抑制胆碱酯酶的活性，缺乏时胆碱酯酶活性增强，乙酰胆碱水解加速，致神经冲动传导障碍，影响胃肠、心肌功能。烟酸在体内能转化为烟酰胺，再与核糖腺嘌呤等组成烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(辅酶Ⅰ)和烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(辅酶Ⅱ)，为脂质、氨基酸、蛋白、嘌呤代谢，组织呼吸的氧化作用和糖元分解所必需。烟酸可降低辅酶A的利用：通过抑制极低密度脂蛋白(VLDL)的合成而影响血中胆固醇的运载。烟酸尚有周围血管扩张作用。甘油磷酸钠是磷补充剂，用以满足人体每天对磷的需要。磷参与骨质的形成，以磷脂形式参与细胞膜的组成，同时磷与许多代谢中的酶活性有关，在能量代谢中的作用至关重要。

【药代动力学】

未进行该项实验且无可靠参考文献。

【贮藏】

密封，遮光，30℃以下保存。

【包装】

塑料瓶装，500ml/瓶。

【有效期】

暂定24个月。

【执行标准】

WS-10001-(HD-1215)-2002-2013

【批准文号】

国药准字H33022369

【生产企业】

企业名称：浙江华立南湖制药有限公司
Zhejiang Holley Nanhu Pharmaceutical Co.,Ltd.
生产地址：嘉兴经济开发区云海路340号
邮政编码：314033
电话号码：0573-82202888
传真号码：0573-82227528
注册地址：嘉兴经济开发区云海路340号