Animals in the Bible © United Bible Societies, 2025. Adapted from: All Creatures Great and Small: Living Things in the Bible, by Edward R. Hope © 2005 United Bible Societies. This work is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

標題：北非狷羚（麅子）（**bubal hartebeest [roe deer]**）

2.7 標題：北非狷羚（麅子）（bubal hartebeest [roe deer]）

經文出處

Hebrew 來：יַחְמוּר (音譯：yachmur)DEU 14:5, 1KI 5:3

討論



北非狷羚 (Pixabay)雖然大多數英文譯本（RSV 、NEB 、JB 、NIV 、REB 、NAB ）均譯作“roebuck”（「雄麅子」），但許多聖經動物學家反對這種譯法。他們認為：麅子在聖經時期雖然相當常見，一年裡有部分時間是獨自或成對生活，但卻並不是群居的動物；牠們極其膽小，生活在茂密的灌木叢中，很少出來，所以很難捕獲。甚至在牠們棲息的地區，也難得看見牠們。因此有人指出，1KI 4:23 記載每天都有大量的麅子擺在所羅門的餐桌上幾乎是不可能的。然而，也有學者認為，打獵捕獲麅子雖然困難，但是設陷阱誘捕就比較容易。

KJV 將其譯成「鹿」，這種譯法也被否定了，因為學者幾乎一致認同希伯來文'ayal 是指鹿，並且這個詞此前已經出現在所羅門的食物清單裡面了。

動物學家一致同意將該詞譯作「北非狷羚」，這種動物為人所熟知，並且很容易進行半馴養，就像鹿那樣。在埃及的壁畫和石刻上就繪有狷羚，西奈半島也有，只是數量較少。另外，人們在埃及考古遺址發現了許多北非狷羚的木乃伊。在迦南和以色列的考古遺址都發現了不少北非狷羚的骨頭，甚至在迦南祭壇附近也有，表明迦南人可能用牠們來獻祭。

希伯來文名稱 yachmur 可能源自 ch-m-r 這個詞根，意思是「紅色的」，與驢的希伯來文名稱的詞根相同。北非狷羚是紅色的，而且長得非常像有角的驢。這種動物也被稱為「赤狷羚」。Hartebeest（「狷羚」）是從荷蘭文借用的英文詞語，字面意思是「鹿牛」。

有趣的是，《七十士譯本》將 yachmur 翻譯為 bubalos （「水牛」），這是以色列人所熟知的動物。巴比倫人和敘利亞人馴養了水牛，並且在以色列北部胡列湖周圍的沼澤中也有水牛的蹤跡。然而，這個譯法沒有得到現代學者的支持。北非狷羚中的狷羚（bubal）一名是源於這個希臘文詞語。

描述

麅子（學名 Capreolus capreolus ）是體型較小的鹿，成年雄性長著有三個分叉的短角。皮毛在夏季呈褐色，冬季呈灰色。牠們獨自或成對生活在森林和茂密林地的矮樹叢中，即使在覓食時，離開樹叢的距離也不會超過一兩米（3–6 英呎）。

狷羚或赤狷羚（學名 Alcelaphus buselaphus ）是一種大型羚羊，肩高約 1.5 米（5 英呎）。雄性和雌性的面部都很長，頭上有一大塊隆起，隆起處長著一對短而粗的角。這對角先是向前、向上彎曲到一半的長度，然後突然筆直地向後生長。狷羚是紅棕色的。

狷羚是平原動物，經常在瞪羚、斑馬或其他羚羊群中吃草。狷羚的背部傾斜，看起來有些笨拙，但其實牠們非常善於奔跑，能夠持續地快速奔跑 10 公里（6 英里），並且在這個距離內能輕鬆超越任何其他動物。

狷羚曾經遍佈北非和以色列的各個平原，貝都因人稱之為「野牛」。在一些猶太聖經譯本中，yachmur 被翻譯為「野牛」。如今，上述地區的狷羚已經滅絕了，但是在博茨瓦納的卡拉哈里半島，以及安哥拉、納米比亞、贊比亞和津巴布韋的鄰近地區，還可以見到這種動物。乍得、蘇丹、烏干達、肯尼亞和坦桑尼亞也有非常相似的狷羚，如萊氏狷羚（學名 Alcelaphus lelwel ）和科氏狷羚（學名 Alcelaphus cokei ）。在肯尼亞和坦桑尼亞，狷羚的斯瓦希里文名稱是 kongoni 。近緣物種有：喀麥隆、扎伊爾、烏干達和肯尼亞的鄂氏牛羚或黑面狷羚（學名 Damaliscus korrigum ）、津巴布韋和莫桑比克的轉角牛羚（學名 Damaliscus lunatus ），以及南非的披紅狷羚（學名 Alcelaphus caama ）、白紋牛羚（學名 Damaliscus pygargus ）和白臉牛羚（學名 Damaliscus albifrons ）。

翻譯

（1）如果選擇將這個詞譯為「麅子」，那麼在麅子為人熟知的地區，可以使用該物種的當地名稱。如果當地人不知道麅子，可以使用其他相似的小型鹿的名稱；例如，在印度、緬甸和東南亞，可譯為麂或赤麂（學名 Muntiacus muntiacus ）；

在拉丁美洲的巴西和阿根廷，可譯為草原鹿（學名 Blastocerus bezoarticus ）。

在不知道鹿的非洲地區，可以使用小型獨羚的名稱，例如霓羚亞科中的一種：

在西非和中非，可譯為黃背霓羚或叢林山羊（學名 Cephalophus sylvicultrix ）；

在東非、中非和南非，可譯為灰霓羚（學名 Sylvicapra grimmia ）；

在其他地方，可以採用類似「小型鹿」（與表示黇鹿的譯詞「大型鹿」相對）的表述或是採用音譯。

（2）如果譯成紅狷羚或北非狷羚，則選擇如下：在博茨瓦納、贊比亞、津巴布韋等地，可採用紅狷羚（學名 Alcelaphus buselaphus ）的當地名稱；

在東非，可譯為科氏狷羚或東非狷羚（學名 Alcelaphus cokei ）；

在乍得和蘇丹，可譯為萊氏狷羚（學名 Alcelaphus lelwel ）；

在南非，可譯為披紅狷羚（學名 Alcelaphus caama ）、轉角牛羚（學名 Damaliscus lunatus ）、白紋牛羚（學名 Damaliscus pygargus ）或白臉牛羚（學名 Damaliscus albifrons ）；

在其他地區，可採用「野牛」這類名稱。