Animals in the Bible © United Bible Societies, 2025. Adapted from: All Creatures Great and Small: Living Things in the Bible, by Edward R. Hope © 2005 United Bible Societies. This work is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

标题：北非狷羚（狍子）（**bubal hartebeest [roe deer]**）

2.7 标题：北非狷羚（狍子）（bubal hartebeest [roe deer]）

经文出处

Hebrew 来：יַחְמוּר (音译：yachmur)DEU 14:5, 1KI 5:3

讨论



北非狷羚 (Pixabay)虽然大多数英文译本（RSV 、NEB 、JB 、NIV 、REB 、NAB ）均译作“roebuck”（“雄狍子”），但许多圣经动物学家反对这种译法。他们认为：狍子在圣经时期虽然相当常见，一年里有部分时间是独自或成对生活，但却并不是群居的动物；它们极其胆小，生活在茂密的灌木丛中，很少出来，所以很难捕获。甚至在它们栖息的地区，也难得看见它们。因此有人指出，1KI 4:23 记载每天都有大量的狍子摆在所罗门的餐桌上几乎是不可能的。然而，也有学者认为，打猎捕获狍子虽然困难，但是设陷阱诱捕就比较容易。

KJV 将其译成“鹞鹿”，这种译法也被否定了，因为学者几乎一致认同希伯来文’ayal 是指鹞鹿，并且这个词此前已经出现在所罗门的食物清单里面了。

动物学家一致同意将该词译作“北非狷羚”，这种动物为人所熟知，并且很容易进行半驯养，就像鹿那样。在埃及的壁画和石刻上就绘有狷羚，西奈半岛也有，只是数量较少。另外，人们在埃及考古遗址发现了许多北非狷羚的木乃伊。在迦南和以色列的考古遗址都发现了不少北非狷羚的骨头，甚至在迦南祭坛附近也有，表明迦南人可能用它们来献祭。

希伯来文名称 yachmur 可能源自 ch-m-r 这个词根，意思是“红色的”，与驴的希伯来文名称的词根相同。北非狷羚是红色的，而且长得非常像有角的驴。这种动物也被称为“赤狷羚”。Hartebeest（“狷羚”）是从荷兰文借用的英文词语，字面意思是“鹿牛”。

有趣的是，《七十士译本》将 yachmur 翻译为 bubalos （“水牛”），这是以色列人所熟知的动物。巴比伦人和叙利亚人驯养了水牛，并且在以色列北部胡列湖周围的沼泽中也有水牛的踪迹。然而，这个译法没有得到现代学者的支持。北非狷羚中的狷羚（bubal）一名是源于这个希腊文词语。

描述

狍子（学名 Capreolus capreolus ）是体型较小的鹿，成年雄性长着有三个分叉的短角。皮毛在夏季呈褐色，冬季呈灰色。它们独自或成对生活在森林和茂密林地的矮树丛中，即使在觅食时，离开树丛的距离也不会超过一两米（3–6 英尺）。

狷羚或赤狷羚（学名 Alcelaphus buselaphus ）是一种大型羚羊，肩高约 1.5 米（5 英尺）。雄性和雌性的面部都很长，头上有一大块隆起，隆起处长着一对短而粗的角。这对角先是向前、向上弯曲到一半的长度，然后突然笔直地向后生长。狷羚是红棕色的。

狷羚是平原动物，经常在瞪羚、斑马或其他羚羊群中吃草。狷羚的背部倾斜，看起来有些笨拙，但其实它们非常善于奔跑，能够持续地快速奔跑 10 公里（6 英里），并且在这个距离内能轻松超越任何其他动物。

狷羚曾经遍布北非和以色列的各个平原，贝都因人称之为“野牛”。在一些犹太圣经译本中，yachmur 被翻译为“野牛”。如今，上述地区的狷羚已经灭绝了，但是在博茨瓦纳的卡拉哈里半岛，以及安哥拉、纳米比亚、赞比亚和津巴布韦的邻近地区，还可以见到这种动物。乍得、苏丹、乌干达、肯尼亚和坦桑尼亚也有非常相似的狷羚，如莱氏狷羚（学名 Alcelaphus lelwel ）和科氏狷羚（学名 Alcelaphus cokei ）。在肯尼亚和坦桑尼亚，狷羚的斯瓦希里文名称是 kongoni 。近缘物种有：喀麦隆、扎伊尔、乌干达和肯尼亚的鄂氏牛羚或黑面狷羚（学名 Damaliscus korrigum ）、津巴布韦和莫桑比克的转角牛羚（学名 Damaliscus lunatus ），以及南非的披红狷羚（学名 Alcelaphus caama ）、白纹牛羚（学名 Damaliscus pygargus ）和白脸牛羚（学名 Damaliscus albifrons ）。

翻译

（1）如果选择将这个词译为“狍子”，那么在狍子为人熟知的地区，可以使用该物种的当地名称。如果当地人不知道狍子，可以使用其他相似的小型鹿的名称；例如，在印度、缅甸和东南亚，可译为麂或赤麂（学名 Muntiacus muntiacus ）；

在拉丁美洲的巴西和阿根廷，可译为草原鹿（学名 Blastocerus bezoarticus ）。

在不知道鹿的非洲地区，可以使用小型独羚的名称，例如鬣羚亚科中的一种：

在西非和中非，可译为黄背鬣羚或丛林山羊（学名 Cephalophus sylvicultrix ）；

在东非、中非和南非，可译为灰鬣羚（学名 Sylvicapra grimmia ）；

在其他地方，可以采用类似“小型鹿”（与表示黇鹿的译词“大型鹿”相对）的表述或是采用音译。

（2）如果译成红狷羚或北非狷羚，则选择如下：在博茨瓦纳、赞比亚、津巴布韦等地，可采用红狷羚（学名 Alcelaphus buselaphus ）的当地名称；

在东非，可译为科氏狷羚或东非狷羚（学名 Alcelaphus cokei ）；

在乍得和苏丹，可译为莱氏狷羚（学名 Alcelaphus lelwel ）；

在南非，可译为披红狷羚（学名 Alcelaphus caama ）、转角牛羚（学名 Damaliscus lunatus ）、白纹牛羚（学名 Damaliscus pygargus ）或白脸牛羚（学名 Damaliscus albifrons ）；

在其他地区，可采用“野牛”这类名称。