

Plants and Trees in the Bible © United Bible Societies, 2025. Adapted from: Each According to its Kind: Plants and Trees in the Bible, by Robert Koops © 2012 United Bible Societies. This work is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

标题：其他实用的植物

5.2 标题：其他实用的植物

本节讨论的植物包括葫芦、梭梭（用于制作碱液）、曼德拉草、马郁兰（牛膝草）、毒参、野瓜和苦艾。虽然后 3 种可以入药，但这不是我们在圣经中看到的主要功能，所以我们将其列在这里，而没有放在第 4 章。

标题：葫芦（**bottle gourd**）

5.2.1 标题：葫芦（bottle gourd）

经文出处

Hebrew 来: פקעִים (音译: peqa'im) 1KI 6:18, 1KI 7:24, 1KI 7:24

讨论



葫芦 (Bonelli (NYPL Digitalcollections))葫芦 (学名 *Lagenaria siceraria*) 是人类最早种植的植物之一，可作食物，入药，以及制作各种器皿和乐器。葫芦原产于非洲，可能在一万年前左右，由于人为或自然因素被引入到亚洲和美洲。这个植物属的名称来自拉丁文 *lagoena*，意思是“长颈瓶”（几乎可以确定，最早的罗马长颈瓶就是用干葫芦制成）。这种植物的名称源于拉丁文的“干”一词，说明其果实干了以后很有用。无疑，住在圣地的人们会把切开的葫芦用作家里的碗或“长柄勺”，就像我们在非洲和亚洲看到的那样。但是，圣经中提到葫芦时，仅仅是说在所罗门圣殿里的香柏木上刻着葫芦图案（1KI 6:18），以及圣殿前面的大铜盆装饰着葫芦图案（1KI 7:24; 1KI 7:24）。祖海里认为，葫芦也出现在地名“底连”（Dilean, JOS 15:38）中；Dilean 源于希伯来文 *dela'ath*，在圣经成书之后的时期，*dela'ath* 是葫芦的希伯来文名称。

描述

葫芦是一种藤蔓植物，与黄瓜和南瓜一样。葫芦的茎是四方形的，有棱，有毛，长度可达 5 米（17 英尺）。叶子为心形，大小和人的手掌差不多，叶缘轻微浅裂。花为黄色，有 5 个花瓣，花落后结出的果实根据品种不同有许多种形状。大多数葫芦的一端是球形，并且带一个细长的突出部分，所以切成两半后非常实用，可在厨房里作大勺子用。

特殊意义



葫芦 (Hyunjung Kim (Wikimedia Commons))数千年来，葫芦一直用作容器，或者切开后作舀水的器具，另外也用来制作乐器。大多数葫芦品种的果肉都很苦，有时甚至有毒。在一些国家，有些品种还用作药物，有通便、驱虫、治疗胸痛和头痛的功效。在非洲南部，叶子和未成熟的幼果被当作蔬菜食用。

翻译

在非洲和亚洲的温带和热带地区，翻译者应该很容易找到表示葫芦的词语。葫芦在法国称为 **courge bouteille**，在葡萄牙称为 **abobora-carneira** 或 **cabaco**，在拉丁美洲称为 **calabaza** 或 **cogorda**，在中国称为“匏瓜”，在印度称为 **lauki**，在印度尼西亚称为 **labu**，在日本称为 **hyotan** 或 **yugao**，在马来西亚称为 **labu ayer**，在菲律宾称为 **upo**，在斯里兰卡称为 **diya labu**，在泰国称为 **buap khaus**，在越南称为 **bau**。

如果当地人们唯一熟知的葫芦是圆球形的，那么提供插图会有助于读者理解，或者可以在脚注中描述我们所知的圣地葫芦的特殊形状。葫芦与 2KI 4:39 提到的野瓜是近缘物种，这种野瓜使一群先知发生食物中毒（参 5.2.6 野瓜（柯罗辛、苦西瓜、药西瓜）(wild gourd [colocynth, egusi, bitter apple])）。对于 JON 4:6 中的“葫芦”（“gourd”；KJV、REB），现在认为该植物是蓖麻（参4.2.2 蓖麻 (castor oil plant [castor bean plant])）。

标题：梭梭（猪毛菜属[Salsola]、盐角草属[Salicornia]）(hammada [Salsola, Salicornia])

5.2.2 标题：梭梭（猪毛菜属[Salsola]、盐角草属[Salicornia]）(hammada [Salsola, Salicornia])

经文出处

Hebrew 来: בֹּרִית (音译: bor)JOB 9:30, ISA 1:25Hebrew 来: בֹּרִית (音译: borith)JER 2:22, MAL 3:2

讨论



梭梭 (Otto Wilhelm Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885, via Kurt Stueber (Wikimedia Commons))耶利米时期的犹太人还没有肥皂, 肥皂要在许多个世纪以后才出现。然而, 他们将某些植物的灰与橄榄油混合, 做出了一种类似肥皂的东西。其中一种植物是梭梭树 (学名 *Hammada salicornica*), 常见于沙漠, 阿拉伯文称为 rimth。赫珀说, 任何一种家里产生的灰烬都可以当作肥皂的原料, 但是藜科灌木 ([*Salsola*]猪毛菜属和[*Salicornia*])

盐角草属、盐草和海蓬子)的灰特别有效。莫尔登克赞成这个观点,并进一步补充说,阿拉伯人称盐草为 **kali** 或 **elkali**, 化学术语碱 (**alkali**) 就是由此衍生而来。

描述

盐角草属(学名[**Salicornia**])有两种。白梭梭是一种无叶灌木,经常生长在金合欢树旁边,高不到 1 米 (3 英尺),茎绿色、多节。小花在 12 月左右开放,所结的小果实里面有一粒羽翼状的种子,可以随风散播。黑梭梭与之类似,但颜色较深,喜砂土,在北非也有分布。

特殊意义



拿着干猪毛菜(“风滚草”)植株的男孩 (Dcrjsr (Wikimedia Commons)) MAL 3:2 提到漂布,指的是洗去羊毛织物上的天然油脂,好进行染色。漂布的人把某些植物的灰烬和橄榄油混合,制成我们所说的碱液或苏打,然后漂洗衣物,并在漂布场晒干(参 2KI 18:17)。漂布所用的碱液要比肥皂强劲得多,更像是今天的漂白剂,《玛拉基书》就是用这种“漂布的碱”来描述上帝对他子民进行的强力清洁。

翻译

我们建议翻译者先研究当地制作肥皂的方法,了解其中的成分,以找到合适的译词。如果要保留 JER 2:22 中希伯来文本的平行结构,翻译者需要有两个表示“使某物洁净”的词语。如果没有“碱液”(或“苏打”)的对等词,翻译者可以考虑使用当地诗歌中表示擦洗身体之物的文化对等词,比如西非的丝瓜或浮石。如果需要音译 **Salsola kali** (带刺的盐草),可以按照希伯来文 **borith**、阿拉伯文 **hurd** 或 **shawk ahhmar**、法文 **soude conchee** 或 **sonde kali**、葡萄牙文 **barilla espinhosa** 或 **soda** 或 **trago-espinhoso**、西班牙文 **abrojos** 或 **barella** 或 **salsora** 等词语进行音译。

标题：曼德拉草（“爱情果”）（**mandrake** [“love apple”]）

5.2.3 标题：曼德拉草（“爱情果”）（mandrake [“love apple”]）

经文出处

Hebrew 来：דודאים (音译：duda'im) GEN 30:14, GEN 30:14, GEN 30:15, GEN 30:15, GEN 30:16, SNG 7:14

讨论



曼德拉草植株 (איתן פרמן (Wikimedia Commons)) 解经家对于希伯来文 *duda'im* 所指植物的意见不一。许多解经家断言，这个词必定是指曼陀罗（毒参茄）或曼德拉草（学名 *Mandragora autumnalis*），但祖海里认为这是不可能的，因为曼陀罗从来没有生长在美索不达米亚地区，即 GEN 30:14; GEN 30:15; GEN 30:16 的故事所在地。在 SNG 7:14（《和》7:13），*duda'im* 是指一种与苹果有关的、种植在河岸上的“佳美果子”（不像《创世记》中的 *duda'im* 那样是从地里挖出来的）。不论这种生长在美索不达米亚的植物原本是什么物种，当以色列人讲述这个故事时，他们使用了一个听众都知道的词，即 *duda'im*。《创世记》的上下文暗示，*duda'im* 与生育能力有关。根据学者们的意见，在圣经时期最受欢迎

的助孕植物是曼陀罗。《七十士译本》和《他尔根》的翻译者带着他们自己对于爱和生育的看法，将 duda'im 置于圣地的背景下，却无意弄清这种生长在美索不达米亚的植物究竟是什么。英文译本参照《七十士译本》，使用了“mandrake”（“曼德拉草”）一词。

描述



中世纪书籍中绘制的曼德拉草的根 (Wikimedia Commons) 曼德拉草是一种没有茎的草本植物，与土豆和西红柿有亲缘关系，但长的更贴近地面。叶子为深绿色，长 30 厘米（1 英尺），宽 10 厘米（4 英寸），呈玫瑰状从中心向外展开。紫色或蓝色的花开在靠近植株中心的茎上，果实呈黄色，成熟后看起来像鸟巢里的蛋。曼德拉草有一种独特的气味，有些人觉得香甜，有些人觉得刺鼻。根很粗壮，通常是分叉的，看起来像人的身体，这也许就是它催情的名声在中东和欧洲远播的原因，也是“爱情果”这个名字的由来。

特殊意义

传说，曼德拉草具有很多神奇的特性。比如，当曼德拉草从地里拔出时会发出尖叫声，叶子在黑暗中会发光。在中世纪，德意志人给它们穿上衣服，向其献祭，以免冒犯神灵。法兰西人相信小精灵住在曼德拉草里面，并要求人们每天献祭。1630 年，汉堡的三名妇女因被控行巫术而处死，原因是她们的家中有曼德拉草的根。阿拉伯人称曼德拉草为“魔鬼的蜡烛”。

翻译

“曼德拉草”的译法有：

1. 使用类似的植物，比如“野生茄子”（如尼日利亚的贝罗姆文），并加上脚注。有些地方可以仿照尼日利亚的豪萨文 gautan daji （或 yalo）。
2. 使用一个功能对等词，即当地众所周知的某种助孕植物，如尼日利亚的蒂夫文的译法（mkehem）。
3. 新造一个描述性短语，如“爱情花”（“love flower”；CEV）或“爱情果”。
4. 按照希伯来文 duda'im 或某种主要语言进行音译，如英文 mandaraki 或法文 mandragore，并在脚注中说明这种植物可能被人认为具有助孕能力。在音译时，建议增加“的根”一语，说明是这种植物的根产生效力。

标题：马郁兰（marjoram）

5.2.4 标题：马郁兰（marjoram）

经文出处

Hebrew 来： עֶזוֹב (音译：'ezov) EXO 12:22, LEV 14:4, LEV 14:6, LEV 14:49, LEV 14:51, LEV 14:52, NUM 19:6, NUM 19:18, 1KI 5:13, PSA 51:9 Greek 希： ὑσσώπος (音译：hussōpos) JHN 19:29, HEB 9:19

讨论



马郁兰（牛膝草） (Ray Pritz (UBS))



马郁兰花 (Gidip (Wikimedia Commons)) 祖海里、赫珀和 ABD 都认为希伯来文 *'ezov* 可能是指马郁兰 (学名 *Origanum syriacum* 或 *Majorana syriaca*)。《七十士译本》的翻译者决定使用希腊文名称 *hussōpos* (意为“牛膝草”，英文“*hyssop*”)为译词，这个词通常是指一种欧洲植物，类似圣地的马郁兰。有些植物学家把圣经中提到的马郁兰称为“叙利亚牛膝草”，带来了更大的困惑。《国际标准圣经百科全书》(The International Standard Bible Encyclopedia) 指出，*'ezov* 可能包括多种植物。我们认为“叙利亚牛膝草”这个名称太过于以欧洲为中心，故建议译成“马郁兰”。*'Ezov* 和 *hussōpos* 是同源词。19 世纪和 20 世纪的一些植物学家查考了“刺山柑”的阿拉伯文 (*el asaf*，后来演变成 *lassaf*)，并推测五经中的 *'ezov* 必定是指这种盛产于埃及和阿拉伯沙漠的刺山柑灌木 (参 3.5.1 刺山柑 (刺山柑灌木、刺山柑浆果) (Caper [caper bush, caper berry]))。的确，在 1KI 5:13 (《和》4:33)，墙上长的刺山柑灌木比马郁兰更说得通。*'Ezov* 是犹太人在洁净礼仪时所需要的植物。是否存在以下可能：当希伯来人进入应许之地后，他们在那里发现了很多马郁兰，洁净礼仪随之发生改变，*'ezov* “符合律法”的定义发生了延伸，从而将马郁兰包含在内呢？马郁兰是一种多毛植物，淋洒水非常方便。因此，新约《约翰福音》中的 *hussōpos* 一词指马郁兰的茎是很有可能性的。

描述

马郁兰植株高 50–80 厘米 (20–32 英寸)，叶小，有很多分枝。茎上长着很多茸毛，因此很适合做刷子。马郁兰的花是白色的。叶子和茎可以提取油脂，加在肥皂或乳液中以添加香气。

特殊意义

在现今的欧洲和中东，马郁兰被用作调味品，圣经时期可能也是这样。但是，圣经记载这种植物是用作刷子。以色列人快要出埃及的时候，摩西吩咐他们把血涂在门框上，给灭命的天使作越过的记号，他们就是用这种植物涂血的。这个事件标志着逾越节的开始，犹太人从此谨守逾越节。在 PSA 51:9 (《和》51:7)，*'ezov* 象征灵性上的洁净。提到这个词的第三处经文是 1KI 5:13 (《和》4:33；所涉问题见下文讨论)，这里 *'ezov* 指一种不起眼的植物，与高大佳美的黎巴嫩香柏树作对比。

翻译

有很多英文译本出于尊重传统，用“*hyssop*” (“牛膝草”) 来翻译 *'ezov*；REB 没有采用这种译法。翻译者没有必要延续这个传统，应该尽量采用在植物学上更正确的“马郁兰”一词。

EXO 12:22 a: “要拿一把牛膝草 (*'ezov*)，蘸盆里的血。”在《出埃及记》的经文中，*'ezov* 的功用比植物本身是什么更为重要。翻译者即使采用“*esov* 的枝子”这样的音译，也应该使用“洒”这样的动词来激发读者对这个画面的想象。如果翻译者选择使用当地通常用于淋洒水的植物，那么需要增加脚注说明原文所指植物是什么。如果翻译者习惯音译英文，那么最好音译“*marjoram*” (“马郁兰”)，而非“*hyssop*” (“牛膝草”)。此外，翻译者还可以音译拉丁文 *majorana*、西班牙文 *mejorana* 或阿拉伯文 *mardakush* 等词语。综上所述，“马郁兰”的部分译法如下：

1. 一般性的表述，如“叶子”；
2. 音译 (见上文)；
3. 替代成当地一种用来点洒水的植物，并加脚注。

西非有多种马郁兰的近缘植物，翻译者可从中选择。在这些候选植物中，有一种叶子带毛的植物生长在冈比亚，被用作驱蚊剂。尼日利亚的蒂夫族称同一种植物为 *huuhuu*，尼日利亚的艾特萨克族 (*Etsako*) 称其为“蚊草”。这种植物的叶子有一种辛辣的味道，并且因为多毛而适合做刷子。

1KI 5:13 a (《思》4:33a): “他 (所罗门) 讲论草木，从黎巴嫩的香柏树直到墙上长的牛膝草 (*'ezov*)” (“草木”在 RSV 作“*trees*”“各种树木”)。这节经文有三个不解之处：

1. 马郁兰 (类似欧洲牛膝草) 不是一种树，而是一种相对低矮的植物，长着细小的叶子和白色的花。如果目标语言中有涵盖“树”和“植物”的统称，翻译者应该使用该词语。德弗里斯 (De Vries) 认为，希伯来文 *'ets* (“树”) 的含义比英文“*tree*” (“树”) 更广，因为这个词还包含了我们所说的藤本植物 (参 EZK 15:2)。尽管如此，将 *'ets* 这个词延伸到涵盖马郁兰这样的草本植物在内也是很牵强的，这也是一些学者仍然不相信 *'ezov* 是马郁兰的原因之一。例如，赫珀倾向于同意特里斯特拉姆 (Tristram) 和鲍尔弗 (Balfour) 的意见，这两人在 19 世纪末提出，*'ezov* 在这里指的是刺山柑灌木 (参 3.5.1 刺山柑 (刺山柑灌木、刺山柑浆果) (Caper [caper bush, caper berry]))。他们的观点有一部分是基于同源词的证据：刺山柑灌木的阿拉伯文是 *lassaf* (源于 *el asaf*)，这个词似乎与 *'ezov* 同源，但

马郁兰的阿拉伯文 (zaatar) 却与之完全无关。有人可能会说，刺山柑也不是树，但很重要的是，它确实有木质的茎。

2. “墙上长的’ezov”这个短语很奇怪，因为实际上，马郁兰通常不会长在墙缝里面。马郁兰性喜岩质土壤，但是不太可能长到墙上。即使对小学生来说，这个植物学上的细节也是显而易见的，难道伟大的生物学家所罗门王会在这上面出错吗？
3. 在这节经文里，从文学的角度来说，与马郁兰相比，从墙缝中长出的植物更能与高大的香柏树形成鲜明的对比。上文提到的刺山柑是一个很好的备选，因为这种植物确实生长在城墙的裂缝中，而且与香柏树形成强烈对比。然而，较晚期的植物学家并不赞同这种意见，并且其他多处出现该词的经文也不适合译成刺山柑。以色列人在出埃及时，用一束’ezov 把血涂在门框上。马郁兰的茎多毛，非常适合作此用途，刺山柑灌木却不是特别适合。那么，’ezov 是否可能在不同的语境中指不同的植物呢？这并非没有先例。例如，祖海里认为希伯来文 berosh 在有些经文中指“柏树”，在另一些经文中指“杉树”（参1.6 柏树 (cypress)）。希伯来文 suf 也出现了相同的情况，这个词可以指“香蒲”，也可以指“海藻”（参5.1.1 香蒲 (cattail [reed-mace])）。

还有最后一个证据，然而遗憾的是，这个证据也没能解决争议。这个证据是：刺山柑灌木在旷野非常多见，而马郁兰更多生长在人们开垦的湿润梯田上。所以，或许在以色列人出埃及的时候，还可以在那里找到马郁兰，但在旷野就没有了。因此，他们难道是出于迫不得已，才在洒血礼仪上使用刺山柑灌木吗？

1KI 5:13（《和》4:33）中的’ezov 译法总结如下：

1. 音译’ezov (esobu、esofi) 或马郁兰 (marjoram、macora)；
2. 替代成当地一种可以长在墙上的植物。

以下是这节经文前半部分的一个翻译示例：“所罗门讲论各样草木／植物，从黎巴嫩（山上）高大的香柏树一直到城墙上面（低矮）的 majoram/esob/kaper/kafer/asafu。”

标题：毒参 (poison hemlock [black henbane, gall])

5.2.5 标题：毒参 (poison hemlock [black henbane, gall])

经文出处

Hebrew 来：רושׁ, ראשׁ (音译：ro’sh, rosh) DEU 29:17, DEU 32:32, PSA 69:22, JER 8:14, JER 9:14, JER 23:15, LAM 3:5, LAM 3:19, HOS 10:4, AMO 6:12 Greek 希：χολή (音译：cholē) MAT 27:34, ACT 8:23

讨论



天仙子（黑莨菪）（Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen (Wikimedia Commons))



毒参 (Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen (Wikimedia Commons)) 祖海里提出，希伯来文 ro'sh /rosh 最初可能是某种有毒植物的名称，后来推及到许多产生毒素的植物。Ro'sh /rosh 常译作“毒药”，也可指提取自毒参（学名 *Conium maculatum*；英文 Poison Hemlock）的毒芹碱。毒参隶于伞形科，与另一种英文同名的常绿树（Hemlock，铁杉）没有亲缘关系。赫珀说，HOS 10:4（“.....如苦菜滋生在田间的犁沟中”）中的 ro'sh 一词可能不是指毒参，因为毒参通常不会生长在田地里。根据他的意见，这节经文更可能是指有脉纹的天仙子（学名 *Hyoscyamus reticulatus*）。

旧约提到 ro'sh /rosh 有 10 次，在《七十士译本》中有 5 次译作希腊文 cholē (“苦胆”)。这表明 ro'sh/rosh 是作为统称使用的，指一种味苦的有毒物质，并且不一定源于植物。DEU 32:33 提到的 ro'sh 出自蛇，《次经·多比传》(《思》《多俾亚传》)中的 cholē 出自鱼 (TOB 6:4; TOB 6:5; TOB 6:7, TOB 6:9, TOB 11:4, TOB 11:8, TOB 11:11)。

MRK 15:23 记载，耶稣在马上被钉十字架的时候，有人(可能是他的门徒)拿“没药调和的酒”给他作镇静剂。马太有意呼应 PSA 69:22 a (RSV 直译“他们拿毒药给我当食物”；“毒药”在《七十士译本》作 cholē；《和》69:21a)，写道：“士兵拿苦胆调和的酒给耶稣喝”(MAT 27:34)；他使用了希腊文中表示苦胆/毒药的统称 cholē，以此强调救主承受的羞辱。

描述

毒参的高度为 1.5—2.5 米 (5—8 英尺)。茎绿色、表面光滑，靠底部的地方长有紫色或红色的条纹。叶子像胡萝卜叶一样呈花边状，叶长可达半米 (2 英尺)，白色小花成簇生长，呈小伞状。因此，毒参可能会被误认为是欧芹或野生胡萝卜。根很粗壮，像欧洲防风草的根。叶子和根均散发出一种苦味。

两年生天仙子具有不同的形态，但一般可以长到 1 米 (3 英尺) 或者更高 (包括花在内)。茎直立，多分枝，长有白色的伞状花序。灰绿色的卵形叶子尖端锐利，叶长可达 30 厘米 (1 英尺)，叶面覆满具有黏性的毛。

在古代，希腊和阿拉伯的医生用毒参作镇静剂，但过量服用将会致命，或者会导致语言能力丧失或瘫痪。天仙子 (英文 henbane，意为“杀鸡药”) 曾被希腊人用作催眠和止痛的药物。欧洲人在中世纪就使用天仙子，11 世纪的盎格鲁-撒克逊医学著作在“亨贝尔”(henbell) 的名目下提到了天仙子。从毒参中提取的毒素叫做“毒芹碱”。

翻译

旧约中所有提及 ro'sh /rosh 的经文都是修辞性的，因此翻译者可以自由寻找富有表现力的当地词语作为译词。另外，由于毒药经常用于打猎、捕鱼或灭鼠，因此大多数语言都会有表示毒药的词。经文提到 ro'sh /rosh 时，有一半与希伯来文 la'anah 成对出现 (参 5.2.7 苦艾 (wormwood))，因此翻译者需要寻找一个合适的词对。如果没有表示“毒药”的词语，那么也可以用有毒植物的名称来替代这对词语。毒参遍布中欧、南欧、亚洲和北非，并被引进北美和南美。野生天仙子遍布欧洲中部和南部、西亚、印度，一直到西伯利亚，现今也生长在北美和南美，特别是巴西。天仙子属 (学名 Hyoscyamus) 的一个近缘物种生长范围广泛，从加那利群岛起，经北非一直到亚洲都有发现。

标题：野瓜 (柯罗辛、苦西瓜、药西瓜) (**wild gourd [colocynth, egusi, bitter apple]**)

5.2.6 标题：野瓜 (柯罗辛、苦西瓜、药西瓜) (wild gourd [colocynth, egusi, bitter apple])

经文出处

Hebrew 来: גֶּפֶן סְדוֹם (音译: gefen sedom) DEU 32:32, DEU 32:32 Hebrew 来: פִּקְעֵת שָׂדֶה (音译: paqu'oth sadeh) 2KI 4:39, 2KI 4:39

讨论



柯罗辛藤 (Ji-Elle (Wikimedia Commons)) 2Ki 4:39 提到的先知门徒可能来自城里。他出去摘“菜”时甚至可能不知道该采些什么。他发现了一棵 **gefen sadeh**（字面意为“田间的藤”）。希伯来文 **gefen** 泛指攀爬或缠绕的植物，但是和英文“vine”（“藤”）一样，这个词也可以特指葡萄藤。在这节经文中，这个词指的是野瓜或柯罗辛（药西瓜），一种在干燥气候里常见的藤本植物。柯罗辛的果实（**paqu'oth**）有几分毒性，不过瓜的粉末可作药用。柯罗辛除了生长在沿海平原之外，现仍生长在约旦河谷靠近吉甲的地方，据说先知门徒的故事就发生在那里。根据赫珀的研究，在主后 54 年，罗马皇帝革老丢就是被他的妻子用柯罗辛毒死的。相关的希伯来文 **peqa'im** 出现在其他地方，指葫芦的果实（参 5.2.1 葫芦 (bottle gourd)）。



长在藤上的柯罗辛 (H. Zell (Wikimedia Commons)) 赫珀认为，摩西的歌 (DEU 32:32) 提到的“所多玛的葡萄树” (希伯来文 *gefen sedom*) 可能是柯罗辛 (学名 *Citrullus colocynthis*)。虽然这个比喻很恰当，但经文本身可能根本不是指一种有毒的植物，而仅仅是把悖逆顽梗的以色列人比作罪恶的所多玛人。赫珀还指出，DEU 29:17 (《和》 29:18)、PSA 69:22 (《和》 69:21)、JER 8:14、JER 9:14 (《和》 9:15)、JER 23:15 和 AMO 6:12 中的希伯来文 *ro'sh* 所指的植物可能就是柯罗辛 (参 5.2.2 梭梭 (猪毛菜属 [*Salsola*]、盐角草属 [*Salicornia*] (*hammada* [*Salsola*, *Salicornia*]))。

描述

柯罗辛藤与西瓜藤、黄瓜藤和葫芦藤很相似。根粗壮，富含水分，可以深深扎入土里。茎匍匐于地，卷须缠在灌木或篱笆上。叶子呈三角形，叶缘浅裂，像西瓜的叶子。花朵黄色，果实黄色、球形，大小如大苹果或西柚。果壳坚硬光滑，果肉松软，种子白色或棕色。

特殊意义



柯罗辛 (Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen (Wikimedia Commons))西奈半岛和尼革夫西部的阿拉伯人供应柯罗辛给医药市场，用于治疗胃病和通便。在食物匮乏的时期，人们会把柯罗辛的种子磨成面做面包。在存放羊毛衣物时，柯罗辛也可用来驱蛾。

翻译

柯罗辛生长在整个地中海地区和西亚。有些翻译者的语言可能没有一个表示攀缘植物的统称，但他们可能有“植物”这个更一般性的词语，或者也可以采用“野生黄瓜”这样的短语。需要记住的一点是：2KI 4:39 中的希伯来文短语 **paqu'oth sadeh** (“野瓜”) 是个笼统的名称，先知门徒自己也不认识这种果实。因此，只有使用较为笼统的词语为译词，这个故事才最合理。圣经植物学家非常确定这个门徒发现的瓜藤就是柯罗辛，但从某种意义上说，这并非故事的重点，因为故事的目的在于显明上帝的奇妙大能。

如果要音译“柯罗辛”，翻译者可以按照法文 **coloquinte**、西班牙／葡萄牙文 **coloquinta**，或阿拉伯文 **banzal** 来音译。

标题：苦艾 (**wormwood**)

5.2.7 标题：苦艾 (wormwood)

经文出处

Hebrew 来: לְאָנָה (音译: la'anah) DEU 29:17, PRO 5:4, JER 9:14, JER 23:15, LAM 3:15, LAM 3:19, AMO 5:7, AMO 6:12 Greek 希: ἄψινθος (音译: apsinthos) REV 8:11, REV 8:11

讨论



苦艾 (אֵתְמוֹר יַפֶּתַת (Wikimedia Commons)) 希伯来文 la'anah 在字面上是指一种植物，但在旧约中只用作比喻，表示某种味道非常苦的东西。尽管证据很少，但解经家和植物学家一致认为，这个词可能指一种从白苦艾中提取的物质。白苦艾盛产于圣地的旷野。

描述



白苦艾 (Steve Law (Wikimedia Commons)) 白苦艾 (学名 *Artemisia herba-alba*) 是一种不到半米 (18 英寸) 高的灌木。叶子毛绒绒的，叶片细碎，在以色列凉爽的雨季结束时掉落，叶片在炎热的季节会变为鳞片状。在 9 月或 10 月左右，苦艾花以 2 至 4 朵成簇开放，并结成多毛的小果实。植物成熟后，把叶子和花晒干可以制成一种非常苦的茶，或者磨成粉、制成膏或油以入药。

特殊意义

旧约提到苦艾时，大多与希伯来文 ro'sh (“毒药／苦胆”) 一词成对使用，喻指痛苦的经历和悲伤 (参 [5.2.5 毒参 \(poison hemlock \[black henbane, gall\]\)](#))。REV 8:11; REV 8:11 提到，一颗名叫茵陈 (希腊文 *apsinthos*) 的星星使地上三分之一的水变苦且有毒。苦艾叶的味道很苦。少量的苦艾可用作麻醉剂，欧洲人用它来调酒 (苦艾酒)。苦艾也可用来驱除飞蛾、跳蚤和肠道寄生虫。

翻译

圣地的白苦艾遍布中东、北非 (埃及、摩洛哥) 和欧洲西南部，然而全世界至少有 300 种蒿属 (学名 *Artemisia*) 植物，通常分布在干旱地区。中国的一种蒿属植物 (“黄花蒿”) 被用作抗疟疾的药物。山道年蒿 (学名 *Artemisia cina*) 和驱蛔蒿 (学名 *Artemisia maritima*) 生长在欧亚大陆，从中提取的山道年 (学名 *Santonica*) 是一种驱肠虫药。因

纽特人把青蒿（学名 *Artemisia tilesii*）当作可待因使用。美国西部的山艾树也隶于蒿属，美洲土著人曾将其用于多种用途。

大多数语言都有指称叶子和／或根味苦植物的词语。因为在旧约中提到苦艾的经文都是比喻性的，所以翻译者可以使用当地的这类植物来表达经文的中心意思。如上所述，*la'anah* 大多与 *ro'sh* 成对出现，所以在这些经文中，这两个词要一起处理。如果没有具体的植物，可以使用“苦果子”、“苦香料”或“苦物”等短语。如果需要，可以按照法文 *absinthe*、葡萄牙文 *absinto* 或 *losna*，或者西班牙文 *absintio* 或 *ajenjo* 来音译。