

Plants and Trees in the Bible © United Bible Societies, 2025. Adapted from: Each According to its Kind: Plants and Trees in the Bible, by Robert Koops © 2012 United Bible Societies. This work is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

標題：豆類植物 (**pulses**)

3.3 標題：豆類植物 (*pulses*)

聖經中提到三種豆類植物：蠶豆、鷹嘴豆和扁豆。

標題：蠶豆 (**beans**)

3.3.1 標題：蠶豆 (*beans*)

經文出處

Hebrew 來: פול (音譯: pol)[2SA 17:28](#), [EZK 4:9](#)

討論



蠶豆植株 (© Rasbak (Wikimedia Commons)) 解經家和翻譯者一致認為，希伯來文 *pol* 指的是蠶豆（學名 *Vicia faba*、*Faba vulgaris*）。蠶豆在中東種植了幾千年，而且可能就原產於那裡。目前還沒有發現蠶豆的野生品種，很有可能它們的原種已經滅絕了。考古學家在耶利哥發掘時，發現了蠶豆的殘餘物，年代可追溯到 7000 至 8000 年前。

## 描述

蠶豆是一種直立植物，而非藤本植物，可以長到 1 米（3 英尺）高，枝子只長在莖的上部。蠶豆沒有捲鬚，這一點和今天許多種類的豆子不同。蠶豆的花是白色的，成熟後形成豆莢，裡面有 3–6 顆豆子，豆子又大又扁，呈奶油色或棕褐色。

## 特殊意義

[2SA 17:28](#) 記載，大衛王在躲避他兒子押沙龍的時候，人們給他送來食物，其中就有蠶豆。在 [EZK 4:9](#) 中，上帝吩咐以西結要當眾用小麥、大麥、蠶豆、扁豆（即他能夠找到的任何糧食）來做「餅」，這裡的重點可能是，優質的餅很快就會在耶路撒冷變得稀缺。

## 翻譯

蠶豆屬（或野豌豆屬；學名 *Vicia*）至少有 200 個品種，蠶豆就是其中的一種。蠶豆屬隸於龐大的豆科。希伯來文 *pol* 可能實際上不止指一種豆子，其中包括我們現在所知道的豌豆。由於世界各地都知道蠶豆和豌豆，翻譯者應該能夠找到一個當地的對等詞。在《撒母耳記下》和《以西結書》的這兩節經文中，*pol* 都是出現在清單裡面。如果翻譯者無法找到當地的豆子品種，那麼可以採用音譯（例如，阿拉伯文 *adas*、法文 *faverole* 或 *fève* 或 *haricot*、西班牙文 *frijol*、葡萄牙文 *fava* 或 *favarola* 或 *feijão*，斯瓦希里文 *haragwe*、拉丁文 *vicia*）。

標題：鷹嘴豆（**chickpeas**）

3.3.2 標題：鷹嘴豆（chickpeas）

## 經文出處

Hebrew 來： חַמִּיץ (音譯：chamits) [ISA 30:24](#)



## 討論



鷹嘴豆植株 (© H. Zell (Wikimedia Commons)) 以賽亞先知在 [ISA 30:24](#) 中說，當上帝復興猶大國的時候，牛和驢必吃「用鏟子和杈子揚淨的」(*belil chamits*)。希伯來文 *belil* 意為「草料、飼料」，這是人們普遍接受的，但修飾詞 *chamits* 的意思存在爭議。RSV 將這個詞譯為“salted”（「加鹽的」），GNB 譯為“finest and best”（「最精細的和最好的」），REB 譯為“well-seasoned”（「調好味的」），NLT 譯為“good”（「好的」）。NRSV 和 NAB 把兩個詞合在一起，譯為“silage”（「青儲飼料」）。然而，希伯來文 *chamits* 與阿拉伯文 *chumus* 及亞蘭文 *chimtsa* 同源，而且後面兩個詞都是指鷹嘴豆（學名 *Cicer arietinum*）。因此，祖海里建議將 *chamits* 譯成「鷹嘴豆」。翻譯者的選擇取決於對 *chamits* 的兩種解釋：一種有同源



詞的證據支持，另一種有傳統的釋經支持。在耶利哥的發展中，考古學家發現的鷹嘴豆至少可追溯到主前 2000 年，比以賽亞時期早得多；另外，考古學家聲稱在中東其他地方的遺址中也發現了鷹嘴豆，其中一些可追溯到主前 7000 年。在新月沃地北部，人們發現了鷹嘴豆的野生品種，因此，植物學家相信鷹嘴豆就起源於那裡。

## 描述



鷹嘴豆 (© Sanjay Acharya (Wikimedia Commons))鷹嘴豆植株約有 20 厘米（8 英吋）高，莖和枝上都有對生的小葉子，開藍色或白色的花，並結出一個短豆莢，裡面有 1—2 顆近乎立方體的棕褐色種子。

## 特殊意義

[ISA 30:24](#) 旨在展示猶大輝煌的將來，到那時，就是牛和驢也必吃美味的食物。

## 翻譯

這裡的語境是修辭性的，所以如果翻譯者把 *chamits* 理解為「鷹嘴豆」，那麼可以使用一個文化上的對等詞，最好是當地家畜喜歡吃的一种植物。如果翻譯者找不到特定的詞語來翻譯鷹嘴豆，則可使用一個統稱或一般性的短語。如果想要採用某種主要語言的音譯，可以考慮阿拉伯文 *hummus*、法文 *poischiche* 或 *cicerole*、葡萄牙文 *graão debico*，或者西班牙文 *garbanzo*。另一方面，如果依循 *chamits* 的另一種解釋，也可以譯為「好的食物」、「最好的食物」、「混勻的食物」等。

## 標題：扁豆 (lentils)

## 3.3.3 標題：扁豆 (lentils)

## 經文出處

Hebrew 來: עֲדָשָׁה (音譯: 'adashah) GEN 25:34, 2SA 17:28, 2SA 23:11, EZK 4:9

## 討論



紅扁豆 (© Ray Pritz (UBS))學者一致認為，希伯來文 'adashah 指的是扁豆（學名 *Lens culinaris*，曾作 *Lens esculenta*）。阿拉伯文 'adas、聖經成書之後的希伯來文獻中幾次出現該詞，以及《七十士譯本》，都證實這個詞指的是扁豆。考古發掘中發現的主前第六個或第七個千年的種子表明，扁豆是人類最早種植的植物之一。在這些考古中，扁豆經常與小麥和大麥種子一起被發現。



## 描述



扁豆植株 (Otto Wilhelm Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885) 扁豆是一種分枝低、莖軟的植物，像南瓜和西葫蘆一樣長著捲鬚，花朵粉紅色，可以像蠶豆那樣長成豆莢，豆莢很短，裡面只有一粒豌豆大小的種子。有一種扁豆的豆粒是紅棕色的，因此 [GEN 25:30](#) 說是「紅的」湯。豆莢通常兩個或三個一簇。在聖地，扁豆在比較冷的季節（11月—3月）生長。

## 特殊意義

[EZK 4:9](#) 提到一種奇怪的餅，用包括扁豆在內的六種穀物和豆類做成，可能是為了表明食物將會短缺，人們只能找到什麼就吃什麼。扁豆通常用來煮湯或做燉菜。雅各就是用這樣的紅豆湯誘使哥哥以掃放棄了長子的權利。大衛被押沙龍追趕時，有人送食物給他，其中就有扁豆。

## 翻譯

現今，扁豆廣泛分佈在亞洲、印度和北非。在人們不知道扁豆的地方，我們建議使用當地某種豆子的名稱來翻譯，而不使用音譯。不過，[EZK 4:9](#) 也提到了「蠶豆」，因此可以將「蠶豆和扁豆」譯為「不同種類的豆子」。在[GEN 25:34](#) 中，用一個一般性的表達來翻譯「紅扁豆湯」比較合適，例如「豆子湯」、「燉豆子」（“bean stew”；CEV），或「蔬菜湯」（“vegetable soup”；NCV）。如果想按某種主要語言進行音譯，可以考慮阿拉伯文 *adas*、法文 *crustallin* 或 *lentille*、西班牙文 *lenteja*、葡萄牙文 *lentilha*，或斯瓦希里文 *adesi*。