Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Composante annuelle, 2013

Spécifications des variables dérivées (VD)

Statistique Canada Statistics Canada

Canada

Table des matières

ADL **Activités de la vie quotidienne (1 VD)**

1) ADLF6R - A besoin d'aide pour certaines tâches 1

ALC **Consommation d'alcool (1 VD)**

1) ALCDTTM - Genre de buveur (12 mois) 2

ALD **Consommation d'alcool - Dépendance (4 VD)**

1) ALDDSF - Échelle de dépendance à l'alcool (cote du questionnaire abrégé) - 12 mois 3

2) ALDDPP - Probabilité prévue pour les répondants (dépendance à l'alcool) - 12 mois 4

3) ALDDINT - Trouble causé par l'alcool au cours des 12 derniers mois - moyenne 5

4) ALDFINT - Indicateur du trouble causé par la consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois 5

ALW **Consommation d'alcool au cours de la dernière semaine (2 VD)**

1) ALWDWKY - Consommation hebdomadaire 7

2) ALWDDLY - Consommation quotidienne moyenne d'alcool 7

CCC **Problèmes de santé chroniques (1 VD)**

1) CCCDDIA - Type de diabète 9

CHP **Contacts avec certains professionnels de la santé (1 VD)**

1) CHPDMDC - Nombre de consultation chez des médecins/pédiatres ou autres spécialistes 10

CPG **Jeu excessif (6 VD)**

1) CPGFGAM - Activité de jeu - joueur vs. non-joueur 11

2) CPGDSEV - Indice de gravité du jeu pathologique (IGJP) - version modifiée 12

3) CPGDTYP - Type de joueur 13

4) CPGDACT - Nombre de catégories d'activités de jeu dans la liste utilisée pour calculer l'ICJE 14

5) CPGDINT - Trouble attribuable au jeu pathologique - moyenne 16

6) CPGFINT - Indicateur du trouble attribuable au jeu pathologique 17

DHH **Variables sur le logement et le ménage (10 VD)**

1) DHHDSAGE - L'âge du conjoint 19

2) DHHDYKD - Nombre de personnes de moins de 16 ans dans le ménage 19

3) DHHDOKD - Nombre de personnes de 16 à 17 ans dans le ménage 19

4) DHHDLE5 - Nombre de personnes de moins de six ans dans le ménage 20

5) DHHD611 - Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage 20

6) DHHDL12 - Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage 20

7) DHHDL18 - Nombre de personnes de moins de 18 ans dans le ménage 21

8) DHHDLVG - Dispositions de vie du répondant sélectionné 21

9) DHHDECF - Situation de la famille économique (type de ménage) 23

10) DHHDHSZ - Taille du ménage 25

DIS **Détresse (3 VD)**

1) DISDK6 - Échelle de détresse - K6 27

2) DISDCHR - Échelle de chronicité de la détresse et de l'affaiblissement lié à la détresse 27

3) DISDDSX - Échelle de détresse - K10 28

DPS **Dépression (4 VD)**

1) DPSDSF - Échelle de dépression - cote du formulaire abrégé 31

2) DPSDPP - Échelle de dépression - probabilité prévue 32

3) DPSDWK - Nombres de semaines pendant lesquelles le répondant s'est senti déprimé - au cours des douze derniers mois 33

4) DPSDMT - Mois au cours duquel le répondant s'est senti déprimé la dernière fois 33

DRV **Conduite et sécurité (1 VD)**

1) DRVFSBU - Utilisation de la ceinture de sécurité du passager (véhicule motorisé) 35

DSU **Usage de suppléments alimentaires - Vitamines et minéraux (1 VD)**

1) DSUDCON - Fréquence de la consommation de suppléments de vitamines et minéraux 36

EDU **Éducation (4 VD)**

1) EDUDH04 - Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux 37

2) EDUDH10 - Plus haut niveau de scolarité - ménage, 10 niveaux 37

3) EDUDR04 - Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux 37

4) EDUDR10 - Plus haut niveau de scolarité - répondant, 10 niveaux 38

FDC **Choix alimentaires (3 VD)**

1) FDCFAVD - Évite certains aliments pour certaines raisons de contenu 40

2) FDCFCAH - Choisit ou évite certains aliments pour certaines questions de santé 40

3) FDCFCHO - Choisit certains aliments pour certaines raisons reliées au contenu 41

FSC **Sécurité alimentaire (3 VD)**

1) FSCDHFS2 - État de sécurité alimentaire du ménage - Version modifiée 45

2) FSCDAFS2 - Sécurité alimentaire - État des adultes 46

3) FSCDCFS2 - Sécurité alimentaire - État des enfants 47

FVC **Consommation de fruits et légumes (8 VD)**

1) FVCDJUI - Consommation quotidienne - jus de fruit 49

2) FVCDFRU - Consommation quotidienne - fruits 49
3) FVCDSAL - Consommation quotidienne - salade verte 50
4) FVCDPOT - Consommation quotidienne - pommes de terre 50
5) FVCDCAR - Consommation quotidienne - carottes 51
6) FVCDVEG - Consommation quotidienne - autres légumes 51
7) FVCDTOT - Consommation quotidienne totale - fruits et légumes 52
8) FVCGTOT - Groupement de la consommation quotidienne totale - fruits et légumes 52

GEN **État de santé général (3 VD)**

1) GENDHDI - Santé perçue 54
2) GENDMHI - Santé mentale perçue 54
3) GENGSWL - Satisfaction à l'égard de la vie en général 55

GEO **Variables géographiques (16 VD)**

1) GEODCMAA - Région métropolitaine du Recensement de 2011 (RMR). 56
2) GEODDA11 - Aire de diffusion du Recensement de 2011 (AD). 57
3) GEODPC - Code postal 57
4) GEODHR4 - Région sociosanitaire 57
5) GEODDHA - District Health Authority (DHA) de la Nouvelle-Écosse 58
6) GEODBCHA - Health Authority - Colombie-Britannique 58
7) GEODLHN - Réseau local d'intégration des services de santé de l'Ontario 58
8) GEODDA06 - Aire de diffusion du Recensement de 2006 (AD) 58
9) GEODFED - Circonscriptions électorales fédérales du Recensement de 2011 (CÉF) 59
10) GEODCSD - Subdivision du Recensement de 2011 (SDR) 59
11) GEODCD - Division du Recensement de 2011 (DR) 59
12) GEODSAT - Type de classification des secteurs statistiques (CSS) 60
13) GEODPG11 - Groupes de régions sociosanitaires homologues 60
14) GEODUR - Classification centre de population - rurale 61
15) GEODUR2 - Classification centre de populaton - rurale - regroupée 62
16) GEODSUBZ - Sous-zones - Alberta 62

HMC **Services de soins de santé à domicile (1 VD)**

1) HMCFRHC - Soins de santé à domicile reçus 63

HUI **Indice de l'état de santé (8 VD)**

1) HUIDVIS - Attribut Vision 64
2) HUIDHER - Attribut Audition 65
3) HUIDSPE - Attribut Élocution 66

4) HUIDMOB - Attribut Mobilité 67

5) HUIDDEX - Attribut Dextérité 68

6) HUIDEMO - Attribut Émotion 69

7) HUIDCOG - Attribut Cognition 70

8) HUIDHSI - Indice de l'état de santé 71

HUP **Indice de l'état de santé - Douleurs et malaise (1 VD)**

1) HUPDPAD - Attribut Douleur 73

HWT **Taille et poids - Autodéclarés (6 VD)**

1) HWTDHTM - Taille (en mètres) - autodéclarée 74

2) HWTDWTK - Poids (en kilogrammes) - autodéclarés 76

3) HWTDBMI - Indice de masse corporelle (autodéclaré) 76

4) HWTDISW - Classification selon l'IMC (autodéclaré) pour les adultes de 18 ans et plus - standard international 77

5) HWTDCOL - Classification selon l'IMC pour les enfants de 12 à 17 ans (autodéclaré) - Système de classification de Cole 78

6) HWTDWHO - Classification selon l'IMC pour les enfants de 12 à 17 ans (autodéclaré) - Système de classification de l'OMS 83

IDG **Usage de drogues illicites (16 VD)**

1) IDGFLCA - Consommation de cannabis - au cours de la vie (y compris la consommation « juste une fois ») 87

2) IDGFLCM - Consommation de cannabis - au cours de la vie (non compris la consommation « juste une fois ») 87

3) IDGFYCM - Consommation de cannabis - au cours des 12 derniers mois (non compris la consommation « juste une fois ») 87

4) IDGFLCO - Consommation de cocaïne ou de crack - au cours de la vie 88

5) IDGFLAM - Consommation d'amphétamines (speed) - au cours de la vie 88

6) IDGFLEX - Consommation de MDMA (ecstasy) - au cours de la vie 89

7) IDGFLHA - Consommation d'hallucinogènes, de PCP ou de LSD - au cours de la vie 89

8) IDGFLGL - Inhalation de colle, d'essence ou d'autres solvants - au cours de la vie 90

9) IDGFLHE - Consommation d'héroïne - au cours de la vie 90

10) IDGFLST - Consommation de stéroïdes - au cours de la vie 91

11) IDGFLA - Consommation de toute drogue illicite - au cours de la vie (y compris de consommation de cannabis « juste une fois ») 91

12) IDGFLAC - Consommation de toute drogue illicite - au cours de la vie (non compris la consommation de cannabis « juste une fois ») 92

13) IDGFYA - Consommation de toute drogue illicite - au cours des 12 derniers mois (y compris la consommation de cannabis « juste une fois ») 92

14) IDGFYAC - Consommation de toute drogue illicite - au cours des 12 derniers mois (non compris la consommation de cannabis « juste une fois ») 93

15) IDGDINT - Trouble causé par la consommation de drogues illicites au cours des 12 derniers mois - moyenne 94

16) IDGFINT - Indicateur de perturbation causée par la consommation de drogues illicites - au cours des 12 derniers mois 95

INC **Revenu (7 VD)**

1) INCFIMP4 - Indicateur d'imputation du revenu 99

2) INCDHH - Revenu total du ménage - de toutes sources 99

3) INCDPER - Revenu personnel - de toutes sources 100

4) INCDADR - Ratio ajusté du revenu du ménage - Échelle nationale 101

5) INCDRCA - Distribution du revenu du ménage - Échelle nationale 102

6) INCDRPR - Distribution du revenu du ménage - Échelle provinciale 102

7) INCDRRS - Distribution du revenu des ménages - Échelle de la région sociosanitaire 103

INJ **Blessures (4 VD)**

1) INJDTBS - Genre de blessure selon la partie du corps 105

2) INJDCAU - Cause de la blessure 110

3) INJDCBP - Cause de la blessure, selon le lieu où la blessure s'est produite 111

4) INJDSTT - Catégorie de blessure 117

INW **Blessures au travail (2 VD)**

1) INWDOCG - Blessure au travail - groupe professionnel 118

2) INWDING - Blessure au travail - Groupe d'industrie 119

LBS **Population active (5 VD)**

1) LBSDHPW - Nombre total d'heures travaillées par semaine 121

2) LBSDPFT - Emploi à temps plein/temps partiel (pour le nombre total d'heures habituelles) 121

3) LBSDWSS - Situation en regard de l'activité la semaine dernière 121

4) LBSDING - Groupe d'industrie 122

5) LBSDOCG - Groupe professionnel 123

MAS **Contrôle de soi (1 VD)**

1) MASDM1 - Échelle de maîtrise de soi dérivée 124

MDB **Humeur (4 VD)**

1) MDBDPOS - Humeur - Affect positif 126

2) MDBDNEG - Humeur - Affect négatif 127

3) MDBDBA1 - Humeur - Affect équilibré - Méthode A 127

4) MDBDBA2 - Humeur - Affect équilibré - Méthode B 128

MEX **Expériences maternelles - Allaitement (2 VD)**

1) MEXDEBF2 - Durée d'allaitement exclusif 129

2) MEXFEB6 - Allaitement exclusif pendant 6 mois (ou plus) 131

OH2 **Santé bucco-dentaire 2 (2 VD)**

1) OH2FLIM - Limites sociales dues à l'état de la santé bucco-dentaire 133

2) OH2FOFP - Douleur faciale ou buccale 133

PAC **Activités physiques (9 VD)**

1) PACDEE - Dépense d'énergie quotidienne durant les activités physiques de loisirs 135

2) PACFLEI - Participant à des activités physiques de loisirs 143

3) PACDFM - Fréquence mensuelle moyenne des activités physiques de loisirs d'une durée de plus de 15 minutes 143

4) PACDFR - Fréquence de toutes les activités physiques de loisirs d'une durée de plus de 15 minutes 147

5) PACFD - Participation quotidienne à des activités physiques de loisirs d'une durée de plus de 15 minutes 147

6) PACDPAI - Indice de l'activité physique pendant les loisirs 148

7) PACDLTI - Indice de l'activité physique pendant le transport et les loisirs 148

8) PACDTLE - Dépense d'énergie quotidienne dans des activités physiques de transport et de loisirs 149

9) PACFLTI - Participation à des activités de transport ou à des activités physiques de loisirs 150

RAC **Limitation des activités (2 VD)**

1) RACDIMP - Incidences des problèmes de santé 151

2) RACDPAL - Participation et limitations des activités 151

SAC **Activités sédentaires (2 VD)**

1) SACDTOT - Nombre total d'heures par semaine consacrées aux activités sédentaires 153

2) SACDTER - Nombre d'heures total par semaine consacrées aux activités sédentaires (excluant la lecture) 154

SAM **Variables de l'échantillon (2 VD)**

1) SAMDSHR - Permission sur le partage de données 155

2) SAMDLNK - Permission sur le jumelage des données 156

SCA **Usage du tabac - Méthodes pour cesser de fumer (1 VD)**

1) SCADQUI - Réussite ou tentative de cesser de fumer 157

SCH **Usage du tabac - Étapes du changement (1 VD)**

1) SCHDSTG - Étapes du changement de l'usage du tabac (fumeurs et anciens fumeurs) 158

SCP **Activité physique - Étapes de changement (1 VD)**

1) SCPDSTG - Étapes du changement - Activité physique 160

SDC **Renseignements sociodémographiques (9 VD)**

1) SDCGCB10 - Pays de naissance - groupée 161
2) SDCDFOLS - Première langue officielle parlée 161
3) SDCDLHM - Langue(s) parlée(s) le plus souvent à la maison 164
4) SDCDAIM - Âge au moment de l'immigration 165
5) SDCFIMM - Indicateur d'immigration 166
6) SDCDRES - Nombre d'années au Canada depuis l'immigration 166
7) SDCDFL1 - Première langue officielle apprise dans l'enfance et encore comprise - Langue maternelle 167
8) SDCDABT - Identité autochtone 168
9) SDCDCGT - Origine culturelle/raciale 168

SFR **État de santé (SF-36) (10 VD)**

1) SFRDPFS - Échelle de fonctionnement physique 173
2) SFRDSFS - Échelle de fonctionnement social 174
3) SFRDPRF - Échelle du rôle du fonctionnement (physique) 174
4) SFRDMRF - Échelle du rôle du fonctionnement (mental) 175
5) SFRDGMH - Échelle sur l'état de santé mentale générale 175
6) SFRDVTS - Échelle de vitalité 175
7) SFRDBPS - Échelle de douleurs physiques 176
8) SFRDGHP - Échelle d'autoévaluation de l'état de santé général 176
9) SFRDPCS - Mesure sommaire de l'état de santé physique 177
10) SFRDMCS - Mesure sommaire de l'état de santé mentale 178

SMK **Usage du tabac (3 VD)**

1) SMKDSTY - Genre de fumeur 180
2) SMKDSTP - Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement 180
3) SMKDYCS - Nombre d'années depuis lesquelles le fumeur fume tous les jours 181

SPS **Échelle de provisions sociales à 10 items (6 VD)**

1) SPSDCON - Échelle de provisions sociales 183
2) SPSDATT - Échelle de provisions sociales - attachement 183
3) SPSDGUI - Échelle de provisions sociales - obtention de conseils 183
4) SPSDALL - Échelle de provisions sociales - aide tangible 184
5) SPSDINT - Échelle de provisions sociales - intégration sociale 184
6) SPSDWOR - Échelle de provisions sociales - réassurance de sa valeur 184

UPE **Utilisation d'équipement protecteur (3 VD)**

1) UPEFILS - Porte de l'équipement de protection lorsque pratique le patin à roues alignées 186

2) UPEFSKB - Port de l'équipement de protection lorsque pratique la planche à roulettes 186

3) UPEFSNB - Porte de l’équipement de protection lorsque pratique la planche à neige 187

Activités de la vie quotidienne (1 VD)

1) A besoin d'aide pour certaines tâches

Nom de la variable : ADLF6R

Basée sur : ADL_01, ADL_02, ADL_03, ADL_04, ADL_05, ADL_06

Description : Cette variable classe les répondants selon leur besoin d'aide (pour raisons de santé) pour les activités de la vie quotidienne, comme la préparation des repas, faire les courses pour l'épicerie ou autres nécessités, les travaux ménagers quotidiens, les travaux lourds (le lavage des murs, les travaux à l'extérieur) et les soins personnels (se laver, s'habiller ou manger), se déplacer dans la maison, ou payer les factures.

Note : Avant 2009, ADLF6R s'appellait RACF6R et faisait partie du module Limitation des activités (RAC). En 2009, le module RAC a été divisé et toutes les questions requises pour la variable dérivée RACF6R ont été déplacées dans le nouveau module appelé Activités de tous les jours (ADL).

RACF6R est modifiée, comparativement à RACAF6 (ESCC Cycle 1.1), par l'ajout de RAC_6G. La série de tâches comprises a été révisée en prenant pour base l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités. Cette variable dérivée ayant été modifiée pour tenir compte d'une série de tâches révisée, elle n'est pas entièrement comparable à RACAF6.

Cette variable a aussi été modifiée en 2007 car la question RAC_6D n'était plus demandée.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	faitADL=2	Le module n'a pas été sélectionné ou population exclue	SO
1	ADL_01 = 1 ou ADL_02 = 1 ou ADL_03 = 1 ou ADL_04 = 1 ou ADL_05 = 1 ou ADL_06 = 1	A besoin d'aide pour au moins une tâche	
2	ADL_01 = 2 et ADL_02 = 2 et ADL_03 = 2 et ADL_04 = 2 et ADL_05 = 2 et ADL_06 = 2	N'a pas besoin d'aide	
9	(ADL_01 = DK, R, NS) ou (ADL_02 = DK, R, NS) ou (ADL_03 = DK, R, NS) ou (ADL_04 = DK, R, NS) ou (ADL_05 = DK, R, NS) ou (ADL_06 = DK, R, NS)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND

Consommation d'alcool (1 VD)

1) Genre de buveur (12 mois)

Nom de la variable : ALCDTTM

Basée sur : ALC_1, ALC_2

Description : Cette variable détermine quel genre de buveur est le répondant d'après ses habitudes de consommation au cours des 12 derniers mois.

Note : Cette variable dérivée a été introduite en 2007. Certaines des qustions comprises dans le module Consommation d'alcool des cycles précédents sont passées dans les modules Consommation d'alcool au cours de la dernière semaine (ALW) et Consommation d'alcool - Anciens buveurs (ALN). Ces deux modules font partie du contenu optionnel, la plupart des variables dérivées qui étaient auparavant calculées pour tous les répondants dans le module Consommation d'alcool (ALC) se trouvent maintenant dans ALW et ALN. Les variables derivées pour les modules du contenu optionanel sont seulement calculées pour les régions sociosanitaires qui ont sélectionné ces modules. ALCDTTM a été créée pour permettre le classement de tous les répondants selon leurs habitudes de consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9	(ALC_1 in (7,8,9)) ou (ALC_2 in (97,98,99))	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
1	(2 <= ALC_2 < 96)	Buveur régulier	
2	ALC_2 = 1	Buveur occasionnel	
3	ALC_1 = 2	N'a pas bu au cours des 12 derniers mois	

Consommation d'alcool - Dépendance (4 VD)

L'ESCC fait appel à la gamme complète de questions mises au point par Kessler et Mroczek pour dériver la mesure de la dépendance à l'alcool. Dans le cadre du cycle 2.1, les répondants qui ont bu cinq consommations ou plus lors de la même occasion au moins une fois par mois au cours des 12 derniers mois ont répondu aux questions concernant la dépendance à l'alcool.

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
ALDT01			
(2 - ALD_01)	(ALD_01 = 1, 2)	Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions ALD_01 à ALD_09 (sauf ALD_02 et ALD_08) de 1 et 2 à 1 et 0 respectivement	
ALDT03			
(2 – ALD_03)	(ALD_03 = 1, 2)	Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions ALD_01 à ALD_09 (sauf ALD_02 et ALD_08) de 1 et 2 à 1 et 0 respectivement	
ALDT04			
(2 – ALD_04)	(ALD_04 = 1, 2)	Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions ALD_01 à ALD_09 (sauf ALD_02 et ALD_08) de 1 et 2 à 1 et 0 respectivement	
ALDT05			
(2 – ALD_05)	(ALD_05 = 1, 2)	Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions ALD_01 à ALD_09 (sauf ALD_02 et ALD_08) de 1 et 2 à 1 et 0 respectivement	
ALDT06			
(2 – ALD_06)	(ALD_06 = 1, 2)	Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions ALD_01 à ALD_09 (sauf ALD_02 et ALD_08) de 1 et 2 à 1 et 0 respectivement	
ALDT07			
(2 – ALD_07)	(ALD_07 = 1, 2)	Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions ALD_01 à ALD_09 (sauf ALD_02 et ALD_08) de 1 et 2 à 1 et 0 respectivement	
ALDT09			
(2 – ALD_09)	(ALD_09 = 1, 2)	Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions ALD_01 à ALD_09 (sauf ALD_02 et ALD_08) de 1 et 2 à 1 et 0 respectivement	

1) Échelle de dépendance à l'alcool (cote du questionnaire abrégé) - 12 mois

Nom de la variable : ALDDSF

Basée sur : ALD_01, ALD_03, ALD_04, ALD_05, ALD_06, ALD_07, ALD_09

Description : Cette variable a été recueillie pour mesurer la dépendance à l'alcool du répondant au cours des 12 mois précédant l'entrevue. La dépendance à l'alcool se rapporte à la tolérance, à l'état de manque, à la perte de contrôle ou à des problèmes sociaux ou physiques liés à la consommation d'alcool.

Note : Les questions posées pour évaluer la dépendance à l'alcool se fondent sur les travaux de Kessler et Mroczek. L'indice est fondé sur un sous ensemble de questions tirées de la Composite International Diagnostic Interview (CIDI). La CIDI est un instrument diagnostique structuré qui a été conçu pour produire des diagnostics conformément à une opérationnalisation partielle des définitions et des critères de diagnostics du trouble d'utilisation des substances psychoactives du DSM III-R.

Source: Kessler R.C., G. Andrews, D. Mroczek et al. « The World Health Organisation Composite Diagnostic Interview Short-Form », Psychological Medicine.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DOALD = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND

99	((ALDT01 = NSP, R, ND) ou (ALDT03 = NSP, R, ND) ou (ALDT04 = NSP, R, ND) ou (ALDT05 = NSP, R, ND) ou (ALDT06 = NSP, R, ND) ou (ALDT07 = NSP, R, ND) ou (ALDT09 = NSP, R, ND)	Au moins une question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	ALDT01 = SO	Le répondant n'avait pas bu suffisamment au cours des 12 derniers mois pour répondre aux questions sur la dépendance à l'alcool pour cette période particulière	
ALDT01 + ALDT03 + ALDT04 + ALDT05 + ALDT06 + ALDT07 + ALDT09	(ALDT01 = 0, 1) et (ALDT03 = 0, 1) et (ALDT04 = 0, 1) et (ALDT05 = 0, 1) et (ALDT06 = 0, 1) et (ALDT07 = 0, 1) et (ALDT09 = 0, 1)	Cote obtenue sur l'échelle de dépendance à l'alcool	(min: 0; max: 7)

2) Probabilité prévue pour les répondants (dépendance à l'alcool) - 12 mois

Nom de la variable : ALDDPP

Basée sur : ALDDSF

Description : Cette variable estime, à partir du score obtenu sur l'échelle de dépendance à l'alcool, la probabilité (exprimée en proportion) qu'aurait eu le répondant d'obtenir un diagnostic de dépendance à l'alcool si son état avait été évalué à l'aide du « Composite International Diagnostic Interview (CIDI) Long-Form Questionnaire » au moment de l'entrevue.

Note : La probabilité prévue de la dépendance à l'alcool des répondants a été attribuée d'après la cote calculée pour le questionnaire abrégé. La mesure de la dépendance à l'alcool du questionnaire abrégé vise à produire une mesure fondée sur l'opérationnalisation partielle du critère A et du critère B du diagnostic du trouble d'utilisation de substances psychoactives du DSM lll R. On a attribué une probabilité nulle aux personnes qui ont répondu non aux questions filtres. La règle optimale de classification dichotomique consiste à définir toutes les personnes qui obtiennent une cote égale ou supérieure à trois pour le questionnaire abrégé comme étant des cas probables et celles qui obtiennent une cote comprise entre zéro et deux comme n'étant probablement pas des cas de dépendance à l'alcool.

D'après des renseignements tirés du National Comorbidity Survey (États Unis), on a procédé à la classification croisée des cotes obtenues sur l'échelle de dépistage et des désignations de cas de dépendance à l'alcool fondées sur le programme diagnostique informatisé de la CIDI.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9.96	ALDDSF = 96	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9.99	ALDDSF = 99	Au moins une question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) ou les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
0.00	ALDDSF = 0	Probabilité des répondants d'être considérés comme des cas de dépendance	
0.05	ALDDSF = 1	Probabilité des répondants d'être considérés comme des cas de dépendance	
0.40	ALDDSF = 2	Probabilité des répondants d'être considérés comme des cas de dépendance	
0.85	ALDDSF = 3	Probabilité des répondants d'être considérés comme des cas de dépendance	
1.00	(3 < ALDDSF < 96)	Probabilité des répondants d'être considérés comme des cas de dépendance	

3) Trouble causé par l'alcool au cours des 12 derniers mois - moyenne

Nom de la variable : ALDDINT

Basée sur : ALD_15A, ALD_5B1, ALD_5B2, ALD_15C, ALD_15D

Description : Cette variable décrit le trouble ou la perturbation attribué à la consommation d'alcool sur les activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une moyenne des cinq items.

Note : Les personnes qui ont répondu négativement à chacune des questions relatives à la dépendance à l'alcool ont été exclues de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99.6	DOALD = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99.6	ALD_15A = 96	Population exclue	SO
99.9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
99.9	(ALD_15Ain (97, 98, 99)) ou (ALD_5B1in (97, 98, 99)) ou (ALD_5B2 in (97, 98, 99)) ou (ALD_15C in (97, 98, 99)) ou (ALD_15D in (97, 98, 99))	Au moins une question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
(ALD_15A + ALD_5B1 + ALD_5B2 + ALD_15C + ALD_15D) / 5	(0<=ALD_5B1<=10) et (0<=ALD_5B2<=10) et (0<=ALD_15A<=10) et (0<=ALD_15C<=10) et (0<=ALD_15D<=10)	Degré de trouble = moyenne des cinq items. Le répondant a répondu aux cinq questions	(arrondie à une décimale près) (min : 0; max : 10)
(ALD_15A + ALD_5B2 + ALD_15C + ALD_15D) / 4	ALD_5B1 = 11 et (0<=ALD_5B2<=10) et (0<=ALD_15A<=10) et (0<=ALD_15C<=10) et (0<=ALD_15D<=10)	Degré de trouble = moyenne de quatre items qui s'appliquent au répondant. ALD_5B1 ne s'applique pas	(arrondie à une décimale près) (min : 0; max : 10)
(ALD_15A + ALD_5B1 + ALD_15C + ALD_15D) / 4	(0<=ALD_5B1<=10) et ALD_5B2 = 11 et (0<=ALD_15A<=10) et (0<=ALD_15C<=10) et (0<=ALD_15D<=10)	Degré de trouble = moyenne de quatre items qui s'appliquent au répondant ALD_5B2 ne s'applique pas	(arrondie à une décimale près) (min : 0; max : 10)
(ALD_15A + ALD_15C + ALD_15D) / 3	ALD_5B1 =11 et ALD_5B2 = 11 et (0<=ALD_15A<=10) et (0<=ALD_15C<=10) et (0<=ALD_15D<=10)	Degré de trouble = moyenne de trois items qui s'appliquent au répondant ALD_5B1 et ALD_5B2 ne s'appliquent pas	(arrondie à une décimale près) (min : 0; max : 10)

4) Indicateur du trouble causé par la consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : ALDFINT

Basée sur : ALD_15A, ALD_5B1, ALD_5B2, ALD_15C, ALD_15D

Description : Cette variable décrit le trouble ou la perturbation attribué à la consommation d'alcool sur les activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une classification indiquant si la consommation d'alcool perturbe de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires), les activités sociales ou les relations personnelles.

Note : Les personnes qui ont répondu négativement à chacune des questions relatives à la dépendance à l'alcool ont été exclues de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOALD = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	ALD_15A = 96	Population exclue	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9	((ALD_15A in (97, 98, 99)) ou (ALD_5B1 in (97, 98, 99)) ou (ALD_5B2 in (97, 98, 99)) ou (ALD_15C in (97, 98, 99)) ou (ALD_15D in (97, 98, 99))	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul	ND
1	(4<=ALD_15A<=10) ou (4<=ALD_5B1<=10) ou (4<=ALD_5B2<=10) ou (4<=ALD_15C<=10) ou (4<=ALD_15D<=10)	La consommation d'alcool a perturbé significativement les activités routinières, le fonctionnement au travail (dans les études), les activités sociales ou les relations personnelles au cours des 12 derniers mois	
2	(0<=ALD_15A<=3) et ((0<=ALD_5B1<=3) ou ALD_5B1 = 11) et ((0<=ALD_5B2<=3) ou ALD_5B2 = 11) et (0<=ALD_15C<=3) et (0<=ALD_15D<=3)	La consommation d'alcool n'a pas perturbé significativement les activités routinières, le fonctionnement au travail (dans les études), les activités sociales ou les relations personnelles au cours des 12 derniers mois	

Consommation d'alcool au cours de la dernière semaine (2 VD)

1) Consommation hebdomadaire

Nom de la variable : ALWDWKY

Basée sur : ALC_1, ALW_1, ALW_2A1, ALW_2A2, ALW_2A3, ALW_2A4, ALW_2A5, ALW_2A6, ALW_2A7

Description : Cette variable sert à déterminer le nombre total de consommations prises par le répondant au cours de la semaine précédant l'interview.

Note : Les répondants qui n'ont pas consommé au moins une fois au cours des 12 derniers mois ont été exclus de la population. Avant 2007, cette variable dérivée était désignée comme ALCnDWKY. Elle était incluse dans les variables dérivées du module "Consommation d'alcool" (ALC) qui visait tous les répondants. Ce module, désormais optionnel, ne s'adresse qu'aux répondants qui résident dans les régions sociosanitaires qui ont sélectionné le module Consommation d'alcool au cours de la dernière semaine (ALW).

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
996	DOALW = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
996	ALC_1 = 2	Population exclue	SO
0	ALW_1 = 2	N'a rien consommé au cours de la dernière semaine	
999	(ALW_1 = NSP, R, ND) ou (ALW_2A1 = NSP, R, ND) ou (ALW_2A2 = NSP, R, ND) ou (ALW_2A3 = NSP, R, ND) ou (ALW_2A4 = NSP, R, ND) ou (ALW_2A5 = NSP, R, ND) ou (ALW_2A6 = NSP, R, ND) ou (ALW_2A7 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
ALW_2A1 + ALW_2A2 + ALW_2A3 + ALW_2A4 + ALW_2A5 + ALW_2A6 + ALW_2A7	(0 <= ALW_2A1 < 100) et (0 <= ALW_2A2 < 100) et (0 <= ALW_2A3 < 100) et (0 <= ALW_2A4 < 100) et (0 <= ALW_2A5 < 100) et (0 <= ALW_2A6 < 100) et (0 <= ALW_2A7 < 100)	Le nombre de consommations prises par le répondant au cours de la dernière semaine	(min: 0; max: 693)

2) Consommation quotidienne moyenne d'alcool

Nom de la variable : ALWDDLY

Basée sur : ALWDWKY

Description : Cette variable indique le nombre moyen de consommations du répondant par jour au cours de la semaine précédant l'interview.

Note : Les répondants qui n'ont pas consommé au moins une fois au cours des 12 derniers mois ont été exclus de la population. Avant 2007, cette variable dérivée était désignée comme ALCnDDLY. Elle était incluse dans les variables dérivées du module "Consommation d'alcool" (ALC) qui visait tous les répondants. Ce module, désormais optionnel, ne s'adresse qu'aux répondants qui résident dans les régions sociosanitaires qui ont sélectionné le module Consommation d'alcool au cours de la dernière semaine (ALW).

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
996	DOALW = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
996	ALWDWKY = SO	Population exclue	SO

999	ALWDWKY = ND	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non-déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
ALWDWKY / 7	ALWDWKY < 694	Consommation quotidienne moyenne d'alcool	(Arrondie au nombre entier) (min: 0; max: 99)

Problèmes de santé chroniques (1 VD)

1) Type de diabète

Nom de la variable : CCCDDIA

Basée sur : CCC_10A, CCC_10B, CCC_10C, CCC_101, CCC_102, CCC_105, CCC_106, DHH_AGE, DHH_SEX

Description : La variable établit les catégories de diabète (type 1, type 2 ou gestationnel) selon l'algorithme Ng-Dasgupta-Johnson (Rapports sur la santé, volume 19, numéro 1, mars 2008).

Note : Cette variable dérivée a été ajoutée en 2009.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	CCC_101 > 1	population exclue	NA
9	(CCC_10A en (7,8,9) ou CCC_10B en (7,8,9) ou CCC_10C en (97,98,99) ou CCC_101 en (7,8,9) ou CCC_102 en (997,998,999) ou CCC_105 en (7,8,9) ou CCC_106 en (7,8,9)) et (CCC_10A en (2,6,7,8,9) ou CCC_10B en (1,6,7,8,9))	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
1	(DHH_SEX = 1 et CCC_101 = 1 et CCC_105 = 1 et CCC_106 = 2 et (CCC_10C <=3 et (DHH_AGE < 30 ou CCC_102 < 30))) ou (DHH_sex = 2 et CCC_101 = 1 et CCC_10B en (1,6) et CCC_105 = 1 et CCC_106 =2 et (CCC_10C <=3 et (DHH_AGE < 30 ou CCC_102 < 30)))	Diabète type 1	
2	CCC_101 = 1 et (CCC_105 = 2 ou CCC_102 >= 30 ou CCC_10C > 3 ou CCC_106 = 1 ou (CCC_105 = 1 et (CCC_102 >= 30 ou CCC_10C > 3))) et (CCC_10A en (2,6,7,8,9) ou CCC_10B en (1,6,7,8,9))	Diabète type 2	
3	CCC_101 = 1 et DHH_SEX = 2 et CCC_10A = 1 et CCC_10B = 2	Diabète gestationnel	

Contacts avec certains professionnels de la santé (1 VD)

1) Nombre de consultation chez des médecins/pédiatres ou autres spécialistes

Nom de la variable : CHPDMDC

Basée sur : CHP_04, CHP_09

Description : Cette variable indique le nombre de fois que le répondant a vu un médecin de famille ou un spécialiste ou lui a parlé au cours des 12 derniers mois.

Note : Avant 2009, CHPDMDC s'appellait HCUDMDC et était dérivée à partir de questions du module Utilisation des services de soins de santé (HCU). En 2009, le module HCU a été divisé et toutes les questions requises pour la variable dérivée HCUDMDC ont été déplacées dans le nouveau module appelé Consultations avec les professionels de la santé (CHP).

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999	(CHP_04 = NSP, R, ND) ou (CHP_09 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu à au moins une question (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
CHP_04 + CHP_09	(0 <= CHP_04 <= 366) et (0 <= CHP_09 <= 300)	Nombre de consultations avec un médecin	(min: 0; max: 666)

Jeu excessif (6 VD)

Ce module vise à évaluer la pratique du jeu et les problèmes qui lui sont associés. Le questionnaire et les variables dérivées sont basés sur l'Indice canadien du jeu excessif (ICJE) mais, un certain nombre de modifications (décrites plus bas) ayant été apportées tant au questionnaire qu'aux variables dérivées, les résultats de la présente enquête ne sont pas directement comparables à ceux que l'on obtiendrait à l'aide de l'Indice Canadien du jeu excessif.

Reformatage temporaire			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
CPGT03			
(CPG_03-1)	(CPG_03 = 1, 2, 3, 4)	Modifier l'échelle des réponses de 1 à 4, à 0 à 3	
CPGT04			
(CPG_04-1)	(CPG_04 = 1, 2, 3, 4)	Modifier l'échelle des réponses de 1 à 4, à 0 à 3	
CPGT05			
(CPG_05-1)	(CPG_05 = 1, 2, 3, 4)	Modifier l'échelle des réponses de 1 à 4, à 0 à 3	
CPGT06			
(CPG_06-1)	(CPG_06 = 1, 2, 3, 4)	Modifier l'échelle des réponses de 1 à 4, à 0 à 3	
CPGT07			
(CPG_07-1)	(CPG_07 = 1, 2, 3, 4)	Modifier l'échelle des réponses de 1 à 4, à 0 à 3	
CPGT08			
(CPG_08-1)	(CPG_08 = 1, 2, 3, 4)	Modifier l'échelle des réponses de 1 à 4, à 0 à 3	
CPGT09			
(CPG_09-1)	(CPG_09 = 1, 2, 3, 4)	Modifier l'échelle des réponses de 1 à 4, à 0 à 3	
CPGT10			
(CPG_10-1)	(CPG_10 = 1, 2, 3, 4)	Modifier l'échelle des réponses de 1 à 4, à 0 à 3	
CPGT13			
(CPG_13-1)	(CPG_13 = 1, 2, 3, 4)	Modifier l'échelle des réponses de 1 à 4, à 0 à 3	

1) Activité de jeu - joueur vs. non-joueur

Nom de la variable : CPGFGAM

Basée sur : CPG_01A, CPG_01B, CPG_01C, CPG_01D, CPG_01E, CPG_01F, CPG_01G, CPG_01H, CPG_01I, CPG_01J, CPG_01K, CPG_01L,CPG_01M

Description : Cette variable catégorise les répondants comme étant des joueurs ou des non joueurs. Un non joueur est défini comme étant une personne qui, l'année précédente, ne s'est adonnée à aucune catégorie d'activité de jeu énumérée. Un joueur est défini comme étant une personne qui s'est adonnée à au moins une catégorie d'activité de jeu à un moment donné l'année précédente.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOCPG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND

1	(1<= CPG_01A <=7) ou (1<= CPG_01B <=7) ou (1<= CPG_01C <=7) ou (1<= CPG_01D <=7) ou (1<= CPG_01E <=7) ou (1<= CPG_01F <=7) ou (1<= CPG_01G <=7) ou (1<= CPG_01H <=7) ou (1<= CPG_01I <=7) ou (1<= CPG_01J <=7) ou (1<= CPG_01K <=7) ou (1<= CPG_01L <=7) ou (1<= CPG_01M <=7)	Joueur	
2	CPG_01A = 8 et CPG_01B = 8 et CPG_01C = 8 et CPG_01D = 8 et CPG_01E = 8 et CPG_01F = 8 et CPG_01G = 8 et CPG_01H = 8 et CPG_01I = 8 et CPG_01J = 8 et CPG_01K = 8 et CPG_01L = 8 et CPG_01M = 8	Non joueur	
9	(CPG_01A = NSP, R, ND) ou (CPG_01B = NSP, R, ND) ou (CPG_01C = NSP, R, ND) ou (CPG_01D = NSP, R, ND) ou (CPG_01E = NSP, R, ND) ou (CPG_01F = NSP, R, ND) ou (CPG_01G = NSP, R, ND) ou (CPG_01H = NSP, R, ND) ou (CPG_01I = NSP, R, ND) ou (CPG_01J = NSP, R, ND) ou (CPG_01K = NSP, R, ND) ou (CPG_01L = NSP, R, ND) ou (CPG_01M = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND

2) Indice de gravité du jeu pathologique (IGJP) - version modifiée

Nom de la variable : CPGDSEV

Basée sur : CPG_02, CPG_03, CPG_04, CPG_05, CPG_06, CPG_07, CPG_08, CPG_09, CPG_10, CPG_13, CPGFGAM

Description : Cette échelle à neuf items est un indice de gravité du jeu excessif.

Note : Un des changements par rapport à l'ICJE réside dans le fait que les répondants qui ont déclaré ne pas être « parieur » à la question CPG_02 ne se sont pas fait poser les questions sur la gravité des problèmes de jeu et ce, même s'ils ont rapporté des activités de jeu au cours des douze derniers mois. Ces répondants se sont vus attribuer la valeur 95 pour la présente variable. De plus, les répondants qui déclaraient avoir pratiqué chacune des activités de jeu (CPGB_01A à CPGB_01M) cinq fois ou moins au cours de la dernière année ne se sont pas fait poser les questions sur les problèmes de jeu. Enfin, dans le questionnaire, les activités de jeu ont été classées en moins de catégories que dans l'ICJE. Les modifications apportées à l'outil original ont été approuvées par le Dr. Wynne. Les non joueurs ont été exclus de la population. Une cote élevée indique la gravité du problème de jeu pathologique.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DOCPG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
96	CPGFGAM = 2	Population exclue	SO

99	ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
99	CPGFGAM = ND ou (CPGT03 = NSP, R, ND) ou (CPGT04 = NSP, R, ND) ou (CPGT05 = NSP, R, ND) ou (CPGT06 = NSP, R, ND) ou (CPGT07 = NSP, R, ND) ou (CPGT08 = NSP, R, ND) ou (CPGT09 = NSP, R, ND) ou (CPGT10 = NSP, R, ND) ou (CPGT13 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
95	CPG_02 = 5	Les questions sur la gravité du jeu pathologique n'ont pas été posées au répondant parce qu'il ne se considère pas comme un joueur	
0	CPGFGAM = 1 et CPG_02 = SO	Les questions de l'indice de gravité n'ont pas été posées aux répondants qui ont joué cinq fois ou moins par année pour chaque activité de jeu mentionnée.	
CPGT03 + CPGT04 + CPGT05 + CPGT06 + CPGT07 + CPGT08 + CPGT09 + CPGT10 + CPGT13	(CPGT03 = 0, 1, 2, 3) et (CPGT04 = 0, 1, 2, 3) et (CPGT05 = 0, 1, 2, 3) et (CPGT06 = 0, 1, 2, 3) et (CPGT07 = 0, 1, 2, 3) et (CPGT08 = 0, 1, 2, 3) et (CPGT09 = 0, 1, 2, 3) et (CPGT10 = 0, 1, 2, 3) et (CPGT13 = 0, 1, 2, 3)	Cote du répondant à l'indice de gravité du jeu excessif	(min: 0; max: 27)

Référence : Version modifiée d'une variable de l'ICJE (Indice canadien du jeu excessif) développée par Harold Wynne et Jackie Ferris. « L'indice canadien du jeu excessif : Rapport final » Jackie Ferris et Harold Wynne. Soumis au Centre canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies.

3) Type de joueur

Nom de la variable : CPGDTYP

Basée sur : CPGDSEV, CPGFGAM

Description : Cette variable classe les répondants selon la gravité de leurs problèmes de jeu.

Note : Un des changements par rapport à l'ICJE réside dans le fait que les répondants qui ont déclaré ne pas être « parieur » à la question CPG_02 ne se sont pas fait poser les questions sur la gravité des problèmes de jeu et ce, même s'ils ont rapporté des activités de jeu au cours des douze derniers mois. Ces répondants se sont vus attribuer la valeur 95 pour la présente variable. De plus, les répondants qui déclaraient avoir pratiqué chacune des activités de jeu (CPG_01A à CPG_01M) cinq fois ou moins au cours de la dernière année ne se sont pas fait poser les questions sur les problèmes de jeu. Enfin, dans le questionnaire, les activités de jeu ont été classées en moins de catégories que dans l'ICJE. Les modifications apportées à l'outil original ont été approuvées par le Dr. Wynne.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DOCPG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99	ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
99	CPGDSEV = ND	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
95	CPGDSEV = 95	Les questions sur la gravité du jeu pathologique n'ont pas été posées au répondant parce qu'il ne se considère pas comme un joueur	
1	CPGFGAM = 2	Non joueur	
2	CPGDSEV = 0	Joueur non pathologique	

3	(CPGDSEV = 1, 2)	Joueur à faible risque
4	(CPGDSEV = 3, 4, 5, 6, 7)	Joueur à risque moyen
5	CPGDSEV >= 8	Joueur pathologique

Référence : Version modifiée d'une variable de l'ICJE (Indice canadien du jeu excessif) développée par Harold Wynne et Jackie Ferris. « L'indice canadien du jeu excessif : Rapport final » Jackie Ferris et Harold Wynne. Soumis au Centre canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies.

4) Nombre de catégories d'activités de jeu dans la liste utilisée pour calculer l'ICJE

Nom de la variable : CPGDACT

Basée sur : CPG_01A, CPG_01B, CPG_01C, CPG_01D, CPG_01E, CPG_01F, CPG_01G, CPG_01H, CPG_01I, CPG_01J, CPG_01K, CPG_01L, CPG_01M

Description : Cette variable indique le nombre de catégories différentes d'activités de jeu (utilisées pour mesurer l'ICJE) auxquelles la personne a participé.

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
CPGT01A			
0	CPG_01A = 8	Recoder provisoirement la valeur 8 à 0 de sorte que les réponses « jamais » ne comptent pas dans la somme des diverses catégories d'activité de jeu auxquelles la personne a participé.	
1	(1<= CPG_01A <=7)	Recoder provisoirement les valeurs 1 à 7 à la valeur 1 de sorte que chaque activité puisse être comptée comme une catégorie distincte d'activité de jeu à laquelle la personne a participé.	
CPGT01B			
0	CPG_01B = 8	Recoder provisoirement la valeur 8 à 0 de sorte que les réponses « jamais » ne comptent pas dans la somme des diverses catégories d'activité de jeu auxquelles la personne a participé	
1	(1<= CPG_01B <=7)	Recoder provisoirement les valeurs 1 à 7 à la valeur 1 de sorte que chaque activité puisse être comptée comme une catégorie distincte d'activité de jeu à laquelle la personne a participé.	
CPGT01C			
0	CPG_01C = 8	Recoder provisoirement la valeur 8 à 0 de sorte que les réponses « jamais » ne comptent pas dans la somme des diverses catégories d'activité de jeu auxquelles la personne a participé	
1	(1<= CPG_01C <=7)	Recoder provisoirement les valeurs 1 à 7 à la valeur 1 de sorte que chaque activité puisse être comptée comme une catégorie distincte d'activité de jeu à laquelle la personne a participé.	
CPGT01D			
0	CPG_01D = 8	Recoder provisoirement la valeur 8 à 0 de sorte que les réponses « jamais » ne comptent pas dans la somme des diverses catégories d'activité de jeu auxquelles la personne a participé	
1	(1<= CPG_01D <=7)	Recoder provisoirement les valeurs 1 à 7 à la valeur 1 de sorte que chaque activité puisse être comptée comme une catégorie distincte d'activité de jeu à laquelle la personne a participé.	
CPGT01E			

0	CPG_01E = 8	Recoder provisoirement la valeur 8 à 0 de sorte que les réponses « jamais » ne comptent pas dans la somme des diverses catégories d'activité de jeu auxquelles la personne a participé
1	(1<= CPG_01E <=7)	Recoder provisoirement les valeurs 1 à 7 à la valeur 1 de sorte que chaque activité puisse être comptée comme une catégorie distincte d'activité de jeu à laquelle la personne a participé.
CPGT01F		
0	CPG_01F = 8	Recoder provisoirement la valeur 8 à 0 de sorte que les réponses « jamais » ne comptent pas dans la somme des diverses catégories d'activité de jeu auxquelles la personne a participé
1	(1<= CPG_01F <=7)	Recoder provisoirement les valeurs 1 à 7 à la valeur 1 de sorte que chaque activité puisse être comptée comme une catégorie distincte d'activité de jeu à laquelle la personne a participé.
CPGT01G		
0	CPG_01G = 8	Recoder provisoirement la valeur 8 à 0 de sorte que les réponses « jamais » ne comptent pas dans la somme des diverses catégories d'activité de jeu auxquelles la personne a participé
1	(1<= CPG_01G <=7)	Recoder provisoirement les valeurs 1 à 7 à la valeur 1 de sorte que chaque activité puisse être comptée comme une catégorie distincte d'activité de jeu à laquelle la personne a participé.
CPGT01H		
0	CPG_01H = 8	Recoder provisoirement la valeur 8 à 0 de sorte que les réponses « jamais » ne comptent pas dans la somme des diverses catégories d'activité de jeu auxquelles la personne a participé
1	(1<= CPG_01H <=7)	Recoder provisoirement les valeurs 1 à 7 à la valeur 1 de sorte que chaque activité puisse être comptée comme une catégorie distincte d'activité de jeu à laquelle la personne a participé.
CPGT01I		
0	CPG_01I = 8	Recoder provisoirement la valeur 8 à 0 de sorte que les réponses « jamais » ne comptent pas dans la somme des diverses catégories d'activité de jeu auxquelles la personne a participé
1	(1<= CPG_01I <=7)	Recoder provisoirement les valeurs 1 à 7 à la valeur 1 de sorte que chaque activité puisse être comptée comme une catégorie distincte d'activité de jeu à laquelle la personne a participé.
CPGT01J		
0	CPG_01J = 8	Recoder provisoirement la valeur 8 à 0 de sorte que les réponses « jamais » ne comptent pas dans la somme des diverses catégories d'activité de jeu auxquelles la personne a participé
1	(1<= CPG_01J <=7)	Recoder provisoirement les valeurs 1 à 7 à la valeur 1 de sorte que chaque activité puisse être comptée comme une catégorie distincte d'activité de jeu à laquelle la personne a participé.
CPGT01K		
0	CPG_01K = 8	Recoder provisoirement la valeur 8 à 0 de sorte que les réponses « jamais » ne comptent pas dans la somme des diverses catégories d'activité de jeu auxquelles la personne a participé

1	(1<= CPG_01K <=7)	Recoder provisoirement les valeurs 1 à 7 à la valeur 1 de sorte que chaque activité puisse être comptée comme une catégorie distincte d'activité de jeu à laquelle la personne a participé.
CPGT01L		
0	CPG_01L = 8	Recoder provisoirement la valeur 8 à 0 de sorte que les réponses « jamais » ne comptent pas dans la somme des diverses catégories d'activité de jeu auxquelles la personne a participé
1	(1<= CPG_01L <=7)	Recoder provisoirement les valeurs 1 à 7 à la valeur 1 de sorte que chaque activité puisse être comptée comme une catégorie distincte d'activité de jeu à laquelle la personne a participé.
CPGT01M		
0	CPG_01M = 8	Recoder provisoirement la valeur 8 à 0 de sorte que les réponses « jamais » ne comptent pas dans la somme des diverses catégories d'activité de jeu auxquelles la personne a participé
1	(1<= CPG_01M <=7)	Recoder provisoirement les valeurs 1 à 7 à la valeur 1 de sorte que chaque activité puisse être comptée comme une catégorie distincte d'activité de jeu à laquelle la personne a participé.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DOCPG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99	ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
99	(CPG_01A = NSP, R, ND) ou (CPG_01B = NSP, R, ND) ou (CPG_01C = NSP, R, ND) ou (CPG_01D = NSP, R, ND) ou (CPG_01E = NSP, R, ND) ou (CPG_01F = NSP, R, ND) ou (CPG_01G = NSP, R, ND) ou (CPG_01H = NSP, R, ND) ou (CPG_01I = NSP, R, ND) ou (CPG_01J = NSP, R, ND) ou (CPG_01K = NSP, R, ND) ou (CPG_01L = NSP, R, ND) ou (CPG_01M = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
CPGT01A + CPGT01B + CPGT01C + CPGT01D + CPGT01E + CPGT01F + CPGT01G + CPGT01H + CPGT01I + CPGT01J + CPGT01K + CPGT01L + CPGT01M	(CPGT01A = 0, 1) et (CPGT01B = 0, 1) et (CPGT01C = 0, 1) et (CPGT01D = 0, 1) et (CPGT01E = 0, 1) et (CPGT01F = 0, 1) et (CPGT01G = 0, 1) et (CPGT01H = 0, 1) et (CPGT01I = 0, 1) et (CPGT01J = 0, 1) et (CPGT01K = 0, 1) et (CPGT01L = 0, 1) et (CPGT01M = 0, 1)	Nombre de catégories distinctes d'activités de jeu auxquelles la personne a participé (liste de jeux utilisés pour mesurer l'ICJE) au cours des douze derniers mois	(min: 0; max: 13)

5) Trouble attribuable au jeu pathologique - moyenne

Nom de la variable : CPGDINT

Basée sur : CPG_19A, CPG_9B1, CPG_9B2, CPG_19C, CPG_19D

Description : Cette variable indique le trouble que le jeu pathologique a entraîné sur les activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une moyenne des 5 items.

Note : Les répondants qui ne se considèrent pas comme joueur ou qui ont indiqué qu'ils n'ont pas de problèmes de jeu ont été exclus de la population. Une cote plus élevée indique un trouble plus élevé.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99,6	DOCPG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99,6	CPG_19A = SO	Population exclue	SO
99,9	ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
99,9	(CPG_19A = NSP, R, ND) ou (CPG_9B1 = NSP, R, ND) ou (CPG_9B21 = NSP, R, ND) ou (CPG_19C = NSP, R, ND) ou (CPG_19D = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
(CPG_19A + (CPG_19A + CPG_9B1 + CPG_91B2 + CPG_19C + CPG_19D) / 5	(0 <= CPG_9B1 <= 10) et (0 <= CPG_9B2 <= 10) et (0 <= CPG_19A <= 10) et (0 <= CPG_19C <= 10) et (0 <= CPG_19D <= 10)	Degré du trouble du jeu Trouble = moyenne des 5 items (valeur de la moyenne basée sur toutes les 5 questions)	(arrondi au décimal près) (min : 0; max : 10.0)
(CPG_19A + CPG_9B2 + CPG_19C + CPG_19D) / 4	CPG_9B1 = 11 et (0 <= CPG_9B2 <= 10) et (0 <= CPG_19A <= 10) et (0 <= CPG_19C <= 10) et (0 <= CPG_19D <= 10)	Degré du trouble du jeu Trouble = moyenne des 4 items (valeur de la moyenne basée sur les 4 questions qui s'appliquent) CPG_9B1 (capacité d'aller à l'école) était sans objet	(arrondi au décimal près) (min : 0; max : 10.0)
(CPG_19A + CPG_9B1 + CPG_19C + CPG_19D) / 4	(0 <= CPG_9B1 <= 10) et CPG_9B2 = 11 et (0 <= CPG_19A <= 10) et (0 <= CPG_19C <= 10) et (0 <= CPG_19D <= 10)	Degré du trouble du jeu Trouble = moyenne des 4 items (valeur de la moyenne basée sur les 4 questions qui s'appliquent) CPG_9B2 (capacité de travailler était sans objet)	(arrondi au décimal près) (min : 0; max : 10.0)
(CPG_19A + CPG_19C + CPG_19D) / 3	CPG_9B1 = 11 et CPG_9B2 = 11 et (0 <= CPG_19A <= 10) et (0 <= CPG_19C <= 10) et (0 <= CPG_19D <= 10)	Degré du trouble du jeu Trouble = moyenne des 3 items (valeur de la moyenne basée sur les 3 questions qui s'appliquent) CPG_9B1 et CPG_9B2 étaient sans objet	(arrondi au décimal près) (min : 0; max : 10.0)

6) Indicateur du trouble attribuable au jeu pathologique

Nom de la variable : CPGFINT

Basée sur : CPG_19A, CPG_9B1, CPG_9B2, CPG_19C, CPG_19D

Description : Cette variable décrit le trouble que le jeu pathologique a entraîné sur les activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une classification indiquant si le jeu pathologique perturbe de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires), les activités sociales ou les relations personnelles.

Note : Les répondants qui ne se considèrent pas comme joueur, ou qui ont indiqué qu'ils n'ont pas de problèmes de jeu ont été exclus de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOCPG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	CPG_19A = SO	Population exclue	SO

9	ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	(4 <= CPG_19A <= 10) ou (4 <= CPG_9B1 <= 10) ou (4 <= CPG_9B2 <= 10) ou (4 <= CPG_19C <= 10) ou (4 <= CPG_19D <= 10)	Le jeu pathologique a troublé de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires), les activités sociales ou les relations personnelles au cours des 12 derniers mois.	
2	(0 <= CPG_19A <= 3) et [(0 <= CPG_9B1 <= 3) ou CPG_9B1 = 11] et [(0 <= CPG_9B2 <= 3) ou CPG_9B2 = 11] et (0 <= CPG_19C <= 3) et (0 <= CPG_19D <= 3)	Le jeu pathologique n'a pas troublé de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires), les activités sociales ou les relations personnelles au cours des 12 derniers mois.	
9	(CPG_19A = NSP, R, ND) ou (CPG_9B1 = NSP, R, ND) ou (CPG_9B2 = NSP, R, ND) ou (CPG_19C = NSP, R, ND) ou (CPG_19D = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND

Variables sur le logement et le ménage (10 VD)

1) L'âge du conjoint

Nom de la variable : DHHDSAGE

Basée sur : SAMPLEID, PERSONID, DHH_AGE, RELATIONSHIP

Description : La variable indique l'âge du conjoint du répondant.

Note : Ajoutée en 2009, la variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en montrant le DHH_AGE de PERSONID ayant une relation de conjoint avec le répondant pour chaque SAMPLEID.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999	DHH_MS = 1 ou 2 et (DHH_Age = null)	Population exclue	ND
996	(DHH_MS <> 1 ou 2) et (DHH_Age = null)	Population exclue	NA
DHH_Age de PERSONID (conjoint) dans chaque SAMPLEID	(RELATIONSHIP = 10 ou 20)	Âge du conjoint du répondant. On entend par conjoint un époux ou une épouse, ou un partenaire en union libre.	(max: âge courant)

2) Nombre de personnes de moins de 16 ans dans le ménage

Nom de la variable : DHHDYKD

Basée sur : PERSONID, DHH_AGE, RELATIONSHIP

Description : Cette variable indique le nombre de personnes, âgées de moins de 16 ans, qui vivent dans un ménage.

Note : Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID, qui ont une valeur de moins de 16 à DHH_AGE, à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
Nombre total de PERSONID dans chaque SAMPLEID	DHH_AGE <= 15 (fichier des membres)	Nombre de personnes de moins de 16 ans dans le ménage	(min: 0; max: 40)

3) Nombre de personnes de 16 à 17 ans dans le ménage

Nom de la variable : DHHDOKD

Basée sur : PERSONID, DHH_AGE, RELATIONSHIP

Description : Cette variable indique le nombre de personnes, âgés de 16 ou 17 ans, qui vivent dans un ménage et dont le lien de parenté avec au moins un adulte vivant dans le ménage est soit enfant, petit-enfant, gendre ou bru, ou neveu ou nièce.

Note : Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en

comptant le nombre de PERSONID, qui ont une valeur de 16 ou 17 à DHH_AGE et dont la valeur à RELATIONSHIP est (50, 51, 52, 53, 80, 100, 112 ou 123) à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
Nombre total de PERSONID dans chaque SAMPLEID	DHH_AGE = 16, 17 (fichier des membres) ET RELATIONSHIP = 50, 51, 52, 53, 80, 100, 112, 123 (fichier des relations)	Nombre de personnes de 16 ou 17 ans dans le ménage dont le lien de parenté avec au moins un adulte dans le ménage est soit enfant, petit-enfant, enfant par alliance, neveu ou nièce	(min: 0; max: 40)

4) Nombre de personnes de moins de six ans dans le ménage

Nom de la variable : DHHDLE5

Basée sur : SAMPLEID, PERSONID, DHH_AGE

Description : Cette variable indique le nombre de personnes, âgées de moins de six ans, qui vivent dans un ménage.

Note : Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID, qui ont une valeur de moins de 6 à DHH_AGE, à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
Nombre total de PERSONID dans chaque SAMPLEID	DHH_AGE <= 5 (fichier des membres)	Nombre de personnes de moins de six ans dans le ménage	(min: 0; max: 40)

5) Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage

Nom de la variable : DHHD611

Basée sur : SAMPLEID, PERSONID, DHH_AGE

Description : Cette variable indique le nombre de personnes, âgées entre 6 et 11 ans, qui vivent dans un ménage.

Note : Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID, qui ont une valeur entre 6 et 11 à DHH_AGE, à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
Nombre total de PERSONID dans chaque SAMPLEID	(6 <= DHH_AGE <= 11) (fichier des membres)	Nombre de personnes entre 6 et 11 ans dans le ménage	(min: 0; max: 40)

6) Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage

Nom de la variable : DHHDL12

Basée sur : SAMPLEID, PERSONID, DHH_AGE

Description : Cette variable indique le nombre de personnes, âgées de moins de 12 ans, qui vivent dans un ménage.

Note : Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID, qui ont une valeur de moins de 12 à DHH_AGE, à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
Nombre total de PERSONID dans chaque SAMPLEID	DHH_AGE < 12 (fichier des membres)	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage	(min: 0; max: 40)

7) Nombre de personnes de moins de 18 ans dans le ménage

Nom de la variable : DHHDL18

Basée sur : SAMPLEID, PERSONID, DHH_AGE, RELATIONSHIP

Description : La variable indique le nombre de personnes, âgées de moins de 18 ans, qui vivent dans un ménage et dont le lien de parenté avec au moins un adulte vivant dans le ménage est un enfant, y compris une belle-fille et un beau-fils, un enfant adopté et un enfant en famille d'accueil.

Note : Ajoutée en 2009, cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID qui ont une valeur de moins de 18 ans à DHH_AGE et dont la valeur à RELATIONSHIP est (50, 51, 52, 53 ou 80) à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
Nombre total de PERSONID dans chaque SAMPLEID	DHH_AGE <= 17 (fichier des membres) et RELATIONSHIP = 50, 51, 52, 53, 80 (fichier des relations)	Nombre de personnes, âgées de moins de 18 ans, qui vivent dans un ménage et dont le lien de parenté avec au moins un adulte vivant dans le ménage est un enfant, y compris une belle-fille et un beau-fils, un enfant adopté et un enfant en famille d'accueil.	(min: 0; max: 40)

8) Dispositions de vie du répondant sélectionné

Nom de la variable : DHHDLVG

Basée sur : DHH_REL du répondant choisi, DHHDHSZ

Description : Cette variable décrit les liens familiaux qui existent entre le répondant sélectionné et le reste des membres de son ménage.

Note : Les données sont recueillies au moyen d'un ensemble de codes de relations qui définissent un lien entre chaque personne d'un ménage. Pour chaque échantillon, les relations entre chaque personne du ménage sont utilisées dans le calcul de cette variable.

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
DHH_REL			
Z1	ND	Non déclaré	Codes de relations
A1	40, 41, 42, 43	Parent (40 = Père/mère, 41 = Père/mère biologique, 42 = Père/mère par alliance, 43 = Père/mère adoptif)	Codes de relations
B1	50, 51, 52, 53	Enfant (50 = Fils/Fille, 51 = Fille/fils biologique, 52 = Fils/fille par alliance, 53 = Fille/fils adopté)	Codes de relations
C1	60, 61, 62, 63, 64	Frère/soeur (60 = Frère/soeur, 61 = Soeur/frère biologique, 62 = Demi-soeur/demi-frère, 63 = Demi-soeur/demi-frère par alliance, 64 = Soeur/frère adopté)	Codes de relations

K1	90, 100, 110, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124	Autre lien de parenté (90 = Grands-parents, 100 = Petits-enfants, 110 = Beaux-parents, 111= Père/mère par alliance, 112 = Fils/fille par alliance 113 = Frère/soeur par alliance, 114 = Autre parent par alliance, 120 = Autre lien, 121= Oncle/tante, 122 = Cousin(e), 123 = Neveu/nièce, 124= Autre parent)	Codes de relations
L1	65, 70, 80, 260, 261, 262, 263	Pas de lien de parenté (65 = Frère/soeur de famille d'accueil, 70 = Parent de famille d'accueil, 80 = Enfant en famille d'accueil, 260 = Aucun lien, 261 = Petit ami/petite amie (chum/blonde), 262 = Colocataire, 263 = Autre)	Codes de relations
X1	10, 20	Conjoint/partenaire (10 = Conjoint/conjointe, 20 = Conjoint de fait)	Codes de relations

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99	Tout DHH_REL = Z1	Non déclaré	ND
1	DHHDHSZ = 1	Personne sans lien vivant seule Le répondant vit seul (Taille du ménage = 1)	
2	Tous les DHH_REL <> X1 et A1	Personne sans lien vivant avec d'autres Le répondant sélectionné vit avec d'autres personnes Il ne peut entretenir aucun lien matrimonial, d'union de fait ou parental, mais d'autres liens, tels que des liens fraternels, sont permis	
3	DHHDHSZ = 2 et DHH_REL = X1	Personne vivant avec un(e) conjoint(e)/partenaire Le répondant sélectionné vit avec un(e) conjoint(e)/partenaire (Taille du ménage = 2)	
4	DHHDHSZ > 2 et un DHH_REL = X1 et tous les autres DHH_REL = A1	Parent vivant avec un(e) conjoint(e)/partenaire et un ou des enfants Le répondant sélectionné vit avec un(e) conjoint(e)/partenaire et un ou des enfants	
5	Tout DHH_REL = A1	Parent seul vivant avec enfant(s); Le répondant sélectionné vit avec un ou des enfants; Aucun autre lien n'est permis	
6	DHHDHSZ = 2 et DHH_REL = B1	Le répondant sélectionné est un enfant qui vit avec un parent seul (Taille du ménage = 2)	
7	DHHDHSZ > 2 et un DHH_REL = B1 et tous les autres DHH_ REL = C1	Le répondant sélectionné est un enfant qui vit avec un parent seul et des frères et (ou) soeurs	
8	DHHDHSZ = 3 et tout DHH_REL = B1	Le répondant sélectionné est un enfant qui vit avec deux parents (Taille du ménage = 3)	
9	DHHDHSZ > 3 et deux DHH_REL = B1 et tous les autres DHH_REL = C1	Le répondant sélectionné est un enfant vivant avec deux parents et des frères et (ou) soeurs	
10	Autre	Autres Le répondant sélectionné vit dans un ménage dont la composition n'est pas classée ici	

9) Situation de la famille économique (type de ménage)

Nom de la variable : DHHDECF

Basée sur : DHH_REL pour tous les PERSONID dans SAMPLEID, DHH_AGE, DHH_SEX, DHHDHSZ

Description : Cette variable indique les liens familiaux au sein du ménage. Par famille économique, on entend un groupe de deux personnes ou plus qui partagent le même logement et qui sont apparentées par le sang, par alliance ou par adoption ou qui vivent en union libre. Un couple peut être de sexe opposé ou de même sexe. Les enfants en famille d'accueil sont inclus.

Note : Les données sont recueillies au moyen d'un ensemble de codes de relations qui définissent un lien entre chaque personne d'un ménage. Pour chaque échantillon, les relations entre chaque personne du ménage sont utilisées dans le calcul de cette variable. La variable se fonde sur l'âge et la relation déclarée de chaque personne par rapport aux autres membres du ménage. La matrice des codes de relations ne figure pas dans le fichier maître. À partir de 2007, les enfants en famille d'accueil âgés de moins de 18 ans sont codés « enfant ».

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
DHH_REL			
Z	R, ND	Non déclaré	Codes de relations
A	40, 41, 42, 43	Parent (40 = Père/mère, 41 = Père/mère biologique, 42 = Père/mère par alliance, 43 = Père/mère adoptif)	Codes de relations
L	60, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 260, 261, 262, 263	Autre (60 = Frère/Soeur, 61 = Soeur/frère biologique, 62 = Demi-soeur/demi-frère, 63 = Demi-soeur/demi-frère par alliance, 64 = Soeur/frère adopté, 65 = Frère/soeur de famille d'accueil, 70 = Parent de famille d'accueil, 80 = Enfant en famille d'accueil, 90 = Grands-parents, 100 = Petits-enfants, 110 = Beaux-parents, 111 = Père/mère par alliance, 112 = Fils/fille par alliance, 113 = Frère/soeur par alliance, 114 = Autre parent par alliance, 120 = Autre lien, 121 = Oncle/tante, 122 = Cousin(e), 123 = Neveu/nièce, 124 = Autre parent, 260 = Aucun lien, 261 = Petit ami/petite amie (chum/blonde), 262 = Colocataire, 263 = Autre)	Codes de relations
M	50, 51, 52, 53 (trié selon l'âge)	Enfant (50 = Fils/Fille, 51 = Fille/fils biologique, 52 = Fils/fille par alliance, 53 = Fille/fils adopté)	Codes de relations
X	10, 20	Conjoint (10 = Conjoint/conjointe, 20 = Conjoint de fait)	Codes de relations
Y	251	Célibataire	Codes de relations

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99	Tout DHH_REL = Z	Non déclaré	ND
1	DHHDHSZ = 1	Personne sans lien vivant seul Personne sans lien (Taille du ménage = 1)	
2	Tout DHH_REL pour tous les PERSONID dans SAMPLEID dans (L,Y)	Personne sans lien vivant avec d'autres Personnes sans liens vivant ensemble; il ne peut y avoir aucune relation matrimoniale, d'union de fait ou parentale, mais d'autres liens, comme des liens fraternels, sont permis	
3	DHHDHSZ = 2 et DHH_REL pour les deux PERSONID dans SAMPLEID = X	Couple seul Marié ou en union de fait, sans enfants; aucun autre lien n'est permis; (taille du ménage = 2)	

4	DHHDHSZ > 2 et au moins 2 PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir un DHH_REL = X et DHH_REL pour tous les PERSONID dans SAMPLEID <> A et M	Couple sans enfants, autres Marié ou en union de fait, sans enfants; il ne peut y avoir aucun lien de parent/enfants; d'autres liens sont permis
5	DHHDHSZ > 2 et Au moins 2 PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir un DHH_REL = X et au moins un doit avoir DHH_REL = A. Tous les autres PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir DHH_REL = M et de ceux-là, au moins un est DHH_AGE < 25	Couple avec enfants de moins de 25 ans Couple marié ou en union de fait dont au moins l'un des partenaires est le parent d'un enfant à charge. Aucun autre lien n'est permis
6	Au moins 2 PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir un DHH_REL = X et au moins un de ceux-là doit avoir un DHH_REL = A. Au moins un autre PERSONID dans SAMPLEID doit avoir un DHH_REL = M avec le PERSONID ci-dessus et de ceux-là au moins un est DHH_AGE < 25	Couple avec enfant(s) de moins de 25 ans, autres Couple marié ou en union de fait dont au moins l'un des partenaires est le parent d'un enfant de moins de 25 ans vivant dans le ménage. D'autres liens sont permis
7	DHHDHSZ > 2 et au moins 2 PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir un DHH_REL = X et au moins un doit avoir un DHH_REL = A. Tous les autres PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir DHH_REL = M et de ceux-là DHH_AGE >= 25	Couple dont tous les enfants ont 25 ans et plus Couple marié ou en union de fait dont tous les enfants ont 25 ans et plus Aucun autre lien n'est permis
8	DHHDHSZ > 2 et Au moins 2 PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir DHH_REL = X et au moins un de ceux-là doit avoir un DHH_REL = A. Au moins un autre PERSONID dans SAMPLEID doit avoir DHH_REL = M avec les PERSONID ci-dessus et de ceux-ci DHH_AGE >= 25	Couple dont tous les enfants ont 25 ans et plus Couple marié ou en union de fait dont tous les enfants ont 25 ans et plus. D'autres liens sont permis
9	DHHDHSZ > 1 et un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir DHH_REL = A et DHH_SEX = 2. Tous les autres PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir DHH_REL = M et de ceux-là au moins un DHH_AGE < 25	Mère seule avec enfant(s) de moins de 25 ans Un enfant doit avoir moins de 25 ans Aucun autre lien n'est permis
10	DHHDHSZ > 1 et un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir DHH_REL = A et DHH_SEX = 2. Au moins un autre PERSONID dans SAMPLEID doit avoir DHH_REL = M avec le PERSONID ci-dessus et de ceux-là au moins un DHH_AGE < 25	Mère seule avec enfant(s) de moins de 25 ans, autres Un enfant doit avoir moins de 25 ans D'autres liens sont permis
11	DHHDHSZ > 1 et un PERSONID dans SAMPLEID doit avoit DHH_REL = A et DHH_SEX = 2. Tous les autres PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir DHH_REL = M et de ceux-là DHH_AGE >= 25	Mère seule dont tous les enfants ont 25 ans et plus Tous les enfants doivent avoir 25 ans et plus Aucun autre lien n'est permis

12	DHHDHSZ > 1 et un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir DHH_REL = A et DHH_SEX = 2. Au moins un autre PERSONID dans SAMPLEID doit avoir DHH_REL = M avec la PERSONID ci-dessus et de ceux-là DHH_AGE >= 25	Mère seule dont tous les enfants ont 25 ans et plus, autres Tous les enfants doivent avoir 25 ans et plus D'autres liens sont permis
13	DHHDHSZ > 1 et un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir DHH_REL = A et DHH_SEX = 1. Tous les autres PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir DHH_REL = M et de ceux-là au moins un DHH_AGE < 25	Père seul avec enfant(s) de moins de 25 ans Un enfant doit avoir au moins 25 ans Aucun autre lien n'est permis
14	DHHDHSZ > 1 et un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir DHH_REL = A et DHH_SEX = 1. Au moins un autre PERSONID dans SAMPLEID doit avoir DHH_REL = M avec le PERSONID ci-dessus et de ceux-là au moins un DHH_AGE < 25	Père seul avec enfant(s) de moins de 25 ans, autres Un enfant doit avoir au moins 25 ans D'autres liens sont permis
15	DHHDHSZ > 1 et un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir DHH_REL = A et DHH_SEX = 1. Tous les autres PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir DHH_REL = M et un de ceux-là DHH_AGE >= 25	Père seul dont tous les enfants ont 25 ans et plus Tous les enfants doivent avoir 25 ans et plus Aucun autre lien n'est permis
16	DHHDHSZ > 1 et un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir DHH_REL = A et DHH_SEX = 1. Au moins un autre PERSONID dans SAMPLEID doit avoir DHH_REL = M avec le PERSONID ci-dessus et de ceux-là DHH_AGE >= 25	Père seul dont tous les enfants ont 25 ans et plus, autres Tous les enfants doivent avoir 25 ans et plus D'autres liens sont permis
17	Autre	Autres types de famille Tous les autres types de ménage

Référence : La classification type de la situation dans la famille économique comprend maintenant les enfants en famille d'accueil âgés de moins de 18 ans. Auparavant, ils étaient classés comme des personnes hors famille économique.

10) Taille du ménage

Nom de la variable : DHHDHSZ

Basée sur : SAMPLEID, PERSONID

Description : Cette variable représente le nombre de personnes qui habitent dans un ménage.

Note : Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
Nombre total de PERSONID dans chaque SAMPLEID	Trier le fichier (ficher des membres) par SAMPLEID et PERSONID	Nombre de personnes qui habitent dans le ménage	(min: 1; max: 40)

Détresse (3 VD)

Les questions des échelles K10 et K6 ont été élaborées à partir d'un ensemble de 612 questions tirées des échelles d'évaluation existantes de la détresse et de la dépression (Kessler RC et coll., 2002). Une fois éliminées les questions redondantes et imprécises, les questions qui restent ont été organisées afin de conserver celles correspondant aux 15 domaines représentés dans les diagnostics du DSM III R de la dépression majeure et du trouble d'anxiété généralisé, ainsi qu'au domaine de l'affectivité positive. Ces questions ont été ramenées à celles figurant dans les échelles K6 et K10, grâce à des procédés comportant des évaluations par un comité consultatif d'experts et des analyses de deux enquêtes pilotes subséquentes, au moyen de la théorie de la réponse d'item. Les questions des échelles définitives K10 et K6 ont été produites à partir de l'analyse de l'enquête pilote par téléphone, au moyen de l'analyse factorielle (Kessler RC et coll., 2002; http://www.hcp.med.harvard.edu/ncs/k6_scales.php)

On a par la suite vérifié l'efficacité des échelles de mesure K6 et K10 de la détresse psychologique non spécifique dans le cadre de l'Australian National Survey of Mental Health and Well-Being, selon les critères s'appliquant aux troubles DSM-IV, et les deux échelles se sont bien comportées (Furukawa TA et coll., 2003).

L'abréviation DSM désigne le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders publié par l'American Psychiatric Association. Il s'agit d'une classification des troubles mentaux reconnue à l'échelle internationale, dont il existe plusieurs versions.

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
DIST10A			
(5 – DIS_10A)	DIS_10A <= 5	Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions de 1 à 5, à 4 à 0	
DIS_10A	DIS_10A > 5	Exécuter les cas de R, NSP et ND	
DIST10B			
DIS_10B	DIS_10B > 5	Exécuter les cas de R, NSP et ND	
(5 – DIS_10B)	DIS_10B <= 5	Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions de 1 à 5, à 4 à 0	
DIST10C			
DIS_10C	DIS_10C > 5	Exécuter les cas de R, NSP et ND	
(5 – DIS_10C)	DIS_10C <= 5	Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions de 1 à 5, à 4 à 0	
DIST10D			
DIS_10D	DIS_10D > 5	Exécuter les cas de R, NSP et ND	
(5 – DIS_10D)	DIS_10D <= 5	Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions de 1 à 5, à 4 à 0	
DIST10E			
DIS_10E	DIS_10E > 5	Exécuter les cas de R, NSP et ND	
(5 – DIS_10E)	DIS_10E <= 5	Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions de 1 à 5, à 4 à 0	
DIST10F			
DIS_10F	DIS_10F > 5	Exécuter les cas de R, NSP et ND	
(5 – DIS_10F)	DIS_10F <= 5	Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions de 1 à 5, à 4 à 0	
DIST10G			
DIS_10G	DIS_10G > 5	Exécuter les cas de R, NSP et ND	
(5 – DIS_10G)	DIS_10G <= 5	Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions de 1 à 5, à 4 à 0	
DIST10H			
DIS_10H	DIS_10H > 5	Exécuter les cas de R, NSP et ND	
(5 – DIS_10H)	DIS_10H <= 5	Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions de 1 à 5, à 4 à 0	
DIST10I			
(5 – DIS_10I)	DIS_10I <= 5	Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions de 1 à 5, à 4 à 0	
DIS_10I	DIS_10I > 5	Exécuter les cas de R, NSP et ND	
DIST10J			
DIS_10J	DIS_10J > 5	Exécuter les cas de R, NSP et ND	

(5 – DIS_10J)	DIS_10J <= 5	Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions de 1 à 5, à 4 à 0

1) Échelle de détresse - K6

Nom de la variable : DISDK6

Basée sur : DIS_10B, DIS_10D, DIS_10E, DIS_10H, DIS_10I, DIS_10J

Description : Cette variable détermine le niveau de détresse du répondant sur une échelle à six questions.

Note : Cette variable est fondée sur six éléments et est désignée l'échelle K6. La détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée.

Site internet : http://www.hcp.med.havard.edu/ncs/k6_scales.php

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DODIS = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99	ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
99	(DIST10B = NSP, R, ND) ou (DIST10D = NSP, R, ND) ou (DIST10E = NSP, R, ND) ou (DIST10H = NSP, R, ND) ou (DIST10I = NSP, R, ND) ou (DIST10J = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
DIST10B + DIST10D + DIST10E + DIST10H + DIST10I + DIST10J	DIST10B <= 4 et DIST10D <= 4 et DIST10E <= 4 et DIST10H <= 4 et DIST10I <= 4 et DIST10J <= 4	Score obtenu sur l'échelle de détresse (K6)	(min: 0; max: 24)

2) Échelle de chronicité de la détresse et de l'affaiblissement lié à la détresse

Nom de la variable : DISDCHR

Basée sur : DIS_10K, DIS_10L, DIS_10M

Description : Cette variable classe les répondants selon la fréquence de leurs sentiments de détresse au cours du dernier mois par rapport à l'habitude.

Site internet : http://www.hcp.med.havard.edu/ncs/k6_scales.php

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DODIS = 2 ou (DIS_10K = 6 et DIS_10L = 6 et DIS_10M = 6)	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99	ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
99	(DIS_10K = NSP, R, ND) ou (DIS_10L = NSP, R, ND) ou (DIS_10M = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul	ND
1	DIS_10L = 1	Beaucoup plus souvent qu'à l'habitude	
2	DIS_10L = 2	Plus souvent qu'à l'habitude	

3	DIS_10L = 3	Un peu plus souvent qu'à l'habitude
4	DIS_10K = 3	Sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude
5	DIS_10M = 3	Un peu moins souvent qu'à l'habitude
6	DIS_10M = 2	Plutôt moins souvent qu'à l'habitude
7	DIS_10M = 1	Beaucoup moins souvent qu'à l'habitude
8	DIS_10K = 4	N'a jamais ressenti ces sentiments

3) Échelle de détresse - K10

Nom de la variable : DISDDSX

Basée sur : DIS_10A, DIS_10B, DIS_10C, DIS_10D, DIS_10E, DIS_10F, DIS_10G, DIS_10H, DIS_10I, DIS_10J

Description : La variable qui suit détermine le niveau de détresse du répondant sur une échelle de dix questions.

Note : Cette variable dérivée est fondée sur dix questions et est connue sous le nom de K10. La détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée.

Site internet : http://www.hcp.med.harvard.edu/ncs/k6_scales.php

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DODIS = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99	ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
99	(DIST10A = NSP, R, ND) ou (DIST10B = NSP, R, ND) ou (DIST10C = NSP, R, ND) ou (DIST10D = NSP, R, ND) ou (DIST10E = NSP, R, ND) ou (DIST10F = NSP, R, ND) ou (DIST10G = NSP, R, ND) ou (DIST10H = NSP, R, ND) ou (DIST10I = NSP, R, ND) ou (DIST10J = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
DIST10A + DIST10B + DIST10C + DIST10D + DIST10E + DIST10F + DIST10G + DIST10H + DIST10I + DIST10J	DIST10A <= 4 et DIST10B <= 4 et DIST10C <= 4 et DIST10D <= 4 et DIST10E <= 4 et DIST10F <= 4 et DIST10G <= 4 et DIST10H <= 4 et DIST10I <= 4 et DIST10J <= 4	Score obtenu sur l'échelle de détresse (K10)	(min: 0; max: 40)

Dépression (4 VD)

Le module de dépression utilisé dans l'ESCC a été développé à la fin des années 1980-début des années 1990 à partir d'une version étendue de l'échelle du Composite International Diagnostic Interview (CIDI). La validation de l'instrument n'a jamais été complétée par l'équipe de recherche du CIDI et par conséquent, ses propriétés psychométriques demeurent peu connues. Statistique Canada explore présentement des stratégies afin de procéder à une telle validation. Pour l'instant, Statistique Canada recommande de limiter l'analyse des données effectuée à partir de ce module à l'examen de la dépression comme un facteur corrélé à d'autres comportements et caractéristiques reliés à la santé. Pour le moment, l'utilisation de ces données en tant qu'indicateur de probabilité de dépression ou pour calculer la simple prévalence dans la population est déconseillée.

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
DPST02			
0	DPS_02 = 2	Modifier l'échelle des réponses nécessaires au calcul de sorte que les réponses correspondent à 1 pour oui et à 0 pour non	
1	DPS_02 = 1	Modifier l'échelle des réponses nécessaires au calcul de sorte que les réponses correspondent à 1 pour oui et à 0 pour non	
DPS_02	DPS_02 > 2	Exécuter les cas de R, NSP et ND	
DPST05			
0	DPS_05 = 2	Modifier l'échelle des réponses nécessaires au calcul de sorte que les réponses correspondent à 1 pour oui et à 0 pour non	
1	DPS_05 = 1	Modifier l'échelle des réponses nécessaires au calcul de sorte que les réponses correspondent à 1 pour oui et à 0 pour non	
DPS_05	DPS_05 > 2	Exécuter les cas de R, NSP et ND	
DPST06			
0	DPS_06 = 2	Modifier l'échelle des réponses nécessaires au calcul de sorte que les réponses correspondent à 1 pour oui et à 0 pour non	
1	DPS_06 = 1	Modifier l'échelle des réponses nécessaires au calcul de sorte que les réponses correspondent à 1 pour oui et à 0 pour non	
DPS_06	DPS_06 > 2	Exécuter les cas de R, NSP et ND	
DPST08A			
0	(DPS_07 = 3, 4) ou [DPS _07 > 2 ou (DPS_08A = NSP, R, ND)]	Pour DPS_07, l'échelle des réponses est modifiée de sorte que 0 = nombre de répondants dont le poids n'a pas varié ou qui ont suivi un régime	
0	[DPS _07 <= 2 et (DPS_08A <> NSP, R, ND)] et [(DPS_08A <= 9 et DPS_08B = 1) ou (DPS_08A <= 4 et DPS_08B = 2)]	Pour DPS_08A, l'échelle des réponses est modifiée de sorte que 1 = le répondant a pris ou a perdu plus de 4 kg (9 livres) et 0 si c'est moins ou s'il n'a pas perdu ou pris de poids	
1	[DPS _07 <= 2 et (DPS_08A <> NSP, R, ND)] et [(DPS_08A > 9 et DPS_08B = 1) ou (DPS_08A > 4 et DPS_08B = 2)]	Pour DPS_08A, l'échelle des réponses est modifiée de sorte que 1 = le répondant a pris ou a perdu plus de 4 kg (9 livres) et 0 si c'est moins ou s'il n'a pas perdu ou pris de poids	
DPS_08A	Sinon	Modifier l'échelle des réponses nécessaires au calcul de sorte que les réponses correspondent à 1 pour oui et à 0 pour non	
DPST10			
0	DPS_10 = 3 ou DPS_09 = 2	Pour DPS_10, l'échelle des réponses est modifiée de sorte que 1 = le répondant a eu du mal à s'endormir chaque soir ou presque chaque soir et 0 si le répondant a eu du mal à le faire moins souvent ou pas du tout	
1	DPS_10 = 1, 2	Pour DPS_10, l'échelle des réponses est modifiée de sorte que 1 = le répondant a eu du mal à s'endormir chaque soir ou presque chaque soir et 0 si le répondant a eu du mal à le faire moins souvent ou pas du tout	

DPS_10	DPS_10 > 3	Exécuter les cas de R, NSP et ND
DPST11		
0	DPS_11 = 2	Modifier l'échelle des réponses nécessaires au calcul de sorte que les réponses correspondent à 1 pour oui et à 0 pour non
1	DPS_11 = 1	Modifier l'échelle des réponses nécessaires au calcul de sorte que les réponses correspondent à 1 pour oui et à 0 pour non
DPS_11	DPS_11 > 2	Exécuter les cas de R, NSP et ND
DPST12		
0	DPS_12 = 2	Modifier l'échelle des réponses nécessaires au calcul de sorte que les réponses correspondent à 1 pour oui et à 0 pour non
1	DPS_12 =1	Modifier l'échelle des réponses nécessaires au calcul de sorte que les réponses correspondent à 1 pour oui et à 0 pour non
DPS_12	DPS_12 > 2	Exécuter les cas de R, NSP et ND
DPST13		
0	DPS_13 = 2	Modifier l'échelle des réponses nécessaires au calcul de sorte que les réponses correspondent à 1 pour oui et à 0 pour non
1	DPS_13 = 1	Modifier l'échelle des réponses nécessaires au calcul de sorte que les réponses correspondent à 1 pour oui et à 0 pour non
DPS_13	DPS_12 > 2	Exécuter les cas de R, NSP et ND
DPST16		
0	DPS_16 = 2	Modifier l'échelle des réponses nécessaires au calcul de sorte que les réponses correspondent à 1 pour oui et à 0 pour non
1	DPS_16 = 1	Modifier l'échelle des réponses nécessaires au calcul de sorte que les réponses correspondent à 1 pour oui et à 0 pour non
DPS_16	DPS_16 > 2	Exécuter les cas de R, NSP et ND
DPST19		
0	DPS_19 = 2	Modifier l'échelle des réponses nécessaires au calcul de sorte que les réponses correspondent à 1 pour oui et à 0 pour non
1	DPS_19 = 1	Modifier l'échelle des réponses nécessaires au calcul de sorte que les réponses correspondent à 1 pour oui et à 0 pour non
DPS_19	DPS_19 > 2	Exécuter les cas de R, NSP et ND
DPST21A		
0	(DPS_20 = 3, 4) ou [DPS _20 > 2 ou (DPS_21A = NSP, R, ND)]	Pour DPS_21, l'échelle des réponses est modifiée de sorte que 0 = nombre de répondants dont le poids n'a pas varié ou qui ont suivi un régime
0	[DPS _20 <= 2 et (DPS_21A <> NSP, R, ND)] et [(DPS_21A <= 9 et DPS_21B = 1) ou (DPS_21A <= 4 et DPS_21B = 2)]	Pour DPS_21, l'échelle des réponses est modifiée de sorte que 1 = le répondant a pris ou a perdu plus de 4 kg (9 livres) et 0 si c'est moins ou s'il n'a pas perdu ou pris de poids
1	[DPS _20 <= 2 et (DPS_21A <> NSP, R, ND)] et [(DPS_21A > 9 et DPS_21B = 1) ou (DPS_21A > 4 et DPS_21B = 2)]	Pour DPS_21, l'échelle des réponses est modifiée de sorte que 1 = le répondant a pris ou a perdu plus de 9 livres (4 kg) et 0 si c'est moins ou s'il n'a pas perdu ou pris de poids
DPS_21A	sinon	Modifier l'échelle des réponses nécessaires au calcul de sorte que les réponses correspondent à 1 pour oui et à 0 pour non
DPST23		

0	DPS_23 = 3 ou DPS_22=2	Pour DPS_23, l'échelle des réponses est modifiée de sorte que 1 = le répondant a eu du mal à s'endormir chaque soir ou presque chaque soir et 0 si le répondant a eu du mal à le faire moins souvent ou pas du tout
1	DPS_23 = 1, 2	Pour DPS_23, l'échelle des réponses est modifiée de sorte que 1 = le répondant a eu du mal à s'endormir chaque soir ou presque chaque soir et 0 si le répondant a eu du mal à le faire moins souvent ou pas du tout
DPS_23	DPS_23 > 3	Exécuter les cas de R, NSP et ND
DPST24		
0	DPS_24 = 2	Modifier l'échelle des réponses nécessaires au calcul de sorte que les réponses correspondent à 1 pour oui et à 0 pour non
1	DPS_24 = 1	Modifier l'échelle des réponses nécessaires au calcul de sorte que les réponses correspondent à 1 pour oui et à 0 pour non
DPS_24	DPS_24 > 2	Exécuter les cas de R, NSP et ND
DPST25		
0	DPS_25 = 2	Modifier l'échelle des réponses nécessaires au calcul de sorte que les réponses correspondent à 1 pour oui et à 0 pour non
1	DPS_25 = 1	Modifier l'échelle des réponses nécessaires au calcul de sorte que les réponses correspondent à 1 pour oui et à 0 pour non
DPS_25	DPS_25 > 2	Exécuter les cas de R, NSP et ND
DPST26		
0	DPS_26 = 2	Modifier l'échelle des réponses nécessaires au calcul de sorte que les réponses correspondent à 1 pour oui et à 0 pour non
1	DPS_26 = 1	Modifier l'échelle des réponses nécessaires au calcul de sorte que les réponses correspondent à 1 pour oui et à 0 pour non
DPS_26	DPS_26 > 2	Exécuter les cas de R, NSP et ND

1) Échelle de dépression - cote du formulaire abrégé

Nom de la variable : DPSDSF

Basée sur : DPS_02, DPS_05, DPS_06, DPS_08A, DPS_08B, DPS_10, DPS_11, DPS_12, DPS_13, DPS_16, DPS_17, DPS_18, DPS_19, DPS_21A, DPS_21B, DPS_23, DPS_24, DPS_25, DPS_26

Description : Cette variable évalue l'état de dépression du répondant selon qu'il s'est senti déprimé ou a perdu tout intérêt pour deux semaines ou plus au cours de la dernière année. Ceci inclut les périodes normales de tristesse (p. ex. suite au décès d'un être cher), ainsi que les épisodes de dépression majeure.

Note : Les questions utilisées pour évaluer la dépression se fondent sur les travaux de Kessler et Mroczek (de l'Université du Michigan). Ces chercheurs ont sélectionné un sous ensemble de questions de la Composite International Diagnostic Interview (CIDI) qui permet de déterminer si la personne a vécu un épisode de dépression majeure (EDM). La CIDI est un instrument diagnostique structuré conçu pour produire des diagnostics conformément aux définitions et critères du Manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux DSM-lll-R et des Critères diagnostiques pour la recherche de la CIM 10. Le questionnaire abrégé utilisé dans le cadre de l'ESCC pour évaluer l'EDM a été mis au point de façon à appliquer les critères A à C de diagnostic de l'EDM du DSM III R. On n'a pas tenu compte des règles hiérarchiques de diagnostic définies au critère D (« non superposé à une schizophrénie, un trouble de forme schizophrénique, un trouble délirant ou un trouble psychotique n.c.a. »).

Des cotes élevées indiquent un niveau plus élevé de dépression.

Site internet : National Comorbidity Survey: www.hcp.med.harvard.edu/ncs/
Composite International Diagnostic Interview (CIDI): www.who.int/msa/cidi/index.htm

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DODEP = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99	ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
99	(DPST02 = NSP, R, ND) ou (DPST05 = NSP, R, ND) ou (DPST06 = NSP, R, ND) ou (DPST08A = NSP, R, ND) ou (DPST10 = NSP, R, ND) ou (DPST11 = NSP, R, ND) ou (DPST12 = NSP, R, ND) ou (DPST13 = NSP, R, ND) ou (DPST16 = NSP, R, ND) ou (DPS_17 = NSP, R, ND) ou (DPS_18 = NSP, R, ND) ou (DPST19 = NSP, R, ND) ou (DPST21A = NSP, R, ND) ou (DPST23 = NSP, R, ND) ou (DPST24 = NSP, R, ND) ou (DPST25 = NSP, R, ND) ou (DPST26 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
0	DPST02 < SO et DPST05 = SO et DPST19 = SO	Le répondant ne s'est pas senti déprimé ou n'a pas perdu tout intérêt pendant au moins deux semaines consécutives l'an dernier, ou s'est senti un peu déprimé (pas toute la journée mais presque tous les jours pendant au moins deux semaines)	
DPST02 + DPST05 + DPST06 + DPST08A + DPST10 + DPST11 + DPST12 + DPST13	DPST02 = 1 et (DPST05 = 1, 0) et (DPST06 = 1, 0) et (DPST08A = 1, 0) et (DPST10 = 1, 0) et (DPST11 = 1, 0) et (DPST12 = 1, 0) et (DPST13 = 1, 0)	Le répondant s'est senti déprimé pendant au moins deux semaines l'an dernier	(min: 1; max: 8)
DPST16 + DPST19 + DPST21A + DPST23 + DPST24 + DPST25 + DPST26	DPST16 = 1 et (DPST19 = 1, 0) et (DPST21A = 1, 0) et (DPST23 = 1, 0) et (DPST24 = 1, 0) et (DPST25 = 1, 0) et (DPST26 = 1, 0)	Le répondant a perdu tout intérêt pendant deux semaines ou plus l'an dernier	(min: 1; max: 7)

2) Échelle de dépression - probabilité prévue

Nom de la variable : DPSDPP

Basée sur : DPSDSF

Description : Cette variable estime, à partir du score obtenu sur l'échelle de dépression, la probabilité (exprimée en proportion) qu'aurait eu le répondant d'obtenir un diagnostic d'épisode de dépression majeure au cours des douze derniers mois si son état avait été évalué à l'aide du « Composite International Diagnostic Interview (CIDI) Long-Form Questionnaire » au moment de l'entrevue.

Note : On a attribué une probabilité nulle (0) de constituer un cas aux répondants qui ont répondu non aux questions de base.

Site internet : National Comorbidity Survey: www.hcp.med.harvard.edu/ncs/
Composite International Diagnostic Interview (CIDI): www.who.int/msa/cidi/index.htm

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9,96	DODEP = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO

9,99	ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9,99	DPSDSF = ND	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire ou les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
0	DPSDSF = 0	Probabilité prévue de constituer un cas	
0,05	DPSDSF = 1	Probabilité prévue de constituer un cas	
0,25	DPSDSF = 2	Probabilité prévue de constituer un cas	
0,50	DPSDSF = 3	Probabilité prévue de constituer un cas	
0,80	DPSDSF = 4	Probabilité prévue de constituer un cas	
0,90	DPSDSF > 4	Probabilité prévue de constituer un cas	

3) Nombres de semaines pendant lesquelles le répondant s'est senti déprimé - au cours des douze derniers mois

Nom de la variable : DPSDWK

Basée sur : DPS_14, DPS_27

Description : Cette variable indique le nombre de semaines pendant lesquelles le répondant s'est senti déprimé au cours des douze derniers mois.

Note : Les répondants qui n'ont pas manifesté les signes de dépression requis, ont été exclus de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DODEP = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
96	DPS_14 = SO et DPS_27 = SO	Population exclue	SO
99	ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
99	(DPS_14 = NSP, R, ND) ou (DPS_27 = NSP, R, ND) ou (DPS_08A = NSP, R, ND) ou (DPS_21A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
DPS_14	DPS_14 < SO	Nombre de semaines durant lesquelles le répondant était triste, mélancolique ou déprimé au cours de la dernière année	
DPS_27	DPS_14 >= SO et DPS_27 < SO	Nombre de semaines durant lesquelles le répondant a perdu tout intérêt au cours de la dernière année	

4) Mois au cours duquel le répondant s'est senti déprimé la dernière fois

Nom de la variable : DPSDMT

Basée sur : DPS_14, DPS_15, DPS_27, DPS_28

Description : Cette variable détermine le mois au cours duquel le répondant s'est senti déprimé la dernière fois au cours de la dernière année.

Note : Les répondants suivants ont été exclus de la population :
1) les répondants qui n'ont pas manifesté les signes de dépression requis; ou
2) les répondants qui ont été déprimés pour 51 semaines ou plus au cours de la dernière année

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DODEP = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
96	DPS_15 = SO et DPS_28 = SO	Population exclue	SO
99	ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
99	(DPS_14 = 52, NSP, R, ND) ou (DPS_15 = NSP, R, ND) ou (DPS_27 = 52, NSP, R, ND) ou (DPS_28 = NSP, R, ND) ou (DPS_08A = NSP, R, ND) ou (DPS_21A = NSP, R, ND)	Le répondant a déclaré avoir été déprimé pour >51 semaines au cours de la dernière année ou n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
DPS_15	DPS_14 < 52 et DPS_15 < SO	Mois au cours duquel le répondant s'est senti triste, mélancolique ou déprimé pendant au moins deux semaines consécutives	(min : 1; max : 12)
DPS_28	DPS_14 >= SO et DPS_27 < 52 et DPS_28< SO	Mois au cours duquel le répondant a perdu tout intérêt pendant au moins deux semaines consécutives	(min : 1; max : 12)

Conduite et sécurité (1 VD)

1) Utilisation de la ceinture de sécurité du passager (véhicule motorisé)

Nom de la variable : DRVFSBU

Basée sur : DRV_08A, DRV_08B

Description : Cette variable indique si le répondant attache toujours sa ceinture de sécurité quand il est assis sur le siège avant ou le siège arrière d'une voiture, d'un camion, ou d'une fourgonnette.

Note : Les gens qui ne sont jamais passagers d'une automobile, d'un camion ou d'une fourgonnette ont été exclus de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DODRV = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
6	DRV_08A = 5 et DRV_08B = 5	Population exclue	SO
1	(DRV_08A = 1, 5) et (DRV_08B = 1, 5)	Attache toujours sa ceinture de sécurité lorsque passager dans un véhicule privé	
2	(DRV_08A = 2, 3, 4) ou (DRV_08B = 2, 3, 4)	N'attache pas toujours sa ceinture de sécurité lorsque passager dans un véhicule privé	
9	(DRV_08A = NSP, R, ND) ou (DRV_08B = NSP, R, ND)	Au moins une question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

Usage de suppléments alimentaires - Vitamines et minéraux (1 VD)

1) Fréquence de la consommation de suppléments de vitamines et minéraux

Nom de la variable : DSUDCON

Basée sur : DSU_1A, DSU_1B, DSU_1C

Description : Cette variable classe les répondants qui ont consommé des suppléments de vitamines ou de minéraux au cours des quatre semaines ayant précédé l'entrevue selon leur fréquence de consommation dans la semaine précédant l'entrevue.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DODSU = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
99	(DSU_1A = NSP, R, ND) ou (DSU_1B = NSP, R, ND) ou (DSU_1C = NSP, R, ND)	Au moins une des questions nécessaires au calcul n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	DSU_1A = 2	Non-utilisateur au cours des 4 dernières semaines	
2	DSU_1B = 2	Utilisateur occasionnel au cours des 4 dernières semaines - moins d'une semaine	
3	(DSU_1C = 1, 2)	Utilisateur régulier au cours des 4 dernières semaines - 1 à 2 jours au cours de la dernière semaine	
4	(DSU_1C = 3, 4)	Utilisateur régulier au cours des 4 dernières semaines - 3 à 4 jours au cours de la dernière semaine	
5	(DSU_1C = 5, 6)	Utilisateur régulier au cours des 4 dernières semaines - 5 à 6 jours au cours de la dernière semaine	
6	DSU_1C = 7	Utilisateur régulier au cours des 4 dernières semaines - 7 jours au cours de la dernière semaine	

Éducation (4 VD)

1) Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux

Nom de la variable : EDUDH04

Basée sur : EDUDR04 pour chaque membre du ménage

Description : Cette variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par tous les membres du ménage.

Note : Cette variable est dérivée en créant temporairement EDUDR04 pour chaque membre du ménage (tous les PERSONID du même SAMPLEID). Ensuite, la valeur supérieure est obtenue en comparant les valeurs de EDUDR04 de tous les membres du ménage. Si un PERSONID a une valeur EDUDR04 de ND (non déclaré), la valeur ND est retournée. Si tous les EDUDR04 sont SO (sans objet), alors SO est retournée.

2) Plus haut niveau de scolarité - ménage, 10 niveaux

Nom de la variable : EDUDH10

Basée sur : EDUDR10 pour chaque membre du ménage

Description : Cette variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par tous les membres du ménage.

Note : Cette variable est dérivée en créant temporairement EDUDR10 pour chaque membre du ménage (tous les PERSONID du même SAMPLEID). Ensuite, la valeur supérieure est obtenue en comparant les valeurs de EDUDR10 de tous les membres du ménage. Si un PERSONID a une valeur EDUDR10 de ND (non déclaré), la valeur ND est retournée. Si tous les EDUDR10 sont SO (sans objet), alors SO est retournée.

3) Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux

Nom de la variable : EDUDR04

Basée sur : EDU_1, EDU_2, EDU_3, EDU_4A

Description : Cette variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par le répondant.

Note : En 2011, le nom externe de la question EDU_Q04 a été changé de EDU_4 à EDU_4A en raison de l'ajout de deux catégories de résponses à la question.

En 2013, le préfixe pour EDU_Q01, EDU_Q02, EDU_Q03 et EDU_Q04A a changé pour EHG2 dans le questionnaire, les préfixes des noms externes continueront d'être EDU.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1	((EDU_1 in (1, 2) ou EDU_2 = 2) et EDU_3 = 2)	Études secondaires partielles	EDUDR10 = 1,2,3
2	EDU_2 = 1 et EDU_3 = 2	Diplôme d'études secondaires, aucune étude postsecondaire	EDUDR10 = 4
3	EDU_3 = 1 et EDU_4A in (1,2)	Études postsecondaires partielles	EDUDR10 = 5
4	EDU_4A in (3,4,5,6,7)	Certificat/diplôme d'études postsecondaires ou grade universitaire	EDUDR10 = 6,7,8,9,10

9	[(EDU_1 in (7,8,9)) et EDU_2 = 2] ou (EDU_2 in (7,8,9)) ou (EDU_3 in (7,8,9)) ou (EDU_4A in (97,98,99))	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND (EDUDR10 = 99)

4) Plus haut niveau de scolarité - répondant, 10 niveaux

Nom de la variable : EDUDR10

Basée sur : EDU_1, EDU_2, EDU_3, EDU_4A

Description : Cette variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par le répondant.

Note : En 2011, le nom externe de la question EDU_Q04 a été changé de EDU_4 à EDU_4A en raison de l'ajout de deux catégories de résponses à la question.

En 2013, le préfixe pour EDU_Q01, EDU_Q02, EDU_Q03 et EDU_Q04A a changé pour EHG2 dans le questionnaire, les préfixes des noms externes continueront d'être EDU.

1: La catégorie 3 inclut les répondants qui n'ont pas obtenu de diplôme d'études secondaires et qui n'ont pas fait d'études post-secondaires.
2: La catégorie 5 inclut les répondants qui ont obtenu un diplôme d'études secondaires, qui ont suivi d'autres cours pouvant mener à l'obtention d'une attestation, d'un certificat ou d'un diplôme mais qui n'ont pas obtenu une telle attestation, certificat ou diplôme.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1	(EDU_1 = 1 et EDU_3 = 2)	Huitième année ou moins (Québec : deuxième secondaire ou moins)	
2	(EDU_1 = 2 et EDU_3 = 2)	Neuvième ou dixième année (QC : troisième ou quatrième secondaire; TN et Labrador : première année du secondaire)	
3	EDU_1 = 3 et EDU_2 = 2 et EDU_3 = 2)	Onzième à treizième années (QC : cinquième secondaire; TN et Labrador: deuxième et troisième années du secondaire) (1)	
4	EDU_2 =1 et EDU_3 =2	Diplôme d'études secondaires, aucune étude postsecondaire	
5	EDU_3=1et (EDU_4A = 1 ou EDU_4A = 2)	Études postsecondaires partielles (2)	
6	EDU_4A = 3	Certificat commercial ou diplôme d'une école de métiers	
7	EDU_4A = 4	Diplôme ou certificat d'un collège, cégep ou autre établissement non universitaire (autre que les certificats ou diplôme de métiers)	
8	EDU_4A = 5	Certificat ou diplôme universitaire au dessous du niveau du baccalauréat	
9	EDU_4A = 6	Baccalauréat	
10	EDU_4A = 7	Certificat, diplôme ou grade universitaire au-dessus du niveau du baccalauréat	
99	[(EDU_1 in (7,8,9)) et EDU_2 = 2] ou (EDU_2 in (7,8,9)) ou (EDU_3 in (7,8,9)) ou (EDU_4A = in (97,98,99))	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND

Choix alimentaires (3 VD)

1) Évite certains aliments pour certaines raisons de contenu

Nom de la variable : FDCFAVD

Basée sur : FDC_3A, FDC_3B, FDC_3C, FDC_3D, FDC_3E

Description : Cette variable indique si le répondant évite certains aliments à cause de préoccupations sur la teneur en gras, le type de gras, le sel, le cholestérol et la teneur en calories.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOFDC = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
2	FDC_3A = 2 et FDC_3B = 2 et FDC_3C = 2 et FDC_3D = 2 et FDC_3E = 2	N'évite pas certains aliments à cause de préoccupations sur la teneur en gras, le type de gras, le sel, le cholestérol et la teneur en calories	
1	FDC_3A = 1 ou FDC_3B = 1 ou FDC_3C = 1 ou FDC_3D = 1 ou FDC_3E = 1	Évite certains aliments à cause de préoccupations sur la teneur en gras, le type de gras, le sel, le cholestérol et la teneur en calories	
9	(FDC_3A = NSP, R, ND) ou (FDC_3B = NSP, R, ND) ou (FDC_3C = NSP, R, ND) ou (FDC_3D = NSP, R, ND) ou (FDC_3E = NSP, R, ND)	Au moins une question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

2) Choisit ou évite certains aliments pour certaines questions de santé

Nom de la variable : FDCFCAH

Basée sur : FDC_1A, FDC_1B, FDC_1C, FDC_1D

Description : Cette variable indique si le répondant choisit ou évite certains types d'aliments à cause d'une ou plusieurs préoccupations suivantes : poids corporel, maladie cardiaque, cancer, ostéoporose.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOFDC = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
2	FDC_1A = 2 et FDC_1B = 2 et FDC_1C = 2 et FDC_1D = 2	Ne choisit ou n'évite pas certains aliments pour des préoccupations reliées au poids corporel, maladie cardiaque, cancer, ostéoporose	
1	FDC_1A = 1 ou FDC_1B = 1 ou FDC_1C = 1 ou FDC_1D = 1	Choisit ou évite certains aliments pour des préoccupations reliées au poids corporel, maladie cardiaque, cancer, ostéoporose	

9	(FDC_1A = NSP, R, ND) ou (FDC_1B = NSP, R, ND) ou (FDC_1C = NSP, R, ND) ou (FDC_1D = NSP, R, ND)	Au moins une question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

3) Choisit certains aliments pour certaines raisons reliées au contenu

Nom de la variable : FDCFCHO

Basée sur : FDC_2A, FDC_2B, FDC_2C

Description : Cette variable indique si le répondant choisit certains aliments à cause de préoccupations reliées à la teneur en gras, en fibres ou en calcium.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOFDC = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
2	FDC_2A = 2 et FDC_2B = 2 et FDC_2C = 2	Ne choisit pas certains aliments à cause de préoccupations sur la teneur en gras, en fibres et en calcium	
1	FDC_2A = 1 ou FDC_2B = 1 ou FDC_2C = 1	Choisit certains aliments à cause de préoccupations sur la teneur en gras, en fibres et en calcium	
9	(FDC_2A = NSP, R, ND) ou (FDC_2B = NSP, R, ND) ou (FDC_2C = NSP, R, ND)	Au moins une question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

Sécurité alimentaire (3 VD)

Reformatage temporaire			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
DHHTDKS			
0	DHHDYKD = 0 et DHHDOKD = 0	Fixer la valeur à 0 pour indiquer qu'il s'agit d'un ménage SANS enfants (de moin de 18 ans)	
1	DHHDYKD <> 0 ou DHHDOKD <> 0	Fixer la valeur à 1 pour indiquer qu'il s'agit d'un ménage AVEC enfants (de moins de 18)	
FSCASUM			
FSCT020 + FSCT030 + FSCT040 + FSCT080 + FSCT081 + FSCT090 + FSCT100 + FSCT110 + FSCT120 + FSCT121	Tous	Somme de toutes les variables temporaires pour adultes à utiliser pour déterminer le niveau d'insécurité alimentaire du ménage Le total varie de 0 à 10	(Min: 0; Max: 10)
FSCCSUM			
FSCT050 + FSCT060 + FSCT070 + FSCT130 + FSCT140 + FSCT141 + FSCT150 + FSCT160	Tous	Somme de toutes les variables temporaires pour enfants à utiliser pour déterminer le niveau d'insécurité alimentaire du ménage Le total varie de 0 à 8	(Min: 0; Max: 8)
FSCT020			
0	(FSC_020 = 3) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire. Fixer la valeur à 1, si le répondant a répondu « affirmativement ». Voir la note ci-dessus.	
1	(FSC_020 en (1, 2)) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire. Fixer la valeur à 1, si le répondant a répondu « affirmativement ». Voir la note ci-dessus.	
FSCT030			
0	(FSC_030 = 3) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire. Fixer la valeur à 1, si le répondant a répondu « affirmativement ». Voir la note ci-dessus.	
1	(FSC_030 en (1,2)) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire. Fixer la valeur à 1, si le répondant a répondu « affirmativement ». Voir la note ci-dessus.	
FSCT040			
0	(FSC_040 = 3) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire. Fixer la valeur à 1, si le répondant a répondu « affirmativement ». Voir la note ci-dessus.	
1	(FSC_040 en (1,2)) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire. Fixer la valeur à 1, si le répondant a répondu « affirmativement ». Voir la note ci-dessus.	
FSCT050			

0	(FSC_050 en (3,6)) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire. Fixer la valeur à 1, si le répondant a répondu « affirmativement ». Voir la note ci-dessus.
1	(FSC_050 en (1, 2)) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire. Fixer la valeur à 1, si le répondant a répondu « affirmativement ». Voir la note ci-dessus.
FSCT060		
0	(FSC_060 en(3,6)) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire. Fixer la valeur à 1, si le répondant a répondu « affirmativement ». Voir la note ci-dessus.
1	(FSC_060 en (1, 2)) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire. Fixer la valeur à 1, si le répondant a répondu « affirmativement ». Voir la note ci-dessus.
FSCT070		
0	(FSC_070 en (3,6)) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire. Fixer la valeur à 1, si le répondant a répondu « affirmativement ». Voir la note ci-dessus.
1	(FSC_070 en (1,2)) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire. Fixer la valeur à 1, si le répondant a répondu « affirmativement ». Voir la note ci-dessus.
FSCT080		
0	(FSC_080 en (2,6)) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire. Fixer la valeur à 1, si le répondant a répondu « affirmativement ». Voir la note ci-dessus.
1	(FSC_080 = 1) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire. Fixer la valeur à 1, si le répondant a répondu « affirmativement ». Voir la note ci-dessus.
FSCT081		
0	(FSC_081 en (3,6)) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire. Fixer la valeur à 1, si le répondant a répondu « affirmativement ». Voir la note ci-dessus.
1	(FSC_081 en (1, 2)) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire. Fixer la valeur à 1, si le répondant a répondu « affirmativement ». Voir la note ci-dessus.
FSCT090		
0	(FSC_090 en (2,6)) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire. Fixer la valeur à 1, si le répondant a répondu « affirmativement ». Voir la note ci-dessus.
1	(FSC_090 = 1) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire. Fixer la valeur à 1, si le répondant a répondu « affirmativement ». Voir la note ci-dessus.
FSCT100		

0	(FSC_100 en (2,6)) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire. Fixer la valeur à 1, si le répondant a répondu « affirmativement ». Voir la note ci-dessus.
1	(FSC_100 = 1) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire. Fixer la valeur à 1, si le répondant a répondu « affirmativement ». Voir la note ci-dessus.
FSCT110		
0	(FSC_110 en (2,6)) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire. Fixer la valeur à 1, si le répondant a répondu « affirmativement ». Voir la note ci-dessus.
1	(FSC_110 = 1) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire. Fixer la valeur à 1, si le répondant a répondu « affirmativement ». Voir la note ci-dessus.
FSCT120		
0	(FSC_120 in (2,6)) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire. Fixer la valeur à 1, si le répondant a répondu « affirmativement ». Voir la note ci-dessus.
1	(FSC_120 = 1) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire. Fixer la valeur à 1, si le répondant a répondu « affirmativement ». Voir la note ci-dessus.
FSCT121		
0	(FSC_121 en (3,6)) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire. Fixer la valeur à 1, si le répondant a répondu « affirmativement ». Voir la note ci-dessus.
1	(FSC_121 en (1,2)) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire. Fixer la valeur à 1, si le répondant a répondu « affirmativement ». Voir la note ci-dessus.
FSCT130		
0	(FSC_130 en (2,6)) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire. Fixer la valeur à 1, si le répondant a répondu « affirmativement ». Voir la note ci-dessus.
1	(FSC_130 = 1) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire. Fixer la valeur à 1, si le répondant a répondu « affirmativement ». Voir la note ci-dessus.
FSCT140		
0	(FSC_140 en (2,6)) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire. Fixer la valeur à 1, si le répondant a répondu « affirmativement ». Voir la note ci-dessus.
1	(FSC_140 = 1) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire. Fixer la valeur à 1, si le répondant a répondu « affirmativement ». Voir la note ci-dessus.
FSCT141		

0	(FSC_141 en (3,6)) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire. Fixer la valeur à 1, si le répondant a répondu « affirmativement ». Voir la note ci-dessus.
1	(FSC_141 en (1,2)) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire. Fixer la valeur à 1, si le répondant a répondu « affirmativement ». Voir la note ci-dessus.
FSCT150		
0	(FSC_150 en (2,6)) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire. Fixer la valeur à 1, si le répondant a répondu « affirmativement ». Voir la note ci-dessus.
1	(FSC_150 = 1) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire. Fixer la valeur à 1, si le répondant a répondu « affirmativement ». Voir la note ci-dessus.
FSCT160		
0	(FSC_160 en (2,6)) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire. Fixer la valeur à 1, si le répondant a répondu « affirmativement ». Voir la note ci-dessus.
1	(FSC_160 = 0) et DOFSC = 1	Fixer la valeur à 0 si le répondant n'a pas répondu « affirmativement » aux questions sur la sécurité alimentaire. Fixer la valeur à 1, si le répondant a répondu « affirmativement ». Voir la note ci-dessus.

1) État de sécurité alimentaire du ménage - Version modifiée

Nom de la variable : FSCDHFS2

Basée sur : FSC_020, FSC_030, FSC_040, FSC_050, FSC_060, FSC_070, FSC_080, FSC_081, FSC_090, FSC_100, FSC_110, FSC_120, FSC_121, FSC_130, FSC_140, FSC_141, FSC_150, FSC_160

Description : Cette variable est fondée sur un ensemble de 18 questions et indique si les ménages avec ou sans enfants avaient les moyens d'acheter les aliments dont ils avaient besoin au cours des 12 mois qui ont précédé l'enquête. Elle reflète trois catégories de situation:

1 - Sécurité alimentaire: Aucun, ou un seul, signe d'un problème concernant l'accès à la nourriture lié au revenu.
2 - Insécurité alimentaire modérée : Signe de compromis en matière de qualité et (ou) de quantité d'aliments consommés.
3 - Insécurité alimentaire grave : Signe de consommation alimentaire réduite et d'habitudes alimentaires perturbées.

Cette variable s'inspire du modèle de Santé Canada concernant les niveaux de sécurité alimentaire.

Note : Lorsqu'on emploie les poids affectés à la personne (WTS_M), cette variable représente le nombre de personnes vivant dans des ménages comportant des insécurités alimentaires. Si l'on utilise les poids des ménages (WTS_MHH), cette variable représente le nombre de ménages comportant des insécurités alimentaires.

Les ménages avec enfants sont définis comme étant des ménages comptant des jeunes de 15 ans et moins (DHHDYKD=1) ou des jeunes de 16 ou 17 ans (DHHDOKD=1) et qui sont les enfants, petits enfants, gendres ou brus, nièces ou neveux d'un autre membre du ménage.

Afin de déterminer la situation de sécurité alimentaire du ménage, la réponse à chaque question est d'abord codée comme étant « affirmative » ou « négative ». Dans certains cas, le codage est évident, parce que les seules options de réponse sont « oui » ou « non ». Pour les questions pour lesquelles les catégories de réponse sont moins évidentes, la procédure de codage est la suivante : les catégories de réponse comme « Souvent vrai », « Parfois vrai », « Presque chaque mois », « Certains mois, mais pas tous les mois » sont codées comme étant « affirmatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 1). Les catégories de réponse telles « Jamais vrai », « Seulement 1 ou 2 mois » sont codées comme étant « négatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 0)

En 2009, on a corrigé une erreur relevée dans le modèle. Veuillez consulter le document Enquête sur la santé dans les

collectivités canadiennes – Errata pour obtenir de plus amples renseignements.

Site internet : http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/surveill/nutrition/commun/insecurit/status-situation-fra.php

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOFSC = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	(FSC_020 en (7,8,9)) ou (FSC_030 en (7,8,9)) ou (FSC_040 en (7,8,9)) ou (FSC_050 en (7,8,9)) ou (FSC_060 en (7,8,9)) ou (FSC_070 en (7,8,9)) ou (FSC_080 en (7,8,9)) ou (FSC_081 en (7,8,9)) ou (FSC_090 en (7,8,9)) ou (FSC_100 en (7,8,9)) ou (FSC_110 en (7,8,9)) ou (FSC_120 en (7,8,9)) ou (FSC_121 en (7,8,9)) ou (FSC_130 en (7,8,9)) ou (FSC_140 en (7,8,9)) ou (FSC_141 en (7,8,9)) ou (FSC_150 en (7,8,9)) ou (FSC_160 en (7,8,9)) ou PMKProxy = 2	Le répondant n'a pas répondu à au moins une des questions requises (ne sait pas, refus, non déclaré) ou la personne la mieux renseignée sur le ménage n'était pas disponible pour répondre aux questions pour les répondants âgés de 17 ans et moins.	ND
0	[DHHTDKS = 1 et (FSCASUM >= 0 et FSCASM <= 1) et (FSCCSUM >=0 et FSCCSUM <= 1)) ou (DHHTDKS = 0 et (FSCASUM >=0 et FSCASUM <= 1))	Alimentation non précaire	
1	[DHHTDKS = 1 et (FSCASUM >=2 et FSCASUM <= 5) et (FSCCSUM >= 2 et FSCCSUM <= 4)) et (DHHTDKS = 1 et (((FSCASUM >= 2 et FSCASUM <= 5) et (FSCCSUM <= 4)) et ((FSCASUM <= 5) et (FSCCSUM >= 2 et FSCCSUM <= 4)))) et (DHHTDKS = 0 et (FSCASUM >= 2 et FSCASUM <= 5))	Alimentation modérément précaire	
2	(DHHTDKS = 1 et ((FSCASUM >=6 et FSCASUM <= 10) ou (FSCCSUM >= 5 et FSCCSUM <= 8))) ou (DHHTDKS = 0 et (FSCASUM >=6 et FSCASUM <= 10))	Alimentation sévèrement précaire	

Référence :Le modèle de la variable « FSCDHFS2 » s'inspire du modèle de Santé Canada concernant les niveaux de sécurité alimentaire, publié par Santé Canada en 2007. Pour en savoir plus au sujet de ce modèle, on consultera le Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition, Santé Canada, "Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Sécurité alimentaire liée au revenu dans les ménages canadiens".

2) Sécurité alimentaire - État des adultes

Nom de la variable : FSCDAFS2

Basée sur : FSC_020, FSC_030, FSC_040, FSC_080, FSC_081, FSC_090, FSC_100, FSC_110, FSC_120, FSC_121

Description : Cette variable est fondée sur une série de dix questions ayant trait aux adultes et décrit la situation relative à la sécurité alimentaire des adultes du ménage. Elle comprend trois types de situations :

1 - Sécurité alimentaire: Aucun, ou un seul, signe d'un problème concernant l'accès à la nourriture lié au revenu.
2 - Insécurité alimentaire modérée : Signe de compromis en matière de qualité et (ou) de quantité d'aliments consommés (2 à 5 responses affirmatif).
3 - Insécurité alimentaire grave : Signe de consommation alimentaire réduite et d'habitudes alimentaires perturbées (>= 6 responses affirmatif).

Adaptée du modèle développé par Santé Canada.

Note : Cette variable ne reflète pas nécessairement l'expérience de tous les adultes du ménage. Lorsqu'on emploie les poids affectés à la personne (WTS_M), cette variable représente le nombre de personnes vivant dans des ménages comportant des adultes aux prises avec des insécurités alimentaires. Si l'on utilise les poids des ménages (WTS_MHH), cette variable représente le nombre de ménages comportant des adultes aux prises avec des insécurités alimentaires.

Afin de déterminer la situation de sécurité alimentaire du ménage, la réponse à chaque question est d'abord codée comme étant « affirmative » ou « négative ». Dans certains cas, le codage est évident, parce que les seules options de réponse sont « oui » ou « non ». Pour les questions pour lesquelles les catégories de réponse sont moins évidentes, la procédure de codage est la suivante : les catégories de réponse comme « Souvent vrai », « Parfois vrai », « Presque chaque mois », « Certains mois, mais pas tous les mois » sont codées comme étant « affirmatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 1). Les catégories de réponse telles « Jamais vrai », « Seulement 1 ou 2 mois » sont codées comme étant « négatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 0)

Cette variable dérivée a été ajoutée en 2010.

Site internet : http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/surveill/nutrition/commun/insecurit/status-situation-fra.php

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOFSC = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	FSC_020 en (7,98,99) ou FSC_030 en (7,8,9) ou FSC_040 en (7,8,9) ou FSC_080 en (7,8,9) ou FSC_081 en (7,8,9) ou FSC_090 en (7,8,9) ou FSC_100 en (7,8,9) ou FSC_110 en (7,8,9) ou FSC_120 en (7,8,9) ou FSC_121 en (7,8,9) ou PMKPROXY = 2	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire ou la personne la mieux renseignée sur le ménage n'était pas disponible pour répondre aux questions pour les répondants âgés de 17 ans et moins.	ND
0	(FSCASUM >= 0 et FSCASUM <= 1)	Alimentation non précaire	
1	(FSCASUM >= 2 et FSCASUM <= 5)	Alimentation modérément précaire	
2	(FSCASUM >= 6 et FSCASUM <= 10)	Alimentation sévèrement précaire	

Référence :Le modèle de la variable « FSCDAFS2» s'inspire du modèle de Santé Canada concernant les niveaux de sécurité alimentaire, publié par Santé Canada en 2007. Pour en savoir plus au sujet de ce modèle, on consultera le Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition, Santé Canada, "Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Sécurité alimentaire liée au revenu dans les ménages canadiens".

3) Sécurité alimentaire - État des enfants

Nom de la variable : FSCDCFS2

Basée sur : FSC_050, FSC_060, FSC_070, FSC_130, FSC_140, FSC_141, FSC_150, FSC_160

Description : Cette variable est fondée sur une série de huit questions ayant trait aux enfants et décrit la situation relative à la sécurité alimentaire des enfants (âgée de moins de 18 ans) du ménage au cours des 12 derniers mois. Elle comprend trois types de situations :

1 - Sécurité alimentaire: Aucun, ou un seul, signe d'un problème concernant l'accès à la nourriture lié au revenu.
2 - Insécurité alimentaire modérée : Signe de compromis en matière de qualité et (ou) de quantité d'aliments consommés. (2 à 4 responses affirmatif)
3 - Insécurité alimentaire grave : Signe de consommation alimentaire réduite et d'habitudes alimentaires perturbées. (>= 5 responses affirmatif)

Adaptée du modèle développé par Santé Canada en 2007.

Note : Cette variable est définie uniquement pour les ménages comportant des membres de 15 ans et moins (DHHDYKD=1), ou âgés de 16 à 17 (DHHDOKD=1) et qui sont l'enfant, le petit enfant, l'enfant par alliance, la nièce ou le neveu d'un autre membre du ménage. La variable ne reflète pas nécessairement la situation de tous les enfants du ménage. Lorsqu'on emploie les poids affectés à la personne (WTS_M), cette variable représente le nombre de personnes vivant dans des ménages comportant des enfants aux prises avec des insécurités alimentaires. Si l'on utilise les poids des ménages (WTS_MHH), cette variable représente le nombre de ménages comportant des enfants aux prises avec des insécurités alimentaires.

Afin de déterminer la situation de sécurité alimentaire du ménage, la réponse à chaque question est d'abord codée comme étant « affirmative » ou « négative ». Dans certains cas, le codage est évident, parce que les seules options de réponse sont « oui » ou « non ». Pour les questions pour lesquelles les catégories de réponse sont moins évidentes, la procédure de codage est la suivante : les catégories de réponse comme « Souvent vrai », « Parfois vrai », « Presque chaque mois », « Certains mois, mais pas tous les mois » sont codées comme étant « affirmatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 1). Les catégories de réponse telles « Jamais vrai », « Seulement 1 ou 2 mois » sont codées comme étant « négatives » (c. à d. qu'on leur donne le code de 0)

Cette variable dérivée a été ajoutée en 2010.

Site internet : http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/surveill/nutrition/commun/insecurit/status-situation-fra.php

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DHHTDKS = 0	Population exclue (les ménages sans enfants de moins de 18 ans)	SO
6	DOFSC = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	(FSC_050 en (7,8,9)) ou (FSC_060 en (7,8,9)) ou (FSC_070 en (7,8,9)) ou (FSC_130 en (7,8,9)) ou (FSC_140 en (7,8,9)) ou (FSC_141 en (7,8,9)) ou (FSC_150 en (7,8,9)) ou (FSC_160 en (7,8,9)) ou PMKPROXY = 2	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire ou la personne la mieux renseignée sur le ménage n'était pas disponible pour répondre aux questions pour les répondants âgés de 17 ans et moins.	ND
0	DHHTDKS = 1 et (FSCCSUM >= 0 et FSCCSUM <= 1)	Alimentation non précaire	
1	DHHTDKS = 1 et (FSCCSUM >= 2 et FSCCSUM <= 4)	Alimentation modérément précaire	
2	DHHTDKS = 1 et (FSCCSUM >= 5 et FSCCSUM <= 8)	Alimentation sévèrement précaire	

Référence :Le modèle de la variable « FSCDCFS2» s'inspire du modèle de Santé Canada concernant les niveaux de sécurité alimentaire, publié par Santé Canada en 2007. Pour en savoir plus au sujet de ce modèle, on consultera le Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition, Santé Canada, "Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Sécurité alimentaire liée au revenu dans les ménages canadiens".

Consommation de fruits et légumes (8 VD)

1) Consommation quotidienne - jus de fruit

Nom de la variable : FVCDJUI

Basée sur : FVC_1A, FVC_1B, FVC_1C, FVC_1D, FVC_1E

Description : Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant boit du jus de fruit.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999,9	ADM_PRX = 1	Les questions ne sont pas posées - entrevue par procuration	ND
999,9	(FVC_1A = NSP, R, ND) ou (FVC_1B = NSP, R, ND) ou (FVC_1C = NSP, R, ND) ou (FVC_1D = NSP, R, ND) ou (FVC_1E = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
FVC_1B	FVC_1A = 1	Nombre de fois/jour	
FVC_1C / 7	FVC_1A = 2	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine)	(arrondi à une décimale près)
FVC_1D / 30	FVC_1A = 3	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois)	(arrondi à une décimale près)
FVC_1E / 365	FVC_1A = 4	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/année)	(arrondi à une décimale près)
0	FVC_1A = 5	Le répondant ne boit pas de jus de fruit	

2) Consommation quotidienne - fruits

Nom de la variable : FVCDFRU

Basée sur : FVC_2A, FVC_2B, FVC_2C, FVC_2D, FVC_2E

Description : Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant a consommé des fruits, à l'exclusion des jus de fruit.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999,9	ADM_PRX = 1	Les questions ne sont pas posées - entrevue par procuration	ND
999,9	(FVC_2A = NSP, R, ND) ou (FVC_2B = NSP, R, ND) ou (FVC_2C = NSP, R, ND) ou (FVC_2D = NSP, R, ND) ou (FVC_2E = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
FVC_2B	FVC_2A = 1	Nombre de fois/jour	
FVC_2C / 7	FVC_2A = 2	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine)	(arrondi à la décimale près)

FVC_2D / 30	FVC_2A = 3	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois)	(arrondi à la décimale près)
FVC_2E / 365	FVC_2A = 4	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/année)	(arrondi à la décimale près)
0	FVC_2A = 5	Le répondant ne mange pas de fruits	

3) Consommation quotidienne - salade verte

Nom de la variable : FVCDSAL

Basée sur : FVC_3A, FVC_3B, FVC_3C, FVC_3D, FVC_3E

Description : Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant mange de la salade verte.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999,9	ADM_PRX = 1	Les questions ne sont pas posées - entrevue par procuration	ND
999,9	(FVC_3A = NSP, R, ND) ou (FVC_3B = NSP, R, ND) ou (FVC_3C = NSP, R, ND) ou (FVC_3D = NSP, R, ND) ou (FVC_3E = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
FVC_3B	FVC_3A = 1	Nombre de fois/jour	
FVC_3C / 7	FVC_3A = 2	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine)	(arrondi à la décimale près)
FVC_3D / 30	FVC_3A = 3	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois)	(arrondi à la décimale près)
FVC_3E / 365	FVC_3A = 4	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/année)	(arrondi à la décimale près)
0	FVC_3A = 5	Le répondant ne mange pas de salade verte	

4) Consommation quotidienne - pommes de terre

Nom de la variable : FVCDPOT

Basée sur : FVC_4A, FVC_4B, FVC_4C, FVC_4D, FVC_4E

Description : Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant mange des pommes de terre, à l'exclusion des frites, des pommes de terre rissolées ou des croustilles.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999,9	ADM_PRX = 1	Les questions ne sont pas posées - entrevue par procuration	ND

999,9	(FVC_4A = NSP, R, ND) ou (FVC_4B = NSP, R, ND) ou (FVC_4C = NSP, R, ND) ou (FVC_4D = NSP, R, ND) ou (FVC_4E = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul	ND
FVC_4B	FVC_4A = 1	Nombre de fois/jour	
FVC_4C / 7	FVC_4A = 2	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine)	(arrondi à la décimale près)
FVC_4D / 30	FVC_4A = 3	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois)	(arrondi à la décimale près)
FVC_4E / 365	FVC_4A = 4	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/année)	(arrondi à la décimale près)
0	FVC_4A = 5	Le répondant ne mange pas de pommes de terre	

5) Consommation quotidienne - carottes

Nom de la variable : FVCDCAR

Basée sur : FVC_5A, FVC_5B, FVC_5C, FVC_5D, FVC_5E

Description : Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant mange des carottes.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999,9	ADM_PRX = 1	Les questions ne sont pas posées - entrevue par procuration	ND
999,9	(FVC_5A = NSP, R, ND) ou (FVC_5B = NSP, R, ND) ou (FVC_5C = NSP, R, ND) ou (FVC_5D = NSP, R, ND) ou (FVC_5E = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
FVC_5B	FVC_5A = 1	Nombre de fois/jour	
FVC_5C / 7	FVC_5A = 2	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine)	(arrondi à la décimale près)
FVC_5D / 30	FVC_5A = 3	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois)	(arrondi à la décimale près)
FVC_5E / 365	FVC_5A = 4	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/année)	(arrondi à la décimale près)
0	FVC_5A = 5	Le répondant ne mange pas de carottes	

6) Consommation quotidienne - autres légumes

Nom de la variable : FVCDVEG

Basée sur : FVC_6A, FVC_6B, FVC_6C, FVC_6D, FVC_6E

Description : Cette variable indique le nombre de fois par jour que le répondant mange d'autres légumes, à l'exception des carottes, des pommes de terre ou de la salade. On demande aux répondants de déclarer les «portions» plutôt que les «nombres de fois» afin de dénombrer tous les différents légumes consommés lors d'un repas. Les portions ne font pas allusion à des quantités spécifiques.

Note : Dans cette question, l'ESCC mesure le nombre de portions, pas la quantité consommée.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
999,9	ADM_PRX = 1	Les questions ne sont pas posées - entrevue par procuration	ND
999,9	(FVC_6A = NSP, R, ND) ou (FVC_6B = NSP, R, ND) ou (FVC_6C = NSP, R, ND) ou (FVC_6D = NSP, R, ND) ou (FVC_6E = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
FVC_6B	FVC_6A = 1	Nombre de fois/jour	
FVC_6C / 7	FVC_6A = 2	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/semaine)	(arrondi à la décimale près)
FVC_6D / 30	FVC_6A = 3	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/mois)	(arrondi à la décimale près)
FVC_6E / 365	FVC_6A = 4	Nombre de fois/jour (le répondant a répondu en nombre de fois/année)	(arrondi à la décimale près)
0	FVC_6A = 5	Le répondant ne mange pas d'autres légumes	

7) Consommation quotidienne totale - fruits et légumes

Nom de la variable : FVCDTOT

Basée sur : FVCDJUI, FVCDFRU, FVCDSAL, FVCDPOT, FVCDCAR, FVCDVEG

Description : Cette variable indique le nombre total de fois par jour que le répondant mange des fruits et des légumes.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
999,9	ADM_PRX = 1	Les questions ne sont pas posées - entrevue par procuration	ND
999,9	FVCDJUI = ND ou FVCDFRU = ND ou FVCDSAL = ND ou FVCDPOT = ND ou FVCDCAR = ND ou FVCDVEG = ND	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
FVCDJUI + FVCDFRU + FVCDSAL + FVCDPOT + FVCDCAR + FVCDVEG	(0 <= FVCDJUI <= 20) et (0 <= FVCDFRU <= 20) et (0 <= FVCDSAL <= 20) et (0 <= FVCDPOT <= 20) et (0 <= FVCDCAR <= 20) et (0 <= FVCDVEG <= 20)	Nombre total de fois que le répondant mange des fruits et des légumes	(min : 0.0; max : 120.0)

8) Groupement de la consommation quotidienne totale - fruits et légumes

Nom de la variable : FVCGTOT

Basée sur : FVCDTOT

Description : Cette variable classe le répondant en fonction de sa consommation quotidienne totale de fruits et légumes.

Note : L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
9	ADM_PRX = 1	Questions ne sont pas posées - entrevue par procuration	ND
9	FVCDTOT = ND	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
1	FVCDTOT < 5	Mange des fruits et légumes moins de 5 fois/jour	
2	(5 <= FVCDTOT <= 10)	Mange des fruits et légumes de 5 à 10 fois/jour	
3	FVCDTOT > 10	Mange des fruits et légumes plus de 10 fois/jour	

État de santé général (3 VD)

1) Santé perçue

Nom de la variable : GENDHDI

Basée sur : GEN_01

Description : Cette variable décrit l'état général de santé du répondant d'après sa propre perception, ou dans le cas d'un interview par procuration, la perception de la personne qui répond. Une cote élevée indique une perception positive de l'état de santé.

Note : Avant 2007, cette variable était appelée autoévaluation de la santé.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9	(GEN_01 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	GEN_01 = 5	Mauvaise	
1	GEN_01 = 4	Passable	
2	GEN_01 = 3	Bonne	
3	GEN_01 = 2	Très bonne	
4	GEN_01 = 1	Excellente	

2) Santé mentale perçue

Nom de la variable : GENDMHI

Basée sur : GEN_02B

Description : Cette variable décrit l'état général de santé mentale du répondant d'après sa propre perception. Une cote élevée indique une perception positive de l'état de santé mentale.

Note : Avant 2007, cette variable était appelée autoévaluation de la santé mentale.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9	ADM_PRX = 1	Les questions ne sont pas posées - entrevue par procuration	ND
9	(GEN_02B = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	GEN_02B = 5	Mauvaise	
1	GEN_02B = 4	Passable	
2	GEN_02B = 3	Bonne	
3	GEN_02B = 2	Très bonne	
4	GEN_02B = 1	Excellente	

3) Satisfaction à l'égard de la vie en général

Nom de la variable : GENGSWL

Basée sur : GEN_02A2

Description : La variable répartit l'échelle de 11 points utilisée dans GEN_02A2 pour évaluer la satisfaction du répondant à l'égard de la vie en 5 catégories. Ces dernières ont été utilisées pour GEN_02A avant 2009.

Note : Cette variable permet de comparer les données provenant de la question GEN_02A2, ajoutée en 2009, à la question GEN_02A. Les utilisateurs ne doivent pas oublier que bien qu'une bonne correspondance ait été établie, la question GEN_02A était basée sur une réponse de 5 points alors que la question GEN_02A2 comprend une échelle de 11 points.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9	ADM_PRX = 1	La question n'a pas été posée-	ND
9	GEN_02A2 en (97,98,99)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
1	(GEN_02A2 >= 9 et GEN_02A2 <= 10)	Très satisfait	
2	(GEN_02A2 >= 6 et GEN_02A2 <= 8)	Satisfait	
3	GEN_02A2 = 5	Ni satisfait ni insatisfait	
4	(GEN_02A2 >= 2 et GEN_02A2 <= 4)	Insatisfait	
5	(GEN_02A2 >= 0 et GEN_02A2 <= 1)	Très insatisfait	

Variables géographiques (16 VD)

La dérivation des variables géographiques s'est faite à partir du Fichier de conversion des codes postaux (FCCP). La totalité des variables géographiques sont fondées sur les éléments géographiques du Recensement de 2011 à l'exception de GEODDA06 and GEODPG11, qui utilise la géographie du recensement de 2006.

1) Région métropolitaine du Recensement de 2011 (RMR).

Nom de la variable : GEODCMAA

Basée sur : GEODPC

Description : Le concept général de la région métropolitaine de recensement (RMR) s'applique à un grand centre de population ainsi qu'aux régions urbaines et rurales adjacentes dont le degré d'intégration économique et sociale avec ce centre de population est très élevé. Une RMR est délimitée à partir d'un centre de population (désignée comme noyau urbanisé et comptant une population d'au moins 100 000 habitants d'après les résultats du dernier recensement). Il y a 33 RMR selon la définition du Recensement de 2011. Lorsque le code postal n'est pas une RMR, cette variable est égale à 000.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
000		Aucune RMR attribuée	
001		St. John's	
205		Halifax	
305		Moncton	
310		Saint John	
408		Saguenay	
421		Québec	
433		Sherbrooke	
442		Trois-Rivières	
462		Montréal	
505		Ottawa - Gatineau	
521		Kingston	
529		Peterborough	
532		Oshawa	
535		Toronto	
537		Hamilton	
539		St. Catharines - Niagara	
541		Kitchener	
543		Brantford	
550		Guelph	
555		London	
559		Windsor	
568		Barrie	
580		Greater Sudbury / Grand Sudbury	
595		Thunder Bay	
602		Winnipeg	
705		Regina	

725	Saskatoon
825	Calgary
835	Edmonton
915	Kelowna
932	Abbotsford
933	Vancouver
935	Victoria

2) Aire de diffusion du Recensement de 2011 (AD).

Nom de la variable : GEODDA11

Basée sur : GEODPC

Description : On entend par aire de diffusion (AD) une petite unité géographique relativement stable formée d'un ou de plusieurs îlots de diffusion avoisinants.
Il s'agit de la plus petite région géographique normalisée pour laquelle toutes les données du recensement sont diffusées. Les AD couvrent tout le territoire du Canada. La variable GEODDA11 est fondée sur le Fichier de conversion des codes postaux (FCCP), qui procure une correspondance entre les codes postaux et les régions géographiques normalisées de Statistique Canada pour lesquelles les données du recensement et autres statistiques sont produites. Elle est composée du code postal province/territoire à deux chiffres, le code des divisions de recensement à deux chiffres et le code de l'aire de diffusion à quatre chiffres. Quand les codes postaux correspondent à plus d'une AD, on assigne un code utilisant la méthode de la « meilleure AD unique ». La variable GEODDA11 est fondée sur les éléments géographiques du Recensement de 2011.

Note : Le dossier définitif des aires de diffusion comporte deux variables : la première est fondée sur les éléments géographiques du Recensement de 2011 (GEODDA11) et la seconde, sur ceux du Recensement de 2006 (GEODDA06).

3) Code postal

Nom de la variable : GEODPC

Basée sur : Les renseignements sur l'adresse du répondant.

Description : Le code postal au Canada est un système de référence unique offrant un moyen d'identifier le lieu pour la distribution du courrier. Ce système est composé de six caractères alphanumériques disposés selon la forme ANA NAN, où « A » représente une lettre de l'alphabet et « N », un chiffre. Le premier caractère d'un code postal (attribué en ordre alphabétique d'est en ouest, d'une côte à l'autre du Canada) représente une province ou un territoire, ou un secteur important situé entièrement dans une province. La variable GEODPC est calculée d'après les renseignements disponibles sur l'adresse du répondant.

4) Région sociosanitaire

Nom de la variable : GEODHR4

Basée sur : GEODPC

Description : Cette variable, un numéro à quatre chiffres, précise la région sociosanitaire. La région sociosanitaire désigne une unité administrative définie par les ministères provinciaux de la santé. Pour qu'on puisse obtenir la couverture complète du Canada, chacun des territoires du Nord constitue aussi une région sociosanitaire. Cette variable est dérivée à partir de l'information disponible sur la base de sondage au moment de l'échantillonnage, ainsi que des renseignements

géographiques fournis par le répondant. Depuis 2013, les régions sociosanitaires sont fondée sur la géographi du Recensement du 2011.

Note : Pour plus de détails sur les régions sociosanitaires, on peut consulter la section « Groupes de régions sociosanitaires homologues » de la publication en ligne « Indicateurs de la santé ». On peut aussi obtenir les fichiers de correspondance (qui permettent de faire le lien entre les régions sociosanitaires et les codes géographiques du recensement les plus récents) et les fichiers numériques des limites dans la publication en ligne « Régions sociosanitaires : limites et correspondance avec la géographie du recensement », Statistique Canada, no 82 402 XWF au catalogue.

5) District Health Authority (DHA) de la Nouvelle-Écosse

Nom de la variable : GEODDHA

Basée sur : GEODPC

Description : Cette variable est un nombre à 4 chiffres servant à identifier les 9 District Health Authorities (DHA) de la province de la Nouvelle-
Écosse. Elle est égale à 9996 (sans objet) partout ailleurs. Cette variable est dérivée en utilisant les renseignements disponibles sur la base de sondage au moment de l'échantillonnage et les renseignements géographiques fournis par le répondant. Depuis 2013, les DHA sont fondées sur la géographie du Recensement de 2011.

6) Health Authority - Colombie-Britannique

Nom de la variable : GEODBCHA

Basée sur : GEODPC

Description : Cette variable est un nombre à 4 chiffres servant à identifier les 5 Health Authorities de la province de la Colombie-Britannique. Elle est égale à 9996 (sans objet) partout ailleurs. Cette variable est dérivée en utilisant les renseignements disponibles sur provenant de la base de sondage au moment de l'échantillonnage et les renseignements géographiques fournis par le répondant. Depuis À partir de 2013, cette variable est fondée sur la géographie du Recensement de 2011.

7) Réseau local d'intégration des services de santé de l'Ontario

Nom de la variable : GEODLHN

Basée sur : GEO_PRV, GEODPC

Description : Cette variable est un nombre à quatre chiffres servant à identifier les régions de santé infra-provinciales de l'Ontario. Elle est égale à 9996 partout à l'extérieur de l'Ontario. Les données de l'Ontario sont fournies pour deux niveaux géographiques : Unités de santé publique (USP) et les réseaux locaux d'intégration des services de santé (RLISS). Depuis 2013, les RLISS sont fondée sur la géographie du Recensement du 2011.

8) Aire de diffusion du Recensement de 2006 (AD)

Nom de la variable : GEODDA06

Basée sur : GEODPC

Description : On entend par aire de diffusion (AD) une petite unité géographique relativement stable formée d'un ou de plusieurs îlots de diffusion avoisinants. Il s'agit de la plus petite région géographique normalisée pour laquelle toutes les données du recensement sont diffusées. Les AD couvrent tout le territoire du Canada. La variable GEODDA06 est fondée sur le Fichier de conversion des codes postaux (FCCP), qui procure une correspondance entre les codes postaux et les régions géographiques normalisées de Statistique Canada pour lesquelles les données du recensement et autres statistiques sont produites. Elle est composée du code postal province/territoire à deux chiffres, le code des divisions de recensement à deux chiffres et le code de l'aire de diffusion à quatre chiffres. Quand les codes postaux correspondent à plus d'une AD, on assigne un code utilisant la méthode de la « meilleure AD unique ». La variable GEODDA06 est fondée sur les éléments géographiques du Recensement de 2006.

Note : Le dossier définitif des aires de diffusion comporte deux variables : la première est fondée sur les éléments géographiques du Recensement de 2011 (GEODDA11) et la seconde, sur ceux du Recensement de 2006 (GEODDA06).

9) Circonscriptions électorales fédérales du Recensement de 2011 (CÉF)

Nom de la variable : GEODFED

Basée sur : GEODDA11

Description : On entend par une circonscription électorale fédérale tout endroit ou toute zone territoriale étant admissible d'élire un député à la Chambre des communes (Source : Loi électorale du Canada, 1990). Parmi les 308 CÉF au Canada, on s'est fondé sur l'Ordonnance de représentation de 2003 pour le Recensement de 2011. Les deux premiers chiffres représentent la province ou le territoire.

10) Subdivision du Recensement de 2011 (SDR)

Nom de la variable : GEODCSD

Basée sur : GEODDA11

Description : Subdivision de recensement est un terme générique qui désigne les municipalités (telles que définies par la loi provinciale) ou leurs équivalents, par exemple les réserves indiennes, les établissements indiens et les territoires non organisés. À Terre Neuve-et-Labrador, en Nouvelle Écosse et en Colombie-Britannique, ce terme désigne également les régions géographiques qui ont été créées par Statistique Canada en collaboration avec les provinces comme équivalents des municipalités. La variable GEODCSD est fondée sur les éléments géographiques du Recensement de 2011.

11) Division du Recensement de 2011 (DR)

Nom de la variable : GEODCD

Basée sur : GEODDA11

Description : La division de recensement renvoie à des unités géographiques établies par la loi provinciale, qui constituent des unités géographiques intermédiaires entre la subdivision de recensement et la province (p. ex., divisions, comtés, districts régionaux, municipalités régionales et sept autres types de régions géographiques formées de groupes de subdivisions de recensement). À Terre-Neuve-et-Labrador, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, la loi provinciale ne prévoit pas ces régions géographiques administratives. Par conséquent, Statistique Canada a établi les divisions de recensement en collaboration avec ces provinces. La variable GEODCD est fondée sur les éléments géographiques du Recensement de 2011.

12) Type de classification des secteurs statistiques (CSS)

Nom de la variable : GEODSAT

Basée sur : GEODCSD

Description : La classification des secteurs statistiques (CSS) regroupe les subdivisions de recensement (SR) selon qu'elles font partie d'une région métropolitaine de recensement (RMR), d'une agglomération de recensement (AR), d'une zone d'influence des régions métropolitaines de recensement et des agglomérations de recensement (ZIM forte, ZIM modérée, ZIM faible ou ZIM sans influence) ou des territoires (Territoires du Nord-Ouest, Yukon et Nunavut). Un code CSS est attribué à chaque SR. La CSS est utilisée pour la diffusion des données.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1		RMR	
2		AR (subdivisées)	
3		AR (non subdivisées))	
4		Fortement influencée (zone)	
5		Moyennement influencée (zone)	
6		Faiblement influencée (zone)	
7		Non influencée (zone)	
8		Territoires	

13) Groupes de régions sociosanitaires homologues

Nom de la variable : GEODPG11

Basée sur : GEODHR4

Description : Les régions sociosanitaires ont été regroupées en 10 grappes ou « groupes de régions homologues » pour qu'on puisse comparer de façon significative les régions semblables au pays.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1	GEODHR4= 1100, 1269, 2403, 2405, 2407, 2413, 2414, 2415, 2416, 3527, 3531, 3534, 3535, 3537, 3538, 3541, 3542, 3543, 3544, 3546, 3552, 3555, 3558, 3568, 4601, 4615, 4704, 4706, 4831, 5913, 5914, 5921, 5941, 5942, 5943	Groupe A de régions sociosanitaires homologues: Mélange de zones urbaines et rurales d'un océan à l'autre Proportion moyenne d'Autochtones Proportion moyenne d'immigrants	
2	GEODHR4= 3530, 3536, 3551, 3560, 3565, 3566, 4832, 4834	Groupe B de régions sociosanitaires homologues: Principalement des centres urbains à densité de population moyennement forte en Ontario et Alberta Faible proportion d'Autochtones Taux d'emploi très élevé Proportion plus élevée que la moyenne d'immigrants	

3	GEODHR4= 1011, 1210, 1223, 1230, 1240, 1301, 1302, 1303, 1304, 2401, 2402, 2404, 2408, 3526, 3540, 3547, 3556, 3561, 3562, 3563	Groupe C de régions sociosanitaires homologues: Mélange de zones urbaines et rurales peu peuplées dans les provinces de l'Est et le centre du Canada Proportion moyenne d'Autochtones Taux d'emploi moyen Faible proportion d'immigrants
4	GEODHR4= 2412, 3533, 3539, 3554, 3557 4602, 4605, 4640, 4645, 4701, 4702, 4703, 4705, 4707, 4708, 5911, 5912	Groupe D de régions sociosanitaires homologues: Principalement des régions rurales, du Québec à la Colombie-Britannique Proportion moyenne d'Autochtones Taux d'emploi élevé
5	GEODHR4= 4603, 4833, 4835, 5953, 6001, 6101	Groupe E de régions sociosanitaires homologues: Principalement des régions rurales et éloignées des provinces de l'Ouest et des Territoires Très forte proportion d'Autochtones Proportion moyenne d'immigrants
6	GEODHR4= 2417, 2418, 4604, 4714, 6201	Groupe F de régions sociosanitaires homologues: Régions du Nord et régions éloignées Très forte proportion d'Autochtones Taux d'emploi très faible Faible proportion d'immigrants
7	GEODHR4= 2406, 3595, 5932	Groupe G de régions sociosanitaires homologues: Plus grands centres urbains, avec une densité de population moyenne de 4065 habitants par kilomètre carré Très faible proportion d'Autochtones Taux d'emploi moyen Proportion très élevée d'immigrants
8	GEODHR4= 1014, 2409, 2410, 3549, 4709, 4710, 5951, 5952	Groupe H de régions sociosanitaires homologues: Zones rurales des régions du nord d'un océan à l'autre Forte proportion d'Autochtones Faible proportion d'immigrants
9	GEODHR4= 1012, 1013, 1258, 1305, 1306, 1307, 2411	Groupe I de régions sociosanitaires homologues: Principalement des régions rurales de l'Est Proportion moyenne d'Autochtones Taux d'emploi faible Proportion très faible d'immigrants
10	GEODHR4= 3553, 3570, 5922, 5923, 5931, 5933	Groupe J de régions sociosanitaires homologues: Principalement des centres urbains en Ontario et en Colombie-Britannique à forte densité de population Faible proportion d'Autochtones Forte proportion d'immigrants

Référence :Référence : Une étude plus détaillée de la raison d'être et des méthodes utilisées pour le développement des groupes de régions homologues est disponible dans les publications suivantes : Régions socio-sanitaires (2007) Groupes de régions homologues - document de recherche (PDF) et Régions socio-sanitaires (2003) Groupes de régions homologues - document de recherche (PDF). Celles-ci sont accessibles à la section « Régions socio-sanitaires » de la publication en ligne intitulée « Indicateurs de la santé », 82-221-XIF au catalogue de Statistique Canada.

14) Classification centre de population - rurale

Nom de la variable : GEODUR

Basée sur : GEODPC

Description : Cette variable précise si le répondant habite un centre de population ou région rurale. Les centres de population représentent les zones bâties en continu ayant une concentration démographique d'au moins 1 000 habitants et une densité de population d'au moins 400 habitants au kilomètre carré, d'après les chiffres de population du recensement actuel.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
0		Rurale	

1	Noyau
2	Banlieue
4	Centre de population hors RMR/AR
6	Noyau secondaire
9	Combinaison de centre de population/rurales

15) Classification centre de populaton - rurale - regroupée

Nom de la variable : GEODUR2

Basée sur : GEODUR

Description : Cette variable est un regroupement de GEODUR en deux catégories. Les unités où la variable GEODUR avait une valeur de 9 ont été classées comme rurales ou urbaines selon la composition des îlots au sein de l'aire de diffusion.

Note : La variable GEODUR2 reste une variable dichotomique (centre de population ou rurale) et est toujours fondée sur GEODUR. Les unités où la variable GEODUR avait une valeur de 9 ont été classées comme rurales ou urbaines selon la composition des îlots de diffusion avoisinants au sein de l'aire de diffusion.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1	GEODUR= 1,2,4 ou 6 et parfois 9	Centre de population	
2	GEODUR= 0 et parfois 9	Rurale	

16) Sous-zones - Alberta

Nom de la variable : GEODSUBZ

Basée sur : GEODPC

Description : Cette variable est un nombre à six chiffres identifiant qui permet d'identifier les sous-zones en Alberta. Cette variables nombre est égale à 999996 (n'ayant pas lieu de figurer) partout ailleurs. Cette variable est dérivée en utilisant le fichier numérique des limites fournis par Alberta et des renseignement lorsque l'information géographiques est fournies par le répondant.

Services de soins de santé à domicile (1 VD)

1) Soins de santé à domicile reçus

Nom de la variable : HMCFRHC

Basée sur : HMC_09, HMC_11

Description : Cette variable indique si le répondant a reçu des soins de santé à domicile dans les derniers 12 mois sous quelque forme que ce soit (que le service soit couvert ou non par un gouvernement).

Note : Les répondants de moins de 18 ans sont exclus de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOHMC = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	DHH_AGE < 18	Population exclue	SO
2	HMC_09 = 2 et HMC_11 = 2	N'a pas reçu de soins de santé à domicile dans les derniers 12 mois	
1	HMC_09 = 1 ou HMC_11 = 1	A reçu des soins de santé à domicile dans les derniers 12 mois	
9	(HMC_09 = NSP, R, ND) ou (HMC_11 = NSP, R, ND)	Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND

Indice de l'état de santé (8 VD)

L'indice de l'état de santé (HUI pour Health Utilities Index) est un système de classification de l'état de santé fondé sur plusieurs attributs qui a été créé pour mesurer l'état de santé générique et la qualité de vie liée à l'état de santé. La version utilisée dans l'ESCC a été adaptée du HUI Mark 3 (HUI3) pour l'ENSP. Les questions sont légèrement différentes du HUI3 original élaboré à l'Université McMaster. L'instrument permet de calculer un indice générique de l'état de santé basé sur les attributs qui figurent dans deux modules distincts de l'ESCC, intitulés Indice de l'état de santé (HUI) et Douleurs et malaises (HUP). Pour plus de renseignements, consulter « Feeny D, Furlong W, Torrance GW et coll. Multi-attribute and single-attribute utility functions for the Health Utilities Index Mark 3 system. Med Care 2002; 40: 113-128 ».

1) Attribut Vision

Nom de la variable : HUIDVIS

Basée sur : HUI_01, HUI_02, HUI_03, HUI_04, HUI_05

Description : L'état de santé relatif à la vue correspond aux facultés visuelles, établies en fonction de la capacité d'une personne à accomplir certaines tâches visuelles, comme lire les caractères ordinaires d'un journal ou reconnaître une connaissance qui se trouve de l'autre côté de la rue. L'utilisation de lentilles correctrices, comme des lunettes ou des verres de contact, est prise en compte dans ce concept de capacité/incapacité.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DOHUI = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
1	HUI_01 = 1 et HUI_02 = SO et HUI_03 = SO et HUI_04 = 1 et HUI_05 = SO	Voit assez bien	
2	(HUI_01 = 1 et HUI_02 = SO et HUI_03 = SO et HUI_04 = 2 et HUI_05 = 1) ou (HUI_01 = 2 et HUI_02 = 1 et HUI_03 = SO et HUI_04 = 1 et HUI_05 = SO) ou (HUI_01 = 2 et HUI_02 = 1 et HUI_03 = SO et HUI_04 = 2 et HUI_05 = 1)	Voit assez bien avec des lunettes ou des verres de contact (de loin, de près ou les deux)	
3	(HUI_01 = 1 et HUI_02 = SO et HUI_03 = SO et HUI_04 = 2 et HUI_05 = 2) ou (HUI_01 = 2 et HUI_02 = 1 et HUI_03 = SO et HUI_04 = 2 et HUI_05 = 2)	Incapable de voir de loin, même avec des lunettes ou des verres de contact	

4	(HUI_01 = 2 et HUI_02 = 2 et HUI_03 = 1 et HUI_04 = 1 et HUI_05 = SO) ou (HUI_01 = 2 et HUI_02 = 2 et HUI_03 = 1 et HUI_04 = 2 et HUI_05 = 1)	Incapable de voir de près, même avec des lunettes ou des verres de contact	
5	HUI_01 = 2 et HUI_02 = 2 et HUI_03 = 1 et HUI_04 = 2 et HUI_05 = 2	Incapable de voir de près et de loin, même avec des lunettes ou des verres de contact	
6	HUI_01 = 2 et HUI_02 = 2 et HUI_03 = 2 et HUI_04 = SO et HUI_05 = SO	Incapable de voir quoi que ce soit	
99	(HUI_01 = NSP, R, ND) ou (HUI_02 = NSP, R, ND) ou (HUI_03 = NSP, R, ND) ou (HUI_04 = NSP, R, ND) ou (HUI_05 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND

Référence :Référence: Pour plus de renseignement concernant l'indice de l'état de santé et plus de détails de chaque catégorie, veuillez voir http://www.statcan.gc.ca/subjects-sujets/standard-norme/otherclass-subject-autreclass-sujet-fra.htm.

2) Attribut Audition

Nom de la variable : HUIDHER

Basée sur : HUI_06, HUI_07, HUI_07A, HUI_08, HUI_09

Description : L'état de santé relatif à l'ouïe correspond à la capacité d'entendre, établie à partir de la capacité d'une personne à accomplir certaines tâches auditives, comme entendre ce qui se dit dans une conversation avec une autre personne ou dans une conversation de groupe. L'utilisation d'une prothèse auditive est prise en compte dans ce concept de capacité/incapacité.

Note : Voir la note concernant l'usage pour la classification.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DOHUI = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
1	HUI_06 = 1 et HUI_07 = SO et HUI_07A = SO et HUI_08 = SO et HUI_09 = SO	Capable de bien entendre	
2	HUI_06 = 2 et HUI_07 = 1 et HUI_07A = SO et HUI_08 = 1 et HUI_09 = SO	Capable de suivre une conversation dans un groupe avec une prothèse auditive	

3	(HUI_06 = 2 et HUI_07 = 1 et HUI_07A = SO et HUI_08 = 2 et HUI_09 = 1) ou (HUI_06 = 2 et HUI_07 = 1 et HUI_07A =SO et HUI_08 = 2 et HUI_09 = 2)	Capable de suivre une conversation, avec une autre personne ou dans un groupe, avec une prothèse auditive	
4	HUI_06 = 2 et HUI_07 = 2 et HUI_07A =1 et HUI_08 = 1 et HUI_09 = SO	Incapable de suivre une conversation dans un groupe et capable de suivre une conversation avec une autre personne sans prothèse auditive	
5	HUI_06 = 2 et HUI_07 = 2 et HUI_07A =1 et HUI_08 = 2 et HUI_09 = 1	Incapable de suivre une conversation dans un groupe et capable de suivre une conversation avec une autre personne avec une prothèse auditive	
6	(HUI_06 = 2 et HUI_07 = 2 et HUI_07A =1 et HUI_08 = 2 et HUI_09 = 2) ou (HUI_06 = 2 et HUI_07 = 2 et HUI_07A =2 et HUI_08 = SO et HUI_09 = SO)	Incapable d'entendre	
99	(HUI_06 = NSP, R, ND) ou (HUI_07 = NSP, R, ND) ou (HUI_07A = NSP, R, ND) ou (HUI_08 = NSP, R, ND) ou (HUI_09 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND

Référence :Référence: Pour plus de renseignement concernant l'indice de l'état de santé et plus de détails de chaque catégorie, veuillez voir http://www.statcan.gc.ca/subjects-sujets/standard-norme/otherclass-subject-autreclass-sujet-fra.htm.

3) Attribut Élocution

Nom de la variable : HUIDSPE

Basée sur : HUI_10, HUI_11, HUI_12, HUI_13

Description : L'état de santé relatif à l'élocution correspond à la capacité de parler et d'être compris, établi à partir de la capacité d'une personne à être comprise par des étrangers et par des personnes qui la connaissent bien.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOHUI = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
1	HUI_10 = 1 et HUI_11 = SO et HUI_12 = SO et HUI_13 = SO	Parfaitement compris	
2	HUI_10 = 2 et HUI_11 = 1 et HUI_12 = 1 et HUI_13 = SO	Parfaitement compris par des personnes qui les connaissent bien et partiellement compris par des inconnus	

3	HUI_10 = 2 et HUI_11 = 1 et HUI_12 = 2 et HUI_13 = 1	Partiellement compris par des personnes qui les connaissent bien	
4	(HUI_10 = 2 et HUI_11 = 2 et HUI_12 = 1 et HUI_13 = SO) ou (HUI_10 = 2 et HUI_11 = 2 et HUI_12 = 2 et HUI_13 = 1)	Incapable d'être compris par des inconnus	
5	(HUI_10 = 2 et HUI_11 = 1 et HUI_12 = 2 et HUI_13 = 2) ou (HUI_10 = 2 et HUI_11 = 2 et HUI_12 = 2 et HUI_13 = 2)	Incapable d'être compris	
9	(HUI_10 = NSP, R, ND) ou (HUI_11 = NSP, R, ND) ou (HUI_12 = NSP, R, ND) ou (HUI_13 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND

Référence :Référence: Pour plus de renseignement concernant l'indice de l'état de santé et plus de détails de chaque catégorie, veuillez voir http://www.statcan.gc.ca/subjects-sujets/standard-norme/otherclass-subject-autreclass-sujet-fra.htm.

4) Attribut Mobilité

Nom de la variable : HUIDMOB

Basée sur : HUI_14, HUI_15, HUI_16, HUI_17, HUI_18

Description : L'état de santé relatif à la mobilité correspond à la capacité ambulatoire, établi à partir de la capacité d'une personne à marcher ou à se déplacer dans le quartier ou sur de courtes distances. L'utilisation d'un appareil ou d'un fauteuil roulant, ainsi que le recours à l'aide d'autres personnes sont pris en compte dans ce concept de capacité/incapacité.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DOHUI = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
1	HUI_14 = 1 et HUI_15 = SO et HUI_16 = SO et HUI_17 = SO et HUI_18 = SO	Capable de marcher sans difficulté	
2	HUI_14 = 2 et HUI_15 = 1 et HUI_16 = 2 et HUI_17 = 2 et HUI_18 = 2	Capable de marcher avec difficulté, sans appareil d'aide à la marche	
3	HUI_14 = 2 et HUI_15 = 1 et HUI_16 = 1 et HUI_17 = 2 et HUI_18 = 2	Capable de marcher avec difficulté, besoin d'un appareil d'aide à la marche	

4	(HUI_14 = 2 et HUI_15 = 1 et HUI_16 = 1 et HUI_17 = 2 et HUI_18 = 1) ou (HUI_14 = 2 et HUI_15 = 1 et HUI_16 = 2 et HUI_17 = 2 et HUI_18 = 1)	Capable de marcher avec difficulté, besoin d'un fauteuil roulant	
5	(HUI_14 = 2 et HUI_15 = 1 et HUI_16 = 1 et HUI_17 = 1 et HUI_18 = 1) ou (HUI_14 = 2 et HUI_15 = 1 et HUI_16 = 1 et HUI_17 = 1 et HUI_18 = 2) ou (HUI_14 = 2 et HUI_15 = 1 et HUI_16 = 2 et HUI_17 = 1 et HUI_18 = 1) ou (HUI_14 = 2 et HUI_15 = 1 et HUI_16 = 2 et HUI_17 = 1 et HUI_18 = 2)	Capable de marcher avec difficulté, avec l'assistance d'une autre personne	
6	(HUI_14 = 2 et HUI_15 = 2 et HUI_16 = SO et HUI_17 = SO et HUI_18 = 1) ou (HUI_14 = 2 et HUI_15 = 2 et HUI_16 = SO et HUI_17 = SO et HUI_18 = 2)	Totalement incapable de marcher	
99	(HUI_14 = NSP, R, ND) ou (HUI_15 = NSP, R, ND) ou (HUI_16 = NSP, R, ND) ou (HUI_17 = NSP, R, ND) ou (HUI_18 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND

Référence :Référence: Pour plus de renseignement concernant l'indice de l'état de santé et plus de détails de chaque catégorie, veuillez voir http://www.statcan.gc.ca/subjects-sujets/standard-norme/otherclass-subject-autreclass-sujet-fra.htm.

5) Attribut Dextérité

Nom de la variable : HUIDDEX

Basée sur : HUI_21, HUI_22, HUI_23, HUI_24

Description : L'état de santé relatif à la dextérité correspond à la capacité de se servir de ses mains, établie en fonction de la capacité d'une personne à exécuter certaines tâches au moyen de ses mains et ses doigts. L'utilisation d'outils spéciaux ainsi que le recours à l'aide d'autres personnes pour faciliter l'exécution des tâches sont pris en compte dans ce concept de capacité/incapacité.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DOHUI = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
1	HUI_21 = 1 et HUI_22 = 6 et HUI_23 = 6 et HUI_24 = 6	Usage complet des mains et des doigts	
2	HUI_21 = 2 et HUI_22 = 2 et HUI_23 = 6 et HUI_24 = 2	Limitations de la dextérité, n'a besoin d'aucune aide	
3	HUI_21 = 2 et HUI_22 = 2 et HUI_23 = 6 et HUI_24 = 1	Limitations de la dextérité, besoin d'équipement spécial	
4	(HUI_21 = 2 et HUI_22 = 1 et HUI_23 = 1 et HUI_24 = 1) ou (HUI_21 = 2 et HUI_22 = 1 et HUI_23 = 1 et HUI_24 = 2)	Limitations de la dextérité, besoin d'aide pour certaines tâches	
5	(HUI_21 = 2 et HUI_22 = 1 et HUI_23 = 2 et HUI_24 = 1) ou (HUI_21 = 2 et HUI_22 = 1 et HUI_23 = 2 et HUI_24 = 2) ou (HUI_21 = 2 et HUI_22 = 1 et HUI_23 = 3 et HUI_24 =1) ou (HUI_21 = 2 et HUI_22 = 1 et HUI_23 = 3 et HUI_24 = 2)	Limitations de la dextérité, besoin d'aide pour la plupart des tâches	
6	(HUI_21 = 2 et HUI_22 = 1 et HUI_23 = 4 et HUI_24 = 1) ou (HUI_21 = 2 et HUI_22 = 1 et HUI_23 = 4 et HUI_24 = 2)	Limitations de la dextérité, besoin d'aide pour toutes les tâches	
99	(HUI_21 = NSP, R, ND) ou (HUI_22 = NSP, R, ND) ou (HUI_23 = NSP, R, ND) ou (HUI_24 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND

Référence :Référence: Pour plus de renseignement concernant l'indice de l'état de santé et plus de détails de chaque catégorie, veuillez voir http://www.statcan.gc.ca/subjects-sujets/standard-norme/otherclass-subject-autreclass-sujet-fra.htm.

6) Attribut Émotion

Nom de la variable : HUIDEMO

Basée sur : HUI_25

Description : L'état de santé relatif à l'état émotif correspond au bien être émotionnel, établi en fonction des divers niveaux de bonheur, d'intérêt pour la vie et de tristesse d'une personne.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOHUI = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
1	HUI_25 = 1	Heureux(se) et intéressé(e) à vivre	
2	HUI_25 = 2	Plutôt heureux(se)	
3	HUI_25 = 3	Plutôt malheureux(se)	
4	HUI_25 = 4	Très malheureux(se)	
5	HUI_25 = 5	Si malheureux(se) que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue	
9	(HUI_25 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND

Référence :Référence: Pour plus de renseignement concernant l'indice de l'état de santé et plus de détails de chaque catégorie, veuillez voir http://www.statcan.gc.ca/subjects-sujets/standard-norme/otherclass-subject-autreclass-sujet-fra.htm.

7) Attribut Cognition

Nom de la variable : HUIDCOG

Basée sur : HUI_26, HUI_27

Description : L'état de santé relatif à la cognition correspond à l'aptitude cognitive, établie à partir de la capacité d'une personne à se souvenir, à réfléchir et à résoudre des problèmes.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
96	DOHUI = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
1	HUI_26 = 1 et HUI_27 = 1	Capable de se souvenir et de penser	
2	(HUI_26 = 1 et HUI_27 = 2) ou (HUI_26 = 1 et HUI_27 = 3)	Capable de se souvenir et un peu de difficulté à penser	
3	HUI_26 = 2 et HUI_27 = 1	Plutôt porté à oublier des choses et capable de penser	
4	(HUI_26 = 2 et HUI_27 = 2) ou (HUI_26 = 2 et HUI_27 = 3)	Plutôt porté à oublier des choses et a un peu de difficulté à penser	

5	(HUI_26 = 1 et HUI_27 = 4) ou (HUI_26 = 2 et HUI_27 = 4) ou (HUI_26 = 3 et HUI_27 = 1) ou (HUI_26 = 3 et HUI_27 = 2) ou (HUI_26 = 3 et HUI_27 = 3) ou (HUI_26 = 3 et HUI_27 = 4)	Très porté à oublier des choses ou a beaucoup de difficulté à penser	
6	(HUI_26 = 1 et HUI_27 = 5) ou (HUI_26 = 2 et HUI_27 = 5) ou (HUI_26 = 3 et HUI_27 = 5) ou (HUI_26 = 4 et HUI_27 = 1) ou (HUI_26 = 4 et HUI_27 = 2) ou (HUI_26 = 4 et HUI_27 = 3) ou (HUI_26 = 4 et HUI_27 = 4) ou (HUI_26 = 4 et HUI_27 = 5)	Incapable de se souvenir ou incapable de penser	
99	(HUI_26 = NSP, R, ND) ou (HUI_27 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND

Référence :Référence: Pour plus de renseignement concernant l'indice de l'état de santé et plus de détails de chaque catégorie, veuillez voir http://www.statcan.gc.ca/subjects-sujets/standard-norme/otherclass-subject-autreclass-sujet-fra.htm.

8) Indice de l'état de santé

Nom de la variable : HUIDHSI

Basée sur : HUIDVIS, HUIDHER, HUIDSPE, HUIDMOB, HUIDDEX, HUIDEMO, HUIDCOG, HUPDPAD

Description : Cette variable dérivée est un indice de l'état de santé qui donne une description de la santé fonctionnelle globale d'une personne fondée sur huit attributs, à savoir la vision, l'ouïe, la parole, la marche (capacité à se déplacer), la dextérité (usage des mains et des doigts), l'émotion (sentiments), la cognition (mémoire et pensée) et la douleur. La version utilisée dans l' ESCC est adaptée du HUI Mark 3 (HUI3). L'indice est conçu pour produire un score global d'état de santé et huit scores pour les attributs individuels. L'analyste peut utiliser une échelle d'utilité (état de santé) à un seul attribut ou examiner l'état de santé global (niveaux pour les huit attributs) sur l'échelle d'utilité (état de santé) globale afin de produire une mesure de la qualité de vie liée à la santé (QVLS) perçue de la personne.

L'indice peut être utilisé pour décrire et surveiller la santé de populations générales et son utilisation dans les études transversales et longitudinales sur la santé des populations a été validée à grande échelle.

Chacun des 8 scores individuels d'état de santé mesure la capacité fonctionnelle relative à un seul attribut et varie de 1,00 (état normal) à 0,00 (incapacité la plus grande). Combinés, ces scores sont utilisés pour produire un indice d'utilité multi-attributs qui donne un score variant de 1,00 (santé parfaite) à 0,00 (état de santé équivalant à la mort) à -0,36 (état de santé pire que la mort).

Note : Le contenu du questionnaire de l'HUI3 fait partie du domaine public et n'est sujet à aucune restriction de droits d'auteur. L'algorithme HUI3 est la propriété de Health Utilities Inc. et est protégé par des droits d'auteur. Statistique Canada a l'autorisation, si la demande lui en est faite, de communiquer cet algorithme aux utilisateurs de données qui souhaitent reproduire les résultats ou les analyses de Statistique Canada. L'utilisation de l'algorithme à d'autres fins ou sa communication à des tiers est interdite.

Plus la cote est élevée, plus l'état de santé est bon.
Fourchette : -0,360 à 1 dans les échelons 0,001

Référence : Pour une explication détaillée du calcul du HUI3, consulter :

- Feeny D, Furlong W, Torrance GW et al. Multiattribute and single-attribute utility functions for the Health Utilities Index Mark 3 system. Med Care 2002; 40: 113-128.

Indice de l'état de santé - Douleurs et malaise (1 VD)

L'indice de l'état de santé (HUI pour Health Utilities Index) est un système de classification de l'état de santé fondé sur plusieurs attributs qui a été créé pour mesurer l'état de santé générique et la qualité de vie liée à l'état de santé. La version utilisée dans l'ESCC est le HUI Mark 3 (HUI3), élaboré au Canada à l'Université McMaster par Health Utilities Inc. Le HUI3 permet de calculer un indice générique de l'état de santé basé sur les attributs qui figurent dans deux modules distincts de l'ESCC, intitulés Douleurs et malaises (HUP) et Indice de l'état de santé (HUI). HUIDHSI peut seulement être calculé lorsque les deux modules HUP et HUI ont été collectés dans une période de référence donnée . Pour plus de renseignements, consulter « Feeny D, Furlong W, Torrance GW et coll. Multi-attribute and single-attribute utility functions for the Health Utilities Index Mark 3 system. Med Care 2002; 40: 113-128 ».

1) Attribut Douleur

Nom de la variable : HUPDPAD

Basée sur : HUP_01, HUP_03

Description : Cette variable permet de classer les répondants en fonction de la limitation de leurs activités due à des douleurs ou à des malaises. Elle est un des 8 attributs utilisés dans le calcul de l'Indice de l'état de santé (HUIDHSI).

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1	HUP_01 = 1 et HUP_03 = 6	Aucune douleur ni malaise	
2	HUP_01 = 2 et HUP_03 = 1	Douleur n'empêchant aucune activité	
3	HUP_01 = 2 et HUP_03 = 2	Douleur empêchant peu d'activités	
4	HUP_01 = 2 et HUP_03 = 3	Douleur empêchant quelques activités	
5	HUP_01 = 2 et HUP_03 = 4	Douleur empêchant la plupart des activités	
9	(HUP_01 = NSP, R, ND) ou (HUP_03 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND

Taille et poids - Autodéclarés (6 VD)

1) Taille (en mètres) - autodéclarée

Nom de la variable : HWTDHTM

Basée sur : HWT_2, HWT_2C, HWT_2D, HWT_2E, HWT_2F

Description : Cette variable indique la taille autodéclarée du répondant en mètres.

Note : Par exemple, une personne ayant déclaré mesurer 5 pieds et 8 pouces aura une hauteur de 1,727 mètres. La valeur de 1,727 correspond au milieu de la fourchette (1,715-1,739), soit environ 5 pieds et 8 pouces. Les valeurs de la fourchette ont été calculées comme suit pour une personne qui mesure 5 pieds 8 pouces : LIMITE INFÉRIEURE : prendre la valeur exacte en mètres d'une personne qui mesure 5 pieds et 7 pouces et l'arrondir à la valeur qui équivaut à 5 pieds 8 pouces. LIMITE SUPÉRIEURE : Prendre la valeur exacte en mètres d'une personne qui fait 5 pieds 9 pouces et l'arrondir à la valeur qui équivaut à 5 pieds 8 pouces, puis soustraire 0,001.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9.996	MAM_037 = 1	Population exclue - Femmes enceintes	SO
9,999	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9,999	(HWT_2 = NSP, R, ND) ou (HWT_2C = NSP, R, ND) ou (HWT_2D = NSP, R, ND) ou (HWT_2E = NSP, R, ND) ou (HWT_2F = NSP, R, ND)	Au moins une question obligatoire n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0,914	HWT_2 = 3 et HWT_2C = 0	0,926 mètres ou moins	
0,940	HWT_2 = 3 et HWT_2C = 1	0,927 à 0,952 mètres	
0,965	HWT_2 = 3 et HWT_2C = 2	0,953 à 0,977 mètres	
0,991	HWT_2 = 3 et HWT_2C = 3	0,978 à 1,002 mètres	
1,016	HWT_2 = 3 et HWT_2C = 4	1,003 à 1,028 mètres	
1,041	HWT_2 = 3 et HWT_2C = 5	1,029 à 1,053 mètres	
1,067	HWT_2 = 3 et HWT_2C = 6	1,054 à 1,079 mètres	
1,092	HWT_2 = 3 et HWT_2C = 7	1,080 à 1,104 mètres	
1,118	HWT_2 = 3 et HWT_2C = 8	1,105 à 1,129 mètres	
1,143	HWT_2 = 3 et HWT_2C = 9	1,130 à 1,155 mètres	
1,168	HWT_2 = 3 et HWT_2C = 10	1,156 à 1,180 mètres	
1,194	HWT_2 = 3 et HWT_2C = 11	1,181 à 1,206 mètres	
1,219	HWT_2 = 4 et HWT_2D = 0	1,207 à 1,231 mètres	

1,245	HWT_2 = 4 et HWT_2D = 1	1,232 à 1,256 mètres
1,270	HWT_2 = 4 et HWT_2D = 2	1,257 à 1,282 mètres
1,295	HWT_2 = 4 et HWT_2D = 3	1,283 à 1,307 mètres
1,321	HWT_2 = 4 et HWT_2D = 4	1,308 à 1,333 mètres
1,346	HWT_2 = 4 et HWT_2D = 5	1,334 à 1,358 mètres
1,372	HWT_2 = 4 et HWT_2D = 6	1,359 à 1,383 mètres
1,397	HWT_2 = 4 et HWT_2D = 7	1,384 à 1,409 mètres
1,422	HWT_2 = 4 et HWT_2D = 8	1,410 à 1,434 mètres
1,448	HWT_2 = 4 et HWT_2D = 9	1,435 à 1,460 mètres
1,473	HWT_2 = 4 et HWT_2D = 10	1,461 à 1,485 mètres
1,499	HWT_2 = 4 et HWT_2D = 11	1,486 à 1,510 mètres
1,524	HWT_2 = 5 et HWT_2E = 0	1,511 à 1,536 mètres
1,549	HWT_2 = 5 et HWT_2E = 1	1,537 à 1,561 mètres
1,575	HWT_2 = 5 et HWT_2E = 2	1,562 à 1,587 mètres
1,600	HWT_2 = 5 et HWT_2E = 3	1,588 à 1,612 mètres
1,626	HWT_2 = 5 et HWT_2E = 4	1,613 à 1,637 mètres
1,651	HWT_2 = 5 et HWT_2E = 5	1,638 à 1,663 mètres
1,676	HWT_2 = 5 et HWT_2E = 6	1,664 à 1,688 mètres
1,702	HWT_2 = 5 et HWT_2E = 7	1,689 à 1,714 mètres
1,727	HWT_2 = 5 et HWT_2E = 8	1,715 à 1,739 mètres
1,753	HWT_2 = 5 et HWT_2E = 9	1,740 à 1,764 mètres
1,778	HWT_2 = 5 et HWT_2E = 10	1,765 à 1,790 mètres
1,803	HWT_2 = 5 et HWT_2E = 11	1,791 à 1,815 mètres
1,829	HWT_2 = 6 et HWT_2F = 0	1,816 à 1,841 mètres
1,854	HWT_2 = 6 et HWT_2F = 1	1,842 à 1,866 mètres
1,880	HWT_2 = 6 et HWT_2F = 2	1,867 à 1,891 mètres

1,905	HWT_2 = 6 et HWT_2F = 3	1,892 à 1,917 mètres
1,930	HWT_2 = 6 et HWT_2F = 4	1,918 à 1,942 mètres
1,956	HWT_2 = 6 et HWT_2F = 5	1,943 à 1,968 mètres
1,981	HWT_2 = 6 et HWT_2F = 6	1,969 à 1,993 mètres
2,007	HWT_2 = 6 et HWT_2F = 7	1,994 à 2,018 mètres
2,032	HWT_2 = 6 et HWT_2F = 8	2,019 à 2,044 mètres
2,057	HWT_2 = 6 et HWT_2F = 9	2,045 à 2,069 mètres
2,083	HWT_2 = 6 et HWT_2F = 10	2,070 à 2,095 mètres
2,108	HWT_2 = 6 et HWT_2F = 11	2,096 à 2,120 mètres
2,134	HWT_2 = 7	2,121 mètres ou plus

2) Poids (en kilogrammes) - autodéclarés

Nom de la variable : HWTDWTK

Basée sur : HWT_3, HWT_N4

Description : Cette variable indique le poids autodéclaré du répondant en kilogrammes.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999.96	MAM_037 = 1	Population exclue - Femmes enceintes	SO
999,99	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées (entrevue par procuration)	
999,99	(HWT_3 = NSP, R, ND)	Une question obligatoire n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
HWT_3	HWT_N4 = 2	Le poids en kilogrammes	(arrondi à deux décimales près)
HWT_3 × 0,45	HWT_N4 = 1	Le poids a été converti de livres en kilogrammes	(arrondi à deux décimales près)

3) Indice de masse corporelle (autodéclaré)

Nom de la variable : HWTDBMI

Basée sur : HWTDHTM, HWTDWTK

Description : L'indice de masse corporelle (IMC) pour cette variable est basé sur le poids et la taille autodéclarés. L'IMC est une comparaison du « poids » par rapport à la « taille » des répondants. Pour calculer l'IMC, on divise le poids exprimé en kilogrammes par le carré de la taille exprimée en mètres.
IMC = POIDS (KG) / TAILLE (MÈTRES) AU CARRÉ

Note : On ne calcule pas l'IMC pour les femmes enceintes. Bien que le calcul de l'IMC ne soit pas recommandé durant la lactation, l'indice fourni ici est calculé pour les femmes qui ont déclaré qu'elles allaitaient (MEX_05 = 1) afin de permettre les comparaisons avec les cycles antérieurs de l'ESCC et l'ENSP.
Pour le cycle 1.1 de l'ESCC, l'IMC n'a été calculé que pour les répondants âgés de 20 à 64 ans. À compter du cycle 2.1, l'IMC est calculé pour les répondants de 18 ans et plus. Avec l'introduction aux cycles 2.2 et 3.1 d'un nouveau système de classification pour les personnes âgées de moins de 18 ans, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes âgées de moins de 18 ans.
Cette classification de l'IMC est créée en utilisant les variables « taille autodéclarée » et « poids autodéclaré ».

Un examen systématique de la littérature a permis de conclure que, chez les adultes, l'utilisation de données autodéclarées produit une sous-estimation du poids et une surestimation de la taille qui donnent lieu à des estimations plus faibles de la prévalence de l'obésité que celles obtenues d'après des données mesurées (Connor Gorber et coll., 2007). Les estimations de la prévalence de l'obésité fondées sur l'ESCC sont sujettes à ces biais (Shields et coll., 2008b). Des équations de correction ont été élaborées en se servant de données provenant du sous-échantillon de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de 2005 pour lequel des valeurs mesurées ainsi qu'autodéclarées ont été recueillies (Connor Gorber et coll. 2008). Ces équations de correction ont pu être appliquées aux données autodéclarées des cycles de 2005 et de 2008 de l'ESCC pour produire des estimations plus exactes de la prévalence de l'obésité (Connor Gorber et coll. 2008; Shields et coll. 2011). Les écarts entre les estimations corrigées de la prévalence de l'obésité d'après l'ESCC et les estimations fondées sur des données mesurées provenant de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé seront suivis au fil du temps afin de déterminer si le biais dans les valeurs autodéclarées évolue et si de nouvelles équations de correction doivent être établies.

L'utilisation de données autodéclarées fausse aussi notre interprétation de la relation entre l'obésité et les maladies liées à l'obésité. Les erreurs de classification qui ont lieu lorsque les catégories d'IMC sont fondées sur des données autodéclarées se traduisent par un accroissement des associations entre l'obésité et des maladies associées à cette dernière, telles que l'hypertension et le diabète (Shields et coll. 2008a). Les associations entre les catégories d'IMC et ces problèmes de santé sont plus exactes lorsqu'elles sont fondées sur des valeurs corrigées (Connor Gorber et coll. 2008).
Voici les équations. Elles devraient être appliquées à la population âgée de 18 ans et plus.

Si sex=1 donc bmi_c=-1.07575 + 1.07592*bmi_sr;
si sex=2 donc bmi_c=-0.12374 + 1.05129*bmi_sr;

Références:
1. Connor Gorber, S., Shields M., Tremblay MS., McDowell I. « La possibilité d'établir des facteurs de correction applicables aux estimations autodéclarées de l'obésité », Rapport sur la santé (no 82-003 au catalogue de Statistique Canada), vol. 19, no 3 (2008), p. 75-87.2
2. Connor Gorber S., Tremblay M., Moher D., Gorber B. « A comparison of direct vs. self-report measures for assessing height, weight and body mass index: a systematic review », Obesity Reviews, vol. 8, no 4 (2007), p. 307-326.
3. Shields M., Connor Gorber S., Tremblay MS. « Effets des mesures sur l'obésité et la morbidité » Rapport sur la santé (no 82-003 au catalogue de Statistique Canada), vol. 19, no 2 (2008a), p. 87-95.
4. Shields M., Connor Gorber S., Tremblay MS. « Estimations de l'obésité fondées sur des mesures autodéclarées et sur des mesures directes », Rapport sur la santé (no 82-003 au catalogue de Statistique Canada), vol. 19, no 2 (2008b); p. 69-85..
5. Shields M, Gorber SC, Janssen I, Tremblay MS. « Biais dans les estimations autodéclarées de l'obésité dans les enquêtes canadiennes sur la santé : le point sur les équations de correction applicables aux adultes », Rapports sur la santé, vol. 22, no 3 (2011), p. 39-50.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999,96	MAM_037 = 1	Population exclue - Femmes enceintes	SO
999,99	DHH_SEX = 2 et (MAM_037 = NSP, R, ND)	Femmes qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
999,99	HWTDHTM = ND ou HWTDWTK = ND	Répondants pour qui une valeur valide de poids ou taille autodéclaré n'a pas été obtenue	ND
999.99	(HWTDHTM > 2.108 et HWTDHTM < 9.996) ou HWTDHTM < .914	La valeur liée à la taille du répondant (de la répondante) n'est pas valide.	
HWTDWTK / (HWTDHTM × HWTDHTM)	HWTDHTM < SO et HWTDWTK < SO	IMC calculé à partir des valeurs de poids et taille autodéclarés	(arrondi à deux décimales près)

4) Classification selon l'IMC (autodéclaré) pour les adultes de 18 ans et plus - standard international

Nom de la variable : HWTDISW

Basée sur : HWTDBMI, DDH_AGE

Description : Cette variable est utilisée pour classer les répondants de 18 ans et plus (sauf les femmes enceintes) dans l'une des catégories qui suivent, d'après leur Indice de masse corporelle (IMC) : poids insuffisant, poids normal, embonpoint ou obésité classe I, obésité classe II et obésité classe III. Les catégories d'IMC adoptées ici sont tirées du système de classification du poids corporel recommandé par Santé Canada et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dont l'usage est très répandu à l'échelle internationale.

Note : Selon Santé Canada, ce système de classification selon l'IMC peut être utilisé comme outil de dépistage en vue de déceler les risques pour la santé associés au poids, tant au niveau de la population que de l'individu. Les risques pour la santé associés à chaque catégorie d'IMC chez les adultes de 18 ans et plus sont les suivants :
poids normal = moindre risque;
poids insuffisant et embonpoint = risque accru;
obésité classe I = risque élevé;
obésité classe II = risque très élevé;
obésité classe III = risque extrêmement élevé.

Au niveau de la population, le système de classification du poids selon l'IMC peut être utilisé pour comparer les profils de poids corporel et les risques pour la santé connexes dans les populations et entre celles-ci, et pour dégager les tendances concernant le poids corporel au sein des populations. La classification devrait être utilisée avec circonspection au niveau individuel, parce que les risques pour la santé associés à chaque catégorie d'IMC varient considérablement d'un individu à l'autre. De surcroît, il faut être particulièrement prudent lorsqu'on classifie des jeunes adultes qui n'ont pas terminé leur croissance, des adultes naturellement minces, des adultes très musclés, les membres de certains groupes ethniques et raciaux, ainsi que les adultes plus de 65 ans.

Cette variable exclut les femmes âgées de 18 à 49 ans qui étaient enceintes ou qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse (c'est-à-dire MAM_037 = ne sait pas, refus, non déclaré).

Site internet : http ://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/onpp-bppn/weight_book_f.pdf

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DDH_AGE < 18 ou MAM_037 = 1	Populations exclues	SO
99	HWTDBMI = ND ou (MAM_037 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu à au moins une question requise (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	HWTDBMI < 18,50	Poids insuffisant	
2	(18,50 <= HWTDBMI <= 24,99)	Poids normal	
3	(25,00 <= HWTDBMI <= 29,99)	Embonpoint	
4	(30,00 <= HWTDBMI <= 34,99)	Obésité - Classe I	
5	(35,00 <= HWTDBMI <= 39,99)	Obésité - Classe II	
6	HWTDBMI >= 40,00	Obésité - Classe III	

Référence : Pour plus de renseignements, consulter les Lignes directrices canadiennes pour la classification du poids chez les adultes, Santé Canada, 2003

5) Classification selon l'IMC pour les enfants de 12 à 17 ans (autodéclaré) - Système de classification de Cole

Nom de la variable : HWTDCOL

Basée sur : HWTDBMI, DHH_SEX, DHHYOB, DHHMOB, DHHDOB, ADM_YOI, ADM_MOI, ADM_DOI

Description : Cette variable est utilisée pour classer les enfants de 12 à 17 ans (sauf les répondantes âgées de 15 à 17 ans qui étaient enceintes ou qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse) comme étant « obèses », en « excès de poids » ou « ni obèses ni en excès de poids » d'après les seuils de l'IMC selon l'âge et le sexe définis par Cole et coll. Les seuils établis par Cole sont fondés sur l'agrégation de données internationales (Brésil, Grande Bretagne, Hong Kong, Pays Bas, Singapour et États Unis) sur l'IMC et reliés aux seuils de 25 (excès de poids/embonpoint) et 30 (obésité) reconnus internationalement pour les adultes.

Note : Les répondants n'entrant pas dans les catégories d'« obésité » ou d'« excès de poids » (telles qu'elles sont définies par Cole et coll.) ont été classés, pour l'ESCC, dans la catégorie « ni obésité ni excès de poids ».

Cette variable exclut les répondants âgés de 18 ans et plus (216 mois).

Reformatage temporaire			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
AGET1			
DHH_AGM / 12	DHH_AGM < 9996	Conversion de l'« âge en mois » du répondant à l'« âge en année »	(arrondi à 0,5 dixième de près)
DHH_AGM			
9999	(DHH_DOB = NSP, R, ND) ou (DHH_MOB = NSP, R ou ND) ou (DHH_YOB = NSP, R ou ND)	Le jour de naissance ou le mois de naissance ou l'année de naissance valide n'est pas disponible pour le répondant.	ND
Âge en mois	La date de l'interview a été convertie en mois (ADM_YOI, ADM_MOI et ADM_DOI) - La date de naissance a été convertie en mois (DHH_YOB, DHH_MOB et DHH_DOB)	L'âge du répondant a été créé en mois au moment de l'interview	(min:144; max:1224)

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	MAM_037 = 1 ou (17 < DHH_AGE or DHH_AGE < 12) ou (DHH_AGM >= 216 et DHH_AGM < 9999)	Population exclue	SO
9	HWTDBMI = ND ou (MAM_037 = NSP, R, ND) ou DHH_AGM = ND	Le répondant n'a pas répondu à au moins une des questions requises (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

3	(AGET1 = 12 et DHH_SEX = 1 et 999.96 > HWTDBMI >= 26,02) ou (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 2 et 999.96 > HWTDBMI >= 26,67) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 1 et 999.96 > HWTDBMI >= 26,43) ou (AGET1 = 12,5 et DHH_SEX = 2 et 999.96 > HWTDBMI >= 27,24) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 1 et 999.96 > HWTDBMI >= 26,84) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 2 et 999.96 > HWTDBMI >= 27,76) ou (AGET1 = 13,5 et DHH_SEX = 1 et 999.96 > HWTDBMI >= 27,25) ou (AGET1 = 13,5 et DHH_SEX = 2 et 999.96 > HWTDBMI >= 28,20) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 1 et 999.96 > HWTDBMI >= 27,63) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 2 et 999.96 > HWTDBMI >= 28,57) ou (AGET1 = 14,5 et DHH_SEX = 1 et 999.96 > HWTDBMI >= 27,98) ou (AGET1 = 14,5 et DHH_SEX = 2 et 999.96 > HWTDBMI >= 28,87) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 1 et 999.96 > HWTDBMI >= 28,30) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 2 et 999.96 > HWTDBMI >= 29,11) ou (AGET1 = 15,5 et DHH_SEX = 1 et 999.96 > HWTDBMI >= 28,60) ou (AGET1 = 15,5 et DHH_SEX = 2 et 999.96 > HWTDBMI >= 29,29) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 1 et 999.96 > HWTDBMI >= 28,88) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 2 et 999.96 > HWTDBMI >= 29,43) ou (AGET1 = 16,5 et DHH_SEX = 1 et 999.96 > HWTDBMI >= 29,14) ou (AGET1 = 16,5 et DHH_SEX = 2 et 999.96 > HWTDBMI >= 29,56) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 1 et 999.96 > HWTDBMI >= 29,41) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 2 et 999.96 > HWTDBMI >= 29,69) ou (AGET1 = 17,5 et DHH_SEX = 1 et 999.96 > HWTDBMI >= 29,70) ou (AGET1 = 17,5 et DHH_SEX = 2 et 999.96 > HWTDBMI >= 29,84) ou (AGET1 = 18 et	Obèse

DHH_SEX = 1 et
999.96 > HWTDBMI >= 30,00) ou
(AGET1 = 18 et
DHH_SEX = 2 et
999.96 > HWTDBMI >= 30,00)

2	(AGET1 = 12 et DHH_SEX = 1 et (21,22 <= HWTDBMI < 26,02)) ou (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 2 et (21,68 <= HWTDBMI < 26,67)) ou (AGET1 = 12,5 et DHH_SEX = 1 et (21,56 <= HWTDBMI < 26,43)) ou (AGET1 = 12,5 et DHH_SEX = 2 et (22,14 <= HWTDBMI < 27,24)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 1 et (21,91 <= HWTDBMI < 26,84)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 2 et (22,58 <= HWTDBMI < 27,76)) ou (AGET1 = 13,5 et DHH_SEX = 1 et (22,27 <= HWTDBMI < 27,25)) ou (AGET1 = 13,5 et DHH_SEX = 2 et (22,98 <= HWTDBMI < 28,20)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 1 et (22,62 <= HWTDBMI < 27,63)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 2 et (23,34 <= HWTDBMI < 28,57)) ou (AGET1 = 14,5 et DHH_SEX = 1 et (22,96 <= HWTDBMI < 27,98)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 2 et (23,66 <= HWTDBMI < 28,87)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 1 et (23,29 <= HWTDBMI < 28,30)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 2 et (23,94 <= HWTDBMI < 29,11)) ou (AGET1 = 15,5 et DHH_SEX = 1 et (23,60 <= HWTDBMI < 28,60)) ou (AGET1 = 15,5 et DHH_SEX = 2 et (24,17 <= HWTDBMI < 29,29)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 1 et (23,90 <= HWTDBMI < 28,88)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 2 et (24,37 <= HWTDBMI < 29,43)) ou (AGET1 = 16,5 et DHH_SEX = 1 et (24,19 <= HWTDBMI < 29,14)) ou (AGET1 = 16,5 et DHH_SEX = 2 et (24,54 <= HWTDBMI < 29,56)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 1 et (24,46 <= HWTDBMI < 29,41)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 2 et (24,70 <= HWTDBMI < 29,69)) ou (AGET1 = 17,5 et DHH_SEX = 1 et (24,73 <= HWTDBMI < 29,70)) ou (AGET1 = 17,5 et DHH_SEX = 2 et (24,85 <= HWTDBMI < 29,84)) ou (AGET1 = 18 et	Embonpoint

	DHH_SEX = 1 et (25,00 <= HWTDBMI < 30,00)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 2 et (25,00 <= HWTDBMI < 30,00))	
1	Sinon	Ni embonpoint ni obèse

Référence : Pour plus de renseignements sur le système de classification selon l'IMC de Cole, consulter Establishing a Standard Definition for Child Overweight et Obesity Worldwide - International survey, par Tim J. Cole, Mary C. Bellizzi, Katherine M. Flegal, William H. Dietz, publié dans le British Medical Journal, volume : 320, mai 2000.

6) Classification selon l'IMC pour les enfants de 12 à 17 ans (autodéclaré) - Système de classification de l'OMS

Nom de la variable : HWTDWHO

Basée sur : MAM_037, DHH_AGE, DHH_AGM, HWTDBMI, AGET1, DHH_SEX

Description : Cette variable est utilisée pour classer les enfants de 12 à 17 ans (sauf les répondantes âgées de 15 à 17 ans qui étaient enceintes ou qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse) comme étant « gravement obèses », « obèses », en « excès de poids » ou « ni obèses ni en excès de poids » d'après les seuils de l'IMC selon l'âge et le sexe définis par l'Organisation Mondiale de la Santé.

En 2007, l'OMS a produit des références de croissance pour les enfants âgés de 5 à 19 ans basées sur des données de NHES II et III ainsi que NHANES I. Les courbes de croissance de l'IMC pour les enfants de 5 à 19 ans ont été construites pour assurer une transition fluide avec les normes de l'OMC pour les 0 à 5 ans.Selon ces courbes de croissance, l'OMC recommande que les enfants don't l'IMC est plus grand que deux écarts types au-dessus de la moyenne soient considérés obèses. Ceux don't l'IMC est situé entre un et deux écarts types au-dessus de la moyenne soit considérés comme étant en excès de poids. Deux écarts types au-dessus de la moyenne correspond approximativement au 97,7e percentile et un écart type, au 84e percentile.

À tout âge, les valeurs-seuil de l'OMC produisent des pourcentages plus élevés de garçons et filles classés comme étant en excès de poids ou obèses que les valeurs-seuils
de IOTF ou CDC.

Note : Référence: Pour plus d'information sur le système de classification de l'IMC de L'OMS, voir Development of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents, de Mercedes de Onis, Adelheid W Onyango, Elaine Borghi, Amani Siyam, Chizuru Nishidaa & Jonathan Siekmanna, publié dans le Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé, Sept 2007;85:660-667.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	MAM_037 = 1 ou (17 < DHH_AGE ou DHH_AGE < 12) ou (DHH_AGM >= 216 et DHH_AGM < 9999)	Le module n'a pas été sélectionné ou population exclue	SO
9	HWTDBMI = 999.99 ou MAM_037 IN(7,8,9) ou DHH_AGM = 9999	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND

4	(AGET1 = 12 et DHH_SEX = 1 et (HWTDBMI < 999.96 et HWTDBMI >= 25.23)) ou (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 2 et (HWTDBMI < 999.96 et HWTDBMI >= 26.81)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDBMI < 999.96 et HWTDBMI >= 25.89)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDBMI < 999.96 et HWTDBMI >= 27.49)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 1 et (HWTDBMI < 999.96 et HWTDBMI >= 26.54)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 2 et (HWTDBMI < 999.96 et HWTDBMI >= 28.14)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDBMI < 999.96 et HWTDBMI >= 27.18)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDBMI < 999.96 et HWTDBMI >= 28.75)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 1 et (HWTDBMI < 999.96 et HWTDBMI >= 27.79)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 2 t (HWTDBMI < 999.96 et HWTDBMI >= 29.31)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDBMI < 999.96 et HWTDBMI >= 28.35)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDBMI < 999.96 et HWTDBMI >= 29.81)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 1 et (HWTDBMI < 999.96 et HWTDBMI >= 28.86)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 2 et (HWTDBMI < 999.96 et HWTDBMI >= 30.24)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDBMI < 999.96 et HWTDBMI >= 29.33)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDBMI < 999.96 et HWTDBMI >= 30.59)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 1 et (HWTDBMI < 999.96 et HWTDBMI >= 29.75)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 2 et (HWTDBMI < 999.96 et HWTDBMI >= 30.88)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDBMI < 999.96 et HWTDBMI >= 30.12)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDBMI < 999.96 et HWTDBMI >= 31.1)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 1 et (HWTDBMI < 999.96 et HWTDBMI >= 30.46)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 2 et (HWTDBMI < 999.96 et HWTDBMI >= 31.26)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDBMI < 999.96 et HWTDBMI >= 30.75)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDBMI < 999.96 et HWTDBMI >= 31.37)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 1 et (HWTDBMI < 999.96 et HWTDBMI >= 31.01)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 2 et (HWTDBMI < 999.96 et HWTDBMI >= 31.45))	Gravement obèse

3	(AGET1 = 12 et DHH_SEX = 1 et HWTDBMI < 25.23 et HWTDBMI >= 23.05) ou (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 2 et HWTDBMI < 26.81 et HWTDBMI >= 24.37) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 1 et HWTDBMI < 25.89 et HWTDBMI >= 23.61) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 2 et HWTDBMI < 27.5 et HWTDBMI >= 24.98) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 1 et HWTDBMI < 26.54 et HWTDBMI >= 24.18) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 2 et HWTDBMI < 28.14 et HWTDBMI >= 25.57) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 1 et HWTDBMI < 27.18 et HWTDBMI >= 24.76) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 2 et HWTDBMI < 28.75 et HWTDBMI >= 26.14) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 1 et HWTDBMI < 27.79 et HWTDBMI >= 25.32) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 2 et HWTDBMI < 29.31 et HWTDBMI >= 26.67) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 1 et HWTDBMI < 28.35 et HWTDBMI >= 25.85) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 2 et HWTDBMI < 29.81 et HWTDBMI >= 27.14) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 1 et HWTDBMI < 28.86 et HWTDBMI >= 26.35) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 2 et HWTDBMI < 30.24 et HWTDBMI >= 27.56) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 1 et HWTDBMI < 29.33 et HWTDBMI >= 26.82) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 2 et HWTDBMI < 30.59 et HWTDBMI >= 27.91) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 1 et HWTDBMI < 29.75 et HWTDBMI >= 27.26) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 2 et HWTDBMI < 30.88 et HWTDBMI >= 28.21) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 1 et HWTDBMI < 30.12 et HWTDBMI >= 27.66) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 2 et HWTDBMI < 31.1 et HWTDBMI >= 28.44) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 1 et HWTDBMI < 30.46 et HWTDBMI >= 28.02) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 2 et HWTDBMI < 31.26 et HWTDBMI >= 28.62) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 1 et HWTDBMI < 30.75 et HWTDBMI >= 28.35) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 2 et HWTDBMI < 31.37 et HWTDBMI >= 28.76) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 1 et HWTDBMI < 31.01 et HWTDBMI >= 28.65) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 2 et HWTDBMI < 31.45 et HWTDBMI >= 28.87)	Obèse

2	(AGET1 = 12 et DHH_SEX = 1 et (HWTDBMI >= 20.05 et HWTDBMI < 23.05)) ou (AGET1 = 12 et DHH_SEX = 2 et (HWTDBMI >= 20.93 et HWTDBMI < 24.37)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDBMI >= 20.49 et HWTDBMI < 23.61)) ou (AGET1 = 12.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDBMI >= 21.43 et HWTDBMI < 24.98)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 1 et (HWTDBMI >= 20.94 et HWTDBMI < 24.18)) ou (AGET1 = 13 et DHH_SEX = 2 et (HWTDBMI >= 21.93 et HWTDBMI < 25.57)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDBMI >= 21.42 et HWTDBMI < 24.76)) ou (AGET1 = 13.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDBMI >= 22.41 et HWTDBMI < 26.14)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 1 et (HWTDBMI >= 21.89 et HWTDBMI < 25.32)) ou (AGET1 = 14 et DHH_SEX = 2 et (HWTDBMI >= 22.87 et HWTDBMI < 26.67)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDBMI >= 22.36 et HWTDBMI < 25.85)) ou (AGET1 = 14.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDBMI >= 23.29 et HWTDBMI < 27.14)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 1 et (HWTDBMI >= 22.81 et HWTDBMI < 26.35)) ou (AGET1 = 15 et DHH_SEX = 2 et (HWTDBMI >= 23.66 et HWTDBMI < 27.56)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDBMI >= 23.25 et HWTDBMI < 26.82)) ou (AGET1 = 15.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDBMI >= 23.98 et HWTDBMI < 27.91)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 1 et (HWTDBMI >= 23.66 et HWTDBMI < 27.26)) ou (AGET1 = 16 et DHH_SEX = 2 et (HWTDBMI >= 24.25 et HWTDBMI < 28.21)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDBMI >= 24.04 et HWTDBMI < 27.66)) ou (AGET1 = 16.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDBMI >= 24.47 et HWTDBMI < 28.44)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 1 et (HWTDBMI >= 24.40 et HWTDBMI < 28.02)) ou (AGET1 = 17 et DHH_SEX = 2 et (HWTDBMI >= 24.65 et HWTDBMI < 28.62)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 1 et (HWTDBMI >= 24.74 et HWTDBMI < 28.35)) ou (AGET1 = 17.5 et DHH_SEX = 2 et (HWTDBMI >= 24.8 et HWTDBMI < 28.76)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 1 et (HWTDBMI >= 25.05 et HWTDBMI < 28.65)) ou (AGET1 = 18 et DHH_SEX = 2 et (HWTDBMI >= 24.92 et HWTDBMI < 28.87))	Embonpoint
1	Sinon	Ni embonpoint ni obèse

Usage de drogues illicites (16 VD)

Ce module mesure la consommation de drogues illicites et la perturbation due aux drogues. Les questions sur la consommation de ces drogues sont basées sur l'Enquête canadienne sur l'alcool et les autres drogues (1994). La perturbation ou le trouble associé à cette dépendance sur les activités et les responsabilités quotidiennes a aussi été évaluée.

1) Consommation de cannabis - au cours de la vie (y compris la consommation « juste une fois »)

Nom de la variable : IDGFLCA

Basée sur : IDG_01

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà consommé de la marijuana, du cannabis ou du haschich.

Source: Enquête canadienne sur l'alcool et les autres drogues 1994 (ECAD)

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOIDG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	(IDG_01 = 1, 2)	Le répondant a consommé de la marijuana	
2	IDG_01 = 3	Le répondant n'a jamais consommé de marijuana	
9	(IDG_01 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire	ND

2) Consommation de cannabis - au cours de la vie (non compris la consommation « juste une fois »)

Nom de la variable : IDGFLCM

Basée sur : IDG_01

Description : Cette variable indique si le répondant a consommé de la marijuana, du cannabis ou du haschich plus d'une fois.

Source: Enquête canadienne sur l'alcool et les autres drogues 1994 (ECAD)

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOIDG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	IDG_01 = 2	Le répondant a consommé de la marijuana plus d'une fois	
2	(IDG_01 = 1, 3)	Le répondant n'a jamais consommé de marijuana plus d'une fois	
9	(IDG_01 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul	ND

3) Consommation de cannabis - au cours des 12 derniers mois (non compris la consommation « juste une fois »)

Nom de la variable : IDGFYCM

Basée sur : IDG_01, IDG_02

Description : Cette variable indique si le répondant a consommé de la marijuana, du cannabis ou du haschich l'année précédente, à l'exclusion de la consommation juste une fois au cours de la vie.

Source: Enquête canadienne sur l'alcool et les autres drogues 1994 (ECAD)

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOIDG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	IDG_01 = 2 et IDG_02 = 1	Le répondant a consommé de la marijuana au cours des 12 derniers mois et en a consommé plus d'une fois au cours de sa vie	
2	(IDG_01 = 1 et IDG_02 = 1) ou (IDG_02 = 2, SO)	Le répondant n'a pas consommé de marijuana au cours des 12 derniers mois ou en a consommé juste une fois au cours des 12 derniers mois et il s'agissait de la seule fois au cours de sa vie	
9	(IDG_02 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul	ND

4) Consommation de cocaïne ou de crack - au cours de la vie

Nom de la variable : IDGFLCO

Basée sur : IDG_04

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà consommé de la cocaïne ou du crack.

Source: Enquête canadienne sur l'alcool et les autres drogues 1994 (ECAD)

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOIDG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	(IDG_04 = 1, 2)	Le répondant a consommé de la cocaïne ou du crack	
2	IDG_04 = 3	Le répondant n'a jamais consommé de cocaïne ni de crack	
9	(IDG_04 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul	ND

5) Consommation d'amphétamines (speed) - au cours de la vie

Nom de la variable : IDGFLAM

Basée sur : IDG_07

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà consommé des amphétamines (speed).

Source: Enquête canadienne sur l'alcool et les autres drogues 1994 (ECAD)

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOIDG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	(IDG_07 = 1, 2)	Le répondant a consommé des amphétamines	
2	IDG_07 = 3	Le répondant n'a jamais consommé d'amphétamines	
9	(IDG_07 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul	ND

6) Consommation de MDMA (ecstasy) - au cours de la vie

Nom de la variable : IDGFLEX

Basée sur : IDG_10

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà consommé de la MDMA (ecstasy) ou des drogues semblables.

Source: Enquête canadienne sur l'alcool et les autres drogues 1994 (ECAD)

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOIDG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	(IDG_10 = 1, 2)	Le répondant a consommé de la MDMA (ecstasy)	
2	IDG_10 = 3	Le répondant n'a jamais consommé de MDMA (ecstasy)	
9	(IDG_10 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul	ND

7) Consommation d'hallucinogènes, de PCP ou de LSD - au cours de la vie

Nom de la variable : IDGFLHA

Basée sur : IDG_13

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà consommé des drogues hallucinogènes, du PCP ou du LSD (acide).

Source: Enquête canadienne sur l'alcool et les autres drogues 1994 (ECAD)

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DOIDG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	(IDG_13 = 1, 2)	Le répondant a consommé des drogues hallucinogènes, du PCP ou du LSD (acide)	

2	IDG_13 = 3	Le répondant n'a jamais consommé de drogues hallucinogènes, de PCP ni de LSD (acide)	
9	(IDG_13 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul	ND

8) Inhalation de colle, d'essence ou d'autres solvants - au cours de la vie

Nom de la variable : IDGFLGL

Basée sur : IDG_16

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà inhalé de la colle, de l'essence ou d'autres solvants.

Source: Enquête canadienne sur l'alcool et les autres drogues 1994 (ECAD)

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOIDG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	(IDG_16 = 1, 2)	Le répondant a inhalé de la colle, de l'essence ou d'autres solvants	
2	IDG_16 = 3	Le répondant n'a jamais inhalé de colle, d'essence ni d'autres solvants	
9	(IDG_16 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul	ND

9) Consommation d'héroïne - au cours de la vie

Nom de la variable : IDGFLHE

Basée sur : IDG_19

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà consommé de l'héroïne.

Source: Enquête canadienne sur l'alcool et les autres drogues 1994 (ECAD)

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOIDG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	(IDG_19 = 1, 2)	Le répondant a consommé de l'héroïne	
2	IDG_19 = 3	Le répondant n'a jamais consommé d'héroïne	
9	(IDG_19 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul	ND

10) Consommation de stéroïdes - au cours de la vie

Nom de la variable : IDGFLST

Basée sur : IDG_22

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà consommé des stéroïdes, comme de la testostérone, du dianabol ou des hormones de croissance.

Source: Enquête canadienne sur l'alcool et les autres drogues 1994 (ECAD)

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOIDG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	(IDG_22 = 1, 2)	Le répondant a consommé des stéroïdes	
2	IDG_22 = 3	Le répondant n'a jamais consommé de stéroïdes	
9	(IDG_22 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul	ND

11) Consommation de toute drogue illicite - au cours de la vie (y compris de consommation de cannabis « juste une fois »)

Nom de la variable : IDGFLA

Basée sur : IDGFLCA, IDGFLCO, IDGFLAM, IDGFLEX, IDGFLHA, IDGFLGL, IDGFLHE, IDGFLST

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà consommé au moins une des drogues énumérées. Ceci inclut l'usage du cannabis juste une fois.

Source: Enquête canadienne sur l'alcool et les autres drogues 1994 (ECAD)

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOIDG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	IDGFLCA = 1 ou IDGFLCO = 1 ou IDGFLAM = 1 ou IDGFLEX = 1 ou IDGFLHA = 1 ou IDGFLGL = 1 ou IDGFLHE = 1 ou IDGFLST = 1	Le répondant a consommé au moins une des 8 drogues énumérées, y compris la consommation de cannabis « juste une fois »	
2	IDGFLCA = 2 et IDGFLCO = 2 et IDGFLAM = 2 et IDGFLEX = 2 et IDGFLHA = 2 et IDGFLGL = 2 et IDGFLHE = 2 et IDGFLST = 2	Le répondant n'a jamais consommé aucune des drogues énumérées	

9	IDGFLCA = ND ou IDGFLCO = ND ou IDGFLAM = ND ou IDGFLEX = ND ou IDGFLHA = ND ou IDGFLGL = ND ou IDGFLHE = ND ou IDGFLST = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) dans une des variables dérivées nécessaire au calcul	ND

12) Consommation de toute drogue illicite - au cours de la vie (non compris la consommation de cannabis « juste une fois »)

Nom de la variable : IDGFLAC

Basée sur : IDGFLCM, IDGFLCO, IDGFLAM, IDGFLEX, IDGFLHA, IDGFLGL, IDGFLHE, IDGFLST

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà utilisé toute drogue figurant sur la liste. N'inclut pas la consommation de cannabis juste une fois.

Source: Enquête canadienne sur l'alcool et les autres drogues 1994 (ECAD)

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOIDG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	IDGFLCM = 1 ou IDGFLCO = 1 ou IDGFLAM = 1 ou IDGFLEX = 1 ou IDGFLHA = 1 ou IDGFLGL = 1 ou IDGFLHE = 1 ou IDGFLST = 1	Le répondant a consommé au moins une des 8 drogues énumérées, à l'exclusion de la consommation de cannabis « juste une fois »	
2	IDGFLCM = 2 et IDGFLCO = 2 et IDGFLAM = 2 et IDGFLEX = 2 et IDGFLHA = 2 et IDGFLGL = 2 et IDGFLHE = 2 et IDGFLST = 2	Le répondant n'a jamais consommé aucune des drogues énumérées, à l'exclusion de la consommation de cannabis juste une fois	
9	IDGFLCM = ND ou IDGFLCO = ND ou IDGFLAM = ND ou IDGFLEX = ND ou IDGFLHA = ND ou IDGFLGL = ND ou IDGFLHE = ND ou IDGFLST = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) dans une des variables dérivées nécessaire au calcul	ND

13) Consommation de toute drogue illicite - au cours des 12 derniers mois (y compris la consommation de cannabis « juste une fois »)

Nom de la variable : IDGFYA

Basée sur : IDG_02, IDG_05, IDG_08, IDG_11, IDG_14, IDG_17, IDG_20, IDG_23

Description : Cette variable indique si le répondant a consommé toute drogue énumérée au cours des 12 derniers mois. Inclut la consommation de cannabis juste une fois.

Source: Enquête canadienne sur l'alcool et les autres drogues 1994 (ECAD)

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOIDG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	IDG_02 = 1 ou IDG_05 = 1 ou IDG_08 = 1 ou IDG_11 = 1 ou IDG_14 = 1 ou IDG_17 = 1 ou IDG_20 = 1 ou IDG_23 = 1	Le répondant a consommé au moins une drogue énumérée au cours des 12 derniers mois, y compris la consommation de cannabis « juste une fois »	
2	(IDG_02 = 2, SO) et (IDG_05 = 2, SO) et (IDG_08 = 2, SO) et (IDG_11 = 2, SO) et (IDG_14 = 2, SO) et (IDG_17 = 2, SO) et (IDG_20 = 2, SO) et (IDG_23 = 2, SO)	Le répondant n'a consommé aucune des drogues énumérées au cours des 12 derniers mois	
9	(IDG_02 = NSP, R, ND) ou (IDG_05 = NSP, R, ND) ou (IDG_08 = NSP, R, ND) ou (IDG_11 = NSP, R, ND) ou (IDG_14 = NSP, R, ND) ou (IDG_17 = NSP, R, ND) ou (IDG_20 = NSP, R, ND) ou (IDG_23 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul	ND

14) Consommation de toute drogue illicite - au cours des 12 derniers mois (non compris la consommation de cannabis « juste une fois »)

Nom de la variable : IDGFYAC

Basée sur : IDGFYCM, IDG_05, IDG_08, IDG_11, IDG_14, IDG_17, IDG_20, IDG_23

Description : Cette variable indique si le répondant a consommé toute drogue énumérée au cours des 12 derniers mois. N'inclut pas la consommation de cannabis juste une fois.

Source: Enquête canadienne sur l'alcool et les autres drogues 1994 (ECAD)

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOIDG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND

1	IDGFYCM = 1 ou IDG_05 = 1 ou IDG_08 = 1 ou IDG_11 = 1 ou IDG_14 = 1 ou IDG_17 = 1 ou IDG_20 = 1 ou IDG_23 = 1	Le répondant a consommé au moins une des huit drogues énumérées au cours des 12 derniers mois, à l'exclusion de la consommation de cannabis « juste une fois » au cours de la vie	
2	IDGFYCM = 2 et (IDG_05 = 2, SO) et (IDG_08 = 2, SO) et (IDG_11 = 2, SO) et (IDG_14 = 2, SO) et (IDG_17 = 2, SO) et (IDG_20 = 2, SO) et (IDG_23 = 2, SO)	Le répondant qui a consommé une fois du cannabis au cours des 12 derniers mois et que cette fois était la seule au cours de la vie	
9	IDGFYCM = ND ou (IDG_05 = NSP, R, ND) ou (IDG_08 = NSP, R, ND) ou (IDG_11 = NSP, R, ND) ou (IDG_14 = NSP, R, ND) ou (IDG_17 = NSP, R, ND) ou (IDG_20 = NSP, R, ND) ou (IDG_23 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul	ND

15) Trouble causé par la consommation de drogues illicites au cours des 12 derniers mois - moyenne

Nom de la variable : IDGDINT

Basée sur : IDG_26A, IDG_6B1, IDG_6B2, IDG_26C, IDG_26D

Description : Cette variable décrit dans quelle mesure la consommation de drogue a perturbé ou troublé les activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une moyenne des cinq items.

Note : Les répondants qui n'ont pas consommé des drogues assez fréquemment ou qui n'ont pas indiqué de problèmes avec les drogues ont été exclus de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99,6	DOIDG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99,6	IDG_26A = SO	Population exclue	SO
99,9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
99,9	(IDG_26A = NSP, R, ND) ou (IDG_6B1 = NSP, R, ND) ou (IDG_6B2 = NSP, R, ND) ou (IDG_26C = NSP, R, ND) ou (IDG_26D = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul	ND
(IDG_26A + IDG_6B1 + IDG_6B2 + IDG_26C + IDG_26D) / 5	(0 <= IDG_26A <= 10) et (0 <= IDG_6B1 <= 10) et (0 <= IDG_6B2 <= 10) et (0 <= IDG_26C <= 10) et (0 <= IDG_26D <= 10)	Degré de trouble = moyenne des cinq items. Le répondant a répondu aux cinq questions	(arrondie à une décimale près) (min : 0,0; max : 10,0)
(IDG_26A + IDG_6B2 + IDG_26C + IDG_26D) / 4	IDG_6B1 = 11 et (0 <= IDG_6B2 <= 10) et (0 <= IDG_26A <= 10) et (0 <= IDG_26C <= 10) et (0 <= IDG_26D <= 10)	Degré de trouble = moyenne de quatre items qui s'appliquent au répondant IDG_6B1 est sans objet	(arrondie à une décimale près) (min : 0,0; max : 10,0)

(IDG_26A + IDG_6B1 + IDG_26C + IDG_26D) / 4	(0 <= IDG_6B1 <= 10) et IDG_6B2 = 11 et (0 <= IDG_26A <= 10) et (0 <= IDG_26C <= 10) et (0 <= IDG_26D <= 10)	Degré de trouble = moyenne de quatre items qui s'appliquent au répondant IDG_6B2 est sans objet	(arrondie à une décimale près) (min : 0,0; max : 10,0)
(IDG_26A + IDG_26C + IDG_26D) / 3	IDG_6B1= 11 et IDG_6B2 = 11 et (0 <= IDG_26A <= 10) et (0 <= IDG_26C <= 10) et (0 <= IDG_26D <= 10)	Degré de trouble = moyenne de trois items qui s'appliquent au répondant IDG_6B1 et IDG_6B2 sont sans objet	(arrondie à une décimale près) (min : 0,0; max : 10,0)

16) Indicateur de perturbation causée par la consommation de drogues illicites - au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : IDGFINT

Basée sur : IDG_26A, IDG_6B1, IDG_6B2, IDG_26C, IDG_26D

Description : Cette variable décrit dans quelle mesure la consommation de drogue a perturbé ou troublé les activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une classification indiquant si la consommation d'alcool perturbe de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires), les activités sociales ou les relations personnelles.

Note : Les répondants qui n'ont pas consommé des drogues assez fréquemment ou qui n'ont pas indiqué de problèmes avec les drogues ont été exclus de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOIDG = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	IDG_26A = SO	Population exclue	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	(4 <= IDG_26A <= 10) ou (4 <= IDG_6B1 <= 10) ou (4 <= IDG_6B2 <= 10) ou (4 <= IDG_26C <= 10) ou (4 <= IDG_26D <= 10)	La consommation de drogue a perturbé significativement les activités routinières, le fonctionnement au travail (dans les études), les activités sociales ou les relations personnelles au cours des 12 derniers mois	
2	(0 <= IDG_26A <= 3) et [(0 <= IDG_6B1 <= 3) ou IDG_6B1 = 11] et [(0 <= IDG_6B2 <= 3) ou IDG_6B2 = 11] et (0 <= IDG_26C <= 3) et (0 <= IDG_26D <= 3)	La consommation de drogue n'a pas perturbé significativement les activités routinières, le fonctionnement au travail (dans les études), les activités sociales ou les relations personnelles au cours des 12 derniers mois	
9	(IDG_26A = NSP, R, ND) ou (IDG_6B1 = NSP, R, ND) ou (IDG_6B2 = NSP, R, ND) ou (IDG_26C = NSP, R, ND) ou (IDG_26D = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul	ND

Revenu (7 VD)

VARIABLE TEMPORAIRE

Ratio du revenu des ménages

Nom de la variable: INCTRAT

Basée sur: INC_3, GEO_PRV, DHHDHSZ, GEOTPSZ

Cette variable dérivée est une variable temporaire utilisée dans le cacul des ratios ajustés (INCDADR). Alors que INCDADR est diffusée dans les fichiers maîtres et de partage, INCTRAT ne l'est pas. Les territoires sont exclus de cette variable dérivée.

Cette variable dérivée est un rapport entre le revenu total du ménage du répondant et le seuil de faible revenu correspondant au nombre de personnes dans le ménage et à la taille de la communauté. Le seuil de faible revenu est le niveau en deçà duquel une famille est susceptible de consacrer une part plus importante de son revenu à l'achat de nécessités comme la nourriture, le logement et l'habillement qu'une famille moyenne.

Cette variable dérivée est produite en 2 étapes distinctes. Un sommaire de ces étapes est fourni ci-dessous.

Étape 1: Les seuils de faible revenu pour chacune des tailles de famille et de communauté ont été obtenus pour l'année de référence 2012 de l'Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR). Dans le cas de l'ESCC, les questions sur le revenu font référence aux 12 derniers mois. Bien que les données de l'enquête aient été recueillies en 2013, au moment où les données devaient être traitées, 2012 était l'année la plus récente pour laquelle les seuils de faible revenu étaient disponibles.

On associe un seuil de faible revenu à tous les répondants (INCTLIC). Ce seuil correspond à la taille du ménage du répondant (DHHDHSZ) et la taille de communauté dans laquelle le répondant vit (GEOTPSZ). Ainsi, 35 combinaisons possibles (7 groupes de taille de ménage multipliés par 5 groupes de taille de communauté) qui pourront être assignés aux répondants. Par exemple, si la taille d'un ménage est de 3 personnes et que la taille de la communauté urbaine dans laquelle le ménage réside est de 47 000 personnes, son INCTLIC sera de 30 976.

Étape 2: Les ratios individuels du revenu du ménage au seuil de faible revenu sont calculés pour chaque ménage à l'intérieur de chacune des tailles de ménage et de communauté en utilisant la variable de taille de ménage DHHDHSZ et la variable de taille de communauté GEOTPSZ. Les ratios sont calculés en divisant le revenu du ménage (INCTINC) par le seuil de faible revenu correspondant (INCTLIC).

Depuis 2013, la valeur maximale pour INCTINC (INC_3) est de 90,000,000$. Depuis 2011, INC_3 est maintenant imputé et INCTINC est maintenant fondé sur INC_3 uniquement. Les valeurs imputées sont maintenant disponibles pour les utilisateurs et entreposées en INC_3. Avant 2011, INCTINC était basé sur INC_3, INCDHH, et des valeurs étaient imputées pour remplacer les valeurs manquantes dans INCDHH. L'imputation était seulement produite pour INCTINC et les valeur imputées pour les valeurs manquantes dans INCDHH n'étaient pas disponible aux utilisateurs.

Un indicateur (INCFIMP4) identifie quelles valeurs ont été imputées.

Les seuils de faible revenu (INCTLIC) provenant de Statistique Canada : « Série de documents de recherche – revenu», Les lignes de faible revenu, 2011-2012, Tableau 2: Seuils de faible revenu (base de 1992) avant impôt. Au catalogue No 75F0002M No 2, juin 2013 .

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
GEOTPSZ			
1	GEODUR = 0	Région rurale	
2	Taille du centre de population (or CMA) < 30 000	Centre de population Moins de 30 000 personnes	
3	30 000 <= Taille du centre de population (or CMA) < 100 000	Centre de population 30 000 à 99 999 personnes	
4	100 000 <= Taille du centre de population (or CMA) < 500 000	Centre de population 100 000 à 499 999 people	
5	Taille du centre de population (or CMA) >= 500 000	Centre de population 500 000 personnes ou plus	
INCTINC			
99999996	GEO_PRV = 60, 61, 62	Résidents des Territoires sont exclus	
99999999	INC_3=99999999	Aucune des questions sur le revenu n'a été déclarée	
0	INC_3<=0	Aucun revenu ou perte de revenu	La valeur 0 est attribuée lorsqu'on enregistre une perte de revenu
INC_3	0 < INC_3 < 99999996	Revenu de ménage précis et positif	
INCTLIC			

16 279	DHHDHSZ = 1 et GEOTPSZ = 1	Seuil de faible revenu lorsque le nombre de personnes dans le ménage = 1 et le groupe de taille de la population = région rurale
20 266	DHHDHSZ = 2 et GEOTPSZ = 1	Seuil de faible revenu lorsque le nombre de personnes dans le ménage = 2 et le groupe de taille de la population = région rurale
24 914	DHHDHSZ = 3 et GEODPSZ = 1	Seuil de faible revenu lorsque le nombre de personnes dans le ménage = 3 et le groupe de taille de la population = région rurale
30 250	DHHDHSZ = 4 et GEOTPSZ = 1	Seuil de faible revenu lorsque le nombre de personnes dans le ménage = 4 et le groupe de taille de la population = région rurale
34 308	DHHDHSZ = 5 et GEOTPSZ = 1	Seuil de faible revenu lorsque le nombre de personnes dans le ménage = 5 et le groupe de taille de la population = région rurale
38 695	DHHDHSZ = 6 et GEOTPSZ = 1	Seuil de faible revenu lorsque le nombre de personnes dans le ménage = 6 et le groupe de taille de la population = région rurale
43 080	DHHDHSZ >= 7 et GEOTPSZ = 1	Seuil de faible revenu lorsque le nombre de personnes dans le ménage >= 7 et le groupe de taille de la population = région rurale
18 520	DHHDHSZ = 1 et GEOTPSZ = 2	Seuil de faible revenu lorsque le nombre de personnes dans le ménage = 1 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants
23 055	DHHDHSZ = 2 et GEOTPSZ = 2	Seuil de faible revenu lorsque le nombre de personnes dans le ménage = 2 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants
28 343	DHHDHSZ = 3 et GEOTPSZ = 2	Seuil de faible revenu lorsque le nombre de personnes dans le ménage = 3 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants
34 414	DHHDHSZ = 4 et GEOTPSZ = 2	Seuil de faible revenu lorsque le nombre de personnes dans le ménage = 4 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants
39 031	DHHDHSZ = 5 et GEOTPSZ = 2	Seuil de faible revenu lorsque le nombre de personnes dans le ménage = 5 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants
44 021	DHHDHSZ = 6 et GEOTPSZ = 2	Seuil de faible revenu lorsque le nombre de personnes dans le ménage = 6 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants
49 010	DHHDHSZ >= 7 et GEOTPSZ = 2	Seuil de faible revenu lorsque le nombre de personnes dans le ménage >= 7 et le groupe de taille de la population = région urbaine - moins de 30 000 habitants
20 240	DHHDHSZ = 1 et GEOTPSZ = 3	Seuil de faible revenu lorsque le nombre de personnes dans le ménage = 1 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants
25 196	DHHDHSZ = 2 et GEOTPSZ = 3	Seuil de faible revenu lorsque le nombre de personnes dans le ménage = 2 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants
30 976	DHHDHSZ = 3 et GEOTPSZ = 3	Seuil de faible revenu lorsque le nombre de personnes dans le ménage = 3 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants
37 610	DHHDHSZ = 4 et GEOTPSZ = 3	Seuil de faible revenu lorsque le nombre de personnes dans le ménage = 4 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants

42 656	DHHDHSZ = 5 et GEOTPSZ = 3	Seuil de faible revenu lorsque le nombre de personnes dans le ménage = 5 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants
48 109	DHHDHSZ = 6 et GEOTPSZ = 3	Seuil de faible revenu lorsque le nombre de personnes dans le ménage = 6 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants
53 562	DHHDHSZ >= 7 et GEOTPSZ = 3	Seuil de faible revenu lorsque le nombre de personnes dans le ménage >= 7 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 30 000 - 99 999 habitants
20 366	DHHDHSZ = 1 et GEOTPSZ = 4	Seuil de faible revenu lorsque le nombre de personnes dans le ménage = 1 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants
25 353	DHHDHSZ = 2 et GEOTPSZ = 4	Seuil de faible revenu lorsque le nombre de personnes dans le ménage = 2 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants
31 168	DHHDHSZ = 3 et GEOTPSZ = 4	Seuil de faible revenu lorsque le nombre de personnes dans le ménage = 3 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants
37 843	DHHDHSZ = 4 et GEOTPSZ = 4	Seuil de faible revenu lorsque le nombre de personnes dans le ménage = 4 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants
42 920	DHHDHSZ = 5 et GEOTPSZ = 4	Seuil de faible revenu lorsque le nombre de personnes dans le ménage = 5 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants
48 408	DHHDHSZ = 6 et GEOTPSZ = 4	Seuil de faible revenu lorsque le nombre de personnes dans le ménage = 6 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants
53 894	DHHDHSZ >= 7 et GEOTPSZ = 4	Seuil de faible revenu lorsque le nombre de personnes dans le ménage >= 7 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 100 000 - 499 999 habitants
23 647	DHHDHSZ = 1 et GEOTPSZ = 5	Seuil de faible revenu lorsque le nombre de personnes dans le ménage = 1 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus
29 440	DHHDHSZ = 2 et GEOTPSZ = 5	Seuil de faible revenu lorsque le nombre de personnes dans le ménage = 2 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus
36 193	DHHDHSZ = 3 et GEOTPSZ = 5	Seuil de faible revenu lorsque le nombre de personnes dans le ménage = 3 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus
43 942	DHHDHSZ = 4 et GEOTPSZ = 5	Seuil de faible revenu lorsque le nombre de personnes dans le ménage = 4 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus
49 839	DHHDHSZ = 5 et GEOTPSZ = 5	Seuil de faible revenu lorsque le nombre de personnes dans le ménage = 5 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus
56 209	DHHDHSZ = 6 et GEOTPSZ = 5	Seuil de faible revenu lorsque le nombre de personnes dans le ménage = 6 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus

62 581	DHHDHSZ >= 7 et GEOTPSZ = 5	Seuil de faible revenu lorsque le nombre de personnes dans le ménage >= 7 et le groupe de taille de la population = région urbaine - 500 000 habitants ou plus	
INCTRAT			
9999.999999996	INCTINC = 99999996	Résidents des territoires sont exclus	9 décimales
9999.999999999	INCTINC = 99999999	Le ratio ne peut pas être calculé car le revenu de ménage n'a pas été déclaré	9 décimales
INCTINC / INCTLIC	INCTINC ne 99999996,99999999	Ratio individuel du revenu du ménage au seuil de faible revenu correspondant à la taille du ménage et la taille de la communauté. Le maximum du ratio est basé sur le revenu de ménage maximal accepté qui est de 90 000 000 $	9 décimales; min: 0, max: 5530

1) Indicateur d'imputation du revenu

Nom de la variable : INCFIMP4

Basée sur : INC_3

Description : L'indicateur signale si la valeur de INC_3 a été imputée, et dans ce cas, si l'imputation était basée sur un intervalle de revenu du ménage complet (réponse complète à INC_5A à INC_5C), sur aucun intervalle de revenu du ménage (aucune réponse aux questions INC_5A à INC_5C) ou sur un intervalle de revenu du ménage partiel (réponse partielle aux questions INC_5A à INC_5C)

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1		Rapporté par le répondant (aucune imputation)	
2		Imputé - intervalle de revenu entièrement complétée	
3		Imputé - sans intervalle de revenu	
4		Imputé - intervalle de revenu partiellement complétée	

2) Revenu total du ménage - de toutes sources

Nom de la variable : INCDHH

Basée sur : INC_3

Description : Cette variable regroupe le revenu total du ménage en provenance de toutes les sources. Antérieurement, l'application attribuait une catégorie d'intervalle de valeurs aux répondants qui indiquaient un montant exact à la question INC_3. À compter de 2011, la catégorie supérieure est passée de 100 000 $ à 150 000 $. Les territoires sont exclus de cette variable dérivée.

Note : La valeur de INC_3 a été imputée et les valeurs dans INCDHH sont maintenant fondées sur INC_3 uniquement. Avant la collecte des données de 2011, la catégorie 1 de INCDHH était fondée sur INC_3. Toutes les autres catégories étaient fondées sur ces catégories d'intervalle de valeurs (INC_5B, INC_5C).

À compter de l'année de référence 2011, la variable de revenu du ménage fait l'objet d'une imputation. Les valeurs qui manquent (parce que le répondant a refusé de répondre ou parce qu'il ne connaissait pas le revenu du ménage) sont imputées en utilisant des méthodes statistiques. La principale variable d'intérêt est INC_3 : « Revenu total du ménage - meilleure estimation », mais toutes les variables qui sont dérivées en se fondant sur le revenu sont également affectées. Les variables de revenu, ainsi qu'un indicateur d'imputation (INCFIMP4) signalant quelles valeurs ont été imputées sont fournis dans le fichier de données.

L'imputation est un processus en deux étapes. Premièrement, on impute les valeurs des observations qui donnent l'intervalle de valeurs du revenu INC_5 à l'intérieur de cet intervalle. Une approche fondée sur la méthode du plus proche voisin est utilisée pour trouver un répondant ayant des caractéristiques comparables à celles du non-répondant qui « donne »

sa valeur de revenu au non-répondant. Pour les observations qui ne fournissent pas un intervalle de valeurs, on utilise un processus semblable, mais les valeurs des donneurs ne sont pas limitées à l'intervalle.

Pour obtenir plus d'information au sujet du processus d'imputation, reportez-vous au document qui a pour titre « L'imputation du revenu pour l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes », en envoyant votre demande à hd-ds@statcan.gc.ca

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99	(INC_3 in (DK,RF,NS)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) aux questions sur le revenu	ND
1	INC_3 <= 0	Aucun revenu ou perte de revenu	La valeur 0 est attribuée lorsqu'on enregistre une perte de revenu.
2	0 < INC_3 < 5000	Moins de 5 000 $	
3	4999 < INC_3 < 10000	De 5 000 $ à 9 999 $	
4	9999 < INC_3 < 15000	De 10 000 $ à 14 999 $	
5	14999 < INC_3 < 20000	De 15 000 $ à 19 999 $	
6	19999 < INC_3 < 30000	De 20 000 $ à 29 999 $	
7	29999 < INC_3 < 40000	De 30 000 $ à 39 999 $	
8	39999 < INC_3 < 50000	De 40 000 $ à 49 999 $	
9	49999 < INC_3 < 60000	De 50 000 $ à 59 999 $	
10	59999 < INC_3 < 70000	De 60 000 $ à 69 999 $	
11	69999 < INC_3 < 80000	De 70 000 $ à 79 999 $	
12	79999 < INC_3 < 90000	De 80 000 $ à 89 999 $	
13	89999 < INC_3 < 100000	De 90 000 $ à 99 999 $	
14	99999 < INC_3 < 150000	100 000 $ à moins de 150 000 $	
15	149999 < INC_3	150 000 $ ou plus	
99	Sinon	Le répondant n'a pas donné suffisamment de renseignements pour qu'on puisse le classer	ND

3) Revenu personnel - de toutes sources

Nom de la variable : INCDPER

Basée sur : INC_8A, INC_8B, INC_8C, INC_8D

Description : Cette variable détermine le revenu personnel du répondant provenant de toutes sources. Une catégorie d'intervalle a été pré-assignée par l'application aux répondants qui ont fourni un montant exact à la question INC_8A. Les territoires sont exclus de cette variable dérivée.

Note : Les répondants de moins de 18 ans ont été exclus de cette population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DHH_AGE <= 17	Populations exclues	SO
14	DHHTHSZ = 1 et INCDHH = 15	La taille de ménage est 1 et le revenu du ménage est de 150,000 $ et plus.	

INCDHH	DHHDHSZ = 1 and INCDHH <15	La valeur pour INCDHH est utilisée quand le répondant fait partie d'un ménage d'une seule personne.	
99	(INC_8B = 7,8,9) ou (INC_8C = 97,98,99) ou (INC_8D = 97,98,99)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) aux questions sur le revenu	ND
1	INC_8A <= 0	Aucun revenu ou perte de revenu	La valeur 0 est attribuée lorsqu'on enregistre une perte de revenu.
2	INC_8C = 1	Moins de 5 000 $	
3	INC_8C = 2	De 5 000 $ à 9 999 $	
4	INC_8C = 3	De 10 000 $ à 14 999 $	
5	INC_8C = 4	De 15 000 $ à 19 999 $	
6	INC_8C = 5 ou 6	De 20 000 $ à 29 999 $	
7	INC_8D = 1	De 30 000 $ à 39 999 $	
8	INC_8D = 2	De 40 000 $ à 49 999 $	
9	INC_8D = 3	De 50 000 $ à 59 999 $	
10	INC_8D = 4	De 60 000 $ à 69 999 $	
11	INC_8D = 5	De 70 000 $ à 79 999 $	
12	INC_8D = 6	De 80 000 $ à 89 999 $	
13	INC_8D = 7	De 90 000 $ à 99 999 $	
14	INC_8D = 8	De 100,000 $ et plus	
99	Sinon	Le répondant n'a pas donné suffisamment de renseignements pour qu'on puisse le classer	ND

4) Ratio ajusté du revenu du ménage - Échelle nationale

Nom de la variable : INCDADR

Basée sur : INCTRAT (Ratio du revenu du ménage au seuil de faible revenu)

Description : Les ratios ajustés du revenu du ménage au seuil de faible revenu sont obtenus en divisant les ratios originaux (INCTRAT) par le ratio le plus élevé parmi tous les répondants de l'enquête. Ceci résulte en des ratios inférieurs ou égaux à 1. Les territoires sont exclus de cette variable dérivée.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9,999999996	INCTRAT = 99,999999996	Résidents des territoires sont exclus	SO (9 décimales)
9,999999999	INCTRAT = 99,999999999	Le ratio ne peut pas être calculé car le revenu de ménage n'a pas été déclaré.	ND (9 décimales)
0 - 1	INCTRAT / Max ratio parmi tous les répondants	Ratio entre 0 et 1 correspondant au revenu du ménage et au seuil correspondant de faible revenu divisé par le ratio le plus élevé parmi tous les répondants	(arrondi à 9 décimales près)

5) Distribution du revenu du ménage - Échelle nationale

Nom de la variable : INCDRCA

Basée sur : INCDADR

Description : Cette variable dérivée est une distribution des répondants en déciles (dix catégories comprenant à peu près le même pourcentage de Canadiens dans chacune des provinces) basée sur leur valeur à INCDADR c'est-à-dire le ratio ajusté du revenu total de leur ménage au seuil de faible revenu correspondant aux tailles de leur ménage et de leur communauté. Elle fournit, pour chaque répondant, une comparaison proportionnelle du revenu de leur ménage à l'ensemble des revenus des ménages répondants.

Note : Les déciles sont produits à partir de données pondérées. Les ratios ajustés sont présentés par ordre croissant, du plus petit au plus grand, pour l'ensemble des 10 provinces sans égard à la taille du ménage et de la communauté. Les variables dérivées ne sont calculées que pour les réponses valides (non déclaré, refus et ne sait pas sont exclus). Du nombre total pondéré de cas pour lesquels des variables dérivées sont calculées, des bornes sont déterminées pour dériver des déciles. Les territoires sont exclus de cette variable dérivée.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	Résidents des Territoires sont exclus	Sans objet	SO
99	INCDADR = 9,999999999	Non déclaré	ND
1	Premier 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDADR)	Décile 1	
2	Deuxième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDADR)	Décile 2	
3	Troisième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDADR)	Décile 3	
4	Quatrième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDADR)	Décile 4	
5	Cinquième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDADR)	Décile 5	
6	Sixième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDADR)	Décile 6	
7	Septième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDADR)	Décile 7	
8	Huitième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDADR)	Décile 8	
9	Neuvième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDADR)	Décile 9	
10	Dixième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDADR)	Décile 10	

6) Distribution du revenu du ménage - Échelle provinciale

Nom de la variable : INCDRPR

Basée sur : INCDADR, GEO_PRV

Description : Cette variable dérivée est une distribution des résidents de chacune des provinces en déciles (dix catégories comprenant à peu près le même pourcentage de résidents pour chaque province) basée sur leur valeur à INCDADR c'est-à-dire le ratio ajusté du revenu total de leur ménage au seuil de faible revenu correspondant aux tailles de leur ménage et de leur communauté. Elle fournit, pour chaque répondant, une comparaison proportionnelle du revenu de leur ménage à l'ensemble des revenus des ménages répondants de la même province. Les territoires sont exclus de cette variable dérivée.

Note : Les déciles sont produits à partir de données pondérées. Les ratios ajustés sont présentés par ordre croissant, du plus petit au plus grand, pour l'ensemble des 10 provinces sans égard à la taille du ménage et de la communauté. Les variables dérivées ne sont calculées que pour les réponses valides (non déclaré, refus, etc. sont exclus). Du nombre total pondéré de cas pour lesquels des variables dérivées sont calculées, des bornes sont déterminées pour dériver des déciles.

Les valeurs de INCDRPR sont basées sur une distribution des ratios ajustés des résidents de chacune des 10 provinces. Cette variable devrait donc être utilisée de pair avec la variable de province de résidence (GEO_PRV).

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	Résidents des territoires sont exclus	Sans objet	SO
99	INCDADR = 9,999999999	Non déclaré	ND
1	Premier 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDADR)	Décile 1	
2	Deuxième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDADR)	Décile 2	
3	Troisième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDADR)	Décile 3	
4	Quatrième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDADR)	Décile 4	
5	Cinquième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDADR)	Décile 5	
6	Sixième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDADR)	Décile 6	
7	Septième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDADR)	Décile 7	
8	Huitième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDADR)	Décile 8	
9	Neuvième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDADR)	Décile 9	
10	Dixième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDADR)	Décile 10	

7) Distribution du revenu des ménages - Échelle de la région sociosanitaire

Nom de la variable : INCDRRS

Basée sur : INCDADR, GEO_DHR4

Description : Cette variable dérivée est une distribution des résidents de chacune des régions sociosanitaires en déciles (dix catégories comprenant à peu près le même pourcentage de résidents pour chaque province) basée sur leur valeur à INCDADR c'est-à-dire le ratio ajusté du revenu total de leur ménage au seuil de faible revenu correspondant aux tailles de leur ménage et de leur communauté. Elle fournit, pour chaque répondant, une comparaison proportionnelle du revenu de leur ménage à l'ensemble des revenus des ménages répondants de la même région sociosanitaire. Les territoires sont exclus de cette variable dérivée.

Note : Les déciles sont produits à partir de données pondérées. Les ratios ajustés sont présentés par ordre croissant, du plus petit au plus grand, pour l'ensemble des 117 régions sociosanitaires provinces sans égard à la taille du ménage et de la communauté. Les variables dérivées ne sont calculées que pour les réponses valides (non déclaré, refus, etc. sont exclus). Du nombre total pondéré de cas pour lesquels des variables dérivées sont calculées, des bornes sont déterminées pour dériver des déciles.

Les valeurs de INCDRRS sont basées sur une distribution des ratios ajustés des résidents de chacune des 122 régions sociosanitaires. Cette variable devrait donc être utilisée de pair avec la variable de région sociosanitaire de résidence (GEO_DHR4).

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	Résidents des Territoires sont exclus	Sans objet	SO
99	INCDADR = 9,999999999	Non déclaré	ND
1	Premier 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDADR)	Décile 1	
2	Deuxième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDADR)	Décile 2	
3	Troisième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDADR)	Décile 3	
4	Quatrième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDADR)	Décile 4	
5	Cinquième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDADR)	Décile 5	
6	Sixième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDADR)	Décile 6	
7	Septième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDADR)	Décile 7	
8	Huitième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDADR)	Décile 8	
9	Neuvième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDADR)	Décile 9	
10	Dixième 10 % des répondants de la liste ascendante des ratios ajustés (INCDADR)	Décile 10	

Blessures (4 VD)

Reformatage temporaire			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
INWTSIC			
LBSCSIC	If INW_1 = 1 then INWTSIC = LBSCSIC sinon INWTSIC = INWCSIC		
INWTSOC			

1) Genre de blessure selon la partie du corps

Nom de la variable : INJDTBS

Basée sur : INJ_05, INJ_06, INJ_07

Description : Cette variable catégorise la blessure selon la partie du corps.

Note : Cette variable est dérivée en créant une matrice de toutes les réponses possibles à la question INJ_05 (genre de blessure) et de toutes les réponses possibles aux questions INJ_06 et INJ_07 (partie du corps atteinte). Un code unique a été attribué à chaque combinaison de la matrice, sauf aux combinaisons impossibles (p. ex., dislocation des yeux).
Il est à noter que la catégorie de réponse "main-poignet" est, depuis 2003, divisée en deux catégories séparées (INJ_06 = 7 et INJ_07 = 8). Celles-ci doivent être fusionnées pour comparer les résultats de 2003 à ceux des périodes de références précédentes.
Les répondants qui n'ont pas subi de blessures au cours des 12 mois ayant précédé l'entrevue ont été exclus de la population.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
9996	DOINJ = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9996	INJ_01=2	Population exclue	SO
9999	(INJ_05=NSP, R, ND) ou (INJ_06=NSP, R, ND) ou (INJ_07=NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
9999	[(INJ_05=2, 4, 5) et INJ_06=2] ou [INJ_05=4 et INJ_06=10]	Combinaison impossible (fractures - yeux dislocation - yeux entorse ou foulure - yeux dislocation - cuisse)	ND
101	INJ_05=1 et INJ_06=1	Blessures multiples - parties multiples	
102	INJ_05=1 et INJ_06=2	Blessures multiples - yeux	
103	INJ_05=1 et INJ_06=3	Blessures multiples - tête (sauf les yeux)	
104	INJ_05=1 et INJ_06=4	Blessures multiples - cou	
105	INJ_05=1 et INJ_06=5	Blessures multiples - épaule, bras	
106	INJ_05=1 et INJ_06=6	Blessures multiples - coude, avant-bras	
108	INJ_05=1 et INJ_06=9	Blessures multiples - hanche	
109	INJ_05=1 et INJ_06=10	Blessures multiples - cuisse	

110	INJ_05=1 et INJ_06=11	Blessures multiples - genou, partie inférieure de la jambe
111	INJ_05=1 et INJ_06=12	Blessures multiples - cheville, pied
112	INJ_05=1 et INJ_06=13	Blessures multiples - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale
113	INJ_05=1 et INJ_06=14	Blessures multiples - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale
114	INJ_05=1 et INJ_06=15	Blessures multiples - cage thoracique (sauf le dos et la colonne vertébrale)
115	INJ_05=1 et INJ_06=16	Blessures multiples - abdomen ou pelvis (sauf le dos et la colonne vertébrale)
117	INJ_05=1 et INJ_06=7	Blessures multiples - poignet
118	INJ_05=1 et INJ_06=8	Blessures multiples - main
201	INJ_05=2 et INJ_06=1	Fractures - parties multiples
203	INJ_05=2 et INJ_06=3	Fractures - tête (sauf les yeux)
204	INJ_05=2 et INJ_06=4	Fractures - cou
205	INJ_05=2 et INJ_06=5	Fractures - épaule, bras
206	INJ_05=2 et INJ_06=6	Fractures - coude, avant-bras
208	INJ_05=2 et INJ_06=9	Fractures - hanche
209	INJ_05=2 et INJ_06=10	Fractures - cuisse
210	INJ_05=2 et INJ_06=11	Fractures - genou, partie inférieure de la jambe
211	INJ_05=2 et INJ_06=12	Fractures - cheville, pied
212	INJ_05=2 et INJ_06=13	Fractures - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale
213	INJ_05=2 et INJ_06=14	Fractures - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale
214	INJ_05=2 et INJ_06=15	Fractures - cage thoracique (sauf le dos et la colonne vertébrale)
215	INJ_05=2 et INJ_06=16	Fractures - abdomen ou pelvis (sauf le dos ou la colonne vertébrale)
217	INJ_05=2 et INJ_06=7	Fractures - poignet
218	INJ_05=2 et INJ_06=8	Fractures - main
301	INJ_05=3 et INJ_06=1	Brûlé ou ébouillanté - parties multiples
302	INJ_05=3 et INJ_06=2	Brûlé ou ébouillanté - yeux
303	INJ_05=3 et INJ_06=3	Brûlé ou ébouillanté - tête (sauf les yeux)

304	INJ_05=3 et INJ_06=4	Brûlé ou ébouillanté - cou
305	INJ_05=3 et INJ_06=5	Brûlé ou ébouillanté - épaule, bras
306	INJ_05=3 et INJ_06=6	Brûlé ou ébouillanté - coude, avant-bras
308	INJ_05=3 et INJ_06=9	Brûlé ou ébouillanté - hanche
309	INJ_05=3 et INJ_06=10	Brûlé ou ébouillanté - cuisse
310	INJ_05=3 et INJ_06=11	Brûlé ou ébouillanté - genou, partie inférieure de la jambe
311	INJ_05=3 et INJ_06=12	Brûlé ou ébouillanté - cheville, pied
312	INJ_05=3 et INJ_06=13	Brûlé ou ébouillanté - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale
313	INJ_05=3 et INJ_06=14	Brûlé ou ébouillanté - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale
314	INJ_05=3 et INJ_06=15	Brûlé ou ébouillanté - cage thoracique (à l'exclusion du dos et de la colonne vertébrale)
315	INJ_05=3 et INJ_06=16	Brûlé ou ébouillanté - abdomen ou pelvis (sauf le dos et la colonne vertébrale)
317	INJ_05=3 et INJ_06=7	Brûlé ou ébouillanté - poignet
318	INJ_05=3 et INJ_06=8	Brûlé ou ébouillanté - main
401	INJ_05=4 et INJ_06=1	Dislocation - parties multiples
403	INJ_05=4 et INJ_06=3	Dislocation - tête (sauf les yeux)
404	INJ_05=4 et INJ_06=4	Dislocation - cou
405	INJ_05=4 et INJ_06=5	Dislocation - épaule, bras
406	INJ_05=4 et INJ_06=6	Dislocation - coude, avant-bras
408	INJ_05=4 et INJ_06=9	Dislocation - hanche
410	INJ_05=4 et INJ_06=11	Dislocation - genou, partie inférieure de la jambe
411	INJ_05=4 et INJ_06=12	Dislocation - cheville, pied
412	INJ_05=4 et INJ_06=13	Dislocation - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale
413	INJ_05=4 et INJ_06=14	Dislocation - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale
414	INJ_05=4 et INJ_06=15	Dislocation - cage thoracique (à l'exclusion du dos et de la colonne vertébrale)
415	INJ_05=4 et INJ_06=16	Dislocation - abdomen ou pelvis (sauf le dos et la colonne vertébrale)
417	INJ_05=4 et INJ_06=7	Dislocation - poignet

418	INJ_05=4 et INJ_06=8	Dislocation - main
501	INJ_05=5 et INJ_06=1	Entorse ou foulure - parties multiples
503	INJ_05=5 et INJ_06=3	Entorse ou foulure - tête (sauf les yeux)
504	INJ_05=5 et INJ_06=4	Entorse ou foulure - cou
505	INJ_05=5 et INJ_06=5	Entorse ou foulure - épaule, bras
506	INJ_05=5 et INJ_06=6	Entorse ou foulure - coude, avant-bras
508	INJ_05=5 et INJ_06=9	Entorse ou foulure - hanche
509	INJ_05=5 et INJ_06=10	Entorse ou foulure - cuisse
510	INJ_05=5 et INJ_06=11	Entorse ou foulure - genou, partie inférieure de la jambe
511	INJ_05=5 et INJ_06=12	Entorse ou foulure - cheville, pied
512	INJ_05=5 et INJ_06=13	Entorse ou foulure - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale
513	INJ_05=5 et INJ_06=14	Entorse ou foulure - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale
514	INJ_05=5 et INJ_06=15	Entorse ou foulure - cage thoracique (à l'exclusion du dos et de la colonne vertébrale)
515	INJ_05=5 et INJ_06=16	Entorse ou foulure - abdomen ou pelvis (sauf le dos et la colonne vertébrale)
517	INJ_05=5 et INJ_06=7	Entorse ou foulure - poignet
518	INJ_05=5 et INJ_06=8	Entorse ou foulure - main
601	INJ_05=6 et INJ_06=1	Coupure, perforation, morsure d'animal - parties multiples
602	INJ_05=6 et INJ_06=2	Coupure, perforation, morsure d'animal - yeux
603	INJ_05=6 et INJ_06=3	Coupure, perforation, morsure d'animal - tête (sauf les yeux)
604	INJ_05=6 et INJ_06=4	Coupure, perforation, morsure d'animal - cou
605	INJ_05=6 et INJ_06=5	Coupure, perforation, morsure d'animal - épaule, bras
606	INJ_05=6 et INJ_06=6	Coupure, perforation, morsure d'animal - coude, avant-bras
608	INJ_05=6 et INJ_06=9	Coupure, perforation, morsure d'animal - hanche
609	INJ_05=6 et INJ_06=10	Coupure, perforation, morsure d'animal - cuisse
610	INJ_05=6 et INJ_06=11	Coupure, perforation, morsure d'animal - genou, partie inférieure de la jambe
611	INJ_05=6 et INJ_06=12	Coupure, perforation, morsure d'animal - cheville, pied

612	INJ_05=6 et INJ_06=13	Coupure, perforation, morsure d'animal - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale
613	INJ_05=6 et INJ_06=14	Coupure, perforation, morsure d'animal - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale
614	INJ_05=6 et INJ_06=15	Coupure, perforation, morsure d'animal - cage thoracique (à l'exclusion du dos et de la colonne vertébrale)
615	INJ_05=6 et INJ_06=16	Coupure, perforation, morsure d'animal - abdomen ou pelvis (sauf le dos et la colonne vertébrale)
617	INJ_05=6 et INJ_06=7	Coupure, perforation, morsure d'animal - poignet
618	INJ_05=6 et INJ_06=8	Coupure, perforation, morsure d'animal - main
701	INJ_05=7 et INJ_06=1	Éraflure, meurtrissure, cloque - parties multiples
702	INJ_05=7 et INJ_06=2	Éraflure, meurtrissure, cloque - yeux
703	INJ_05=7 et INJ_06=3	Éraflure, meurtrissure, cloque - tête (sauf les yeux)
704	INJ_05=7 et INJ_06=4	Éraflure, meurtrissure, cloque - cou
705	INJ_05=7 et INJ_06=5	Éraflure, meurtrissure, cloque - épaule, bras
706	INJ_05=7 et INJ_06=6	Éraflure, meurtrissure, cloque - coude, avant-bras
708	INJ_05=7 et INJ_06=9	Éraflure, meurtrissure, cloque - hanche
709	INJ_05=7 et INJ_06=10	Éraflure, meurtrissure, cloque - cuisse
710	INJ_05=7 et INJ_06=11	Éraflure, meurtrissure, cloque - genou, partie inférieure de la jambe
711	INJ_05=7 et INJ_06=12	Éraflure, meurtrissure, cloque - cheville, pied
712	INJ_05=7 et INJ_06=13	Éraflure, meurtrissure, cloque - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale
713	INJ_05=7 et INJ_06=14	Éraflure, meurtrissure, cloque - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale
714	INJ_05=7 et INJ_06=15	Éraflure, meurtrissure, cloque - cage thoracique (à l'exclusion du dos et de la colonne vertébrale)
715	INJ_05=7 et INJ_06=16	Éraflure, meurtrissure, cloque - abdomen ou pelvis (sauf le dos et la colonne vertébrale)
717	INJ_05=7 et INJ_06=7	Éraflure, meurtrissure, cloque - poignet
718	INJ_05=7 et INJ_06=8	Éraflure, meurtrissure, cloque - main
800	INJ_05=8	Commotion ou autre traumatisme cérébral - Tête (sauf les yeux)
900	INJ_05=9	Empoisonnement - effet systémique
1014	INJ_05=10 et INJ_07=1	Lésion des organes internes - poitrine (cage thoracique)
1015	INJ_05=10 et INJ_07=2	Lésion des organes internes - abdomen ou pelvis (en dessous des côtes)

1016	INJ_05=10 et INJ_07=3	Lésion des organes internes - autre partie
1101	INJ_05=11 et INJ_06=1	Autre blessure - parties multiples
1102	INJ_05=11 et INJ_06=2	Autre blessure - yeux
1103	INJ_05=11 et INJ_06=3	Autre blessure - tête (sauf les yeux)
1104	INJ_05=11 et INJ_06=4	Autre blessure - cou
1105	INJ_05=11 et INJ_06=5	Autre blessure - épaule, bras
1106	INJ_05=11 et INJ_06=6	Autre blessure - coude, avant-bras
1108	INJ_05=11 et INJ_06=9	Autre blessure - hanche
1109	INJ_05=11 et INJ_06=10	Autre blessure - cuisse
1110	INJ_05=11 et INJ_06=11	Autre blessure - genou, partie inférieure de la jambe
1111	INJ_05=11 et INJ_06=12	Autre blessure - cheville, pied
1112	INJ_05=11 et INJ_06=13	Autre blessure - partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale
1113	INJ_05=11 et INJ_06=14	Autre blessure - partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale
1114	INJ_05=11 et INJ_06=15	Autre blessure - cage thoracique (à l'exclusion du dos et de la colonne vertébrale)
1115	INJ_05=11 et INJ_06=16	Autre blessure - abdomen ou pelvis (sauf le dos et la colonne vertébrale)
1117	INJ_05=11 et INJ_06=7	Autre blessure - poignet
1118	INJ_05=11 et INJ_06=8	Autre blessure - main

2) Cause de la blessure

Nom de la variable : INJDCAU

Basée sur : INJ_10, INJ_12

Description : Cette variable indique la cause de la blessure du répondant.

Note : Les répondants qui n'ont pas subi de blessures au cours des 12 mois ayant précédé l'entrevue ont été exclus de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DOINJ = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
96	INJ_01= 2 ou INJ_10 = 6	Population exclue	SO

99	(INJ_10 = 2, NSP, R, ND) et (INJ_12 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une des questions nécessaires	ND
1	INJ_10 = 1	Chute (sauf transport)	
2	INJ_12 = 1	Accident de transport	
3	INJ_12 = 2	Frappé, poussé, mordu, etc. accidentellement par une personne ou par un animal	
4	INJ_12 = 3	Heurté ou écrasé accidentellement	
5	INJ_12 = 4	Contact accidentel avec une machine, un objet ou un outil tranchant	
6	INJ_12 = 5	Fumée, feu, flammes	
7	INJ_12 = 6	Contact accidentel avec un objet, un liquide ou un gaz chaud	
8	INJ_12 = 7	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle	
9	INJ_12 = 8	Exercice trop intensif ou mouvement ardu	
10	INJ_12 = 9	Agression	
11	INJ_12 = 10	Autre	

3) Cause de la blessure, selon le lieu où la blessure s'est produite

Nom de la variable : INJDCBP

Basée sur : INJ_08, INJDCAU

Description : Cette variable catégorise la cause de la blessure selon le lieu où la blessure s'est produite.

Note : Cette variable est dérivée en créant une matrice de toutes les réponses possibles à la variable INJDCAU (cause de la blessure) et de toutes les réponses possibles à la question INJ_08 (cause de la blessure selon le lieu où la blessure s'est produite). La catégorie « Autre cause de blessure » peut inclure des accidents tels que ceux causés par un courant électrique, une arme à feu et un remonte-pente. Les répondants qui n'ont pas subi de blessures au cours des 12 mois ayant précédé l'entrevue ont été exclus de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9996	DOINJ = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9996	INJ_01 = 2 ou INJDCAU = 96	Population exclue	SO
9999	(INJ_08 = NSP, R, ND) ou INJDCAU=ND	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une des questions nécessaires	ND
100	INJDCAU=1 et INJ_08=1	Chute - maison	
110	INJDCAU=1 et INJ_08=2	Chute - établissement résidentiel	
120	INJDCAU=1 et INJ_08=3	Chute - école, collège, université (sauf les lieux de sport)	
130	INJDCAU=1 et INJ_08=6	Chute - autre établissement	
141	INJDCAU=1 et INJ_08=4	Chute - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège, ou d'une université	

142	INJDCAU=1 et INJ_08=5	Chute - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université)
150	INJDCAU=1 et INJ_08=7	Chute - rue, autoroute, trottoir
160	INJDCAU=1 et INJ_08=8	Chute - zone commerciale
170	INJDCAU=1 et INJ_08=9	Chute - zone industrielle ou de construction
180	INJDCAU=1 et INJ_08=10	Chute - exploitation agricole
191	INJDCAU=1 et INJ_08=11	Chute - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc.
192	INJDCAU=1 et INJ_08=12	Chute - autre
200	INJDCAU=2 et INJ_08=1	Transport - maison
210	INJDCAU=2 et INJ_08=2	Transport - établissement résidentiel
220	INJDCAU=2 et INJ_08=3	Transport - école, collège, université (sauf les lieux de sport)
230	INJDCAU=2 et INJ_08=6	Transport - autre établissement
241	INJDCAU=2 et INJ_08=4	Transport - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université
242	INJDCAU=2 et INJ_08=5	Transport - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université)
250	INJDCAU=2 et INJ_08=7	Transport - rue, autoroute, trottoir
260	INJDCAU=2 et INJ_08=8	Transport - zone commerciale
270	INJDCAU=2 et INJ_08=9	Transport - zone industrielle ou de construction
280	INJDCAU=2 et INJ_08=10	Transport - exploitation agricole
291	INJDCAU=2 et INJ_08=11	Transport - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc.
292	INJDCAU=2 et INJ_08=12	Transport - autre
300	INJDCAU=3 et INJ_08=1	Frappé, poussé, mordu - maison
310	INJDCAU=3 et INJ_08=2	Frappé, poussé, mordu - établissement résidentiel
320	INJDCAU=3 et INJ_08=3	Frappé, poussé, mordu - école, collège, université (sauf les lieux de sport)
330	INJDCAU=3 et INJ_08=6	Frappé, poussé, mordu - autre établissement
341	INJDCAU=3 et INJ_08=4	Frappé, poussé, mordu - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université
342	INJDCAU=3 et INJ_08=5	Frappé, poussé, mordu - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université)

350	INJDCAU=3 et INJ_08=7	Frappé, poussé, mordu - rue, autoroute, trottoir
360	INJDCAU=3 et INJ_08=8	Frappé, poussé, mordu - zone commerciale
370	INJDCAU=3 et INJ_08=9	Frappé, poussé, mordu - zone industrielle ou de construction
380	INJDCAU=3 et INJ_08=10	Frappé, poussé, mordu - exploitation agricole
391	INJDCAU=3 et INJ_08=11	Frappé, poussé, mordu - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc.
392	INJDCAU=3 et INJ_08=12	Frappé, poussé, mordu - autre
400	INJDCAU=4 et INJ_08=1	Frappé, écrasé (objet) - maison
410	INJDCAU=4 et INJ_08=2	Frappé, écrasé (objet) - établissement résidentiel
420	INJDCAU=4 et INJ_08=3	Frappé, écrasé (objet) - école, collège, université (sauf les lieux de sport)
430	INJDCAU=4 et INJ_08=6	Frappé, écrasé (objet) - autre établissement
441	INJDCAU=4 et INJ_08=4	Frappé, écrasé (objet) - lieu de sport ou d'athlétisme d’une école, d’un collège ou d’une université
442	INJDCAU=4 et INJ_08=5	Frappé, écrasé (objet) - lieu de sport ou d’athlétisme (autre que ceux d’une école, d’un collège, ou d’une université)
450	INJDCAU=4 et INJ_08=7	Frappé, écrasé (objet) - rue, autoroute, trottoir
460	INJDCAU=4 et INJ_08=8	Frappé, écrasé (objet) - zone commerciale
470	INJDCAU=4 et INJ_08=9	Frappé, écrasé (objet) - zone industrielle ou de construction
480	INJDCAU=4 et INJ_08=10	Frappé, écrasé (objet) - exploitation agricole
491	INJDCAU=4 et INJ_08=11	Frappé, écrasé (objet) - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc.
492	INJDCAU=4 et INJ_08=12	Frappé, écrasé (objet) - autre
500	INJDCAU=5 et INJ_08=1	Contact, objet tranchant - maison
510	INJDCAU=5 et INJ_08=2	Contact, objet tranchant - établissement résidentiel
520	INJDCAU=5 et INJ_08=3	Contact, objet tranchant - école, collège, université (sauf les lieux de sport)
530	INJDCAU=5 et INJ_08=6	Contact, objet tranchant - autre établissement
541	INJDCAU=5 et INJ_08=4	Contact, objet tranchant - lieu de sport ou d’athlétisme d’une école, d’un collège ou d’une université
542	INJDCAU=5 et INJ_08=5	Contact, objet tranchant - lieu de sport ou d’athlétisme (autre que ceux d’une école, d’un collège, ou d’une université)
550	INJDCAU=5 et INJ_08=7	Contact, objet tranchant - rue, autoroute, trottoir

560	INJDCAU=5 et INJ_08=8	Contact, objet tranchant - zone commerciale
570	INJDCAU=5 et INJ_08=9	Contact, objet tranchant - zone industrielle ou de construction
580	INJDCAU=5 et INJ_08=10	Contact, objet tranchant - exploitation agricole
591	INJDCAU=5 et INJ_08=11	Contact, objet tranchant - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc.
592	INJDCAU=5 et INJ_08=12	Contact, objet tranchant - autre
600	INJDCAU=6 et INJ_08=1	Fumée, feu, flammes - maison
610	INJDCAU=6 et INJ_08=2	Fumée, feu, flammes - établissement résidentiel
620	INJDCAU=6 et INJ_08=3	Fumée, feu, flammes - école, collège, université (sauf les lieux de sport)
630	INJDCAU=6 et INJ_08=6	Fumée, feu, flammes - autre établissement
641	INJDCAU=6 et INJ_08=4	Fumée, feu, flammes - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université
642	INJDCAU=6 et INJ_08=5	Fumée, feu, flammes - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université)
650	INJDCAU=6 et INJ_08=7	Fumée, feu, flammes - rue, autoroute, trottoir
660	INJDCAU=6 et INJ_08=8	Fumée, feu, flammes - zone commerciale
670	INJDCAU=6 et INJ_08=9	Fumée, feu, flammes - zone industrielle ou de construction
680	INJDCAU=6 et INJ_08=10	Fumée, feu, flammes - exploitation agricole
691	INJDCAU=6 et INJ_08=11	Fumée, feu, flammes - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc.
692	INJDCAU=6 et INJ_08=12	Fumée, feu, flammes - autre
700	INJDCAU=7 et INJ_08=1	Contact, objet, liquide ou gaz chaud - maison
710	INJDCAU=7 et INJ_08=2	Contact, objet, liquide ou gaz chaud - établissement résidentiel
720	INJDCAU=7 et INJ_08=3	Contact, objet, liquide ou gaz chaud - école, collège, université (sauf les lieux de sport)
730	INJDCAU=7 et INJ_08=6	Contact, objet, liquide ou gaz chaud - autre établissement
741	INJDCAU=7 et INJ_08=4	Contact, objet, liquide ou gaz chaud - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université
742	INJDCAU=7 et INJ_08=5	Contact, objet, liquide ou gaz chaud - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université)
750	INJDCAU=7 et INJ_08=7	Contact, objet, liquide ou gaz chaud - rue, autoroute, trottoir
760	INJDCAU=7 et INJ_08=8	Contact, objet, liquide ou gaz chaud - zone commerciale

770	INJDCAU=7 et INJ_08=9	Contact, objet, liquide ou gaz chaud - zone industrielle ou de construction
780	INJDCAU=7 et INJ_08=10	Contact, objet, liquide ou gaz chaud - exploitation agricole
791	INJDCAU=7 et INJ_08=11	Contact, objet, liquide ou gaz chaud - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc.
792	INJDCAU=7 et INJ_08=12	Contact, objet, liquide ou gaz chaud - autre
800	INJDCAU=8 et INJ_08=1	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - maison
810	INJDCAU=8 et INJ_08=2	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - établissement résidentiel
820	INJDCAU=8 et INJ_08=3	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - école, collège, université (sauf les lieux de sport)
830	INJDCAU=8 et INJ_08=6	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - autre établissement
841	INJDCAU=8 et INJ_08=4	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université
842	INJDCAU=8 et INJ_08=5	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université)
850	INJDCAU=8 et INJ_08=7	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - rue, autoroute, trottoir
860	INJDCAU=8 et INJ_08=8	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - zone commerciale
870	INJDCAU=8 et INJ_08=9	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - zone industrielle ou de construction
880	INJDCAU=8 et INJ_08=10	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - exploitation agricole
891	INJDCAU=8 et INJ_08=11	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc.
892	INJDCAU=8 et INJ_08=12	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle - autre
900	INJDCAU=9 et INJ_08=1	Exercice trop intensif ou mouvement ardu - maison
910	INJDCAU=9 et INJ_08=2	Exercice trop intensif ou mouvement ardu - établissement résidentiel
920	INJDCAU=9 et INJ_08=3	Exercice trop intensif ou mouvement ardu - école, collège, université (sauf les lieux de sport)
930	INJDCAU=9 et INJ_08=6	Exercice trop intensif ou mouvement ardu - autre établissement
941	INJDCAU=9 et INJ_08=4	Exercice trop intensif ou mouvement ardu - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université
942	INJDCAU=9 et INJ_08=5	Exercice trop intensif ou mouvement ardu - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université)
950	INJDCAU=9 et INJ_08=7	Exercice trop intensif ou mouvement ardu - rue, autoroute, trottoir

960	INJDCAU=9 et INJ_08=8	Exercice trop intensif ou mouvement ardu - zone commerciale
970	INJDCAU=9 et INJ_08=9	Exercice trop intensif ou mouvement ardu - zone industrielle ou de construction
980	INJDCAU=9 et INJ_08=10	Exercice trop intensif ou mouvement ardu - exploitation agricole
991	INJDCAU=9 et INJ_08=11	Exercice trop intensif ou mouvement ardu - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc.
992	INJDCAU=9 et INJ_08=12	Exercice trop intensif ou mouvement ardu - autre
1000	INJDCAU=10 et INJ_08=1	Agression - maison
1010	INJDCAU=10 et INJ_08=2	Agression - établissement résidentiel
1020	INJDCAU=10 et INJ_08=3	Agression - école, collège, université (sauf les lieux de sport)
1030	INJDCAU=10 et INJ_08=6	Agression - autre établissement
1041	INJDCAU=10 et INJ_08=4	Agression - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université
1042	INJDCAU=10 et INJ_08=5	Agression - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université)
1050	INJDCAU=10 et INJ_08=7	Agression - rue, autoroute, trottoir
1060	INJDCAU=10 et INJ_08=8	Agression - zone commerciale
1070	INJDCAU=10 et INJ_08=9	Agression - zone industrielle ou de construction
1080	INJDCAU=10 et INJ_08=10	Agression - exploitation agricole
1091	INJDCAU=10 et INJ_08=11	Agression - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc.
1092	INJDCAU=10 et INJ_08=12	Agression - autre
1100	INJDCAU=11 et INJ_08=1	Autre cause - maison
1110	INJDCAU=11 et INJ_08=2	Autre cause - établissement résidentiel
1120	INJDCAU=11 et INJ_08=3	Autre cause - école, collège, université (sauf les lieux de sport)
1130	INJDCAU=11 et INJ_08=6	Autre cause - autre établissement
1141	INJDCAU=11 et INJ_08=4	Autre cause - lieu de sport ou d'athlétisme d'une école, d'un collège ou d'une université
1142	INJDCAU=11 et INJ_08=5	Autre cause - lieu de sport ou d'athlétisme (autre que ceux d'une école, d'un collège, ou d'une université)
1150	INJDCAU=11 et INJ_08=7	Autre cause - rue, autoroute, trottoir
1160	INJDCAU=11 et INJ_08=8	Autre cause - zone commerciale

1170	INJDCAU=11 et INJ_08=9	Autre cause - zone industrielle ou de construction
1180	INJDCAU=11 et INJ_08=10	Autre cause - exploitation agricole
1191	INJDCAU=11 et INJ_08=11	Autre cause - à la campagne, en forêt, en montagne, au lac, à la mer, dans une prairie, etc.
1192	INJDCAU=11 et INJ_08=12	Autre cause - autre

4) Catégorie de blessure

Nom de la variable : INJDSTT

Basée sur : INJ_01, INJ_16

Description : Cette variable indique la catégorie de blessure du répondant.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOINJ = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	(INJ_01=NSP, R, ND) ou (INJ_16=NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une des questions nécessaires	ND
0	INJ_01=2 et INJ_16=2	Aucune blessure	
1	INJ_01=1 et INJ_16=2	Blessure limitant les activités seulement	
2	INJ_01=2 et INJ_16=1	Blessure traitée (qui ne limite pas les activités) seulement	
3	INJ_01=1 et INJ_16=1	Blessure limitant les activités et blessure traitée (qui ne limite pas les activités)	

Blessures au travail (2 VD)

Reformatage temporaire			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
INWTSIC			
LBSCSIC	INW_1 = 1	Secteur d'industrie de l'emploi au cours duquel la blessure est survenue. Est survenue dans l'emploi principal actuel. Le code d'industrie a été copié du module sur le marché du travail (LBS).	
INWCSIC	INW_1 <> 1	Secteur d'industrie de l'emploi au cours duquel la blessure est survenue. N'est pas survenue dans l'emploi principal actuel. Le code d'industrie a été dérivé du module INW.	
INWTSOC			
LBSCSOC	INW_1 = 1	Emploi au cours duquel la blessure est survenue. Est survenue dans l'emploi principal actuel. Le code d'occupation a été copié du module sur le marché du travail (LBS).	
INWCSOC	INW_1 <> 1	Emploi au cours duquel la blessure est survenue. N'est pas survenue dans l'emploi principal actuel. Le code d'occupation a été dérivé du module INW.	

1) Blessure au travail - groupe professionnel

Nom de la variable : INWDOCG

Basée sur : DHH_AGE, LBSDWSS, INWTSOC

Description : Cette variable dérivée montre le groupe professionnel de l'emploi au cours duquel la blessure au travail est survenue.

Note : Le groupe professionnel de l'emploi est basé sur le premier caractère selon la Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S) de 2006.

Reformatage temporaire			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
INWTSOC			
premier caractère dans INWTSOC	INWTSOC <> (9997,9998,9999)		

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
96	DHH_AGE < 15 ou DHH_AGE > 75 ou LBSDWSS = 3 ou 4 ou INJ_09 <> 3 ou INWTSOC = 9996	Le module n'a pas été sélectionné ou population exclue	SO
99	INWTSOC = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
95	INWTSOC = XXXX	N'a pu être codé	
01	INWTSOC = A	Gestion	
02	INWTSOC = B	Affaires, finance et administration	
03	INWTSOC = C	Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées	
04	INWTSOC = D	Secteur de la santé	
05	INWTSOC = E	Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion	

06	INWTSOC = F	Arts, culture, sports et loisirs
07	INWTSOC = G	Ventes et services
08	INWTSOC = H	Métiers, transport et machinerie
09	INWTSOC = I	Professions propres au secteur primaire
10	INWTSOC = J	Transformation, fabrication et services d'utilité publique

2) Blessure au travail - Groupe d'industrie

Nom de la variable : INWDING

Basée sur : INWTSIC, DHH_AGE, LBSDWSS

Description : Cette variable dérivée montre le groupe d'industrie de l'emploi au cours duquel la blessure au travail est survenue.

Note : Le groupe d'industrie de l'emploi est basé sur les deux premiers caractères du code SCAN (Système de classification de l'Amérique du Nord) 2007.

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
INWTSIC			
2 premiers caractères dans INWTSIC	INWTSIC <> (99997,99998,99999)		

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DHH_AGE < 15 ou DHH_AGE > 75 ou LBSDWSS = 3 ou 4 ou INJ_09 <> 3 ou INWTSIC = 99996	Population exclue	SO
99	INWTSIC = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
95	INWTSIC = XXXX	N'a pu être codé	
01	INWTSIC = 11	Agriculture, foresterie, pêche et chasse	
02	INWTSIC = 21	Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz	
03	INWTSIC = 22	Services publics	
04	INWTSIC = 23	Construction	
05	INWTSIC = 31 ou 32 ou 33	Fabrication	
06	INWTSIC = 41	Commerce de gros	
07	INWTSIC = 44 ou 45	Commerce de détail	
08	INWTSIC = 48 ou 49	Transport et entreposage	
09	INWTSIC = 51	Industrie de l'information et industrie culturelle	
10	INWTSIC = 52	Finance et assurances	
11	INWTSIC = 53	Services immobiliers et services de location et de location à bail	

12	INWTSIC = 54	Services professionnels, scientifiques et techniques
13	INWTSIC = 55	Gestion de sociétés et d'entreprises
14	INWTSIC = 56	Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement
15	INWTSIC = 61	Services d'enseignement
16	INWTSIC = 62	Soins de santé et assistance sociale
17	INWTSIC = 71	Arts, spectacles et loisirs
18	INWTSIC = 72	Hébergement et services de restauration
19	INWTSIC = 81	Autres services, sauf les administrations publiques
20	INWTSIC = 91	Administrations publiques

Population active (5 VD)

1) Nombre total d'heures travaillées par semaine

Nom de la variable : LBSDHPW

Basée sur : LBS_42, LBS_53

Description : Cette variable donne le nombre total d'heures travaillées par semaine par le répondant.

Note : Les personnes âgées de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans et les personnes qui n'ont pas travaillé au cours de la semaine qui a précédé l'entrevue ont été exclues de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
996	DHH_AGE < 15 ou DHH_AGE > 75 ou LBS_42 = SO	Exclusions de la population	SO
999	(LBS_42 = NSP, R, ND) ou (LBS_53 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
LBS_42	LBS_42 < SO et LBS_53 = SO	Le nombre d'heures habituellement travaillées dans le cas des répondants n'ayant qu'un emploi	
LBS_42 + LBS_53	LBS_42 < SO et LBS_53 < SO	Le nombre d'heures habituellement travaillées par les répondants qui ont plus d'un emploi	

2) Emploi à temps plein/temps partiel (pour le nombre total d'heures habituelles)

Nom de la variable : LBSDPFT

Basée sur : LBSDHPW

Description : Cette variable indique si le répondant travaillait à temps plein ou à temps partiel.

Note : Les personnes âgées de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans et les personnes qui n'ont pas travaillé au cours de la semaine qui a précédé l'entrevue ont été exclues de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	LBSDHPW = SO	Exclusions de la population	SO
9	LBSDHPW = ND	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
1	LBSDHPW >= 30	Temps plein	
2	LBSDHPW < 30	Temps partiel	

3) Situation en regard de l'activité la semaine dernière

Nom de la variable : LBSDWSS

Basée sur : LBS_01, LBS_02

Description : Cette variable détermine la situation en regard de l'activité du répondant au cours de la semaine précédant l'entrevue.

Note : Les personnes âgées de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ont été exclues de la population.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	DHH_AGE < 15 ou DHH_AGE > 75	Exclusions de la population	SO
1	LBS_01 = 1	Le répondant travaillait à un emploi ou à une entreprise.	
2	LBS_02 = 1	Le répondant avait un emploi mais ne travaillait pas (absent)	
3	LBS_02 = 2	Le répondant n'avait pas d'emploi	
4	LBS_01 = 3	Le répondant souffrait d'incapacité permanente	
9	(LBS_02 = NSP, R, ND) ou (LBS_01 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND

4) Groupe d'industrie

Nom de la variable : LBSDING

Basée sur : LBSCSIC

Description : Cette variable indique le groupe d'industrie auquel le répondant appartient, selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) de 2007, au niveau à deux chiffres.

Note : Les répondants âgés de moins de 15 ans et de plus de 75 ans ont été exclus de la population.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
96	DHH_AGE < 15 ou DHH_AGE > 75 ou LBSDWSS = 3 ou 4	Population exclue	SO
99	LBSCSIC = NSP, R, ND	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
01	2 premiers caractères dans LBSCSIC = 11	Agriculture, foresterie, pêche et chasse	
02	2 premiers caractères dans LBSCSIC = 21	Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz	
03	2 premiers caractères dans LBSCSIC = 22	Services publics	
04	2 premiers caractères dans LBSCSIC = 23	Construction	
05	2 premiers caractères dans LBSCSIC = 31 ou 32 ou 33	Fabrication	
06	2 premiers caractères dans LBSCSIC = 41	Commerce de gros	
07	2 premiers caractères dans LBSCSIC = 44 ou LBSCSIC = 45	Commerce de détail	
08	2 premiers caractères dans LBSCSIC = 48 ou LBSCSIC = 49	Transport et entreposage	
09	2 premiers caractères dans LBSCSIC = 51	Industrie de l'information et industrie culturelle	
10	2 premiers caractères dans LBSCSIC = 52	Finance et assurances	
11	2 premiers caractères dans LBSCSIC = 53	Services immobiliers et services de location et de location à bail	
12	2 premiers caractères dans LBSCSIC = 54	Services professionnels, scientifiques et techniques	

13	2 premiers caractères dans LBSCSIC = 55	Gestion de sociétés et d'entreprises
14	2 premiers caractères dans LBSCSIC = 56	Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement
15	2 premiers caractères dans LBSCSIC = 61	Services d'enseignement
16	2 premiers caractères dans LBSCSIC = 62	Soins de santé et assistance sociale
17	2 premiers caractères dans LBSCSIC = 71	Arts, spectacles et loisirs
18	2 premiers caractères dans LBSCSIC = 72	Hébergement et services de restauration
19	2 premiers caractères dans LBSCSIC = 81	Autres services, sauf les administrations publiques
20	2 premiers caractères dans LBSCSIC = 91	Administrations publiques
95	LBSCSIC = XXXX	N'a pu être codé

5) Groupe professionnel

Nom de la variable : LBSDOCG

Basée sur : LBSCSOC

Description : Cette variable indique le groupe professionnel auquel appartient le répondant, selon la Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S) de 2006, au niveau à deux chiffres.

Note : Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ont été exclus de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DHH_AGE < 15 ou DHH_AGE > 75 ou LBSDWSS = 3 ou 4	Population exclue	SO
99	LBSCSOC = NSP, R, ND	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
01	Premier caractère dans LBSCSOC = A	Gestion	
02	Premier caractère dans LBSCSOC = B	Affaires, finance et administration	
03	Premier caractère dans LBSCSOC = C	Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées	
04	Premier caractère dans LBSCSOC = D	Secteur de la santé	
05	Premier caractère dans LBSCSOC = E	Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion	
06	Premier caractère dans LBSCSOC = F	Arts, culture, sports et loisirs	
07	Premier caractère dans LBSCSOC = G	Ventes et services	
08	Premier caractère dans LBSCSOC = H	Métiers, transport et machinerie	
09	Premier caractère dans LBSCSOC = I	Professions propres au secteur primaire	
10	Premier caractère dans LBSCSOC = J	Transformation, fabrication et services d'utilité publique	
95	LBSCSOC = XXXX	N'a pu être codé	

Contrôle de soi (1 VD)

Reformatage temporaire			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
MAST601			
MAS_601	MAS_601 > 5	Exécuter les cas de R, NSP et ND.	
(MAS_601 – 1)	MAS_601 <= 5	Modifier l'échelle des réponses des questions	
MAST602			
MAS_602	MAS_602 > 5	Exécuter les cas de R, NSP et ND.	
(MAS_602 – 1)	MAS_602 <= 5	Modifier l'échelle des réponses des questions	
MAST603			
MAS_603	MAS_603 > 5	Exécuter les cas de R, NSP et ND.	
(MAS_603 – 1)	MAS_603 <= 5	Modifier l'échelle des réponses des questions	
MAST604			
MAS_604	MAS_604 > 5	Exécuter les cas de R, NSP et ND.	
(MAS_604 – 1)	MAS_604 <= 5	Modifier l'échelle des réponses des questions	
MAST605			
MAS_605	MAS_605 > 5	Exécuter les cas de R, NSP et ND.	
(MAS_605 – 1)	MAS_605 <= 5	Modifier l'échelle des réponses des questions	
MAST606			
MAS_606	MAS_606 > 5	Exécuter les cas de R, NSP et ND.	
(4 – MAST606)	MAST606 <= 4	Inverser l'échelle des questions dont l'échelle a été modifiée	
(MAS_606 – 1)	MAS_606 <= 5	Modifier l'échelle des réponses des questions	
MAST607			
(4 – MAST607)	MAST607 <= 4	Inverser l'échelle des questions dont l'échelle a été modifiée	
MAS_607	MAS_607 > 5	Exécuter les cas de R, NSP et ND.	
(MAS_607 – 1)	MAS_607 <= 5	Modifier l'échelle des réponses des questions	

1) Échelle de maîtrise de soi dérivée

Nom de la variable : MASDM1

Basée sur : MAS_601, MAS_602, MAS_603, MAS_604, MAS_605, MAS_606, MAS_607

Description : Cette variable mesure la maîtrise de soi, c'est-à-dire l'ampleur de la croyance qu'ont les personnes que leurs choix dans la vie sont sous leur contrôle.

Note : Plus les cotes sont élevées, plus la maîtrise de soi est élevée.

Site internet : www.jstor.org/

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
96	DOMAS = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99	ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND

99	(MAST601 = NSP, R, ND) ou (MAST602 = NSP, R, ND) ou (MAST603 = NSP, R, ND) ou (MAST604 = NSP, R, ND) ou (MAST605 = NSP, R, ND) ou (MAST606 = NSP, R, ND) ou (MAST607 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
MAST601 + MAST602 + MAST603 + MAST604 + MAST605 + MAST606 +MAST607	(0 <= MAST601 <= 4) et (0 <= MAST602 <= 4) et (0 <= MAST603 <= 4) et (0 <= MAST604 <= 4) et (0 <= MAST605 <= 4) et (0 <= MAST606 <= 4) et (0 <= MAST607 <= 4)	Cote obtenue à l'échelle de maîtrise de soi	(min: 0; max: 28)

Référence : Pearlin, LI et Schooler, C, Journal of health and Social Behavior,« The Structure of Coping », 1981, vol 19, p. 2-21.

Humeur (4 VD)

Humeur (Échelle d'équilibre affectif de Bradburn)

VARIABLES TEMPORAIRES

Noms des variables: MDBT1, MDBT2, MDBT3, MDBT4, MDBT5, MDBT6, MDBT7, MDBT8, MDBT9, MDBT10

Basée sur: MDB_1, MDB_2, MDB_3, MDB_4, MDB_5, MDB_6, MDB_7, MDB_8, MDB_9, MDB_10

Ces variables dérivées temporaires inversent les réponses de toutes les questions de MDB avec catégories de réponses utilisées dans les variables.

Les questions élaborées par Norman Bradburn visaient à indiquer les réactions psychologiques (positives et négatives) des personnes faisant partie de la population générale à des événements dans leur vie de tous les jours. Indicateurs de bonheur ou de bien-être général psychologique, ces ternes dénotent la capacité d'une personne à composer avec le stress du quotidien. On n'essaie pas ici de déceler des désordres psychiatriques ou psychologiques.

On a aussi posé une autre question : Tout compte fait, comment diriez-vous que vous vous sentez ces jours-ci? Diriez-vous que vous êtes : ... très heureux? passablement heureux? pas très heureux?

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
MDBT1			
4 - MDB_1	MDB_1 > 0 and MDB_1 < 4	Inverser les réponses dans MDB_1.	
MDBT10			
4 - MDB_10	MDB_10 > 0 and MDB_10 < 4	Inverser les réponses dans MDB_10.	
MDBT2			
4 - MDB_2	MDB_2 > 0 and MDB_2 < 4	Inverser les réponses dans MDB_2.	
MDBT3			
4 - MDB_3	MDB_3 > 0 and MDB_3 < 4	Inverser les réponses dans MDB_3.	
MDBT4			
4 - MDB_4	MDB_4 > 0 and MDB_4 < 4	Inverser les réponses dans MDB_4.	
MDBT5			
4 - MDB_5	MDB_5 > 0 and MDB_5 < 4	Inverser les réponses dans MDB_5.	
MDBT6			
4 - MDB_6	MDB_6 > 0 and MDB_6 < 4	Inverser les réponses dans MDB_6.	
MDBT7			
4 - MDB_7	MDB_7 > 0 and MDB_7 < 4	Inverser les réponses dans MDB_7.	
MDBT8			
4 - MDB_8	MDB_8 > 0 and MDB_8 < 4	Inverser les réponses dans MDB_8.	
MDBT9			
4 - MDB_9	MDB_9 > 0 and MDB_9 < 4	Inverser les réponses dans MDB_9.	

1) Humeur - Affect positif

Nom de la variable : MDBDPOS

Basée sur : MDB_01, MDB_03, MDB_05, MDB_07, MDB_09 , MDBT1, MDBT3, MDBT5, MDBT7, MDBT9

Description : La variable suivante indique les réactions psychologiques (positives) des personnes au sein de la population générale quant aux événements de leur vie quotidienne. L'échelle est un indicateur de bonheur ou de bien-être psychologique général, qui dénote la capacité d'une personne à composer avec les stress de la vie quotidienne. La sous-échelle de l'affect positif peut être utilisée comme mesure du bien-être.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes

96	MDB_1 = 6	Exclusion de la population - contenu facultatif non sélectionné.	SO
99	DOMDB = 1 et ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées par procuration.	ND
99	MDB_1 IN(7,8,9) ou MDB_3 IN(7,8,9) ou MDB_5 IN(7,8,9) ou MDB_7 IN(7,8,9) ou MDB_9 IN(7,8,9)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une des questions requises.	ND
MDBT1 + MDBT3 + MDBT5 + MDBT7 + MDBT9	(MDB_1 > 0 et MDB_1 < 4) et (MDB_3 > 0 et MDB_3 < 4) et (MDB_5 > 0 et MDB_5 < 4) et (MDB_7 > 0 et MDB_7 < 4) et (MDB_9 > 0 et MDB_9 < 4)	Le répondant a répondu à toutes les questions.	min. : 5; max. : 15

2) Humeur - Affect négatif

Nom de la variable : MDBDNEG

Basée sur : MDB_2, MDB_4, MDB_6, MDB_8, MDB_10, MDBT2, MDBT4, MDBT6, MDBT8, MDBT10

Description : L'échelle de l'affect négatif peut servir d'indicateur de détresse psychologique. L'échelle d'équilibre affectif de Bradburn ne vise pas à déceler des désordres psychiatriques ou psychologiques.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	MDB_1 = 6	Exclusion de la population - contenu facultatif non sélectionné.	SO
99	DOMDB = 1 et ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées par procuration.	ND
99	MDB_2 IN(7,8,9) ou MDB_4 IN(7,8,9) ou MDB_6 IN(7,8,9) ou MDB_8 IN(7,8,9) ou MDB_10 IN(7,8,9)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
MDBT2 + MDBT4 + MDBT6 + MDBT8 + MDBT10	(MDB_2 > 0 et MDB_2 < 4) et (MDB_4 > 0 et MDB_4 < 4) et (MDB_6 > 0 et MDB_6 < 4) et (MDB_8 > 0 et MDB_8 < 4) et (MDB_10 > 0 et MDB_10 < 4)	Le répondant a répondu à toutes les questions.	min. :5; max. :15

3) Humeur - Affect équilibré - Méthode A

Nom de la variable : MDBDBA1

Basée sur : MDBDPOS, MDBDNEG

Description : La variable suivante est un bon indicateur du niveau actuel de bien-être psychologique d'une personne.

Note : Spéc. techniques : La variable a été calculée à partir de la différence entre les cotes des indices positifs et négatifs.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	MDBDPOS = 96 ou MDBDNEG = 96	Exclusion de la population - contenu facultatif non sélectionné.	SO

99	MDBDPOS = 99 ou MDBDNEG = 99	Non-réponse	ND
MDBDPOS - MDBDNEG	(MDBDPOS >= 5 et MDBDPOS <= 15) et (MDBDNEG >= 5 et MDBDNEG <= 15)	Codes de réponses valides pour les deux variables.	min. : -10; max. : 10

4) Humeur - Affect équilibré - Méthode B

Nom de la variable : MDBDBA2

Basée sur : MDBDPOS, MDBDNEG

Description : La variable suivante détermine si le répondant a un équilibre négatif, neutre ou positif.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	MDBDPOS = 96 ou MDBDNEG = 96	Exclusion de la population - contenu facultatif non sélectionné.	SO
9	MDBDPOS = 99 ou MDBDNEG = 99	Non-réponse	ND
1	(MDBDPOS >= 5 et MDBDPOS < 8) et (MDBDNEG >= 8 et MDBDNEG <= 15) ou (MDBDPOS >= 8 et MDBDPOS <= 12) et (MDBDNEG > 12 et MDBDNEG <= 15)	Équilibre négatif	
2	(MDBDPOS >= 5 et MDBDPOS < 8) et (MDBDNEG >= 5 et MDBDNEG < 8) ou (MDBDPOS >= 8 et MDBDPOS <= 12) et (MDBDNEG >= 8 et MDBDNEG <= 12) ou (MDBDPOS > 12 et MDBDPOS <= 15) et (MDBDNEG > 12 et MDBDNEG <= 15)	Neutre	
3	(MDBDPOS >= 8 et MDBDPOS <= 15) et (MDBDNEG >= 5 et MDBDNEG < 8) ou (MDBDPOS > 12 et MDBDPOS <= 15) et (MDBDNEG >= 8 et MDBDNEG <= 12)	Équilibre positif	

Expériences maternelles - Allaitement (2 VD)

1) Durée d'allaitement exclusif

Nom de la variable : MEXDEBF2

Basée sur : DOMEX, MEX_01, MEX_03, MEX_05, MEX_06, MEX_06A, MEX_06B, MEX_08A

Description : Cette variable indique la durée de temps qu'une répondante a exclusivement allaité son dernier bébé.

Note : En 2011, MEX_07 a été divisée en deux questions : MEX_06B et MEX_08A; cette variable a donc dû être mise à jour en conséquence.

En 2010, cette variable était une mise à jour de MEXDEBF. Elle comprend un plus grand nombre de catégories et couvre la période de six mois dans une catégorie unique. Jusqu'à 2010, elle tenait compte des renseignements contradictoires fournis en réponse à MEX_06 et à MEX_07. Les répondantes qui n'ont pas eu d'enfants au cours des cinq dernières années, ou qui étaient âgées de moins de 15 ans ou de plus de 55 ans, sont exclues de la population. Puisque cette variable est utilisée pour mesurer seulement la durée finale de l'allaitement exclusif, les mères qui allaitaient encore en date de l'interview et qui n'avaient pas encore ajouté un autre liquide ou des aliments solides à l'alimentation du bébé sont également exclues.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DOMEX = 2 ou DHH_SEX = 1 or DHH_AGE < 15 or DHH_AGE > 55 or MEX_01 = 2 or (MEX_05 = 1 and (MEX_06A = 2 or MEX_06B = 13) and MEX_08A=13)	Le module n'a pas été sélectionné ou population exclue	SO
99	ADM_PRX = 1 ou (MEX_06B in (97:99) ou MEX_08A in (97:99) ou MEX_03 in (7:9) ou MEX_06 in (97:99))	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
0	MEX_03 = 2	N'a pas allaité son dernier bébé	
1	((MEX_06B =1 ou MEX_08A =1) et (MEX_06 in (1:12) or MEX_06 = 96)) ou (MEX_06 = 1 et ((MEX_06B > MEX_06 et MEX_06B <13) ou (MEX_08A > MEX_06 et MEX_08A <13))) ou ((MEX_06B = 13 ou MEX_08A = 13) et MEX_06 = 1)	Moins d'une semaine	
2	((MEX_06B in (2,3) ou MEX_08A in (2,3)) et (MEX_06 in (2:12) ou MEX_06 = 96)) ou (MEX_06 in (2:3) et ((MEX_06B > MEX_06 et MEX_06B <13) ou (MEX_08A > MEX_06 et MEX_08A <13))) ou ((MEX_06B = 13 ou MEX_08A = 13) et MEX_06 in (2,3))	1 semaine à moins de 5 semaines	

3	((MEX_06B in (4,5) ou MEX_08A in (4,5)) et (MEX_06 in (4:12) ou MEX_06 = 96)) ou (MEX_06 in (4,5) et ((MEX_06B > MEX_06 et MEX_06B<13) ou (MEX_08A > MEX_06 et MEX_08A <13))) ou ((MEX_06B = 13 ou MEX_08A= 13) et MEX_06 in (4,5))	5 semaines à moins de 12 semaines
4	((MEX_06B in (6) ou MEX_08A in (6)) et (MEX_06 in (6:12) ou MEX_06 = 96)) ou (MEX_06 in (6) et ((MEX_06B > MEX_06 et MEX_06B <13) ou (MEX_08A > MEX_06 et MEX_08A <13))) ou ((MEX_06B = 13 ou MEX_08A = 13) et MEX_06 in (6))	12 semaines à moins de 16 semaines (3 mois)
5	((MEX_06B in (7) ou MEX_08A in (7)) et (MEX_06 in (7:12) ou MEX_06 = 96)) ou (MEX_06 in (7) et ((MEX_06B > MEX_06 et MEX_06B<13) ou (MEX_08A > MEX_06 et MEX_08A <13))) ou ((MEX_06B = 13 ou MEX_08A = 13) et MEX_06 in (7))	16 semaines à moins de 20 semaines (4 mois)
6	((MEX_06B in (8) ou MEX_08A in (8)) et (MEX_06 in (8:12) ou MEX_06 = 96)) ou (MEX_06 in (8) et ((MEX_06B > MEX_06 et MEX_06B <13) ou (MEX_08A> MEX_06 et MEX_08A <13))) ou ((MEX_06B = 13 ou MEX_08A = 13) et MEX_06 in (8))	20 semaines à moins de 24 semaines (5 mois)
7	((MEX_06B in (9) ou MEX_08A in (9)) and (MEX_06 in (9:12) ou MEX_06 = 96)) ou (MEX_06 in (9) and ((MEX_06B > MEX_06 and MEX_06B <13) ou (MEX_08A > MEX_06 and MEX_08A <13))) ou ((MEX_06B = 13 ou MEX_08A = 13) and MEX_06 in (9))	24 semaines à moins de 28 semaines (6 mois)

8	((MEX_06B in (10, 11, 12) ou MEX_08A in (10, 11, 12)) et (MEX_06 in (10:12) ou MEX_06 = 96)) ou (MEX_06 in (10, 11, 12) et ((MEX_06B > MEX_06 et MEX_06B <13) ou (MEX_08A > MEX_06 et MEX_08A <13))) ou ((MEX_06B = 13 ou MEX_08A= 13) et MEX_06 in (10, 11, 12))	7 months or more

2) Allaitement exclusif pendant 6 mois (ou plus)

Nom de la variable : MEXFEB6

Basée sur : DOMEX, MEX_01, MEX_03, MEX_06, MEX_6A, MEX_06B, MEX_08A

Description : Cette variable indique si une répondante a exclusivement allaité son dernier bébé pendant au moins 6 mois.

Note : En 2011, MEX_07 a été divisée en deux questions : MEX_06B et MEX_08A; cette variable a donc dû être mise à jour en conséquence.
Santé Canada recommande l'allaitement exclusif pendant une période de six mois. Cette variable indique le nombre de mères qui ont suivi cette recommandation. Les répondantes qui n'ont pas eu d'enfants au cours des cinq dernières années, ou qui étaient âgées de moins de 15 ans ou de plus de 55 ans, sont exclues de la population. Étant donné que cette variable est utilisée pour mesurer uniquement la durée finale de l'allaitement exclusif, les mères qui allaitent toujours et qui n'ont pas encore ajouté un autre liquide ou des aliments solides à l'alimentation du bébé sont aussi exclues.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOMEX = 2 ou DHH_SEX = 1 ou DHH_AGE < 15 ou DHH_AGE > 55 ou MEX_01 = 2 ou (MEX_05 = 1 et (MEX_06A = 2 et MEX_08A = 13)))	Le module n’a pas été sélectionné ou population exclue	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9	(MEX_06A in (97:99) ou MEX_06B in (97:99) ou MEX_08A in (97:99) ou MEX_03 in (7:9) ou MEX_06 in (97:99))	Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
1	(((MEX_06B in (9:12) and MEX_08A not in (1:8)) or (MEX_06B not in (1:8) and MEX_08A in (9:12)) or (MEX_06B in (9:12) and MEX_08A in (9:12))) and MEX_06 in (9:12)) or (MEX_06 = 96 and ((MEX_06B in (9:12) and MEX_08A not in (1:8)) or (MEX_06B not in (1:8) and MEX_08A in (9:12)) or (MEX_06B in (9:12) and MEX_08A in (9:12)))) or (MEX_05=2 and MEX_06B in (9:13) and MEX_08A in (9:13) and MEX_06 in (9:12))	A exclusivement allaité son dernier bébé pendant au moins 6 mois	

2	(MEX_03=2) ou (MEX_06 < 9) ou MEX_06B < 9 ou MEX_08A < 9	N'a pas exclusivement allaité son dernier bébé pendant au moins 6 mois

Santé bucco-dentaire 2 (2 VD)

1) Limites sociales dues à l'état de la santé bucco-dentaire

Nom de la variable : OH2FLIM

Basée sur : OH2_23, OH2_24

Description : Cette variable indique si l'état de santé oral a un impact sur le fonctionnement social, comme éviter les conversations ou les contacts avec les autres, ou éviter de rire ou de sourire.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOOH2 = 2	Le module n'a pas été sélectionné.	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
2	(OH2_23 = 3, 4) et (OH2_24 = 3, 4)	Pas de limite sociale due à un problème oral	
1	(OH2_23 = 1, 2) ou (OH2_24 = 1, 2)	Limite sociale vécue à cause d'un problème oral	
9	(OH2_23 = NSP, R, ND) ou (OH2_24 = NSP, R, ND)	Au moins une question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

2) Douleur faciale ou buccale

Nom de la variable : OH2FOFP

Basée sur : OH2_25A, OH2_25B, OH2_25C, OH2_25D, OH2_25E, OH2_25F, OH2_25G

Description : Cette variable indique la présence de douleur faciale ou buccale dans le dernier mois.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOOH2 = 2	Le module n'a pas été sélectionné.	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
2	(OH2_25A = 2 et OH2_25B = 2 et OH2_25C = 2 et OH2_25D = 2 et OH2_25E = 2 et OH2_25F = 2 et OH2_25G = 2) ou (OH2_25A = 6 et OH2_25B = 6 et OH2_25C = 2 et OH2_25D = 2 et OH2_25E = 2 et OH2_25F = 2 et OH2_25G = 2)	N'a pas vécu de douleur ou d'inconfort oral ou facial dans le dernier mois	

1	OH2_25A = 1 ou OH2_25B = 1 ou OH2_25C = 1 ou OH2_25D = 1 ou OH2_25E = 1 ou OH2_25F = 1 ou OH2_25G = 1	A vécu de la douleur ou de l'inconfort oral ou facial dans le dernier mois	
9	(OH2_25A = NSP, R, ND) ou (OH2_25B = NSP, R, ND) ou (OH2_25C = NSP, R, ND) ou (OH2_25D = NSP, R, ND) ou (OH2_25E = NSP, R, ND) ou (OH2_25F = NSP, R, ND) ou (OH2_25G = NSP, R, ND)	Au moins une question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

Activités physiques (9 VD)

1) Dépense d'énergie quotidienne durant les activités physiques de loisirs

Nom de la variable : PACDEE

Basée sur : PAC_1V, PAC_2A, PAC_2B, PAC_2C, PAC_2D, PAC_2E, PAC_2F, PAC_2G, PAC_2H, PAC_2I, PAC_2J, PAC_2K, PAC_2L, PAC_2M, PAC_2N, PAC_2O, PAC_2P, PAC_2Q, PAC_2R, PAC_2S, PAC_2T, PAC_2U, PAC_2W, PAC_2X, PAC_2Z, PAC_3A, PAC_3B, PAC_3C, PAC_3D, PAC_3E, PAC_3F, PAC_3G, PAC_3H, PAC_3I, PAC_3J, PAC_3K, PAC_3L, PAC_3M, PAC_3N, PAC_3O, PAC_3P, PAC_3Q, PAC_3R, PAC_3S, PAC_3T, PAC_3U, PAC_3W, PAC_3X, PAC_3Z

Description : Cette variable est une mesure de l'énergie quotidienne moyenne dépensée durant les activités de loisirs du répondant au cours des trois derniers mois.

Note : On se fonde, pour calculer la dépense d'énergie (DE), sur la fréquence et sur la durée des séances d'activités physiques, ainsi que sur la valeur de la MET. La MET représente la demande d'énergie métabolique exprimée sous forme d'un multiple du taux de métabolisme au repos. Par exemple, une activité de quatre MET exige quatre fois la quantité d'énergie brûlée par l'organisme au repos.

DE (dépense d'énergie pour chaque activité) = (N × D × valeur de la MET) / 365
Où :
N = nombre de fois que le répondant a fait une activité pendant une période de 12 mois
D = durée moyenne, en heures de l'activité
Valeur de la MET = demande d'énergie de l'activité, exprimée en kilocalories dépensées par kilo de masse corporelle par heure d'activité (kcal/kg par heure)/365 (pour convertir les données annuelles en données quotidiennes)

En général, on regroupe les valeurs de la MET en trois niveaux d'intensité (c. à d. faible, moyenne et forte). Comme l'ESCC ne contient aucune question demandant de préciser le niveau d'intensité des activités physiques, on a utilisé les valeurs de la MET correspondant à une faible intensité pour chaque activité. Cette approche est celle adoptée par l'institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de vie, car les gens ont tendance à surestimer l'intensité, la fréquence et la durée de leurs activités.

Nom de la variable	Activité	Valeur de la MET (kcal/kg/heure)
PACDEEA	MARCHE POUR FAIRE DE L'EXERCICE	3
PACDEEB	JARDINAGE OU TRAVAUX À L'EXTÉRIEUR	3
PACDEEC	NATATION	3
PACDEED	BICYCLETTE	4
PACDEEE	DANSE MODERNE OU DANSE SOCIALE	3
PACDEEF	EXERCICES À LA MAISON	3
PACDEEG	HOCKEY SUR GLACE	6
PACDEEH	PATINAGE SUR GLACE	4
PACDEEI	PATINS À ROUES ALIGNÉES	5
PACDEEJ	JOGGING OU COURSE *	9,5
PACDEEK	GOLF	4
PACDEEL	EXERCICES DIRIGÉS OU AÉROBIE	4
PACDEEM	SKI ALPIN OU PLANCHE À NEIGE	4
PACDEEN	QUILLES	2
PACDEEO	BASEBALL OU BALLE-MOLLE	3
PACDEEP	TENNIS	4
PACDEEQ	POIDS ET HALTÈRES	3
PACDEER	PÊCHE	3
PACDEES	VOLLEYBALL	5
PACDEET	BASKETBALL	6
PACDEEZ	SOCCER	5
PACDEEU	AUTRE (U)*	4
PACDEEW	AUTRE (W)*	4
PACDEEX	AUTRE (X)*	4

*Le jogging (valeur de la MET 7) et la course (valeur de la MET 12) s'inscrivent dans une seule catégorie. Par conséquent, la valeur de la MET pour l'activité regroupée est la moyenne de leurs valeurs de la MET (9,5). Puisqu'il est difficile d'attribuer une valeur de la MET à la catégorie « Autres activités », la valeur utilisée est la moyenne des valeurs correspondant aux activités énumérées, sauf pour le jogging et la course. Pour ces deux activités, on a remplacé la moyenne par la valeur correspondant au jogging uniquement dans le calcul de la moyenne globale pour les « autres activités ». La valeur de la MET est inférieure à la moyenne pour certaines activités; toutefois, cette approche est conforme à celle adoptée pour d'autres études, comme l'Enquête Campbell et l'Enquête sur la santé en Ontario (ESO).

* Le nombre de fois a été arrondi à une valeur moyenne pour le calcul, comme dans le cas de l'ENSP : (13 minutes ou 0,2167 heure, 23 minutes ou 0,3833 heure, 45 minutes ou 0,75 heure, 60 minutes ou une heure).

Commençant au cycle 2.1 de l'ESCC, la liste des activités (PAC_1n) a légèrement changé comparativement aux cycles précédents. Le « soccer » fait partie de la liste d'activités de la question posée explicitement au répondant du Cycle 2.1. Pour cycle 1.1, cette activité faisait partie d' « autre » activité.

Reformatage temporaire			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
PACDEEA			
0	PAC_3A = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité	MARCHE POUR FAIRE DE L'EXERCICE
0	(PAC_3A = NSP, R, ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	MARCHE POUR FAIRE DE L'EXERCICE
(PAC_2A × 4 × 0,2167 × 3) / 365	PAC_3A = 1	Calculer la DE pour < 15 min*	MARCHE POUR FAIRE DE L'EXERCICE
(PAC_2A × 4 × 0,3833 × 3) / 365	PAC_3A = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min*	MARCHE POUR FAIRE DE L'EXERCICE
(PAC_2A × 4 × 0,75 × 3) / 365	PAC_3A = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min*	MARCHE POUR FAIRE DE L'EXERCICE
(PAC_2A × 4 × 1 × 3) / 365	PAC_3A = 4	Calculer la DE pour > 60 min*	MARCHE POUR FAIRE DE L'EXERCICE
PACDEEB			
0	PAC_3B = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité	JARDINAGE OU TRAVAUX À L'EXTÉRIEUR
0	(PAC_3B = NSP, R, ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	JARDINAGE OU TRAVAUX À L'EXTÉRIEUR
(PAC_2B × 4 × 0,2167 × 3) / 365	PAC_3B = 1	Calculer la DE pour < 15 min*	JARDINAGE OU TRAVAUX À L'EXTÉRIEUR
(PAC_2B × 4 × 0,3833 × 3) / 365	PAC_3B = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min*	JARDINAGE OU TRAVAUX À L'EXTÉRIEUR
(PAC_2B × 4 × 0,75 × 3) / 365	PAC_3B = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min*	JARDINAGE OU TRAVAUX À L'EXTÉRIEUR
(PAC_2B × 4 × 1 × 3) / 365	PAC_3B = 4	Calculer la DE pour > 60 min*	JARDINAGE OU TRAVAUX À L'EXTÉRIEUR
PACDEEC			
0	PAC_3C = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité	NATATION
0	(PAC_3C = NSP, R, ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	NATATION
(PAC_2C × 4 × 0,2167 × 3) / 365	PAC_3C = 1	Calculer la DE pour < 15 min*	NATATION
(PAC_2C × 4 × 0,3833 × 3) / 365	PAC_3C = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min*	NATATION

(PAC_2C × 4 × 0,75 × 3) / 365	PAC_3C = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min*	NATATION
(PAC_2C × 4 × 1 × 3) / 365	PAC_3C = 4	Calculer la DE pour > 60 min*	NATATION
PACDEED			
0	PAC_3D = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité	BICYCLETTE
0	(PAC_3D = NSP, R, ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	BICYCLETTE
(PAC_2D × 4 × 0,2167 × 4) / 365	PAC_3D = 1	Calculer la DE pour < 15 min*	BICYCLETTE
(PAC_2D × 4 × 0,3833 × 4) / 365	PAC_3D = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min*	BICYCLETTE
(PAC_2D × 4 × 0,75 × 4) / 365	PAC_3D = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min*	BICYCLETTE
(PAC_2D × 4 × 1 × 4) / 365	PAC_3D = 4	Calculer la DE pour > 60 min*	BICYCLETTE
PACDEEE			
0	PAC_3E = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité	DANSE MODERNE OU DANSE SOCIALE
0	(PAC_3E = NSP, R, ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	DANSE MODERNE OU DANSE SOCIALE
(PAC_2E × 4 × 0,2167 × 3) / 365	PAC_3E = 1	Calculer la DE pour < 15 min*	DANSE MODERNE OU DANSE SOCIALE
(PAC_2E × 4 × 0,3833 × 3) / 365	PAC_3E = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min*	DANSE MODERNE OU DANSE SOCIALE
(PAC_2E × 4 × 0,75 × 3) / 365	PAC_3E = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min*	DANSE MODERNE OU DANSE SOCIALE
(PAC_2E × 4 × 1 × 3) / 365	PAC_3E = 4	Calculer la DE pour > 60 min*	DANSE MODERNE OU DANSE SOCIALE
PACDEEF			
0	PAC_3F = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité	EXERCICES À LA MAISON
0	(PAC_3F = NSP, R, ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	EXERCICES À LA MAISON
(PAC_2F × 4 × 0,2167 × 3) / 365	PAC_3F = 1	Calculer la DE pour < 15 min*	EXERCICES À LA MAISON
(PAC_2F × 4 × 0,3833 × 3) / 365	PAC_3F = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min*	EXERCICES À LA MAISON
(PAC_2F × 4 × 0,75 × 3) / 365	PAC_3F = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min*	EXERCICES À LA MAISON
(PAC_2F × 4 × 1 × 3) / 365	PAC_3F = 4	Calculer la DE pour > 60 min*	EXERCICES À LA MAISON
PACDEEG			
0	PAC_3G = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité	HOCKEY SUR GLACE
0	(PAC_3G = NSP, R, ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	HOCKEY SUR GLACE

(PAC_2G × 4 × 0,2167 × 6) / 365	PAC_3G = 1	Calculer la DE pour < 15 min*	HOCKEY SUR GLACE
(PAC_2G × 4 × 0,3833 × 6) / 365	PAC_3G = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min*	HOCKEY SUR GLACE
(PAC_2G × 4 × 0,75 × 6) / 365	PAC_3G = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min*	HOCKEY SUR GLACE
(PAC_2G × 4 × 1 × 6) / 365	PAC_3G = 4	Calculer la DE pour > 60 min*	HOCKEY SUR GLACE
PACDEEH			
0	PAC_3H = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité	PATINAGE SUR GLACE
0	(PAC_3H = NSP, R, ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	PATINAGE SUR GLACE
(PAC_2H × 4 × 0,2167 × 4) / 365	PAC_3H = 1	Calculer la DE pour < 15 min*	PATINAGE SUR GLACE
(PAC_2H × 4 × 0,3833 × 4) / 365	PAC_3H = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min*	PATINAGE SUR GLACE
(PAC_2H × 4 × 0,75 × 4) / 365	PAC_3H = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min*	PATINAGE SUR GLACE
(PAC_2H × 4 × 1 × 4) / 365	PAC_3H = 4	Calculer la DE pour > 60 min*	PATINAGE SUR GLACE
PACDEEI			
0	PAC_3I = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité	PATINS À ROUES ALIGNÉES
0	(PAC_3I = NSP, R, ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	PATINS À ROUES ALIGNÉES
(PAC_2I × 4 × 0,2167 × 5) / 365	PAC_3I = 1	Calculer la DE pour < 15 min*	PATINS À ROUES ALIGNÉES
(PAC_2I × 4 × 0,3833 × 5) / 365	PAC_3I = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min*	PATINS À ROUES ALIGNÉES
(PAC_2I × 4 × 0,75 × 5) / 365	PAC_3I = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min*	PATINS À ROUES ALIGNÉES
(PAC_2I × 4 × 1 × 5) / 365	PAC_3I = 4	Calculer la DE pour > 60 min*	PATINS À ROUES ALIGNÉES
PACDEEJ			
0	PAC_3J = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité	JOGGING OU COURSE
0	(PAC_3J = NSP, R, ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	JOGGING OU COURSE
(PAC_2J × 4 × 0,2167 × 9,5) / 365	PAC_3J = 1	Calculer la DE pour < 15 min*	JOGGING OU COURSE
(PAC_2J × 4 × 0,3833 × 9,5) / 365	PAC_3J = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min*	JOGGING OU COURSE
(PAC_2J × 4 × 0,75 × 9,5) / 365	PAC_3J = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min*	JOGGING OU COURSE
(PAC_2J × 4 × 1 × 9.5) / 365	PAC_3J = 4	Calculer la DE pour > 60 min*	JOGGING OU COURSE
PACDEEK			
0	PAC_3K = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité	GOLF
0	(PAC_3K = NSP, R, ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	GOLF

(PAC_2K × 4 × 0,2167 × 4) / 365	PAC_3K = 1	Calculer la DE pour < 15 min*	GOLF
(PAC_2K × 4 × 0,3833 × 4) / 365	PAC_3K = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min*	GOLF
(PAC_2K × 4 × 0,75 × 4) / 365	PAC_3K = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min*	GOLF
(PAC_2K × 4 × 1 × 4) / 365	PAC_3K = 4	Calculer la DE pour > 60 min*	GOLF
PACDEEL			
0	PAC_3L = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité	EXERCICES DIRIGÉS OU AÉROBIE
0	(PAC_3L = NSP, R, ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	EXERCICES DIRIGÉS OU AÉROBIE
(PAC_2L × 4 × 0,2167 × 4) / 365	PAC_3L = 1	Calculer la DE pour < 15 min*	EXERCICES DIRIGÉS OU AÉROBIE
(PAC_2L × 4 × 0,3833 × 4) / 365	PAC_3L = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min*	EXERCICES DIRIGÉS OU AÉROBIE
(PAC_2L × 4 × 0,75 × 4) / 365	PAC_3L = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min*	EXERCICES DIRIGÉS OU AÉROBIE
(PAC_2L × 4 × 1 × 4) / 365	PAC_3L = 4	Calculer la DE pour > 60 min*	EXERCICES DIRIGÉS OU AÉROBIE
PACDEEM			
0	PAC_3M =SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité	SKI ALPIN OU PLANCHE À NEIGE
0	(PAC_3M = NSP, R, ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	SKI ALPIN OU PLANCHE À NEIGE
(PAC_2M × 4 × 0,2167 × 4) / 365	PAC_3M = 1	Calculer la DE pour < 15 min*	SKI ALPIN OU PLANCHE À NEIGE
(PAC_2M × 4 × 0,3833 × 4) / 365	PAC_3M = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min*	SKI ALPIN OU PLANCHE À NEIGE
(PAC_2M × 4 × 0,75 × 4) / 365	PAC_3M = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min*	SKI ALPIN OU PLANCHE À NEIGE
(PAC_2M × 4 × 1 × 4) / 365	PAC_3M = 4	Calculer la DE pour > 60 min*	SKI ALPIN OU PLANCHE À NEIGE
PACDEEN			
0	PAC_3N = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité	QUILLES
0	(PAC_3N = NSP, R, ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	QUILLES
(PAC_2N × 4 × 0,2167 × 2) / 365	PAC_3N = 1	Calculer la DE pour < 15 min*	QUILLES
(PAC_2N × 4 × 0,3833 × 2) / 365	PAC_3N = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min*	QUILLES

(PAC_2N × 4 × 0,75 × 2) / 365	PAC_3N = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min*	QUILLES
(PAC_2N × 4 × 1 × 2) / 365	PAC_3N = 4	Calculer la DE pour > 60 min*	QUILLES
PACDEEO			
0	PAC_3O = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité	BASEBALL OU BALLE-MOLLE
0	(PAC_3O = NSP, R, ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	BASEBALL OU BALLE-MOLLE
(PAC_2O × 4 × 0,2167 × 3) / 365	PAC_3O = 1	Calculer la DE pour < 15 min*	BASEBALL OU BALLE-MOLLE
(PAC_2O × 4 × 0,3833 × 3) / 365	PAC_3O = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min*	BASEBALL OU BALLE-MOLLE
(PAC_2O × 4 × 0,75 × 3) / 365	PAC_3O = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min*	BASEBALL OU BALLE-MOLLE
(PAC_2O × 4 × 1 × 3) / 365	PAC_3O = 4	Calculer la DE pour > 60 min*	BASEBALL OU BALLE-MOLLE
PACDEEP			
0	PAC_3P = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité	TENNIS
0	(PAC_3P = NSP, R, ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	TENNIS
(PAC_2P × 4 × 0,2167 × 4) / 365	PAC_3P = 1	Calculer la DE pour < 15 min*	TENNIS
(PAC_2P × 4 × 0,3833 × 4) / 365	PAC_3P = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min*	TENNIS
(PAC_2P × 4 × 0,75 × 4) / 365	PAC_3P = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min*	TENNIS
(PAC_2P × 4 × 1 × 4) / 365	PAC_3P = 4	Calculer la DE pour > 60 min*	TENNIS
PACDEEQ			
0	PAC_3Q = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité	POIDS ET HALTÈRES
0	(PAC_3Q = NSP, R, ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	POIDS ET HALTÈRES
(PAC_2Q × 4 × 0,2167 × 3) / 365	PAC_3Q = 1	Calculer la DE pour < 15 min*	POIDS ET HALTÈRES
(PAC_2Q × 4 × 0,3833 × 3) / 365	PAC_3Q = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min*	POIDS ET HALTÈRES
(PAC_2Q × 4 × 0,75 × 3) / 365	PAC_3Q = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min*	POIDS ET HALTÈRES
(PAC_2Q × 4 × 1 × 3) / 365	PAC_3Q = 4	Calculer la DE pour > 60 min*	POIDS ET HALTÈRES
PACDEER			
0	PAC_3R = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité	PÊCHE
0	(PAC_3R = NSP, R, ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	PÊCHE
(PAC_2S × 4 × 0,2167 × 5) / 365	PAC_3R = 1	Calculer la DE pour < 15 min*	PÊCHE
(PAC_2S × 4 × 0,3833 × 5) / 365	PAC_3R = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min*	PÊCHE

(PAC_2S × 4 × 0,75 × 5) / 365	PAC_3R = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min*	PÊCHE
(PAC_2R × 4 × 1 × 3) / 365	PAC_3R = 4	Calculer la DE pour > 60 min*	PÊCHE
PACDEES			
0	PAC_3S = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité	VOLLEYBALL
0	(PAC_3S = NSP, R, ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	VOLLEYBALL
(PAC_2S × 4 × 0,2167 × 5) / 365	PAC_3S = 1	Calculer la DE pour < 15 min*	VOLLEYBALL
(PAC_2S × 4 × 0,3833 × 5) / 365	PAC_3S = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min*	VOLLEYBALL
(PAC_2S × 4 × 0,75 × 5) / 365	PAC_3S = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min*	VOLLEYBALL
(PAC_2S × 4 × 1 × 5) / 365	PAC_3S = 4	Calculer la DE pour > 60 min*	VOLLEYBALL
PACDEET			
0	PAC_3T = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité	BASKETBALL
0	(PAC_3T = NSP, R, ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	BASKETBALL
(PAC_2T × 4 × 0,2167 × 6) / 365	PAC_3T = 1	Calculer la DE pour < 15 min*	BASKETBALL
(PAC_2T × 4 × 0,3833 × 6) / 365	PAC_3T = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min*	BASKETBALL
(PAC_2T × 4 × 0,75 × 6) / 365	PAC_3T = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min*	BASKETBALL
(PAC_2T × 4 × 1 × 6) / 365	PAC_3T = 4	Calculer la DE pour > 60 min*	BASKETBALL
PACDEEU			
0	PAC_3U = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité	AUTRE (U)
0	(PAC_3U = NSP, R, ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	AUTRE (U)
(PAC_2U × 4 × 0,2167 × 4) / 365	PAC_3U = 1	Calculer la DE pour < 15 min*	AUTRE (U)
(PAC_2U × 4 × 0,3833 × 4) / 365	PAC_3U = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min*	AUTRE (U)
(PAC_2U × 4 × 0,75 × 4) / 365	PAC_3U = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min*	AUTRE (U)
(PAC_2U × 4 × 1 × 4) / 365	PAC_3U = 4	Calculer la DE pour > 60 min*	AUTRE (U)
PACDEEW			
0	PAC_3W = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité	AUTRE (W)
0	(PAC_3W = NSP, R, ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	AUTRE (W)
(PAC_2W × 4 × 0,2167 × 4) / 365	PAC_3W = 1	Calculer la DE pour < 15 min*	AUTRE (W)
(PAC_2W × 4 × 0,3833 × 4) / 365	PAC_3W = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min*	AUTRE (W)
(PAC_2W × 4 × 0,75 × 4) / 365	PAC_3W = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min*	AUTRE (W)

(PAC_2W × 4 × 1 × 4) / 365	PAC_3W = 4	Calculer la DE pour > 60 min*	AUTRE (W)
PACDEEX			
0	PAC_3X = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité	AUTRE (X)
0	(PAC_3X = NSP, R, ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	AUTRE (X)
(PAC_2X × 4 × 0,2167 × 4) / 365	PAC_3X = 1	Calculer la DE pour < 15 min*	AUTRE (X)
(PAC_2X × 4 × 0,3833 × 4) / 365	PAC_3X = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min*	AUTRE (X)
(PAC_2X × 4 × 0,75 × 4) / 365	PAC_3X = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min*	AUTRE (X)
(PAC_2X × 4 × 1 × 4) / 365	PAC_3X = 4	Calculer la DE pour > 60 min*	AUTRE (X)
PACDEEZ			
0	PAC_3Z = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité	SOCCER
0	(PAC_3Z = NSP, R, ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	SOCCER
(PAC_2Z × 4 × 0,2167 × 5) / 365	PAC_3Z = 1	Calculer la DE pour < 15 min*	SOCCER
(PAC_2Z × 4 × 0,3833 × 5) / 365	PAC_3Z = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min*	SOCCER
(PAC_2Z × 4 × 0,75 × 5) / 365	PAC_3Z = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min*	SOCCER
(PAC_2Z × 4 × 1 × 5) / 365	PAC_3Z = 4	Calculer la DE pour > 60 min*	SOCCER

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99,9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
99,9	(PAC_1V = NSP, R, ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	PAC_1V = 1	Aucune activité physique de loisirs	

PACDEEA + PACDEEB + PACDEEC + PACDEED + PACDEEE + PACDEEF + PACDEEG + PACDEEH + PACDEEI + PACDEEJ + PACDEEK + PACDEEL + PACDEEM + PACDEEN + PACDEEO + PACDEEP + PACDEEQ + PACDEER + PACDEES + PACDEET + PACDEEZ + PACDEEU + PACDEEW + PACDEEX	(0 <= PACDEEA < SO) et (0 <= PACDEEB < SO) et (0 <= PACDEEC < SO) et (0 <= PACDEED < SO) et (0 <= PACDEEE < SO) et (0 <= PACDEEF < SO) et (0 <= PACDEEG < SO) et (0 <= PACDEEH < SO) et (0 <= PACDEEI < SO) et (0 <= PACDEEJ < SO) et (0 <= PACDEEK < SO) et (0 <= PACDEEL < SO) et (0 <= PACDEEM < SO) et (0 <= PACDEEN < SO) et (0 <= PACDEEO < SO) et (0 <= PACDEEP < SO) et (0 <= PACDEEQ < SO) et (0 <= PACDEER < SO) et (0 <= PACDEES < SO) et (0 <= PACDEET < SO) et (0 <= PACDEEZ < SO) et (0 <= PACDEEU < SO) et (0 <= PACDEEW < SO) et (0 <= PACDEEX < SO)	Énergie quotidienne totale (kcal/kg/par jour)	(arrondie à une décimale) (min : 0,0; max : 99,5)

2) Participant à des activités physiques de loisirs

Nom de la variable : PACFLEI

Basée sur : PAC_1V

Description : Cette variable sert à déterminer si le répondant a participé à des activités physiques de loisirs dans les trois mois qui ont précédé l'interview.

Source: Enquête sur la santé des Ontariens

Site internet : www.chass.utoronto.ca/datalib/codebooks/utm/ohs/ohs90.htm

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	PAC_1V = 2	Participe à des activités physiques de loisirs	
2	PAC_1V = 1	Ne participe pas à des activités physiques de loisirs	
9	(PAC_1V = NSP, R, ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

3) Fréquence mensuelle moyenne des activités physiques de loisirs d'une durée de plus de 15 minutes

Nom de la variable : PACDFM

Basée sur : PAC_1V, PAC_2A, PAC_2B, PAC_2C, PAC_2D, PAC_2E, PAC_2F, PAC_2G, PAC_2H, PAC_2I, PAC_2J, PAC_2K, PAC_2L, PAC_2M, PAC_2N, PAC_2O, PAC_2P, PAC_2Q, PAC_2R, PAC_2S, PAC_2T, PAC_2Z, PAC_2U, PAC_2W, PAC_2X, PAC_3A, PAC_3B, PAC_3C, PAC_3D, PAC_3E, PAC_3F, PAC_3G, PAC_3H, PAC_3I, PAC_3J, PAC_3K, PAC_3L, PAC_3M, PAC_3N, PAC_3O, PAC_3P, PAC_3Q, PAC_3R, PAC_3S, PAC_3T, PAC_3Z, PAC_3U, PAC_3W, PAC_3X

Description : Cette variable permet de calculer le nombre total de fois par mois que la personne a participé à une ou des activités physiques de loisirs, d'une durée de plus de 15 minutes.

Note : Les questions se rapportent « aux derniers trois mois. » Cette variable calcule une moyenne sur un mois en divisant la fréquence rapportée en trois.

Source: Enquête sur la santé des Ontariens

Site internet : www.chass.utoronto.ca/datalib/codebooks/utm/ohs/ohs90.htm

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
PACT2A			
0	(PAC_3A = 1, SO, NSP, R, ND)	Fixer les valeurs de PAC_2A (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_3A est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question)	
PACT2B			
0	(PAC_3B = 1, SO, NSP, R, ND)	Fixer les valeurs de PAC_2B (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_3B est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question)	
PACT2C			
0	(PAC_3C = 1, SO, NSP, R, ND)	Fixer les valeurs de PAC_2C (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_3C est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question)	
PACT2D			
0	(PAC_3D = 1, SO, NSP, R, ND)	Fixer les valeurs de PAC_2D (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_3D est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question)	
PACT2E			
0	(PAC_3E = 1, SO, NSP, R, ND)	Fixer les valeurs de PAC_2E (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_3E est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question)	
PACT2F			
0	(PAC_3F = 1, SO, NSP, R, ND)	Fixer les valeurs de PAC_2F (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_3F est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question)	
PACT2G			
0	(PAC_3G = 1, SO, NSP, R, ND)	Fixer les valeurs de PAC_2G (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_3G est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question)	
PACT2H			
0	(PAC_3H = 1, SO, NSP, R, ND)	Fixer les valeurs de PAC_2H (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_3H est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question)	
PACT2I			

0	(PAC_3I = 1, SO, NSP, R, ND)	Fixer les valeurs de PAC_2I (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_3I est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question)
PACT2J		
0	(PAC_3J = 1, SO, NSP, R, ND)	Fixer les valeurs de PAC_2J (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_3J est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question)
PACT2K		
0	(PAC_3K = 1, SO, NSP, R, ND)	Fixer les valeurs de PAC_2K (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_3K est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question)
PACT2L		
0	(PAC_3L = 1, SO, NSP, R, ND)	Fixer les valeurs de PAC_2L (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_3L est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question)
PACT2M		
0	(PAC_3M = 1, SO, NSP, R, ND)	Fixer les valeurs de PAC_2M (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_3M est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question)
PACT2N		
0	(PAC_3N = 1, SO, NSP, R, ND)	Fixer les valeurs de PAC_2N (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_3N est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question)
PACT2O		
0	(PAC_3O = 1, SO, NSP, R, ND)	Fixer les valeurs de PAC_2O (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_3O est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question)
PACT2P		
0	(PAC_3P = 1, SO, NSP, R, ND)	Fixer les valeurs de PAC_2P (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_3P est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question)
PACT2Q		
0	(PAC_3Q = 1, SO, NSP, R, ND)	Fixer les valeurs de PAC_2Q (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_3Q est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question)
PACT2R		
0	(PAC_3R = 1, SO, NSP, R, ND)	Fixer les valeurs de PAC_2R (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_3R est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question)
PACT2S		

0	(PAC_3S = 1, SO, NSP, R, ND)	Fixer les valeurs de PAC_2S (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_3S est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question)
PACT2T		
0	(PAC_3T = 1, SO, NSP, R, ND)	Fixer les valeurs de PAC_2T (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_3T est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question)
PACT2U		
0	(PAC_3U = 1, SO, NSP, R, ND)	Fixer les valeurs de PAC_2U (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_3U est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question)
PACT2W		
0	(PAC_3W = 1, SO, NSP, R, ND)	Fixer les valeurs de PAC_2W (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_3W est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question)
PACT2X		
0	(PAC_3X = 1, SO, NSP, R, ND)	Fixer les valeurs de PAC_2X (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_3X est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question)
PACT2Z		
0	(PAC_3Z = 1, SO, NSP, R, ND)	Fixer les valeurs de PAC_2Z (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_3Z est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question)

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
999	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
999	(PAC_1V = NSP, R, ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	PAC_1V=1	Pas d'activité physique	

(PACT2A + PACT2B + PACT2C + PACT2D + PACT2E + PACT2F + PACT2G + PACT2H + PACT2I + PACT2J + PACT2K + PACT2L + PACT2M + PACT2N + PACT2O + PACT2P + PACT2Q + PACT2R + PACT2S + PACT2T + PACT2Z + PACT2U + PACT2W + PACT2X) / 3	(0 <= PACT2A < SO) et (0 <= PACT2B < SO) et (0 <= PACT2C < SO) et (0 <= PACT2D < SO) et (0 <= PACT2E < SO) et (0 <= PACT2F < SO) et (0 <= PACT2G < SO) et (0 <= PACT2H < SO) et (0 <= PACT2I < SO) et (0 <= PACT2J < SO) et (0 <= PACT2K < SO) et (0 <= PACT2L < SO) et (0 <= PACT2M < SO) et (0 <= PACT2N < SO) et (0 <= PACT2O < SO) et (0 <= PACT2P < SO) et (0 <= PACT2Q < SO) et (0 <= PACT2R < SO) et (0 <= PACT2S < SO) et (0 <= PACT2T < SO) et (0 <= PACT2Z < SO) et (0 <= PACT2U < SO) et (0 <= PACT2W < SO) et (0 <= PACT2X < SO)	Fréquence mensuelle de toutes les activités physiques de loisirs d'une durée de plus de 15 minutes	(arrondie au nombre entier près) (min : 0; max : 995)

4) Fréquence de toutes les activités physiques de loisirs d'une durée de plus de 15 minutes

Nom de la variable : PACDFR

Basée sur : PACDFM

Description : Cette variable permet de classer les répondants selon leur comportement ou la régularité de leurs activités physiques de loisirs d'une durée de plus de 15 minutes.

Note : Cette variable utilise les valeurs de la variable dérivée de fréquence mensuelle moyenne des activités physiques (PACDFM). Les valeurs de PACDFM reflètent une moyenne mensuelle basée sur les données rapportées au cours d'une période de trois mois.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9	PACDFM =ND	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	(12 <= PACDFM < SO)	Participation régulière à des activités de loisirs	
2	(4 <= PACDFM < 12)	Participation occasionnelle à des activités de loisirs	
3	PACDFM < 4	Participation rare à des activités de loisirs	

5) Participation quotidienne à des activités physiques de loisirs d'une durée de plus de 15 minutes

Nom de la variable : PACFD

Basée sur : PACDFM

Description : Cette variable indique si le répondant a participé quotidiennement à une activité physique de loisirs d'une durée de plus de 15 minutes.

Note : La variable utilise les valeurs de la variable dérivée de fréquence mensuelle moyenne des activités physiques durant plus de

15 minutes (PACDFM). Les valeurs de PACDFM reflètent une moyenne mensuelle basée sur les données rapportées au cours d'une période de trois mois.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9	PACDFM = ND	Au moins une question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	(30 <= PACDFM < SO)	Participe à des activités physiques quotidiennes	
2	PACDFM < 30	Ne participe pas à des activités physiques quotidiennes	

6) Indice de l'activité physique pendant les loisirs

Nom de la variable : PACDPAI

Basée sur : PACDEE

Description : Cette variable permet de classer les répondants comme étant « actifs », « modérément actifs », ou « inactifs » pendant leurs loisirs, selon les valeurs de dépenses d'énergie totales (kcal/kg/jour) calculées pour PACDEE.

Note : Les valeurs de l'indice de l'activité physique utilisées pour classer les personnes sont les mêmes que celles utilisées pour l'Enquête sur la santé des Ontariens (ESO) et l'Enquête Campbell sur le mieux être au Canada.

Site internet : Enquête Campbell sur le mieux-être au Canada : http://www.cflri.ca//pdf/e/88wkp.pdf

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9	PACDEE = ND	Au moins une question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	(3 <= PACDEE < SO)	Actif	
2	(1,5 <= PACDEE < 3,0)	Modérément actif	
3	(0 <= PACDEE < 1,5)	Inactif	

7) Indice de l'activité physique pendant le transport et les loisirs

Nom de la variable : PACDLTI

Basée sur : PACDTLE

Description : Cette variable sert à indiquer si les répondants sont « actifs », « modérément actifs », ou « inactifs » pendant leur transport et leurs loisirs, selon les valeurs de dépenses d'énergie totales quotidiennes (kcal/kg/jour) calculées pour PACDTLE.

Note : L'indice de l'activité physique pendant le transport et les loisirs répond aux mêmes critères que la variable PACDPAI (Indice de l'activité physique pendant les loisirs).

L'activité physique durant les transports n'est pas collectée de manière exclusive dans l'ESCC. Pour cette raison, l'information recueillie ne peut être présenté séparée des activités physiques de loisirs.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**

9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
9	PACDTLE = ND	La question requise n'a pas été répondue (non déclaré)	ND
1	(3 <= PACDTLE < SO)	Actif	
2	(1.5 <= PACDTLE < 3.0)	Modérément actif	
3	(0 <= PACDTLE < 1.5)	Inactif	

8) Dépense d'énergie quotidienne dans des activités physiques de transport et de loisirs

Nom de la variable : PACDTLE

Basée sur : PACDEE, PAC_Q7, PAC_Q7A, PAC_Q7B, PAC_Q8, PAC_Q8A, PAC_Q8B

Description : Cette variable mesure la dépense moyenne d'énergie quotidienne du répondant dans des activités physiques de transport et de loisirs au cours des trois derniers mois.

Note : Pour en savoir plus sur la façon de calculer cette variable dérivée, voir la note relative à la variable PACDEE (Dépense d'énergie quotidienne durant les activités physiques de loisirs).

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
PACDTEA			
0	PAC_7B = SO	N'a pas participé à des activités de transport ou à des activités physique de loisirs	MARCHE POUR SE DÉPLACER
0	(PAC_7B = NSP, R, ND)	Au moins une question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	MARCHE POUR SE DÉPLACER
(PAC_7A × 4 × .2167 × 3) / 365	PAC_7B = 1	Calcul de la DE pour < 15 min*	MARCHE POUR SE DÉPLACER
(PAC_7A × 4 × .3833 × 3) / 365	PAC_7B = 2	Calcul de la DE pour 16 à 30 min*	MARCHE POUR SE DÉPLACER
(PAC_7A × 4 × .75 × 3) / 365	PAC_7B = 3	Calcul de la DE pour 31 à 60 min*	MARCHE POUR SE DÉPLACER
(PAC_7A × 4 × 1 × 3) / 365	PAC_7B = 4	Calcul de la DE pour > 60 min*	MARCHE POUR SE DÉPLACER
PACDTED			
0	PAC_8B = SO	N'a pas participé à des activités de transport ou à des activités physique de loisirs	BICYCLETTE POUR SE DÉPLACER
0	(PAC_8B = NSP, R, ND)	Au moins une question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	BICYCLETTE POUR SE DÉPLACER
(PAC_8A × 4 × .2167 × 4) / 365	PAC_8B = 1	Calcul de la DE pour < 15 min*	BICYCLETTE POUR SE DÉPLACER
(PAC_8A × 4 × .3833 × 4) / 365	PAC_8B = 2	Calcul de la DE pour 16 à 30 min*	BICYCLETTE POUR SE DÉPLACER
(PAC_8A × 4 × .75 × 4) / 365	PAC_8B = 3	Calcul de la DE pour 31 à 60 min*	BICYCLETTE POUR SE DÉPLACER

(PAC_8A × 4 × 1 × 4) / 365	PAC_8B = 4	Calcul de la DE pour > 60 min*	BICYCLETTE POUR SE DÉPLACER

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99.9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
99.9	(PACDEE = NSP, R, ND) (PAC_7B = NSP, R, ND) ou (PAC_8B = NSP, R, ND)	Au moins une question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
0	(PACDEE = 0) et (PAC_7 = 2, 3) et (PAC_8 = 2, 3)	Pas d'activité de transport ou d'activité physique de loisirs	
PACDEE + PACDTEA + PACDTED	(0 <= PACDEE < SO) et (0 <= PACDTEA < SO) et (0 <= PACDTED < SO)	Dépense totale quotidienne d'énergie (kcal/kg/jour)	(arrondie à une décimale) (min : 0.0; max: 99.5)

9) Participation à des activités de transport ou à des activités physiques de loisirs

Nom de la variable : PACFLTI

Basée sur : PAC_1V, PAC_7, PAC_8

Description : Cette variable sert à déterminer si le répondant a participé à des activités de transport ou à des activités physiques de loisirs au cours des trois mois qui ont précédé l'interview.

Note : En 2010, la programmation des catégories de réponses de cette variable dérivée a été modifiée. Les répondants fournissant un mélange de non réponse et de réponses valides aux questions PAC_1V, PAC_7 ou PAC_8 ont été codés aux catégories 1 ou 2 de PACFLTI. Auparavant les répondants qui ont fourni une non-réponse aux questions PAC_1V, PAC_7 ou PAC_8 étaient codés dans la catégorie de non réponse dans la variable dérivée PACFLTI.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	PAC_1V = 2 ou PAC_7 = 1 ou PAC_8 = 1	Participe à des activités de transport ou à des activités physiques de loisirs	
2	(PAC_1V = 1) et (PAC_7 = 2, 3) et (PAC_8 = 2, 3)	Ne participe pas à des activités de transport ou à des activités physiques de loisirs	
9	(PAC_1V = NSP, R, ND) ou (PAC_7 = NSP, R, ND) ou (PAC_8 = NSP, R, ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

Limitation des activités (2 VD)

1) Incidences des problèmes de santé

Nom de la variable : RACDIMP

Basée sur : RAC_2A, RAC_2B1, RAC_2B2, RAC_2C

Description : Cette variable est une mesure brute de l'incidence des problèmes de santé physique, de santé mentale et de santé à long terme sur les principales sphères de la vie : la maison, le travail ou l'école, et les autres activités.

Note : Il ne faut pas utiliser cette variable pour obtenir le taux d'incapacité ou de limitation des activités au sein de la population. Les questions utilisées pour créer cette variable, plus RAC_1, ont été posées dans le cadre du Recensement de 2006 dans le but de prélever un échantillon en vue de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités (EPLA) post censitaire de 2006.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
2	RAC_2A = 2 ou RAC_2B1 = 2 ou RAC_2B2 = 2 ou RAC_2C = 2	Souvent	
1	RAC_2A = 1 ou RAC_2B1 = 1 ou RAC_2B2 = 1 ou RAC_2C = 1	Parfois	
3	RAC_2A = 3 et (RAC_2B1 = 3, 4) et (RAC_2B2 = 3, 4) et RAC_2C = 3	Jamais	
9	(RAC_2A = NSP, R, ND) ou (RAC_2B1 = NSP, R, ND) ou (RAC_2B2 = NSP, R, ND) ou (RAC_2C = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND

2) Participation et limitations des activités

Nom de la variable : RACDPAL

Basée sur : RAC_1, RAC_2A, RAC_2B1, RAC_2B2, RAC_2C

Description : Cette variable indique la réduction d'activités due à des maladies ou des problèmes physiques ou mentaux à long terme qui durent ou devraient durer 6 mois ou plus.

Note : La variable est la même que la variable RACDIMP, sauf qu'il est tenu compte de la réponse à la question RAC_1. Cette variable est une modification de la variable dérivée de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités (EPLA). L'attribution de la cote est la même dans l'EPLA, sauf pour le calcul de la non-réponse. Dans le cas de l'EPLA, on considère que les réponses « ne sait pas » et « refus » sont négatives (fixées à « jamais »), plutôt qu'une non réponse. Ce traitement est incompatible avec la façon dont les réponses « NSP » et « R » sont traitées dans le cas de l'ESCC et, par conséquent, lors du calcul de notre variable dérivée, les réponses « NSP » et « R » demeurent équivalentes à « non déclaré ».

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9	(RAC_2A = NSP, R, ND) ou (RAC_2B1 = NSP, R, ND) ou (RAC_2B2 = NSP, R, ND) ou (RAC_2C = NSP, R, ND) ou (RAC_1 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND

2	RAC_2A = 2 ou RAC_2B1 = 2 ou RAC_2B2 = 2 ou RAC_2C = 2 ou RAC_1 = 2	Souvent
1	RAC_2A = 1 ou RAC_2B1 = 1 ou RAC_2B2 = 1 ou RAC_2C = 1 ou RAC_1 = 1	Parfois
3	RAC_2A = 3 et (RAC_2B1 = 3, 4) et (RAC_2B2 = 3, 4) et RAC_2C = 3 et RAC_1 = 3	Jamais

Activités sédentaires (2 VD)

1) Nombre total d'heures par semaine consacrées aux activités sédentaires

Nom de la variable : SACDTOT

Basée sur : SAC_1, SAC_2, SAC_3, SAC_4

Description : Cette variable estime le nombre total d'heures consacrées par le répondant, pendant une semaine caractéristique des trois derniers mois, à des activités sédentaires : utiliser un ordinateur (notamment en jouant à des jeux électroniques), se balader sur Internet, s'adonner à des jeux vidéo (Nintendo, PlayStation, etc.), regarder la télévision ou un vidéo et lire. Le temps consacré à ces activités à l'école ou au travail est exclu.

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
SAC			
996	SAC_1 = SO	Population exclue	SO
999	ADM_PRX = 1	Les questions ne sont pas posées - entrevue par procuration	ND
999	(SAC_1 = NSP, R, ND) ou (SAC_2 = NSP, R, ND) ou (SAC_3 = NSP, R, ND) ou (SAC_4 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
SAC_1+SAC_2+ SAC_3+SAC_4	(0 <= SAC_1 <= 70) et (0 <= SAC_2 <= 70) et (0 <= SAC_3 <= 70) et (0 <= SAC_4 <= 70)	Nombre d'heures total consacrées aux activités sédentaires	
SAC_1+SAC_3+ SAC_4	(0 <= SAC_1 <= 70) et SAC_2 = SO et (0 <= SAC_3 <= 70) et (0 <= SAC_4 <= 70)	Nombre d'heures total consacrées aux activités sédentaires	

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	SAC = SO	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99	SAC = ND	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
99	SAC = ND	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
1	(0 <= SAC < 5)	Moins de cinq heures	
2	(5 <= SAC < 10)	De 5 à 9 heures	
3	(10 <= SAC < 15)	De 10 à 14 heures	
4	(15 <= SAC < 20)	De 15 à 19 heures	
5	(20 <= SAC < 25)	De 20 à 24 heures	
6	(25 <= SAC < 30)	De 25 à 29 heures	
7	(30 <= SAC < 35)	De 30 à 34 heures	
8	(35 <= SAC < 40)	De 35 à 39 heures	
9	(40 <= SAC < 45)	De 40 à 44 heures	
10	(45 <= SAC < NA)	Plus de 45 heures	

2) Nombre d'heures total par semaine consacrées aux activités sédentaires (excluant la lecture)

Nom de la variable : SACDTER

Basée sur : SAC_1, SAC_2, SAC_3

Description : Cette variable estime le nombre total d'heures consacrées par le répondant, pendant une semaine caractéristique des trois derniers mois, à des activités sédentaires : utiliser un ordinateur (notamment en jouant des jeux électroniques), se balader sur Internet, s'adonner à des jeux vidéo (Nintendo, PlayStation, etc.), regarder la télévision ou un vidéo. Le temps consacré à ces activités à l'école ou au travail est exclu. Le temps consacré à la lecture n'est pas inclu.

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
SACTTER			
996	SAC_1 = SO	Population exclusion	SO
999	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
999	(SAC_1 = NSP, R, ND) ou (SAC_2 = NSP, R, ND) ou (SAC_3 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
SAC_1 + SAC_2 + SAC_3	(0 <= SAC_1 <= 70) et (0 <= SAC_2 <= 70) et (0 <= SAC_3 <= 70)	Nombre d'heures total par semaine consacrées aux activités sédentaires (excluant la lecture)	
SAC_1 + SAC_3	(0 <= SAC_1 <= 70) et (0 <= SAC_3 <= 70)	Nombre d'heures total par semaine consacrées aux activités sédentaires (excluant la lecture)	

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	SACTTER = SO	Population exclue	SO
99	SACTTER = ND	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
1	(0 <= SACTTER < 5)	Moins de cinq heures	
2	(5 <= SACTTER < 10)	De 5 à 9 heures	
3	(10 <= SACTTER < 15)	De 10 à 14 heures	
4	(15 <= SACTTER < 20)	De 15 à 19 heures	
5	(20 <= SACTTER < 25)	De 20 à 24 heures	
6	(25 <= SACTTER < 30)	De 25 à 29 heures	
7	(30 <= SACTTER < 35)	De 30 à 34 heures	
8	(35 <= SACTTER < 40)	De 35 à 39 heures	
9	(40 <= SACTTER < 45)	De 40 à 44 heures	
10	(45 <= SACTTER < SO)	45 heures ou plus	

Variables de l'échantillon (2 VD)

1) Permission sur le partage de données

Nom de la variable : SAMDSHR

Basée sur : ADM_Q04B (question sur le partage de données de la composante principale [absente du fichier]), PS_Q02 (question sur le partage de la composante de Sortie [absente du fichier]), PMK_Q016 (Question de partage pour les 14-17 ans du module PMK [absente du fichier]) .

Description : Cette variable sert à déterminer si le répondant a accepté ou non de partager l'information recueillie lors de l'enquête avec les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé, Santé Canada, l'Agence de santé publique du Canada et l'Institut de la statistique du Québec, pour les répondants du Québec. La variable SAMDSHR est calculée en prenant les réponses aux questions sur le partage de la composante principale (ADM_Q04B), du module sur la Personne la mieux renseignée à propos du ménage (PMK_Q016) et la composante de Sortie (PS_Q02).

Note : À compter de 2011, la permission de partager les données a été demandée en fonction de l'âge des répondants et de l'identification d'une personne la mieux renseignée à propos du ménage (PMKPROXY) pour les répondants âgés de moins de 16 ans. À compter de 2013, ceci a été changé à moins de 18 ans.

Pour les 12-13 ans, la permission de partager les informations ne leur est pas demandée directement. Si une PMKPROXY est identifiée ou si leur interview a été complétée par une personne interposée (PROXY), la permission de partager les données de l'enquête au complet a été demandée soit à la PMKPROXY ou la PROXY dans ADM_Q04B ou PS_Q02. Si aucune PMKPROXY n'a été identifiée ou que l'enquête a été complétée par le répondant âgé de 12 ou 13 ans ou que la PROXY était âgée de moins de 18 ans, aucune question sur le partage des données n'a été demandée et le partage de l'information n'est pas possible.

Pour les répondants âgés de 14-17 ans, la permission de partager la partie de l'enquête jusqu'au module Personne la mieux renseignée sur le ménage (PMK) peut leur avoir été demandée à l'un ou l'autre des points suivant : soit directement dans le module PMK avant que leur participation à l'enquête ne se termine, ou dans la question PS_Q02. Si l'interview a été complété jusqu'au module PMK et qu'une PMKPROXY a été identifiée et a complété l'interview, on a demandé à la PMKPROXY la permission de partager l'information qu'elle a donnée dans les modules liés au ménage. Cette permission a été demandée soit dans la question ADM_Q04B ou à PS_Q02. Si la permission de partager l'information a été obtenue à la fois du répondant âgé de 14-17 ans et de la PKMPROXY dans ADM_Q04B et PS_Q02, l'information de toute l'interview peut être partagée. Si la PMKPROXY n'a pas acceptée de partager l'information qu'elle a fournie dans les modules à propos du ménage, seule l'information fournie par le répondant de 14-17 ans sera partagée (c'est-à-dire les données recueillies jusqu'au module PMK). Dans cette situation, SAMDSHR = 3, c'est-à-dire un partage partiel de l'information. Si une PROXY a complété l'enquête pour le répondant de 14-17 ans, la permission de partage aura été demandée seulement dans ADM_Q04B ou PS_Q02.

Pour les répondants âgés de 18 ans et plus, les procédures pour demander les questions de partage demeurent les mêmes. Les permissions de partage sont demandées directement au répondant ou à la PROXY dans ADM_Q04B ou PS_Q01

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1	(((ANC_AGE IN (12,13) ou ANC_AGE > 17 ou DV_HHSIZE = 1 ou GR_N01B = 1) et (ADM_Q04B = 1 ou (ADM_Q04B NE 2 et PS_Q02 = 1))) ou ((DV_HHSIZE > 1 et GR_N01B NE 1) et ANC_AGE IN(14,15,16,17) et ((PMKPROXY NE 1 et (PMK_Q016 = 1 ou (PS_Q02 = 1 et PMK_Q016 NE 2))) ou ANC_AGE IN(14,15,16,17) et (PMKPROXY = 1 et STATUS_HD = 71 et (PMK_Q016 = 1 et PS_Q02 = 1)) ou ANC_AGE IN(14,15,16,17) et (PMKPROXY = 1 et STATUS_HD = 70 et (PMK_Q016 = 1 et ADM_Q04B = 1)))))	Oui - Le répondant a accepté de partager l'information	

2	(((ANC_AGE IN (12,13) ou ANC_AGE > 17 ou DV_HHSIZE = 1 ou GR_N01B = 1) et NOT((ADM_Q04B = 1 ou (ADM_Q04B NE 2 et PS_Q02 = 1)) ou (ADM_Q04B =. et PS_Q02 = . Et STATUS_HD = 70))) ou ((DV_HHSIZE > 1 et GR_N01B NE 1 et ANC_AGE IN (14,15,16,17)) et ((PMKPROXY NE 1 et NOT((PMK_Q016 = 1 ou (PS_Q02 = 1 et PMK_Q016 NE 2)) ou (PS_Q02 = . Et PMK_Q016 = .))) ou ((ANC_AGE IN (14,15,16,17) et PMKPROXY = 1 et STATUS_HD = 71) et NOT(((PMK_Q016 = 1 et PS_Q02 NE 1) ou ((PMK_Q016 = 1 et PS_Q02 = 1)) ou (PS_Q02 = . Et PMK_Q016 = .)))) ou ((ANC_AGE IN (14,15,16,17) et PMKPROXY = 1 et STATUS_HD = 70) et NOT((PMK_Q016 = 1 et ADM_Q04B NE 1) ou (PMK_Q016 = 1 et ADM_Q04B = 1) ou (PS_Q02 = . Et PMK_Q016 = . Et ADM_Q04B = .))))))	Non - Le répondant n'a pas accepté de partager l'information	
3	(ANC_AGE IN(14,15,16,17) et DV_HHSIZE > 1 et GR_N01B NE 1 et PMKPROXY = 1 et ((STATUS_HD = 71 et (PMK_Q016 = 1 et PS_Q02 NE 1)) ou (STATUS_HD = 70 et (PMK_Q016 = 1 et ADM_Q04B NE 1))))	Partielle - Le répondant âgé de 14 - 17 ans accepte de partager l'information, mais permission de partage pas obtenue de la PMR.	
9	Sinon	On n'a pas posé au répondant la question sur le partage de l'information	ND

2) Permission sur le jumelage des données

Nom de la variable : SAMDLNK

Basée sur : ADM_Q01B (question sur le jumelage de la composante principale [absent du fichier])

Description : Cette variable sert à déterminer si le répondant accepte ou non que les données du questionnaire soient couplées aux dossiers administratifs concernant son utilisation passée et courante des services de santé.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9	ADM_Q01B = ND	On n'a pas posé au répondant la question sur le jumelage des données	ND
1	ADM_Q01B = 1	Le répondant a accepté qu'il y ait un jumelage des données	
2	Sinon	Le répondant n'a pas accepté qu'il y ait un jumelage des données	

Usage du tabac - Méthodes pour cesser de fumer (1 VD)

1) Réussite ou tentative de cesser de fumer

Nom de la variable : SCADQUI

Basée sur : SMKDSTY, SMK_01A, SMK_202, SMK_06A, SMK_09A, SMK_10, SMK_10A, SCA_50, SCH_3

Description : Cette variable sert à classer les répondants dans l'une des quatre catégories suivantes : (a) fumeurs quotidiens ou occasionnels qui n'ont pas tenté de cesser de fumer dans les douze derniers mois (b) fumeurs quotidiens ou occasionnels qui ont tenté de cesser de fumer dans les douze derniers mois, (c) fumeurs qui ont réussi à cesser de fumer l'an dernier et (d) fumeurs qui ont réussi à arrêter de fumer il y a plus d'un an.

Note : Les non-fumeurs et les répondants qui ont fumé moins de 100 cigarettes au cours de leur vie sont exclus de cette population. Cette variable dérivée peut être calculée uniquement pour les régions sociosanitaires qui ont aussi sélectionné le module Usage du tabac - Étapes du changement (SCH).

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOSCA = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
6	SMK_01A = 2 et SMK_202 = 3	Population exclue	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	(SMK_202 = 1, 2) et (SCA_50 = 2 ou SCH_3= 2)	Le répondant n'a pas essayé d'arrêter de fumer l'an dernier (fumeur quotidien ou occasionnel)	
2	(SMK_202 = 1, 2) et (SCA_50 = 1 ou SCH_3 = 1)	Le répondant a essayé en vain d'arrêter de fumer l'an dernier (fumeur quotidien ou occasionnel)	
3	(SMKDSTY = 4, 5) et (SMK_06A = 1 ou SMK_09A = 1 ou SMK_10a = 1)	Le répondant a réussi à arrêter de fumer l'an dernier (ancien fumeur)	
4	(SMKDSTY = 4, 5) et [(2 <= SMK_06A <=4) ou (SMK_10 = 1 et (2 <= SMK_09A <=4)) ou (2 <= SMK_10A <=4)]	Le répondant a réussi à arrêter de fumer il y a plus d'un an (ancien fumeur)	
9	SMKDSTY = ND ou (SMK_202 = NSP, R, ND) ou (SMK_06A = NSP, R, ND) ou (SMK_09A = NSP, R, ND) ou (SMK_10 = NSP, R, ND) ou (SMK_10A = NSP, R, ND) ou (SCA_50 = NSP, R, ND) ou (SCH_3 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND

Usage du tabac - Étapes du changement (1 VD)

Le modèle des étapes du changement définit cinq étapes dans le processus de renoncement au tabac :

1) Préréflexion - La personne n'a aucune intention de changer de comportement dans un avenir prévisible (p. ex., arrêter de fumer).
2) Réflexion - La personne est consciente du problème et pense sérieusement à changer de comportement, mais n'est pas encore déterminée à agir ou n'est pas certaine d'être capable de maintenir le changement de comportement (autrement dit, pense sérieusement à arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours, mais n'a pas essayé d'arrêter pendant au moins 24 heures au cours des 12 derniers mois, ou pense sérieusement à cesser de fumer au cours des 6 prochains mois, mais pas au cours des 30 prochains jours).
3) Préparation - La personne prévoit sérieusement agir au cours du prochain mois et se sent capable de réussir (autrement dit, pense sérieusement à arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours et a déjà arrêté de fumer au moins une fois au cours des 12 derniers mois).
4) Action - La personne a réussi à modifier le comportement au cours des six derniers mois (autrement dit, a arrêté de fumer il y a moins de six mois).
5) Suivi - La personne a maintenu le changement de comportement pendant au moins six mois (autrement dit, a arrêté de fumer il y a au moins six mois).

1) Étapes du changement de l'usage du tabac (fumeurs et anciens fumeurs)

Nom de la variable : SCHDSTG

Basée sur : SMK_202, SMK_06A, SMK_06B, SMK_09A, SMK_09B, SMK_10, SMK_10A, SMK_10B, SCH_1, SCH_2, SCH_3, SCH_4, ADM_MOI

Description : Cette variable classe les fumeurs et les anciens fumeurs par catégorie d'après le modèle des étapes du changement.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOSCH= 2	Le module non sélectionné	SO
6	SMK_202 = 3 et SMK_01A = 2	Population exclue	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
1	(SMK_202 = 1, 2) et SCH_1 = 2	Étape de la préréflexion (fumeurs quotidiens ou occasionnels)	
2	(SMK_202 = 1, 2) et [(SCH_1 = 1 et SCH_2 = 2) ou (SCH_2 = 1 et SCH_3 = 2)]	Étape de la réflexion (fumeurs quotidiens ou occasionnels)	
3	(SMK_202 = 1, 2) et SCH_2 = 1 et (1 <= SCH_4 <= 95)	Étape de la préparation (fumeurs quotidiens ou occasionnels)	
4	SMK_202 = 3 et (SMK_06B < 6 mois d'après ADM_MOI) OU SMK_202 = 3 et SMK_10 = 1 et (SMK_09B < 6 mois d'après ADM_MOI) OU SMK_202 = 3 et (SMK_10B < 6 mois d'après ADM_MOI)	Étape de l'action (anciens fumeurs) Permet de déterminer si le répondant a cessé de fumer au cours des six mois qui ont précédé l'enquête	
5	SMK_202 = 3 et [(SMK_06A = 2, 3, 4) ou (SMK_06B >= 6 mois d'après ADM_MOI)] OU SMK_202 = 3 et SMK_10 = 1 et [(SMK_9A = 2, 3, 4) ou (SMK_09B >= 6 mois d'après ADM_MOI)] OU SMK_202 = 3 et [(SMK_10A = 2, 3, 4) ou (SMK_10B >= 6 mois d'après ADM_MOI)]	Étape du suivi (anciens fumeurs) Permet de déterminer si le répondant a cessé de fumer six mois ou plus avant l'enquête.	

9	(SMK_202 = NSP, R, ND) ou (SMK_06B = NSP, R, ND) ou (SMK_09B = NSP, R, ND) ou (SMK_10 = NSP, R, ND) ou (SMK_10B = NSP, R, ND) ou (SCH_1 = NSP, R, ND) ou (SCH_2 = NSP, R, ND) ou (SCH_3 = NSP, R, ND) ou (SCH_4 = NSP, R, ND)	Au moins une question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

Référence : DiClemente, C.C., Prochaska, J.O., Fairhurst, S., Velicer, W.F., Rossi J.S., & Velasquez, M. (1991). The process of smoking cessation: An analysis of precontemplation, contemplation and contemplation/action. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59, 295-304.

Activité physique - Étapes de changement (1 VD)

1) Étapes du changement - Activité physique

Nom de la variable : SCPDSTG

Basée sur : MAM_037, ADM_PRX, SCP_01, SCP_02, SCP_03, SCP_04

Description : Le modèle des étapes du changement définit cinq étapes dans le processus du changement pour l'activité physique.

1. Pré-réflexion: Le répondant rapporte être quelque peu ou pas du tout actif physiquement et n'a pas l'intention d'augmenter son niveau d'activité physique au cours des six prochains mois.

2. Réflexion: Le répondant rapporte être quelque peu ou pas du tout actif physiquement et a l'intention d'augmenter son niveau d'activité physique au cours des six prochains mois.

3. Préparation: Le répondant rapporte être quelque peu ou pas du tout actif physiquement et a l'intention d'augmenter son niveau d'activité physique au cours des 30 prochains jours.

4. Action: Le répondant rapporte être très ou modérément actif physiquement et a augmenté son niveau d'activité physique au cours des six derniers mois.

5. Suivi: Le répondant rapporte être très ou modérément actif physiquement et n'a pas augmenté son niveau d'activité physique au cours des six derniers mois.

Source: Transtheoretical model, Cancer Prevention Research Center www.uri.edu/research/cprc/measures/Exercise02.htm.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	(DoSCP=2) ou (MAM_037=1)	Le module n'a pas été sélectionné ou population exclue	SO
9	(ADM_PRX=1) ou (SCP_01 in (7:9)) ou (SCP_02 in (7:9)) ou SCP_03 in (7:9)) ou (SCP_04 in (7:9))	Interview par procuration ou le répondant a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
1	SCP_04=2	Pré-réflexion	
2	SCP_04=1	Réflexion	
3	SCP_03=1	Préparation	
4	SCP_01 in (1,2) and SCP_02=1	Action	
5	SCP_01 in (1,2) et SCP_02=2	Suivi	

Renseignements sociodémographiques (9 VD)

1) Pays de naissance - groupée

Nom de la variable : SDCGCB10

Basée sur : SDCCCB13

Description : Cette variable classe le répondant dans un groupe spécifique en fonction de son pays de naissance.

Note : Créée pour la première fois avec les données de 2011, cette variable est une mise à jour de SDCGCB. Le code du pays est fondé sur la Classification type des pays et des zones d'intérêt (CTPZI) de 2010. La CTPZI est la classification officielle des pays et des zones d'intérêt utilisée à Statistique Canada pour classer les statistiques.

1. Autre d'Amérique du Nord comprend États-Unis, Groenland et Saint-Pierre-et-Miquelon.
2. Amérique du Sud comprend Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud.
3. Océanie comprend Île Christmas, les îles Cocos (Keeling), et les îles mineures éloignées des États-Unis.
4. Antarctique et îles adjacentes comprend Antarctique, Île Bouvet, Île Heard et les îles McDonald, et Terres australes françaises.

Site internet : http://www.statcan.gc.ca/subjects-sujets/standard-norme/sccai-ctpzi/2010/sccaivar-ctpzivar-fra.htm

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99	SDCCCB13 in (99997, 99998, 99999)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	SDCCCB13 = 11124	Canada	
2	11000 <= SDCCCB13 < 12000	Autre - Amérique du Nord (1)	
3	12001 <= SDCCCB13 < 15000	Amérique du Sud, Amérique centrale et Antilles (2)	
4	21001 <= SDCCCB13 < 25000	Europe	
5	31001 <= SDCCCB13 < 36000	Afrique	
6	41001<= SDCCCB13 < 45000	Asie	
7	51001<= SDCCCB13 < 52000	Océanie (3)	
8	61001 <= SDCCCB13 < 62000	Antarctique et îles adjacentes (4)	

2) Première langue officielle parlée

Nom de la variable : SDCDFOLS

Basée sur : SDC_5A_1, SDCDFL1, SDCDLHM

Description : Pour les recensements, cette variable a été dérivée dans le cadre de l'application de la Loi sur les langues officielles. La même méthode pour dériver la variable est appliquée ici.

La méthode de dérivation est décrite dans le règlement concernant l'emploi des langues officielles dans la prestation de services au public. Elle tient compte premièrement de la connaissance des deux langues officielles, deuxièmement de la langue maternelle et troisièmement de la langue parlée à la maison.
Les personnes qui peuvent soutenir une conversation en français seulement ont le français comme première langue officielle parlée. Les personnes qui peuvent soutenir une conversation en anglais seulement ont l'anglais comme première langue officielle parlée. Les réponses aux questions sur la langue maternelle et sur la langue parlée à la maison sont ensuite utilisées pour établir la première langue officielle parlée des personnes qui peuvent parler le français et l'anglais ou qui ne parlent ni l'une ni l'autre des langues officielles. On inclut dans la catégorie « Français » les personnes qui ont le français seulement ou le français et au moins une langue non officielle comme langue maternelle. Les personnes qui ont l'anglais seulement ou l'anglais et au moins une langue non officielle comme langue maternelle sont incluses dans la catégorie « Anglais ». Pour les cas non encore classés, on inclut dans la catégorie « Français » les personnes ayant le français seulement ou le français et au moins une langue non officielle comme langue parlée à la maison. On procède de la même

manière pour la catégorie « Anglais ». La population se trouve ainsi classée dans deux catégories principales : d'une part le français et d'autre part l'anglais. Il faut ajouter deux catégories résiduelles pour les personnes qui n'ont pu être classées à l'aide des renseignements fournis : le français et l'anglais et ni le français ni l'anglais.
Veuillez consulter les documents suivants pour obtenir plus de renseignements : Règlement concernant l'emploi de l'une ou l'autre des langues officielles dans les communications avec le public et la prestation des services au public, enregistré le 16 décembre 1991 conformément à l'article 85 de la Loi sur les langues officielles, L.R.C., ch. 32 (4e supplément) et Estimations de la population selon la première langue officielle parlée, 1991, no 94-320 au catalogue, Division de la démographie, Statistique Canada.

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/ref/dict/pop034a-fra.cfm

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
SDCTLNG			
1	SDC_5A_1 in (1)	L'anglais seulement	
2	SDC_5A_1 in (2)	Le français seulement	
3	SDC_5A_1 in (3)	Le français et l'anglais	
4	SDC_5A_1 in (4)	Ni le français ni l'anglais	
9	SDC_5A_1 in (7:9)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1	[(SDDCTLNG=1 et (SDCDFL1 in (1,2,3,4,5,6,7,99)) et (SDCDLHM in (1,2,3,4,5,6,7,99)] ou [(SDCTLNG=3) et (SDCDFL1=1) et SDCDLHM in (1,2,3,4,5,6,7,99)] ou [(SDCTLNG=3) et SDCDFL1 in (3,4,7) et SDCDLHM in (1,5)] ou [(SDCTLNG=3) et (SDCDFL1=5) et (SDCDLHM in (1,2,3,4,5,6,7,99)] ou [(SDCTLNG=4) et (SDCDFL1=1) et (SDCDLHM in (1,2,3,4,5,6,7,99)] ou [(SDCTLNG=4) et SDCDFL1 in (3,4) et SDCDLHM in (1,5)] ou [(SDCTLNG=4) et SDCDFL1=5) et SDCDLHM in (1,2,3,4,5,6,7,99)] ou [(SDCTLNG=4) e SDCDFL1=7 et SDCDLHM in (1,5)] ou [(SDCTLNG=9) et SDCDFL1 in (1,5) et SDCDLHM in (1,2,3,4,5,6,7,99)] ou [(SDCTLNG=9) et SDCDFL1 in (3,4,7) et SDCDLHM in (1,5)] ou [(SDCTLNG=9) et (SDCDFL1 in(7,99) et (SDCDLHM=7,99) et (ADM_N12 = 1) et (ADM_PRX =2 et PMKPROXY > 1)] ou [SDCTLNG in (3,4,9) et (SDCDFL1=99) et SDCDLHM in (1,5)] ou [(SDCTLNG=9) et SDCDFL1 in (1,5) et SDCDLHM=99)]	Anglais	

2	[(SDCTLNG=2 et (SDCDFL1 in (1,2,3,4,5,6,7,99)) et (SDCDLHM in (1,2,3,4,5,6,7,99)] or [(SDCTLNG=3) et (SDCDFL1=2) et SDCDLHM in (1,2,3,4,5,6,7,99)] ou [(SDCTLNG=3) et SDCDFL1 in (3,4,7) et SDCDLHM in (2,6)] ou [(SDCTLNG=3) et (SDCDFL1=6) et (SDCDLHM in (1,2,3,4,5,6,7,99)] ou [(SDCTLNG=4) et (SDCDFL1=2) et (SDCDLHM in (1,2,3,4,5,6,7,99)] ou [(SDCTLNG=4) et SDCDFL1 in (3,4)et SDCDLHM in (2,6)] ou [(SDCTLNG=4) et SDCDFL1=6) et SDCDLHM in (1,2,3,4,5,6,7,99)] ou [(SDCTLNG=4) et SDCDFL1=7 et SDCDLHM in (2,6)] ou [(SDCTLNG=9) et SDCDFL1 in (2,6) et SDCDLHM in (1,2,3,4,5,6,7,99)] ou [(SDCTLNG=9) et SDCDFL1 in (3,4,7) et SDCDLHM in (2,6)] ou [(SDCTLNG=9) et (SDCDFL1 in(7,99) et (SDCDLHM=7,99) et (ADM_N12 = 2) et (ADM_PRX =2 et PMKPROXY > 1)] ou [SDCTLNG in (3,4,9) et (SDCDFL1=99) et SDCDLHM in (2,6)] ou [(SDCTLNG=9) et SDCDFL1 in (2,6) et SDCDLHM=99)]	Français

3	[(SDCTLNG=3) et SDCDFL1=3 and SDCDLHM in (3,7,99)] ou [(SDCTLNG=3) and SDCDFL1=4 and SDCDLHM in (4,7,99)] ou [(SDCTLNG=3) and SDCDFL1=7 and SDCDLHM in (3,4,7,99)] ou [(SDCTLNG=4) and SDCDFL1=3 and SDCDLHM in (3,4,7,99)] ou [(SDCTLNG=4) and SDCDFL1=4 and SDCDLHM in (3,4,7,99)] ou [(SDCTLNG=4) and SDCDFL1=7 and SDCDLHM in (3,4)] ou [(SDCTLNG=9) and SDCDFL1 in (3,4)and SDCDLHM in (3,4,7)] ou [(SDCTLNG=9) and SDCDFL1=7 and SDCDLHM in (3,4)] ou [(SDCTLNG in (3,4) and SDCDFL1=99 and SDCDLHM in (3,4,7,99)] ou [(SDCTLNG in (9) and SDCDFL1=99 and SDCDLHM in (3,4)] ou [(SDCTLNG in (9) and SDCDFL1 in (3,4) and SDCDLHM=99]	Anglais et Français	
4	[(SDCTLNG in (4,9) et SDCDFL1 in (7,99) et SDCDLHM in (7,99)] ou	Ni Anglais ni Français	
9	[(SDCTLNG=9) et (SDCDFL1=99) et (SDCDLHM=99)]	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non-déclaré) à au moins une question nécessaire	ND

3) Langue(s) parlée(s) le plus souvent à la maison

Nom de la variable : SDCDLHM

Basée sur : SDCC5B1, SDCC5B2, SDCC5B3

Description : Cette variable indique la ou les langue(s) parlée(s) le plus souvent par le répondant à la maison.

Note : À partir des données de 2011, la cueillette de cette information a été modifiée. Le répondant peut fournir jusqu'à trois réponses. De 2007 à 2011, il pouvait en fournir plusieurs, sans restriction quant au nombre de réponses. Avant 2007, les réponse multiples n'étaient pas acceptées et était recueillie dans la question SDC_Q5A.

Site internet : http://www.statcan.gc.ca/concepts/definitions/language-langue02-fra.htm

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
SDCT5B1			
1	SDCC5B1 = 21010000	Première réponse fournie: anglais	
2	SDCC5B1 = 21020000	Première réponse fournie: français	
3	SDCC5B1 = 22240000 ou (SDCC5B1 > 21020000 and SDCC5B1 < 90000000)	Première réponse fournie: autre qu'anglais ou français	

6	SDCC5B1 = 99999996	Sans objet
9	SDCC5B1 >= 99999997 and SDCC5B1 <= 99999999	Non déclaré
SDCT5B2		
1	SDCC5B2 = 21010000	Deuxième réponse fournie: anglais
2	SDCC5B2 = 21020000	Deuxième réponse fournie: français
3	SDCC5B2 = 22240000 ou (SDCC5B2 > 21020000 and SDCC5B2 < 90000000)	Deuxième réponse fournie: autre qu'anglais ou français
6	SDCC5B2 = 99999996	Sans objet
9	SDCC5B2 >= 99999997 et SDCC5B2 <= 99999999	Non déclaré
SDCT5B3		
1	SDCC5B3 = 21010000	Troisième réponse fournie: anglais
2	SDCC5B3 = 21020000	Troisième réponse fournie: français
3	SDCC5B3 = 22240000 ou (SDCC5B3 > 21020000 and SDCC5B3 < 90000000)	Troisième réponse fournie: autre qu'anglais ou français
6	SDCC5B3 = 99999996	Sans objet
9	SDCC5B3 >= 99999997 et SDCC5B3 <= 99999999 then SDCT5B3 = 9	Non déclaré
SDCT5_E		
1	SDCT5B1 = 1 or SDCT5B2 = 1 or SDCT5B3 = 1	Anglais déclaré dans SDCC5B1 ou SDCC5B2 ou SDCC5B3
SDCT5_F		
1	SDCT5B1 = 2 or SDCT5B2 = 2 or SDCT5B3 = 2	Français déclaré dans SDCC5B1 ou SDCC5B2 ou SDCC5B3
SDCT5_O		
1	SDCT5B1 = 3 or SDCT5B2 = 3 or SDCT5B3 = 3	Autre langue déclarée dans SDCC5B1 ou SDCC5B2 ou SDCC5B3

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99	SDCT5B1=999	La question requise n'a pas été répondue	ND
1	SDCT5_E=1 et SDCT5_F=0 et SDCT5_O=0	Anglais	
2	SDCT5_E=0 et SDCT5_F=1 et SDCT5_O=0	Français	
3	SDCT5_E=1 et SDCT5_F=1 et SDCT5_O=0	Anglais et français	
4	SDCT5_E=1 et SDCT5_F=1 et SDCT5_O=1	Anglais, français et autre	
5	SDCT5_E=1 et SDCT5_F=0 et SDCT5_O=1	Anglais et autre	
6	SDCT5_E=0 et SDCT5_F=1 et SDCT5_O=1	Français et autre	
7	SDCT5_E = 0 et SDCT5_F = 0 et SDCT5_O = 1	Autre	

4) Âge au moment de l'immigration

Nom de la variable : SDCDAIM

Basée sur : SDCCCB13, SDC_3, DHH_YOB

Description : Cette variable indique l'âge du répondant au moment de son immigration au Canada.

Note : Les répondants qui n'ont pas immigré sont exclus de cette population.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
996	SDCCCB13 = SO	Population exclue	SO
996	SDC_3 = SO	Population exclue	SO
999	(SDC_3 = NSP, R, ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
SDC_3 - DHH_YOB	SDC_3 < SO	Âge au moment de l'immigration	[min : 0 ; max : 121 (âge actuel)]

5) Indicateur d'immigration

Nom de la variable : SDCFIMM

Basée sur : SDCCCB13, SDC_3

Description : Cette variable indique si le répondant est un immigrant.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
6	SDCCCB13 = SO	Population exclue	SO
9	(SDC_3 = NSP, R, ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
1	SDC_3 < SO	Le répondant est un immigrant	
2	SDC_3 = SO	Le répondant n'est pas un immigrant	

6) Nombre d'années au Canada depuis l'immigration

Nom de la variable : SDCDRES

Basée sur : SDCCCB13, SDC_3, ADM_YOI

Description : Cette variable donne le nombre d'années que le répondant est au Canada depuis son immigration.

Note : Les répondants qui n'ont pas immigré sont exclus de cette population.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
996	SDCCCB13 = SO	Le module n'a pas été sélectionné ou population exclue	SO
996	SDC_3 = SO	Population exclue	SO
999	(SDC_3 = NSP, R, ND)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
ADM_YOI - SDC_3	SDC_3 < SO	Nombre d'année au Canada depuis l'immigration (date de l'entrevue - date de l'immigration)	[min : 0 ; max : 121 (âge actuel)]

7) Première langue officielle apprise dans l'enfance et encore comprise - Langue maternelle

Nom de la variable : SDCDFL1

Basée sur : SDCC61, SDCC62, SDCC63

Description : Cette variable indique la première langue apprise en premier lieu à la maison dans l'enfance et toujours comprise.

Note : À partir des données de 2011, la cueillette de cette information a été modifiée. Le répondant peut fournir jusqu'à trois réponses. Avant 2011, il pouvait en fournir plusieurs, sans restriction quant au nombre de réponses.

Site internet : http://www.statcan.gc.ca/concepts/definitions/language-langue01-fra.htm

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
SDCT6_1			
1	SDCC61 = 21010000	Première réponse fournie: anglais	
2	SDCC61 = 21020000	Première réponse fournie: français	
3	SDCC61 = 22240000 ou (SDCC61 > 21020000 et SDCC61 < =90000000)	Première réponse fournie: autre qu'anglais ou français	
9	SDCC61 >= 99999997 et SDCC6_1 <= 99999999	Non déclaré	
SDCT6_2			
1	SDCC62 = 21010000	Deuxième réponse fournie: anglais	
2	SDCC62 = 21020000	Deuxième réponse fournie: français	
3	SDCC62 = 22240000 ou (SDCC62 > 21020000 et SDCC62 < 90000000)	Deuxième réponse fournie: autre qu'anglais ou français	
9	SDCC62 >= 99999997 et SDCC62 <= 99999999	Non déclaré	
SDCT6_3			
1	SDCC63 = 21010000	Troisième réponse fournie: anglais	
2	SDCC63 = 21020000	Troisième réponse fournie: français	
3	SDCC63 = 22240000 ou (SDCC63 > 21020000 et SDCC63 < 90000000)	Troisième réponse fournie: autre qu'anglais ou français	
9	SDCC63 >= 99999997 et SDCC63 <= 99999999	Non déclaré	
SDCT6_E			
1	SDCT6_1 = 1 ou SDCT6_2 = 1 ou SDCT6_3 = 1	Anglais déclaré dans SDCC6_1 ou SDCC6_2 ou SDCC6_3	
SDCT6_F			
1	SDCT6_1 = 2 ou SDCT6_2 = 2 ou SDCT6_3 = 2	Français déclaré dans SDCC6_1 ou SDCC6_2 ou SDCC6_3	
SDCT6_O			
1	SDCT6_1 = 3 ou SDCT6_2 = 3 ou SDCT6_3 = 3	Autre langue déclarée dans SDCC6_1 ou SDCC6_2 ou SDCC6_3	

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1	SDCT6_E = 1 et SDCT6_F = 0 et SDCT6_O = 0	Anglais	
2	SDCT6_E = 0 et SDCT6_F = 1 et SDCT6_O = 0	Français	

3	SDCT6_E = 1 et SDCT6_F = 1 et SDCT6_O = 0	Anglais et français	
4	SDCT6_E = 1 et SDCT6_F = 1 et SDCT6_O = 1	Anglais, français et autre	
5	SDCT6_E = 1 et SDCT6_F = 0 et SDCT6_O = 1	Anglais et autre	
6	SDCT6_E = 0 et SDCT6_F = 1 et SDCT6_O = 1	Français et autre	
7	SDCT6_E = 0 et SDCT6_F = 0 et SDCT6_O = 1	Autre	
99	si SDCT6_1 = 999	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND

8) Identité autochtone

Nom de la variable : SDCDABT

Basée sur : SDC_41

Description : Cette variable dérivée sert à indiquer si le répondant a déclaré être Autochtone.

Note : En 2011, le terme "Premières nations" a remplacé "Indien de l'Amérique du Nord" dans la question qui recueille l'identité autochtone (SDC_Q4B_1). De plus, en 2011, cette question a été demandée seulement aux répondants qui ont déclaré être nés au Canada, États-Unis, en Allemagne ou au Groenland. Cette question n'a pas été demandée aux autres répondants.

Avant juin 2005 (milieu du cycle 3.1), les répondants pouvaient déclarer des origines autochtones et d'autres origines culturelles ou raciales. On attribuait une valeur de un à tous les répondants Autochtones pour cette variable, peu importe s'ils avaient déclaré des origines Autochtones uniquement ou en combinaison avec des origines non Autochtones. Depuis juin 2005, les répondants s'identifiant comme Autochtones n'ont pas à répondre aux questions SDC_Q43A à SDC_Q43M, qui servent à recueillir des données sur les autres origines. Ce changement a été adopté en conformité avec les procédures utilisées dans le Recensement de 2006.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9	SDC_41 en (7,8,9)	La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
6	SDC_41 = 6	Le module n’a pas été sélectionné ou population exclue	SO
1	SDC_41 = 1	Identité autochtone (Première nation, Métis, Inuk/Inuit)	
2	SDC_41 = 2	Aucune identité autochtone	

9) Origine culturelle/raciale

Nom de la variable : SDCDCGT

Basée sur : SDC_43A, SDC_43B, SDC_43C, SDC_43D, SDC_43E, SDC_43F, SDC_43G, SDC_43H, SDC_43I, SDC_43J, SDC_43K, SDC_43M

Description : Cette variable indique l'origine culturelle ou raciale du répondant. Depuis le milieu du cycle 3.1, cette variable exclut tous les répondants qui s'identifient comme Autochtones dans la question SDC_41. (L'exclusion des Autochtones de cette variable a commencé au milieu du cycle 3.1 par souci de conformité avec les méthodes du Recensement de 2006.)

Note : À compter de 2011, un maximum de quatre réponses peuvent être saisies durant l'interview à la question SDC_Q4C. Avant 2011, il n'y avait aucune limite quant au nombre d'origine raciale ou culturelle qui pouvaient être recueillies à cette question.

Avant juin 2005, la variable dérivée comprenait les catégories « origines culturelles ou raciales multiples » et « Autochtone seulement ». Les répondants qui avaient déclaré une origine autochtone en combinaison avec une autre origine étaient classés dans la catégorie « origines culturelles ou raciales multiples » et les répondants qui avaient déclaré une origine autochtone mais aucune autre origine étaient classés dans la catégorie « Autochtone seulement » pour la variable dérivée. À

compter de juin 2005, la question sur l'origine raciale ou culturelle n'est plus demandée aux répondants s'étant identifiés comme Autochtones « SDC_41=1 » ou ayant rédondu « Ne sais pas» ou « Refus» (SDC_41 = 7 ou 8) à la question portant sur les origines autochtones. Ce changement a été adopté en conformité avec les procédures utilisées dans le Recensement de 2006.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99	(SDC_43A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu à la question requise (ne sait pas, refus, non déclaré)	ND
96	SDC_41 = 1	Identité autochtone	SO
1	SDC_43A = 1 et SDC_43B > 1 et SDC_43C > 1 et SDC_43D > 1 et SDC_43E > 1 et SDC_43F > 1 et SDC_43G > 1 et SDC_43H > 1 et SDC_43I > 1 et SDC_43J > 1 et SDC_43K > 1 et SDC_43M > 1	Blanc seulement	
2	SDC_43A > 1 et SDC_43B > 1 et SDC_43C > 1 et SDC_43D = 1 et SDC_43E > 1 et SDC_43F > 1 et SDC_43G > 1 et SDC_43H > 1 et SDC_43I > 1 et SDC_43J > 1 et SDC_43K > 1 et SDC_43M > 1	Noir seulement	
3	SDC_43A > 1 et SDC_43B > 1 et SDC_43C > 1 et SDC_43D > 1 et SDC_43E > 1 et SDC_43F > 1 et SDC_43G > 1 et SDC_43H > 1 et SDC_43I > 1 et SDC_43J > 1 et SDC_43K = 1 et SDC_43M > 1	Coréen seulement	
4	SDC_43A > 1 et SDC_43B > 1 et SDC_43C > 1 et SDC_43D > 1 et SDC_43E = 1 et SDC_43F > 1 et SDC_43G > 1 et SDC_43H > 1 et SDC_43I > 1 et SDC_43J > 1 et SDC_43K > 1 et SDC_43M > 1	Philippin seulement	

5	SDC_43A > 1 et SDC_43B > 1 et SDC_43C > 1 et SDC_43D > 1 et SDC_43E > 1 et SDC_43F > 1 et SDC_43G > 1 et SDC_43H > 1 et SDC_43I > 1 et SDC_43J = 1 et SDC_43K > 1 et SDC_43M > 1	Japonais seulement
6	SDC_43A > 1 et SDC_43B = 1 et SDC_43C > 1 et SDC_43D > 1 et SDC_43E > 1 et SDC_43F > 1 et SDC_43G > 1 et SDC_43H > 1 et SDC_43I > 1 et SDC_43J > 1 et SDC_43K > 1 et SDC_43M > 1	Chinois seulement
7	SDC_43A > 1 et SDC_43B > 1 et SDC_43C = 1 et SDC_43D > 1 et SDC_43E > 1 et SDC_43F > 1 et SDC_43G > 1 et SDC_43H > 1 et SDC_43I > 1 et SDC_43J > 1 et SDC_43K > 1 et SDC_43M > 1	Asiatique du sud seulement
8	SDC_43A > 1 et SDC_43B > 1 et SDC_43C > 1 et SDC_43D > 1 et SDC_43E > 1 et SDC_43F > 1 et SDC_43G = 1 et SDC_43H > 1 et SDC_43I > 1 et SDC_43J > 1 et SDC_43K > 1 et SDC_43M > 1	Asiatique du Sud-Est seulement
9	SDC_43A > 1 et SDC_43B > 1 et SDC_43C > 1 et SDC_43D > 1 et SDC_43E > 1 et SDC_43F > 1 et SDC_43G > 1 et SDC_43H = 1 et SDC_43I > 1 et SDC_43J > 1 et SDC_43K > 1 et SDC_43M > 1	Arabes seulement

10	SDC_43A > 1 et SDC_43B > 1 et SDC_43C > 1 et SDC_43D > 1 et SDC_43E > 1 et SDC_43F > 1 et SDC_43G > 1 et SDC_43H > 1 et SDC_43I = 1 et SDC_43J > 1 et SDC_43K > 1 et SDC_43M > 1	Asie occidentale seulement
11	SDC_43A > 1 et SDC_43B > 1 et SDC_43C > 1 et SDC_43D > 1 et SDC_43E > 1 et SDC_43F = 1 et SDC_43G > 1 et SDC_43H > 1 et SDC_43I > 1 et SDC_43J > 1 et SDC_43K > 1 et SDC_43M > 1	Latino-Américain seulement
12	SDC_43A > 1 et SDC_43B > 1 et SDC_43C > 1 et SDC_43D > 1 et SDC_43E > 1 et SDC_43F > 1 et SDC_43G > 1 et SDC_43H > 1 et SDC_43I > 1 et SDC_43J > 1 et SDC_43K > 1 et SDC_43M = 1	Autres origines culturelles ou raciales (seulement)
13	SDC_41 > 1 et Plus d'une catégories répondues à partir de SDC_43A à SDC_43M.	Origines culturelles ou raciales multiples

État de santé (SF-36) (10 VD)

La version abrégée, contenant 36 questions (Short Form 36 ou SF 36), du questionnaire de la Medical Outcomes Study est un indicateur générique de l'état de santé conçu pour être utilisé dans les enquêtes sur la population et les études d'évaluation de la politique en matière de santé. Le SF 36 a été élaboré par John E. Ware Jr., à l'Institute for the Improvement of Medical Care and Health, New England Medical Center Hospitals. Les questions du SF 36 sont extraites des 245 questions originales de la Medical Outcomes Study (MOS). Le SF 36 comprend des échelles à items multiples pour l'évaluation des trois attributs importants de la santé et des huit concepts de l'état de santé qui suivent :

État fonctionnel
- Fonctionnement physique
- Fonctionnement social
- Limitations du rôle attribuées à des problèmes physiques
- Limitations du rôle attribuées à des problèmes émotionnels

Bien-être
- Santé mentale
- Énergie (vitalité)
- Douleur physique

Évaluation globale de la santé
- Autoévaluation de l'état de santé général

Une échelle est calculée pour chacun des huit concepts d'état de santé. Sur chaque échelle, la notation est telle qu'une cote élevée correspond à un état de santé positif. Par exemple, la notation sur une échelle de « fonctionnement » est telle qu'une cote élevée reflète une augmentation fonctionnelle.

Afin de faciliter les comparaisons entre les échelles du SF 36, les cotes brutes obtenues pour chaque échelle sont transformées linéairement en une échelle de 0 à 100 au moyen de la formule :

Échelle transformée = [(cote actuelle - cote possible la plus faible) / fourchette de cotes possibles] X 100

La cote transformée reflète la position relative du répondant sur le continuum allant de la cote la plus faible à la cote la plus élevée possible de l'échelle.

Deux mesures sommaires de la santé physique et mentale sont également construites d'après les huit échelles.

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
SFRT01			
1	GEN_01 = 5	Les réponses doivent être rééchelonnées pour créer les huit échelles conceptuelles de la santé	
2,0	GEN_01 = 4	Les réponses doivent être rééchelonnées pour créer les huit échelles conceptuelles de la santé	
3,4	GEN_01 = 3	Les réponses doivent être rééchelonnées pour créer les huit échelles conceptuelles de la santé	
4,4	GEN_01 = 2	Les réponses doivent être rééchelonnées pour créer les huit échelles conceptuelles de la santé	
5	GEN_01 = 1	Les réponses doivent être rééchelonnées pour créer les huit échelles conceptuelles de la santé	
SFRT20			
(6 – SFR_20)	Tous	Les réponses doivent être rééchelonnées pour créer les huit échelles conceptuelles de la santé	
SFRT21			
1	SFR_21 = 6	Les réponses doivent être rééchelonnées pour créer les huit échelles conceptuelles de la santé	
2,2	SFR_21 = 5	Les réponses doivent être rééchelonnées pour créer les huit échelles conceptuelles de la santé	
3,1	SFR_21 = 4	Les réponses doivent être rééchelonnées pour créer les huit échelles conceptuelles de la santé	
4,2	SFR_21 = 3	Les réponses doivent être rééchelonnées pour créer les huit échelles conceptuelles de la santé	
5,4	SFR_21 = 2	Les réponses doivent être rééchelonnées pour créer les huit échelles conceptuelles de la santé	
6	SFR_21 = 1	Les réponses doivent être rééchelonnées pour créer les huit échelles conceptuelles de la santé	
SFRT22			

1	SFR_22 = 5 et (1 <= SFR_21 <= 6)	Les réponses doivent être rééchelonnées pour créer les huit échelles conceptuelles de la santé
2	SFR_22 = 4 et (1 <= SFR_21 <= 6)	Les réponses doivent être rééchelonnées pour créer les huit échelles conceptuelles de la santé
3	SFR_22 = 3 et (1 <= SFR_21 <= 6)	Les réponses doivent être rééchelonnées pour créer les huit échelles conceptuelles de la santé
4	SFR_22 = 2 et (1 <= SFR_21 <= 6)	Les réponses doivent être rééchelonnées pour créer les huit échelles conceptuelles de la santé
5	SFR_22 = 1 et (2 <= SFR_21 <= 6)	Les réponses doivent être rééchelonnées pour créer les huit échelles conceptuelles de la santé
6	SFR_22 = 1 et SFR_21 = 1	Les réponses doivent être rééchelonnées pour créer les huit échelles conceptuelles de la santé
SFRT23		
(7 – SFR_23)	Tous	Les réponses doivent être rééchelonnées pour créer les huit échelles conceptuelles de la santé
SFRT26		
(7 – SFR_26)	Tous	Les réponses doivent être rééchelonnées pour créer les huit échelles conceptuelles de la santé
SFRT27		
(7 – SFR_27)	Tous	Les réponses doivent être rééchelonnées pour créer les huit échelles conceptuelles de la santé
SFRT30		
(7 – SFR_30)	Tous	Les réponses doivent être rééchelonnées pour créer les huit échelles conceptuelles de la santé
SFRT34		
(6 – SFR_34)	Tous	Les réponses doivent être rééchelonnées pour créer les huit échelles conceptuelles de la santé
SFRT36		
(6 – SFR_36)	Tous	Les réponses doivent être rééchelonnées pour créer les huit échelles conceptuelles de la santé

1) Échelle de fonctionnement physique

Nom de la variable : SFRDPFS

Basée sur : SFR_03, SFR_04, SFR_05, SFR_06, SFR_07, SFR_08, SFR_09, SFR_10, SFR_11, SFR_12

Description : Cette variable mesure le niveau de fonctionnement physique du répondant comparativement à la population générale.

Note : Une cote élevée reflète une augmentation du fonctionnement physique.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
996	DOSFR = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999	(SFR_03 = NSP, R, ND) ou (SFR_04 = NSP, R, ND) ou (SFR_05 = NSP, R, ND) ou (SFR_06 = NSP, R, ND) ou (SFR_07 = NSP, R, ND) ou (SFR_08 = NSP, R, ND) ou (SFR_09 = NSP, R, ND) ou (SFR_10 = NSP, R, ND) ou (SFR_11 = NSP, R, ND) ou (SFR_12 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND

100*[(SFR_03 + SFR_04 + SFR_05 + SFR_06 + SFR_07 + SFR_08 + SFR_09 + SFR_10 + SFR_11 + SFR_12) - 10] / 20	(1 <= SFR_03 <= 3) et (1 <= SFR_04 <= 3) et (1 <= SFR_05 <= 3) et (1 <= SFR_06 <= 3) et (1 <= SFR_07 <= 3) et (1 <= SFR_08 <= 3) et (1 <= SFR_09 <= 3) et (1 <= SFR_10 <= 3) et (1 <= SFR_11 <= 3) et (1 <= SFR_12 <= 3)	Cote obtenue sur l'échelle de fonctionnement physique	(min: 0; max: 100)

2) Échelle de fonctionnement social

Nom de la variable : SFRDSFS

Basée sur : SFR_20, SFR_32

Description : Cette variable mesure le niveau de fonctionnement social du répondant comparativement à la population générale.

Note : Une cote élevée reflète une augmentation du fonctionnement social.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
996	DOSFR = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999	(SFR_20 = NSP, R, ND) ou (SFR_32 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
100*[(SFRT20 + SFR_32) - 2] / 9	(1 <= SFRT20 <= 5) et (1 <= SFR_32 <= 5)	Cote obtenue sur l'échelle de fonctionnement social	(min: 0; max: 100)

3) Échelle du rôle du fonctionnement (physique)

Nom de la variable : SFRDPRF

Basée sur : SFR_13, SFR_14, SFR_15, SFR_16

Description : Cette variable mesure les limitations du rôle dues à des problèmes de santé physique du répondant comparativement à la population générale.

Note : Une cote élevée reflète une augmentation du fonctionnement physique (c. à d. moins de limitations).

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
996	DOSFR = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999	(SFR_13 = NSP, R, ND) ou (SFR_14 = NSP, R, ND) ou (SFR_15 = NSP, R, ND) ou (SFR_16 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
100*[(SFR_13 + SFR_14 + SFR_15 + SFR_16) - 4] / 4	(1 <= SFR_13 <= 2) et (1 <= SFR_14 <= 2) et (1 <= SFR_15 <= 2) et (1 <= SFR_16 <= 2)	Cote obtenue sur l'échelle de fonctionnement (physique) concernant le rôle	(min: 0; max: 100)

4) Échelle du rôle du fonctionnement (mental)

Nom de la variable : SFRDMRF

Basée sur : SFR_17, SFR_18, SFR_19

Description : Cette variable mesure le fonctionnement mental concernant le rôle du répondant comparativement à la population générale.

Note : Une cote élevée concorde avec un état de santé mentale positif.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
996	DOSFR = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999	(SFR_17 = NSP, R, ND) ou (SFR_18 = NSP, R, ND) ou (SFR_19 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
100*[(SFR_17 + SFR_18 + SFR_19) - 3] / 3	(1 <= SFR_17 <= 2) et (1 <= SFR_18 <= 2) et (1 <= SFR_19 <= 2)	Cote obtenue sur l'échelle de fonctionnement (mental) concernant le rôle	(min: 0; max: 100)

5) Échelle sur l'état de santé mentale générale

Nom de la variable : SFRDGMH

Basée sur : SFR_24, SFR_25, SFR_26, SFR_28, SFR_30

Description : Cette variable indique l'état général de santé mentale des membres de la population observée.

Note : L'échelle est transformée pour faciliter les comparaisons entre échelles et refléter une position relative. Une cote élevée concorde avec un état général de santé mentale positif.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
996	DOSFR = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999	(SFR_24 = NSP, R, ND) ou (SFR_25 = NSP, R, ND) ou (SFR_26 = NSP, R, ND) ou (SFR_28 = NSP, R, ND) ou (SFR_30 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
100*[(SFR_24 + SFR_25 + SFRT26 + SFR_28 + SFRT30) - 5] / 25	(1 <= SFR_24 <= 6) et (1 <= SFR_25 <= 6) et (1 <= SFRT26 <= 6) et (1 <= SFR_28 <= 6) et (1 <= SFRT30 <= 6)	Cote obtenue sur l'échelle de santé mentale générale	(min: 0; max: 100)

6) Échelle de vitalité

Nom de la variable : SFRDVTS

Basée sur : SFR_23, SFR_27, SFR_29, SFR_31

Description : Cette variable donne une mesure de l'énergie (vitalité) du répondant comparativement à la population générale.

Note : Une cote élevée concorde avec un niveau positif d'énergie.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
996	DOSFR = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999	(SFR_23 = NSP, R, ND) ou (SFR_27 = NSP, R, ND) ou (SFR_29 = NSP, R, ND) ou (SFR_31 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
100*[(SFRT23 + SFRT27 + SFR_29 + SFR_31) - 4] / 20	(1 <= SFRT23 <= 6) et (1 <= SFRT27 <= 6) et (1 <= SFR_29 <= 6) et (1 <= SFR_31 <= 6)	Cote obtenue sur l'échelle de vitalité	(min: 0; max: 100)

7) Échelle de douleurs physiques

Nom de la variable : SFRDBPS

Basée sur : SFR_21, SFR_22

Description : Cette variable donne une mesure de la douleur physique éprouvée par le répondant comparativement à la population générale.

Note : Une cote élevée concorde avec une diminution du niveau de douleur.

Spécifications			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
996	DOSFR = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999	(SFRT21 = NSP, R, ND) ou (SFRT22 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
100*((SFRT21 + SFRT22) - 2) / 10	(1 <= SFRT21 <= 6) et (1 <= SFRT22 <= 6)	Cote obtenue sur l'échelle de douleur physique	(min: 0; max: 100)

8) Échelle d'autoévaluation de l'état de santé général

Nom de la variable : SFRDGHP

Basée sur : SFR_01, SFR_33, SFR_34, SFR_35, SFR_36

Description : Cette variable indique comment le répondant perçoit son état de santé général comparativement à la population générale.

Note : Une cote élevée concorde avec une perception positive de l'état de santé général.

Reformatage temporaire			
Valeur	**Condition(s)**	**Description**	**Notes**
SFRDBPST			
(SFRDBPS - 75,49196) / 23,55879		Reformater les huit échelles conceptuelles de la santé pour calculer deux mesures sommaires de la santé physique et mentale	
SFRDGHPT			

(SFRDGHP - 72,21316) / 20,16964	Reformater les huit échelles conceptuelles de la santé pour calculer deux mesures sommaires de la santé physique et mentale
SFRDGMHT	
(SFRDGMH - 74,84212) / 18,01189	Reformater les huit échelles conceptuelles de la santé pour calculer deux mesures sommaires de la santé physique et mentale
SFRDMRFT	
(SFRDMRF - 81,29467) / 33,02717	Reformater les huit échelles conceptuelles de la santé pour calculer deux mesures sommaires de la santé physique et mentale
SFRDPFST	
(SFRDPFS - 84,52404) / 22,89490	Reformater les huit échelles conceptuelles de la santé pour calculer deux mesures sommaires de la santé physique et mentale
SFRDPRFT	
(SFRDPRF - 81,19907) / 33,79729	Reformater les huit échelles conceptuelles de la santé pour calculer deux mesures sommaires de la santé physique et mentale
SFRDSFST	
(SFRDSFS - 83,59753) / 22,37642	Reformater les huit échelles conceptuelles de la santé pour calculer deux mesures sommaires de la santé physique et mentale
SFRDVTST	
(SFRDVTS - 61,05453) / 20,86942	Reformater les huit échelles conceptuelles de la santé pour calculer deux mesures sommaires de la santé physique et mentale

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
996	DOSFR = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
999	(SFRT01 = NSP, R, ND) ou (SFR_33 = NSP, R, ND) ou (SFR_34 = NSP, R, ND) ou (SFR_35 = NSP, R, ND) ou (SFR_36 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
100*[(SFRT01 + SFR_33 + SFRT34 + SFR_35 + SFRT36) - 5] / 20	(1 <= SFRT01 <= 5) et (1 <= SFR_33 <= 5) et (1 <= SFRT34 <= 5) et (1 <= SFR_35 <= 5) et (1 <= SFRT36 <= 5)	Cote obtenue sur l'échelle d'autoévaluation de l'état de santé général	(min: 0; max: 100)

9) Mesure sommaire de l'état de santé physique

Nom de la variable : SFRDPCS

Basée sur : SFRDPFS, SFRDSFS, SFRDPRF, SFRDMRF, SFRDGMH, SFRDVTS, SFRDBPS, SFRDGHP

Description : Cette variable est une mesure sommaire de l'état de santé physique construite d'après les huit échelles conceptuelles de la santé (fonctionnement physique, fonctionnement social, limitations du rôle - physiques, limitations du rôle - mentales, santé mentale générale, vitalité, douleur physique, autoévaluation de l'état de santé général.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DOSFR = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99	SFRDPFS = ND ou SFRDSFS = ND ou SFRDPRF = ND ou SFRDMRF = ND ou SFRDGMH = ND ou SFRDVTS = ND ou SFRDBPS = ND ou SFRDGHP = ND	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
[((SFRDPFST * .42402) + (SFRDSFST * -.00753) + (SFRDPRFT * .35119) + (SFRDMRFT * -.19206) + (SFRDGMHT * -.22069) + (SFRDVTST * .02877) + (SFRDBPST * .31754) + (SFRDGHPT * .24954)) * 10] + 50	SFRDPFS <> ND et SFRDSFS <> ND et SFRDPRF <> ND et SFRDMRF <> ND et SFRDGMH <> ND et SFRDVTS <> ND et SFRDBPS <> ND et SFRDGHP <> ND	Mesure de la santé physique	(min: 8; max 68)

10) Mesure sommaire de l'état de santé mentale

Nom de la variable : SFRDMCS

Basée sur : SFRDPFS, SFRDSFS, SFRDPRF, SFRDMRF, SFRDGMH, SFRDVTS, SFRDBPS, SFRDGHP

Description : Cette variable est une mesure sommaire de la santé mentale construite d'après les huit échelles conceptuelles de la santé (fonctionnement physique, fonctionnement social, limitations du rôle - physiques, limitations du rôle - mentales, santé mentale générale, vitalité, douleur physique, autoévaluation de l'état de santé général.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
96	DOSFR = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
99	SFRDPFS = ND ou SFRDSFS = ND ou SFRDPRF = ND ou SFRDMRF = ND ou SFRDGMH = ND ou SFRDVTS = ND ou SFRDBPS = ND ou SFRDGHP = ND	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND

[((SFRDPFST * -.22999) + (SFRDSFST * .26876) + (SFRDPRFT * -.12329) + (SFRDMRFT * .43407) + (SFRDGMHT * .48581) + (SFRDVTST * .23534) + (SFRDBPST * -.09731) + (SFRDGHPT * -.01571)) * 10] + 50	SFRDPFS <> ND et SFRDSFS <> ND et SFRDPRF <> ND et SFRDMRF <> ND et SFRDGMH <> ND et SFRDVTS <> ND et SFRDBPS <> ND et SFRDGHP <> ND	Mesure sommaire de la santé mentale	(min: 3; max: 74)

Usage du tabac (3 VD)

1) Genre de fumeur

Nom de la variable : SMKDSTY

Basée sur : SMK_01A, SMK_01B, SMK_202, SMK_05D

Description : Cette variable indique le genre de fumeur qu'est le répondant en fonction de ses habitudes.

Note : La variable indique aussi la consommation de cigarette au cours de la vie.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
1	SMK_202 = 1	Fume tous les jours	
2	SMK_202 = 2 et SMK_05D = 1	Fume à l'occasion mais fumait tous les jours auparavant	
3	SMK_202 = 2 et (SMK_05D = 2, SO)	Fume à l'occasion (n'a jamais fumé tous les jours ou a fumé moins de 100 cigarettes au cours de sa vie)	
4	SMK_202 = 3 et SMK_05D = 1	Fumait tous les jours auparavant (non-fumeur maintenant)	
5	SMK_202 = 3 et [[SMK_05D = 2 ou SMK_05D = 6] et [SMK_01A = 1 ou SMK_01B = 1]]	Fumait à l'occasion auparavant (au moins une cigarette, non-fumeur maintenant)	
6	SMK_202 = 3 et SMK_01A = 2 et SMK_01B = 2	N'a jamais fumé une cigarette complète	
99	(SMK_01A = NSP, R, ND) ou (SMK_01B = NSP, R, ND) ou (SMK_202 = NSP, R, ND) ou (SMK_05D = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND

Référence :En 2010, la programmation des catégories de réponses pour cette variable a changé. Les répondants qui ont déclaré être non fumeurs, qui n'ont pas fumé plus de 100 cigarettes et qui ont déjà fumé une cigarette complète (SMK_202=3, SMK_05D=5, SMK_01A=2 et SMK_01B=1) étaient auparavant assignés à la catégorie non déclaré (SMKDSTY = 99). Ils auraient dû être classés dans la catégorie ancien fumeur occasionnel (fumé au moins une cigarette complète, maintenant non fumeur) (SMKDSTY = 5). La programmation a été ajustée pour refléter ce changement.

2) Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement

Nom de la variable : SMKDSTP

Basée sur : SMK_06A, SMK_06C, SMK_09A, SMK_09C, SMK_10, SMK_10A, SMK_10C, SMKDSTY

Description : Cette variable indique le nombre approximatif d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement.

Note : Les fumeurs, les répondants qui n'ont jamais fumé une cigarette complète et les répondants qui ont fumé moins de 100 cigarettes au cours de leur vie sont exclus de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
996	(SMKDSTY = 1, 2, 3, 6, SO) ou (SMK_202 = 3 et SMK_01A = 2 et SMK_01B = 1)	Population exclue	SO

999	SMKDSTY = ND ou (SMK_10 = NSP, R, ND) ou (SMK_06A = NSP, R, ND) ou (SMK_06C = NSP, R, ND) ou (SMK_09A = NSP, R, ND) ou (SMK_09C = NSP, R, ND) ou (SMK_10A = NSP, R, ND) ou (SMK_10C = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
0	SMK_06A = 1 ou (SMK_10 = 1 et SMK_09A = 1) ou SMK_10A = 1	Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement	(moins de 1 an)
1	SMK_06A = 2 ou (SMK_10 = 1 et SMK_09A = 2) ou SMK_10A = 2	Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement	(1 an à < 2 ans)
2	SMK_06A = 3 ou (SMK_10 = 1 et SMK_09A = 3) ou SMK_10A = 3	Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement	(2 ans à < 3 ans)
SMK_06C	SMK_06A = 4	Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement	(min: 3; max: 125)
SMK_09C	SMK_09A = 4 et SMK_10 = 1	Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement	(min: 3; max: 125)
SMK_10C	SMK_10A = 4	Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement	(min: 3; max: 125)

3) Nombre d'années depuis lesquelles le fumeur fume tous les jours

Nom de la variable : SMKDYCS

Basée sur : SMK_202, SMK_203, DHH_AGE

Description : Cette variable indique le nombre d'année depuis lesquelles le fumeur fume tous les jours.

Note : Les répondants qui ne fument pas tous les jours sont exclus de la population. Les variables de l'ENSP incluent les non-fumeurs et les fumeurs occasionnels qui fumaient tous les jours auparavant.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
996	(SMK_202 = 2, 3)	Population exclue	SO
999	(SMK_202 = NSP, R, ND) ou (SMK_203 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
DHH_AGE - SMK_203	SMK_202 = 1	Nombre d'année depuis lesquelles le fumeur fume tous les jours	(min: 0; max: 125)

Échelle de provisions sociales à 10 items (6 VD)

Ce module est fondé sur l'Échelle de provisions sociales (24 items) élaborée par Cutrona et Russell (1987) et validée en français par Caron (1996). L'Échelle de provisions sociales évalue les six provisions des relations sociales décrites par Weiss (1973, 1974). Aux fins de la présente enquête, le Dr Caron a élaboré cette version abrégée comptant dix items, qui comprend les cinq principales provisions sociales. La version abrégée maintient les propriétés psychométriques de l'instrument initial. Des variables dérivées servent à mesurer un score global sur l'Échelle de provisions sociales et il y a également des sous-échelles pour les cinq provisions sociales évaluées dans le module. Ces sous-échelles mesurent le soutien émotionnel, les conseils et les informations, l'intégration sociale, l'aide matérielle et la réassurance de sa valeur.

Les items se rapportant à l'échelle de provisions sociales - le besoin de se sentir utile et nécessaire (fournir de l'aide à autrui) n'ont pas été conservés pour les raisons suivantes :

1) cette dimension des provisions sociales mesure le soutien offert plutôt que le soutien reçu;
2) dans plusieurs recherches antérieures, cette dimension était le moins reliée à la santé mentale;
3) pour réduire le temps consacré à l'administration du module.

Réf. : Cutrona, C. E. & Russell, D. W., 1987, The provisions of social support and adaptation to stress. Advance in Personal Relationships, 1, p. 37-67.
Caron, J., 1996, L'Échelle de provisions sociales : une validation québécoise. Santé mentale au Québec, 21 (2), p. 158-180.

Http://ccutrona.public.iastate.edu/socprov.htm

Reformatage temporaire

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
SPST01			
5 - SPS_01	SPS_01 <= 4	Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient « Tout à fait d'accord ».	
SPST02			
5 - SPS_02	SPS_02 <= 4	Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient « Tout à fait d'accord ».	
SPST03			
5 - SPS_03	SPS_03 <= 4	Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient « Tout à fait d'accord ».	
SPST04			
5 - SPS_04	SPS_04 <= 4	Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient « Tout à fait d'accord ».	
SPST05			
5 - SPS_05	SPS_05 <= 4	Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient « Tout à fait d'accord ».	
SPST06			
5 - SPS_06	SPS_06 <= 4	Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient « Tout à fait d'accord ».	
SPST07			
5 - SPS_07	SPS_07 <= 4	Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient « Tout à fait d'accord ».	
SPST08			
5 - SPS_08	SPS_08 <= 4	Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient « Tout à fait d'accord ».	
SPST09			
5 - SPS_09	SPS_09 <= 4	Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient « Tout à fait d'accord ».	
SPST10			
5 - SPS_10	SPS_10 <= 4	Inversion pour passer de « 1 à 4 » à « 4 à 1 », où 1 devient « Entièrement en désaccord » et 4 devient « Tout à fait d'accord ».	

1) Échelle de provisions sociales

Nom de la variable : SPSDCON

Basée sur : SPS_01, SPS_02, SPS_03, SPS_04, SPS_05, SPS_06, SPS_07, SPS_08, SPS_09, SPS_10

Description : Cette variable est utilisée pour mesurer le score global sur l'Échelle de provisions sociales (Social Provisions Scale). L'intervalle de valeurs est de 10 à 40, où un score élevé reflète un niveau perçu élevé de soutien social.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
99	SPS_01 in (7, 8, 9) ou SPS_02 in (7, 8, 9) ou SPS_03 in (7, 8, 9) ou SPS_04 in (7, 8, 9) ou SPS_05 in (7, 8, 9) ou SPS_06 in (7, 8, 9) ou SPS_07 in (7, 8, 9) ou SPS_08 in (7, 8, 9) ou SPS_09 in (7, 8, 9) ou SPS_10 in (7, 8, 9)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
SPST01 + SPST02 + SPST03 + SPST04 + SPST05 + SPST06 + SPST07 + SPST08 + SPST09 + SPST10	(1 <= SPS_01 <= 4) et (1 <= SPS_02 <= 4) et (1 <= SPS_03 <= 4) et (1 <= SPS_04 <= 4) et (1 <= SPS_05 <= 4) et (1 <= SPS_06 <= 4) et (1 <= SPS_07 <= 4) et (1 <= SPS_08 <= 4) et (1 <= SPS_09 <= 4) et (1 <= SPS_10 <= 4)	Score obtenu sur l'Échelle de provisions sociales (min: 10; max 40)	

2) Échelle de provisions sociales - attachement

Nom de la variable : SPSDATT

Basée sur : SPS_03, SPS_08

Description : Cette variable est utilisée pour mesurer le score du répondant sur la sous-échelle d'attachement («Attachment»). Un score élevé reflète un niveau perçu élevé d'attachement, qui est défini comme l'existence d'une proximité affective.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9	SPS_03 in (7, 8, 9) ou SPS_08 in (7, 8, 9)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
SPST03 + SPST08	(1 <= SPS_03 <= 4) et (1 <= SPS_08 <= 4)	Score obtenu sur l'Échelle de provisions sociales - attachement (min: 2; max 8)	

3) Échelle de provisions sociales - obtention de conseils

Nom de la variable : SPSDGUI

Basée sur : SPS_04, SPS_06

Description : Cette variable est utilisée pour mesurer le score du répondant sur la sous-échelle d'obtention de conseils («Guidance»). Un score élevé reflète un niveau perçu élevé d'obtention de conseils, qui est défini comme l'obtention de conseils ou d'information.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9	SPS_04 in (7, 8, 9) ou SPS_06 in (7, 8, 9)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
SPST04 + SPST06	(1 <= SPS_04 <= 4) et (1 <= SPS_06 <= 4)	Score obtenu sur l'Échelle de provisions sociales - l'obtention de conseils (min: 2; max 8)	

4) Échelle de provisions sociales - aide tangible

Nom de la variable : SPSDALL

Basée sur : SPS_01, SPS_10

Description : Cette variable est utilisée pour mesurer le score du répondant sur la sous-échelle d'aide tangible («Reliable Alliance»). Un score élevé reflète la perception d'un niveau élevé d'aide tangible , qui est définie comme la conviction de pouvoir compter sur les autres durant les périodes de stress.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9	SPS_01 in (7, 8, 9) ou SPS_10 in (7, 8, 9)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
SPST01 + SPST10	(1 <=SPS_01 <= 4) et (1 <= SPS_10 <= 4)	Score obtenu sur l'Échelle de provisions sociales - l'aide tangible (min: 2; max 8)	

5) Échelle de provisions sociales - intégration sociale

Nom de la variable : SPSDINT

Basée sur : SPS_02, SPS_07

Description : Cette variable est utilisée pour mesurer le score du répondant sur la sous-échelle d'intégration sociale («Social integration»). Un score élevé reflète un niveau perçu élevé d'intégration sociale , qui est définie comme le sentiment d'appartenance à un groupe d'amis.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9	SPS_02 in (7, 8, 9) ou SPS_07 in (7, 8, 9)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
SPST02 + SPST07	(1 <= SPS_02 <= 4) et (1 <= SPS_07 <= 4)	Score obtenu sur l'Échelle de provisions sociales - l'intégration sociale (min: 2; max 8)	

6) Échelle de provisions sociales - réassurance de sa valeur

Nom de la variable : SPSDWOR

Basée sur : SPS_05, SPS_09

Description : Cette variable est utilisée pour mesurer le score du répondant sur la sous-échelle de réassurance de sa valeur («Reassurance of Worth»), qui est définie comme la reconnaissance de ses compétences.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
9	(SPS_05 = 7, 8, 9) ou (SPS_09 = 7, 8, 9)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND
SPST05 + SPST09	(1 <= SPS_05 <= 4) et (1 <= SPS_09 <= 4)	Score obtenu sur l'Échelle de provisions sociales - la réassurance de sa valeur (min: 2; max 8)	

Utilisation d'équipement protecteur (3 VD)

1) Porte de l'équipement de protection lorsque pratique le patin à roues alignées

Nom de la variable : UPEFILS

Basée sur : UPE_02, UPE_02A, UPE_02B, UPE_02C, UPE_02D

Description : Cette variable indique si le répondant porte un casque, des protège-poignets ou des protège-coudes toujours ou la plupart du temps lorsqu'il pratique le patin à roues alignées.

Note : Les répondants qui ne pratiquent pas le patin à roues alignées sont exclus de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOUPE = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
6	UPE_02 = 2	Population exclue	SO
1	(UPE_02A = 1, 2) et (UPE_02B = 1, 2) et (UPE_02C = 1, 2) et (UPE_02D = 1, 2)	Porte toujours ou la plupart du temps un casque, des protège-poignets, des protège-coudes et des protèges-genous	
2	(UPE_02A = 3, 4) ou (UPE_02B = 3, 4) ou (UPE_02C = 3, 4) ou (UPE_02D = 3, 4)	Ne porte pas toujours ni la plupart du temps de casque, de protège-poignets, de protège-coudes ou des protèges-genous	
9	(UPE_02A = NSP, R, ND) ou (UPE_02B = NSP, R, ND) ou (UPE_02C = NSP, R, ND) ou (UPE_02D = NSP, R, ND) ou (PAC_1I = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND

2) Port de l'équipement de protection lorsque pratique la planche à roulettes

Nom de la variable : UPEFSKB

Basée sur : UPE_06A, UPE_06B, UPE_06C

Description : Cette variable indique si les répondants âgés de 12 à 19 ans portent un casque, des protège-poignets ou des protège-coudes toujours ou la plupart du temps lorsqu'ils pratiquent la planche à roulettes.

Note : Les répondants de plus de 19 ans et les répondants qui n'ont pas pratiqué la planche à roulettes dans les 12 derniers mois sont exclus de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOUPE = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1 et 12 <= DHH_AGE <= 19	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
6	DHH_AGE > 19 ou UPE_06 = 2	Population exclue	SO
1	(UPE_06A = 1, 2) et (UPE_06B = 1, 2) et (UPE_06C = 1, 2)	Porte toujours ou la plupart du temps un casque, des protège-poignets, des protège-coudes	

2	(UPE_06A = 3, 4) or (UPE_06B = 3, 4) or (UPE_06C = 3, 4)	Ne porte pas toujours ni la plupart du temps de casque, de protège-poignets, de protège-coudes	
9	(UPE_06A = DK, R, NS) or (UPE_06B = DK, R, NS) or (UPE_06C = DK, R, NS)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND

3) Porte de l'équipement de protection lorsque pratique la planche à neige

Nom de la variable : UPEFSNB

Basée sur : UPE_05A, UPE_05B

Description : Cette variable indique si le répondant porte un casque, des protège-poignets ou des protège-coudes toujours ou la plupart du temps lorsqu'il pratique la planche à neige.

Note : Les répondants qui n'ont pas pratiqué la planche à neige durant les 12 derniers mois sont exclus de la population.

Spécifications

Valeur	Condition(s)	Description	Notes
6	DOUPE = 2	Le module n'a pas été sélectionné	SO
9	ADM_PRX = 1	Les questions du module n'ont pas été posées - entrevue par procuration	ND
6	(UPE_03A = 1) ou (UPE_03B = 1, 4)	Population exclue	SO
1	(UPE_05A = 1, 2) et (UPE_05B = 1, 2)	Porte toujours ou la plupart du temps un casque, des protège-poignets	
2	(UPE_05A = 3, 4) ou (UPE_05B = 3, 4)	Ne porte pas toujours ni la plupart du temps de casque, de protège-poignets	
9	(UPE_05A = NSP, R, ND) ou (UPE_05B = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire	ND