



1    Decay Scheme

Rn-220 mainly decays by alpha emission to the Po-216 fundamental level.  
*Le radon 220 se désintègre par émission alpha principalement vers le niveau fondamental du polonium 216.*

2    Nuclear Data

$T_{1/2}({}^{220}\text{Rn})$

:

55,8

(3)

s

$T_{1/2}({}^{216}\text{Po})$

:

0,150

(5)

s

$Q^{\alpha}({}^{220}\text{Rn})$

:

6404,67

(10)

keV

2.1     $\alpha$  Transitions

	Energy keV	Probability × 100	F
$\alpha_{0,1}$	5854,91 (14)	0,118 (15)	3,08
$\alpha_{0,0}$	6404,67 (10)	99,882 (15)	1

2.2    Gamma Transitions and Internal Conversion Coefficients

	Energy keV	$P_{\gamma+ce}$ × 100	Multipolarity	$\alpha_K$	$\alpha_L$	$\alpha_{M+}$	$\alpha_T$
$\gamma_{1,0}(\text{Po})$	549,76 (4)	0,118 (15)	E2	0,0184 (6)	0,0057 (2)	0,00190 (6)	0,0260 (8)

3    Atomic Data

3.1    Po

$\omega_K$

:

0,965

(4)

$\bar{\omega}_L$

:

0,403

(16)

$n_{KL}$

:

0,807

(5)

**3.1.1 X Radiations**

	Energy keV	Relative probability
X <sub>K</sub>	Kα <sub>2</sub>	76,864
	Kα <sub>1</sub>	79,293
	Kβ <sub>3</sub>	89,256
	Kβ <sub>1</sub>	89,807
	Kβ <sub>5</sub> <sup>''</sup>	90,363
		}
	Kβ <sub>2</sub>	92,263
	Kβ <sub>4</sub>	92,618
	KO <sub>2,3</sub>	92,983
		}
X <sub>L</sub>		
	Lℓ	9,658
	Lα	11,016 – 11,13
	Lη	12,085
	Lβ	12,823 – 13,778
	Lγ	15,742 – 16,213

**3.1.2 Auger Electrons**

	Energy keV	Relative probability
Auger K		
KLL	58,98 – 65,21	100
KLX	71,90 – 79,29	55
KXY	84,8 – 93,1	8
Auger L		
	5,43 – 10,93	3400

**4 α Emissions**

	Energy keV	Probability × 100
α <sub>0,1</sub>	5748,46 (14)	0,118 (15)
α <sub>0,0</sub>	6288,22 (10)	99,882 (15)

5 Electron Emissions

		Energy keV	Electrons per 100 disint.	
e <sub>AL</sub>	(Po)	5,43 - 10,93	0,00155 (12)	
e <sub>AK</sub>	(Po)		0,000074 (13)	
	KLL	58,98 - 65,21	}	
	KLX	71,90 - 79,29	}	
	KXY	84,8 - 93,1	}	

6 Photon Emissions

6.1 X-Ray Emissions

		Energy keV	Photons per 100 disint.	
XL	(Po)	9,658 — 16,213	0,00096 (7)	
XK $\alpha_2$	(Po)	76,864	0,00060 (8)	} K $\alpha$
XK $\alpha_1$	(Po)	79,293	0,00100 (14)	
XK $\beta_3$	(Po)	89,256	}	K' $\beta_1$
XK $\beta_1$	(Po)	89,807	}	
XK $\beta_5''$	(Po)	90,363	}	
XK $\beta_2$	(Po)	92,263	}	K' $\beta_2$
XK $\beta_4$	(Po)	92,618	}	
XK $O_{2,3}$	(Po)	92,983	}	

6.2 Gamma Emissions

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{1,0}(\text{Po})$	549,76 (4)	0,115 (15)

7 Main Production Modes

Th – 228  $\alpha$  decays()

## 8 References

- A.G. WARD. Proc. Roy. Soc. (London) 181A (1942) 183  
(Half-life)
- H. SCHMIED, R.W. FINK, B.L. ROBINSON. J. Inorg. Nucl. Chem. 1 (1955) 342  
(Half-life)
- L. MADANSKY, F. RASETTI. Phys. Rev. 102 (1956) 464  
(Gamma-ray emission probabilities)
- H. RODENBUSCH, G. HERRMANN. Z. Naturforsch. 16a (1961) 577  
(Half-life)
- R.J. WALEN. Compt. Rend. Ac. Sci. (Paris) 255 (1962) 1604  
(Alpha emission energies, Alpha emission probabilities)
- J.E. GINDLER, D.W. ENGELKEMEIR. Radiochim. Acta 2 (1963) 58  
(Half-life)
- H. DIAMOND, J.E. GINDLER. J. Inorg. Nucl. Chem. 25 (1963) 143  
(Half-life)
- J.B. HURSH. J. Inorg. Nucl. Chem. 28 (1966) 2771  
(Half-life)
- J. DALMASSO. Report FRNC-TH-441 (1972)  
(Gamma-ray emission probabilities)
- J. DALMASSO. Comp. Rend. Acad. Sci. (Paris) 277B (1973) 467  
(Gamma-ray emission probabilities)
- W. KURCEWICZ, N. KAFFRELL, N. TRAUTMANN, A. PLOCHOCKI, J. ZYLICZ, A. MATUL, K. STRYCZNIEWICZ. Nucl. Phys. A289 (1977) 1  
(Gamma-ray emission probabilities)
- F. RÖSEL, H.M. FRIES, K. ALDER, H.C. PAULI. At. Data. Nucl. Data Tables 21 (1978) 291  
(Internal conversion coefficients)
- R.J. GEHRKE, V.J. NOVICK, J.D. BAKER. Int. J. Appl. Radiat. Isotop. 35 (1984) 581  
(Gamma-ray emission probabilities)
- G. AUDI, A.H. WAPSTRA. Nucl. Phys. A595 (1995) 409  
(Q value)
- E. SCHÖNFELD, H. JANSSEN. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A369 (1996) 527  
(K-x ray, L-x ray, Auger electrons)
- A. ARTNA-COHEN. Nucl. Data Sheets 80 (1997) 157  
(Nuclear structure, energies)
- E. SCHÖNFELD, G. RODLOFF. PTB Report 6.11-98-1 (1998)  
(Auger electrons)
- E. SCHÖNFELD, G. RODLOFF. PTB Report 6.11-1999-1 (1999)  
(K-x ray)

