



1 Decay Scheme

Po-216 decays (100%) by alpha emission to the Pb-212 fundamental level.
Le polonium 216 se désintègre (100%) par émission alpha vers le niveau fondamental de plomb 212.

2 Nuclear Data

$T_{1/2}(^{216}\text{Po})$: 0,150 (5) s
 $T_{1/2}(^{212}\text{Pb})$: 10,64 (1) h
 $Q^\alpha(^{216}\text{Po})$: 6906,52 (51) keV

2.1 α Transitions

	Energy keV	Probability × 100	F
$\alpha_{0,1}$	6101,6 (10)	0,0019 (3)	34,7
$\alpha_{0,0}$	6906,52 (50)	99,9981 (3)	1

2.2 Gamma Transitions and Internal Conversion Coefficients

	Energy keV	$P_{\gamma+ce}$ × 100	Multipolarity	α_K	α_L	α_{M+}	α_T
$\gamma_{1,0}(\text{Pb})$	804,9 (5)	0,0019 (3)	[E2]	0,0081 (2)	0,00180 (4)	0,00050 (1)	0,0104 (2)

3 Atomic Data

3.1 Pb

ω_K : 0,963 (4)
 $\bar{\omega}_L$: 0,379 (15)
 n_{KL} : 0,811 (5)

3.1.1 X Radiations

	Energy keV	Relative probability
X_K	$K\alpha_2$	72,8049
	$K\alpha_1$	74,97
	$K\beta_3$	84,451
	$K\beta_1$	84,937
	$K\beta_5''$	85,47
		}
	$K\beta_2$	87,238
	$K\beta_4$	87,58
	$KO_{2,3}$	87,911
		}
X_L		
	$L\ell$	9,184
	$L\alpha$	10,45 – 10,551
	$L\eta$	11,349
	$L\beta$	12,142 – 13,015
	$L\gamma$	14,765 – 15,216

3.1.2 Auger Electrons

	Energy keV	Relative probability
Auger K		
KLL	56,03 – 61,67	100
KLX	68,18 – 74,97	54
KXY	80,3 – 88,0	7,7
Auger L		
	5,26 – 10,40	3060

4 α Emissions

	Energy keV	Probability $\times 100$
$\alpha_{0,1}$	5988,6 (10)	0,0019 (3)
$\alpha_{0,0}$	6778,6 (5)	99,9981 (3)

5 Electron Emissions

		Energy keV	Electrons per 100 disint.
e _{AL}	(Pb)	5,26 - 10,40	0,0000107 (10)
e _{AK}	(Pb)		0,00000057 (11)
	KLL	56,03 - 61,67	}
	KLX	68,18 - 74,97	}
	KXY	80,3 - 88,0	}

6 Photon Emissions

6.1 X-Ray Emissions

		Energy keV	Photons per 100 disint.	
XL	(Pb)	9,184 — 15,216	0,0000060 (6)	
XK α_2	(Pb)	72,8049	0,0000043 (7)	} K α
XK α_1	(Pb)	74,97	0,0000073 (12)	
XK β_3	(Pb)	84,451	}	
XK β_1	(Pb)	84,937	}	} K' β_1
XK β_5''	(Pb)	85,47	}	
XK β_2	(Pb)	87,238	}	
XK β_4	(Pb)	87,58	}	} K' β_2
XK $\text{O}_{2,3}$	(Pb)	87,911	}	

6.2 Gamma Emissions

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{1,0}(\text{Pb})$	804,9 (5)	0,0019 (3)

7 Main Production Modes

Bi – $216(\beta^-)\text{Po}$ – 216

Th – 228 α decays

8 References

- H.G.J. MOSELEY, K. FAJANS. Phil. Mag. 22 (1911) 629
(Half-life)
- A.G. WARD. Proc. Roy. Soc. (London) 181A (1942) 183
(Half-life)
- H.V. BUTTLAR. Naturwissenschaften 39 (1952) 575
(Half-life)
- P. MARIN, G.R. BISHOP, H. HALBAN. Proc. Phys. Soc. (London) 66A (1953) 608
(Half-life)
- J. TOBAILEM, J. ROBERT. J. Phys. Radium 16 (1955) 115
(Half-life)
- R.J. WALEN. Comp. Rend. Acad. Sci. (Paris) 255 (1962) 1604
(Alpha emission energies, Alpha emission probabilities)
- H. DIAMOND, J.E. GINDLER. J. Inorg. Nucl. Chem. 25 (1963) 143
(Half-life)
- W. KURCEWICZ, N. KAFFRELL, N. TRAUTMANN, A. PLOCHOCKI, J. ZYLICZ, M. MATUL, K. STRYCZNIEWICZ. Nucl. Phys. A289 (1977) 1
(Gamma-ray energies, Gamma-ray emission probabilities)
- F. RÖSEL, H.M. FRIES, K. ALDER, H.C. PAULI. At. Data Nucl. Data Tables 21 (1978) 291
(Internal conversion coefficients)
- A. ARTNA-COHEN. Nucl. Data Sheets 66 (1992) 171
(Nuclear structure, energies)
- G. AUDI, A.H. WAPSTRA. Nucl. Phys. A595 (1995) 409
(Q value)
- E. SCHÖNFELD, H. JANSSEN. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A369 (1996) 527
(K-x ray, L-x ray, Auger electrons)
- E. SCHÖNFELD, G. RODLOFF. Report PTB-6.11-98-1 (1998)
(Auger electrons)
- E. SCHÖNFELD, G. RODLOFF. Report PTB-6.11-1999 (1999)
(K-x ray)

