PHÒNG CHỐNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO THẢM HỌA BÃO LỤT

TS.BS Trần Quỳnh Anh

BM Sức khỏe Môi trường

tranquynhanh@hmu.edu.vn

MỤC TIÊU

1) Trình bày được nội dung chuẩn bị công tác vệ sinh môi trường trước thảm họa bão lụt
2) Trình bày được các biện pháp xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường trong và sau thảm họa bão lụt.

Công tác dự phòng vệ sinh môi trường trước thảm họa lũ lụt

Công tác chuẩn bị của y tế địa phương

- Phổ biến thông tin về các dịch vụ y tế MT: hoá chất xử lý nước, xử lý VSMT, địa chỉ liên hệ và phương thức cung cấp.
- Truyền thông giáo dục cộng đồng xoá bỏ các khu vực sinh trưởng của các vật chủ trung gian truyền bệnh.
- Giáo dục các biện pháp đề phòng dịch bệnh lây truyền và vệ sinh cá nhân.

Công tác chuẩn bị của y tế địa phương

- Chuẩn bị hoá chất xử lý nước:
  - Phèn chua
  - Cloramin B bột 25%
  - Cloramin B viên 0,25g
- Chuẩn bị hoá chất diệt côn trùng và xử lý môi trường
  - Chuẩn bị vôi bột
  - Trang bị bình bơm

Sự chuẩn bị của người dân

- Dự trữ lương thực, thực phẩm, chất đốt phòng lũ lụt dài ngày
- Chuẩn bị một số thuốc thông thường như thuốc tiêu chảy, cảm sốt, dầu xoa, thuốc đau mắt, bông băng, thuốc đỏ, thuốc ngoài da,...
- Gia cố nhà cửa, thuyền, ghe (tùy từng vùng), chuẩn bị phao, dây buộc và phương án di chuyển khi xảy ra thảm hoạ

Bảo vệ nguồn nước

- Chuẩn bị nắp và ny-lông để bịt miệng giếng khơi hoặc nút miệng giếng khoan.
- Bịt miệng giếng trước khi sơ tán hoặc khi thấy có nguy cơ giếng bị ngập.
- Nơi có nước máy phải dự trữ nước trong các bể lớn ở trên cao.
- Dự trữ nước sạch cho gia đình, dự báo và diễn tập tình huống mất nước máy

Với nhà tiêu và chuồng gia súc

- Nhà tiêu hai ngăn: Lấy hết phân ra, đào hố ủ lèn chặt đất, mỗi ngăn đổ 2 - 3 kg vôi bột, chuẩn bị sẵn nắp đậy lỗ đi tiêu.
- Nhà tiêu tự hoại hoặc thấm dội nước: chuẩn bị nút bệ xí.
- Nhà tiêu đào: lấp một lớp đất dày khoảng 0,5m, lèn chặt.
- Chuồng gia súc: lấy hết phân ra ủ, rắc 2 - 3 kg vôi bột. Đồng thời dời chuồng gia súc đến nơi đất cao.

Xử lý các vấn đề VSMT trong và sau lũ lụt

Xử lý nước uống

- Tại khu vực nông thôn, sử dụng nước giếng đào, giếng khoan
- Trường hợp giếng bị ngập mà không có nước dự trữ hoặc nước mưa để sử dụng thì phải lấy nước bề mặt để xử lý

Xử lý nước uống

- Dùng phèn chua với liều lượng 1g phèn chua cho 20 lít nước.
- Múc một gáo nước, hoà lượng phèn tương ứng thể tích nước cần xử lý cho tan hết; cho vào chum, vại hay thùng và khuấy đều, chờ khoảng 30 phút cho cặn lắng hết rồi gạn lấy nước trong.
- Nếu không có phèn chua thì dùng vải sạch để lọc nước, giữ lại các cặn bẩn, làm vài lần cho đến khi được nước trong.

Khử trùng bằng hóa chất



Quy trình xử lý nước uống

Xử lý nước uống

- Khử trùng bằng viên Cloramin B 0,25g:
  - Cloramin B được sản xuất dưới dạng viên hàm lượng 0,25g. Loại này rất tiện lợi cho khử trùng các thể tích nước nhỏ như chum, vại, bể chứa nước nhỏ. Một viên Cloramin B dùng để khử trùng 25 lít nước.

Xử lý nước uống

- Khử trùng bằng bột Cloramin B:
- Tính lượng hoá chất cần thiết để khử trùng, nồng độ yêu cầu là 10mg/lít.
- Ví dụ: để khử trùng một thùng nước 30 lít thì cần 0,3g Cloramin B 25%. Có thể dùng thìa canh để đong bột hoá chất khử trùng, mỗi thìa canh đầy tương đương 10g. Như vậy để khử trùng 300 lít nước cần khoảng 1/3 thìa bột Cloramin B.

Xử lý phân khi ngập lụt

- Tận dụng chỗ đất cao, không ngập => đào hố tiêu tạm thời (mỗi chiều 0,5m). Lưu ý: xa nhà ở, nguồn nước ≥30 m
- Nơi nước ngập không kịp sơ tán hoặc bắt buộc phải ở lại nơi ngập lụt: xử lý tạm thời bằng các phương tiện như thùng, chậu, rổ, giá hỏng đổ tro, trấu, mùn cưa hoặc đất, chờ khi nước rút đem ra chôn.

Xử lý môi trường

- Nước rút đến đâu làm VS nhà cửa và huy động cộng đồng làm vệ sinh môi truờng đến đó vì nếu không làm kịp thời thì sẽ khó đẩy được phù sa ra khỏi nhà, sân và đường đi.
- Khi nước rút hết, môi trường ô nhiễm nặng nề do xác súc vật, côn trùng, cây cối thối rữa. Cần khơi thông cống rãnh, lấp vũng nước đọng, chôn lấp xác súc vật chết, và tẩy uế.

Xử lý môi trường

- Dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, phơi khô quần áo, không treo mắc quần áo ẩm ướt vào một chỗ dễ làm nơi trú ẩn cho muỗi.
- Làm vệ sinh và tu sửa nhà tiêu (nếu không hỏng nặng). Nếu nhà tiêu hỏng nặng, chọn nơi cao ráo xa nhà, xa giếng (≥20m) đào hố tạm trong khi chờ xây mới (chú ý lấp đất, tránh ruồi, côn trùng và súc vật).
- Tiến hành sớm các biện pháp diệt côn trùng và trung gian truyền bệnh.

Xử lý súc vật chết

- Khảo sát sơ bộ để ước lượng số lượng xác súc vật chết cần xử lý.
- Vị trí chôn: tốt nhất là ở ngoài đồng, xa nguồn nước (ao, sông, hồ...) ít nhất 50m. Nếu chôn trong vườn: xa giếng nước ≥30m + xử lý kỹ bằng hoá chất khử trùng tẩy uế.

Xử lý súc vật chết

- Cần hớt một lớp đất ~ 10cm chỗ xác súc vật nằm chôn cùng với súc vật, phun thuốc khử trùng hoặc rắc vôi bột (có thể tập trung rác và đốt).
- Đào hố chôn sâu dưới đất ≥ 0,8m.
- Đổ 2 - 3 kg vôi bột hoặc phun dung dịch hoá chất khử trùng, tẩy uế nồng độ cao (có thể tới 100mg/l Cloramin B 25%) lên trên rồi lấp đất, lèn chặt.
- Cắm biển báo hiệu. Không để súc vật hoặc chuột đào bới

Quản lý chất thải rắn

- Khôi phục sớm việc thu gom và xử lý CTR
- CTR hữu cơ: chôn lấp hoặc đốt, không chất đống
- Cẩn thận khi lựa chọn khu vực tập kết và xử lý chất thải => bãi rác sau này
- Thận trọng khi xử lý vật liệu, đồ phế thải độc hại

Quản lý chất thải rắn

- Chất thải y tế không nhiều nhưng nguy hại => nguồn lây bệnh
- CSYT phải có kế hoạch thu gom xử lý chất thải trong ĐK lũ lụt
- Có thể thiêu đốt tại chỗ hoặc thu gom về một nơi có lò thiêu chất thải y tế.

CÂU HỎI?