

ĐỀ THI DỊCH TỄ HỌC SỐ 3:

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu ý đúng nhất trong các câu sau:

1. Người lành mang mầm bệnh là nguồn lây nhiễm mang mầm bệnh:

A. Bệnh Sởi	@ B. Thương hàn
C. Ho gà	D. Đậu mùa

2. Biện pháp hiệu quả nhất trong điều trị dự phòng Viêm gan B là:

A. Sàng lọc máu trước khi truyền
B. Thực hiện an toàn trong môi trường chăm sóc
C. Thực hiện tốt vô trùng – tiệt trùng
@D. Tiêm vacxin viêm gan B

3. Bệnh lây truyền qua đường máu **không** có ổ dịch thiên nhiên:

A. Bệnh viêm não Nhật Bản	B. Bệnh sốt rét
@ C. Bệnh viêm gan B,C	D. Bệnh dịch hạch

4. Bệnh chỉ lây truyền từ người sang người:

A. Bệnh viêm não Nhật Bản	@ B. Bệnh giang mai
C. Bệnh dại	D. Bệnh than

5. Bệnh chỉ lây truyền từ động vật sang người:

A. Bệnh sởi	B. Bệnh ho gà
C. Bệnh bạch hầu	@ D. Bệnh dại

6. Những người chưa tiêm huyết thanh giải độc tố uốn ván thì phải tạo miễn dịch bị động khi bị:

A. Vết thương bị nhiễm đất, mảnh quần áo
B. Gãy xương hở
C. Vết thương sâu do đâm hoặc mảnh bom
@ D. Tất cả các trường hợp trên

7. Phương pháp có hiệu quả nhất cho phòng chống HIV/AIDS là:

A. Phát hiện, cách ly và điều trị sớm người nhiễm HIV
B. Thực hiện tốt kiểm dịch biên giới
C. Thanh toán các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm
@ D. Giáo dục thay đổi hành vi và xây dựng hành vi an toàn

8. Phương thức lây truyền HIV chủ yếu ở Việt Nam hiện nay là:

A. Tình dục đồng giới
B. Tình dục khác giới
C. Truyền máu và các sản phẩm của máu
@ D. Tiêm chích ma túy

9. Biện pháp phát hiện sớm ung thư cổ tử cung:

A. Khám lâm sàng	@ B. Xét nghiệm tế bào cổ tử cung
C. Siêu âm	D. Xét nghiệm máu

10. Yếu tố phổ biến làm tăng nguy cơ ung thư gan:

A. Tia xạ	@ B. Virus viêm gan B
C. Bụi gỗ	D. Di truyền

11. Các yếu tố nguy cơ của bệnh tăng huyết áp nguyên phát là:

A. Ăn mặn	B. Ít vận động
C. Béo phì	@ D. Tất cả các loại kể trên

12. Các yếu tố nguy cơ của bệnh mạch vành là:

A. Ăn nhiều chất béo	B. Tiểu đường
C. Tăng HA	@ D. Tất cả các loại kể trên

13. Một nhà nghiên cứu quan tâm đến bệnh căn của vàng da sơ sinh. Để nghiên cứu vấn đề này, ông ta đã chọn 100 trẻ em được chẩn đoán là vàng da và 100 trẻ em được sinh ra trong cùng một thời gian, ở cùng một bệnh viện mà không bị vàng da. Sau đó ông ta xem lại tất cả các hồ sơ sản khoa và lúc đẻ của các bà mẹ để xác định phơi nhiễm trước và trong lúc đẻ. Đây là ví dụ về:

A. Nghiên cứu ngang	@ B. Nghiên cứu bệnh/chứng
C. Nghiên cứu thuần tập tương lai	D. Thử nghiệm lâm sàng

14. Nhận xét nào dưới đây không đúng với nghiên cứu bệnh chứng và nghiên cứu thuần tập:

A. Nghiên cứu thuần tập tương lai cho phép tính toán trực tiếp tỷ suất mới mắc.
B. Nghiên cứu bệnh chứng có ưu điểm là đã sẵn có các số liệu cho việc phân tích nhóm
@ C. Nghiên cứu thuần tập tương lai thường dễ áp dụng để làm sáng tỏ các yếu tố liên quan với các bệnh hiếm gặp.
D. Nghiên cứu thuần tập tương lai ít nhạy cảm với các sai lệch

15. Người ta tiến hành một nghiên cứu về mối liên quan giữa thói quen hút thuốc lá của bà mẹ khi mang thai và cân nặng thấp của trẻ sơ sinh. Người ta tiến hành phỏng vấn tiền sử hút thuốc lá của 340 bà mẹ đẻ con có cân nặng thấp phát hiện ra có 40 bà mẹ có tiền sử hút thuốc lá khi mang thai. Đồng thời người ta cũng tiến hành phỏng vấn bà mẹ đẻ con có cân nặng bình thường và phát hiện ra 16 bà mẹ có tiền sử hút thuốc lá khi mang thai. Đây là ví dụ về:

A. Nghiên cứu ngang	B. Nghiên cứu thuần tập tương lai
@ C. Nghiên cứu bệnh chứng	D. Nghiên cứu thực nghiệm

16. Mẫu số để đo lường tye suất mật độ mới mắc một bệnh xảy ra là:

A. Số những trường hợp bệnh quan sát được
B. Số những trường hợp không có triệu chứng
@ C. Số năm người quan sát được
D. Số người mất trong theo dõi

17. Ở một cuộc điều tra cơ bản, 17 người trong số 1000 người đã có dấu hiện của bệnh mạch vành tim. Chỉ số đo lường bệnh xảy ra là:

@ A. Tỉ suất hiện mắc	B. Tỉ suất mới mắc
C. Tỉ suất mới mắc tích lũy	D. Tỉ suất mật độ mới mắc

18. Một nghiên cứu thuần tập trong thời gian 12 năm nhằm đánh giá nguy cơ của hút thuốc lá đối với bệnh tim mạch, người ta thấy tỉ lệ xảy ra cơn đau thắt ngực ở những người nghiện thuốc lá cao gấp 1,6 lần so với những người không nghiện thuốc lá. Chỉ số dùng để đo lường tỉ lệ mắc bệnh xảy ra là:

A. Tỉ suất mới mắc	B. Tỉ suất mắc bệnh được chuẩn hóa
C. Tỉ lệ chết xác định theo tuổi	@ D. Tỉ suất mới mắc

19. Trong một nghiên cứu về bệnh tăng huyết áp, người ta phát hiện được 45 người mắc bệnh tăng huyết áp trong số 1000 người ở nhóm tuổi 15-49 được lấy vào nghiên cứu. Chỉ số đo lường bệnh xảy ra là:

@ A. Tỉ suất hiện mắc	B. Tỉ suất mới mắc
C. Tỉ lệ mắc bệnh được chuẩn hóa	D. Tỉ suất mới mắc xác định theo tuổi

20. Ở một nghiên cứu cơ bản, 131 người trong số 1000 người ở lứa tuổi 60-64 đã mắc bệnh mạch vành tim. Chỉ số đo lường bệnh xảy ra là:

A. Tỉ suất hiện mắc	B. Tỉ suất mới mắc
C. Tỉ lệ mắc bệnh được chuẩn hóa	@ D. Tỉ suất hiện mắc xác định theo tuổi

21. Một thay đổi trong tỉ suất hiện mắc là hậu quả thay đổi của:

@ A. Tỉ suất mới mắc	B. Nguy cơ tương đối
C. Nguy cơ quy thuộc	D. Có số người bị chết (lethality)

22. Khi một loại thuốc hay một phương pháp điều trị có khả năng giảm tỉ lệ chết nhưng không làm khỏi hẳn bệnh, sẽ dẫn tới tình huống sau:

A. Tỉ suất hiện mắc của bệnh sẽ giảm	@ B. Tỉ suất hiện mắc của bệnh sẽ tăng
C. Tỉ suất mới mắc của bệnh sẽ giảm	D. Tỉ suất mới mắc của bệnh sẽ tăng

23. Một cộng đồng A có 100.000 dân. Năm 2000 có 1000 người chết do tất cả các nguyên nhân. Có 300 bệnh nhân lao, 200 nam và 100 nữ. Trong năm 2001 có 60 bệnh nhân lao chết, trong đó có 50 là nam. Tỷ lệ chết thô ở cộng đồng A là:

A. 300/100.000	B. 60/1000
@ C. 10/1000	D. 100/1000

24. Một cộng đồng A có 100.000 dân. Năm 2000 có 1000 người chết do tất cả các nguyên nhân. Có 300 bệnh nhân lao, 200 nam và 100 nữ. Trong năm 2001 có 60 bệnh nhân lao chết, trong đó có 50 là nam. Tỷ lệ chết trên mắc của lao là:

A. 6%	@ B. 20%
C. 2%	D. Như nhau ở nam và nữ

25. Một cộng đồng A có 100.000 dân. Năm 2000 có 1000 người chết do tất cả các nguyên nhân. Có 300 bệnh nhân lao, 200 nam và 100 nữ. Trong năm 2001 có 60 bệnh nhân lao chết, trong đó có 50 là nam. Tỷ lệ chết riêng phần theo nguyên nhân đối với lao là:

@ A. 60/100.000	B. 300/100.000
C. 200/1000	D. 2%

26. Tỷ lệ chết của trẻ em dưới 1 tuổi được đo bằng số trẻ chết:

A. Từ 24 giờ đến 1 năm tuổi trên 1000 trẻ đẻ sống
B. Dưới 1 năm tuổi trên 1000 cuộc đẻ
C. Dưới 6 tháng tuổi trên 1000 trẻ đẻ sống
@ D. Dưới 1 năm tuổi trên 1000 trẻ đẻ sống

27. Tỷ lệ chết/mắc của một bệnh là:

A. Tỷ lệ chết thô/100.000 dân
@ B. Tỷ lệ chết theo nguyên nhân do bệnh đó
C. Tỷ lệ phần trăm chết ở các bệnh nhân
D. Tỷ lệ chết do bệnh đó trong tất cả những người chết vì tất cả các nguyên nhân

28. Trong một cộng đồng có 1.000.000 người, có 1000 trường hợp mắc một bệnh cấp tính, trong đó có 300 trường hợp chết vì bệnh này trong năm. Tỷ lệ chết/mắc bệnh này trong năm là:

A. 3%	B. 1%
C. 10%	@ D. 30%

29. Trong một cộng đồng có 100.000 người, có 1000 trường hợp bệnh và 200 trường hợp chết vì bệnh đó trong năm. Tỷ lệ chết do bệnh này (tỷ lệ chết theo nguyên nhân) trong năm đó là:

A. 200/1000	@ B. 200/100.000
C. 800/1000	D. 800/100.000

30. Tỷ suất mới mắc bệnh được định nghĩa là:

A. Số ca hiện có của một bệnh trong một thời gian chia cho số dân lúc bắt đầu thời gian này
B. Số ca hiện có của một bệnh trong một thời gian chia cho số dân ở thời điểm giữa thời gian này
@ C. Số ca mới mắc của một bệnh trong một thời gian chia cho số dân có nguy cơ lúc bắt đầu nghiên cứu
D. Số ca mới mắc của một bệnh trong một thời gian chia cho số dân ở thời điểm giữa thời gian này

31. Tỷ suất mắc bệnh tại một thời điểm được định nghĩa là:

A. Số ca hiện mắc trong một thời gian nhân với thời gian kéo dài trung bình của bệnh
B. Số ca hiện mắc trong một thời gian chia cho số dân lúc bắt đầu thời gian đó
@ C. Số ca hiện mắc trong một thời điểm chia cho số dân ở thời điểm đó
D. Số ca hiện mắc trong một thời gian chia cho số dân ở cuối thời gian đó

32. Để đánh giá mức độ kết hợp giữa một phơi nhiễm với một bệnh những chỉ số dịch tễ học có lợi ích nhất là:

A. Tỷ suất mới mắc bệnh ở những người có phơi nhiễm

@ B. Nguy cơ quy thuộc

C. Tỷ suất hiện mắc bệnh ở những người có phơi nhiễm

D. Nguy cơ tương đối của bệnh

33. Có 112 người bị ốm, trong đó 72 nữ và 36 nam. Sau một cuộc dã ngoại trong tổng số 250 người (80 nam và 170 nữ). Tỷ lệ được tính toán đúng là:

A. Tỷ lệ tấn công theo giới đối với nam $36/112 = 0,32$

B. Tỷ lệ tấn công theo giới đối với nam $80/250 = 0,30$

C. Tỷ lệ tấn công theo giới đối với nữ $76/112 = 0,70$

@ D. Tỷ lệ tấn công chung $112/250 = 0,45$

34. Trong một nghiên cứu sàng lọc tiến hành trên 5000 phụ nữ, người ta đã tìm thấy 25 người mắc bệnh ung thư vú. Năm năm sau đó người ta đã phát hiện thêm 10 trường hợp bị bệnh. Tỷ suất mắc bệnh sau 5 năm nghiên cứu là:

@ A. $10/(5000 - 25)$

B. $10/5000$

C. $10/25$

D. $10/(5000 + 25)$

35. NC mô tả là nghiên cứu các vấn đề sau, TRỪ:

A. Sự phân bố bệnh tật hay một vấn đề sức khỏe

B. Các yếu tố liên quan tới quy định sự phân bố một vấn đề sức khỏe

C. Mức độ, phạm vi của một vấn đề sức khỏe

@ D. Kiểm định một giả thiết nhân quả

36. Nghiên cứu dịch tễ học mô tả nhằm mục đích sau, TRỪ:

A. Đánh giá chiều hướng của sức khỏe cộng đồng

B. Cơ sở cho việc lập kế hoạch và đánh giá các dịch vụ y tế

C. Xác định các dịch vụ cần nghiên cứu hình thành giả thiết

@ D. Xác định yếu tố nguy cơ

37. Nghiên cứu DTH mô tả gồm các loại nghiên cứu dưới đây, TRỪ:

A. Nghiên cứu một trường hợp bệnh riêng lẻ hiếm gặp

@ B. Nghiên cứu hiệu quả điều trị

C. Nghiên cứu một chùm bệnh

D. Nghiên cứu tương quan

38. Nghiên cứu dịch tễ học mô tả nhằm:

A. Xác định mối liên quan giữa phơi nhiễm và bệnh

B. Kiểm định giả thiết

C. Chứng minh giả thiết

@ D. Hình thành giả thiết

39. Đặc điểm dưới đây KHÔNG phải ưu tiên của nghiên cứu tương quan:

A. Nhanh

B. Dựa trên số liệu sẵn có

@ C. Kiểm soát được ảnh hưởng của các yếu tố gây nhiễu

D. Mô tả mức phơi nhiễm trung bình của quần thể

40. Mô tả một trường hợp bệnh hoặc một chùm bệnh có những ưu điểm sau, TRỪ:

A. Đơn giản, nhanh, dễ làm
B. Cơ sở ban đầu cho hình thành giả thuyết
@ C. Xác định căn nguyên trong thời gian ngắn
D. Cơ sở ban đầu cho việc xác định sự xuất hiện một vấn đề sức khỏe

41. Điều tra ngang không cho phép tính tỉ suất nào sau đây:

A. Tỉ suất hiện mắc	@ B. Tỉ suất mới mắc
C. Tỉ suất hiện mắc điểm	D. Tỉ suất hiện mắc kì

42. Điều tra ngang được tiến hành với kỹ thuật chọn mẫu sau, TRỪ:

A. Mẫu ngẫu nhiên đơn hoặc hệ thống	B. Mẫu tổng hợp chùm
@ C. Mẫu ghép cặp	D. Mẫu 30 cụm ngẫu nhiên

43. Điều tra ngang có những ưu điểm sau:

A. Xác định được mối liên quan giữa yếu tố phơi nhiễm và bệnh
@ B. Có thể làm trong thời gian ngắn, thu được kết quả nhanh chóng
C. Không mắc sai số ngẫu nhiên
D. Loại trừ được yếu tố nhiễu

44. Đặc trưng không được đề cập tới trong nghiên cứu dịch tễ học.

A. Con người	B. Không gian
C. Thời gian	@ D. Căn nguyên

45. nhược điểm cơ bản của các nghiên cứu biện chứng về vai trò của yếu tố căn nguyên nghi ngờ khi so sánh với nghiên cứu thuần tập tương lai là:

A. Tốn kém hơn và kéo dài hơn
@ B. Có thể có sai số hệ thống trong việc xác định sự có mặt hay không có mặt của yếu tố nguy cơ.
C. Có thể có hệ thống trong việc xác định sự có mặt của hậu quả bệnh
D. Khó chọn nhóm đối chứng

46. Loại nghiên cứu nào sau đây là nghiên cứu biện chứng

A. Nghiên cứu tỉ lệ tử vong hay mắc bệnh trước đây từ đó ước lượng tỉ lệ bệnh trong tương lai
@ B. So sánh mức độ phơi nhiễm với yếu tố nguy cơ ở nhóm bệnh nhân và nhóm người khỏe mạnh
C. Phân tích các nghiên cứu trước đây ở những nơi khác nhau trong những hoàn cảnh khác nhau nhằm đưa ra một giả thuyết về tất cả các yếu tố nguy cơ đã biết.
D. So sánh hiệu quả các phương pháp điều trị mới so với một phương pháp điều trị cũ

47. Kỹ thuật phép cặp trong nghiên cứu bệnh chứng để:

@ A. Kiểm soát các biến số đã được biết là có ảnh hưởng tới sự phân bố của bệnh mà ta nghiên cứu ở cả hai nhóm bệnh và nhóm chứng
B. Có thể nghiên cứu được ảnh hưởng của các nhóm số được phép
C. Kết quả được quy cho ảnh hưởng của các biến số được phép
D. Giảm cơ mẫu nghiên cứu

48. Nhóm chứng cần thiết trong nghiên cứu bệnh chứng bởi vì:

- | |
|---|
| A. Nhóm chứng được so sánh với các nhóm bệnh về các yếu tố căn nguyên nghi ngờ. |
| B. Nhóm chứng được xác định liệu có phát triển bệnh mà ta nghiên cứu hay không |
| C. Nhóm chứng giúp làm tăng cỡ mẫu nhằm đạt được ý nghĩa thống kê |
| @ D. Cho phép sự đánh giá khác biệt về mức độ phơi nhiễm giữa nhóm bệnh và nhóm chứng |

49. Một nghiên cứu bệnh chứng có đặc điểm sau, TRỪ:

- | |
|--|
| A. Có thể không quá tốn kém |
| B. Có thể ước lượng được tỉ suất chênh |
| @ C. Có thể ước lượng được tỉ suất mới mắc |
| D. Có thể chọn nhóm chứng từ những người mới mắc |

50. Nhận xét nào dưới đây là ưu điểm của một nghiên cứu bệnh chứng:

- | |
|---|
| A. Không có hay có ít sai chênh trong việc đánh giá phơi nhiễm với một yếu tố nguy cơ |
| B. Có thể nghiên cứu ảnh hưởng của một phơi nhiễm đối với nhiều bệnh |
| C. Loại trừ được sự phụ thuộc vào việc nhớ lại của đối tượng nghiên cứu |
| @ D. Thường được sử dụng để nghiên cứu bệnh căn các bệnh hiếm gặp |

51. Nhóm chứng trong nghiên cứu thuần tập là nhóm:

- | |
|--|
| A. Nhóm bệnh nhân đủ các tiêu chuẩn nghiên cứu |
| @ B. Giống nhóm chủ cứu về tất cả các đặc điểm trừ phơi nhiễm nghiên cứu |
| C. Nhóm người khỏe mạnh không mắc bệnh nghiên cứu |
| D. Nhóm người tiếp xúc với yếu tố phơi nhiễm đang nghiên cứu |

52. Nhóm so sánh **tốt nhất** trong nghiên cứu thuần tập là:

- | |
|---|
| A. Một nhóm so sánh bên trong |
| B. Một nhóm so sánh bên ngoài |
| C. Một nhóm so sánh ở cộng đồng |
| @ D. Cả nhóm so sánh bên trong và bên ngoài |

53. Thông tin về phơi nhiễm ít gặp sai số nhất từ những nguồn nào sau đây, TRỪ:

- | |
|--|
| A. Hồ sơ có từ trước |
| B. Hỏi đối tượng nghiên cứu |
| C. Khám sức khỏe hay làm xét nghiệm trực tiếp |
| @ D. Điều tra môi trường nước và không khí trực tiếp |

54. Sai số thường gặp nhất liên quan đến thông tin về bệnh là từ nguồn nào sau đây, TRỪ:

- | |
|---|
| A. Giấy chứng nhận tử vong: Thông qua mô tử thi, hồ sơ bệnh án ở bệnh viện hay hỏi họ hàng, người thân của bệnh nhân. |
| B. Hồ sơ bệnh án hay sổ khám bệnh |
| @@@ C. Hỏi trực tiếp đối tượng nghiên cứu hoặc người thân bằng các bộ câu hỏi |
| D. Khám sức khỏe định kỳ: sử dụng tiêu chuẩn chẩn đoán chuẩn đối với các đối tượng nghiên cứu |

55. Trong nghiên cứu thuần tập người ta thường không tính chỉ số nào sau đây:

A. Tỉ số mới mắc	@ B. Tỉ suất chênh (OR)
C. Nguy cơ tương đối	D. Nguy cơ quy thuộc

56. Kết quả nghiên cứu thuần tập thường được trình bày trong bảng:

@ A. Bảng tiếp liên (2x2)	B. Bảng tiếp liên có phép cặp
C. Bảng tỉ lệ %	D. Bảng sống

57. Sai số hay gặp nhất trong nghiên cứu thuần tập là:

A. Sai số lựa chọn
B. Sai lệch phân loại
C. Ảnh hưởng của việc mất các đối tượng nghiên cứu trong quá trình theo dõi
D. Ảnh hưởng của sự không tham gia nghiên cứu

58. Đặc điểm nào dưới đây không phải là nghiên cứu thuần tập

A. Thích hợp cho các phơi nhiễm hiếm gặp
B. Thích hợp cho các bệnh hiếm gặp
C. Có thể làm sáng tỏ mối quan hệ về thời gian giữa phơi nhiễm và bệnh
D. Cho phép tính toán trực tiếp tỉ suất mới mắc bệnh ở cả hai nhóm có và không phơi nhiễm

59. Ưu điểm của nghiên cứu thuần tập là:

@ A. Ước lượng chính xác hơn về nguy cơ mắc bệnh
B. Rất tốn kém về kinh phí và thời gian nếu là thuần tập lồng ghép bệnh chứng
C. Cần phải có hồ sơ đầy đủ nếu là nghiên cứu thuần tập hồi cứu
D. Giá trị của kết quả nghiên cứu có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng do bị mất các đối tượng nghiên cứu trong quá trình theo dõi

60. Trong một nghiên cứu nhằm xác định liệu việc cắt bỏ amidam có kết quả với sự phát triển sau này bệnh hodgkin, nguy cơ tương đối ước lượng sự phát triển bệnh hodgkin ở những người cắt amidam là 2,9 với $p < 0,05$. Từ kết quả này có thể kết luận là:

A. Tỉ lệ chết/mắc ở những người cắt amidam cao hơn
B. Tỉ suất mới mắc bệnh hodgkin ở những người cắt amidam trước đây cao hơn 2,9 lần so với những người không cắt amidam
C. Nguyên nhân gây hodgkin là do cắt amidam
D. Cắt amidam có thể bảo vệ chống lại sự phát triển hodgkin

61. Bảng sau trình bày nguy cơ tương đối được tính bằng tỉ suất của các tỷ lệ tử vong có liên quan với 2 phương pháp điều trị ở bệnh viện A và bệnh viện B:

Phương pháp	Nguy cơ tương đối (A/B)	P
Mổ đẻ	0,5	0,05
Nội động mạch vành	2,0	0,1

Nhận xét nào sau đây có giá trị cho những số liệu này:

A. Nguy cơ tử vong có liên quan với phẫu thuật nội động mạch vành ở bệnh viện A là gần gấp 2 lần so với bệnh viện B
B. Nguy cơ tử vong do mổ đẻ giữa hai bệnh viện có khác nhau một chút ít nhưng sự khác biệt nhỏ này lại có ý nghĩa thống kê
C. Nguy cơ tử vong do mổ đẻ ở bệnh viện B lớn gấp hai lần so với bệnh viện A và sự khác

biệt nhỏ này lại có ý nghĩa thống kê

D. Giá trị P gợi ý rằng nguy cơ chết vì mổ đẻ là quan trọng gấp 2 lần so với nguy cơ chết vì bệnh mạch vành tim

62. Năm 1985, có 1000 phụ nữ làm việc ở phân xưởng sản xuất của nhà máy hóa chất. Tỷ suất mới mắc ung thư xương ở những phụ nữ này vào năm 2005 đã được so sánh với 1000 phụ nữ làm việc ở khu vực văn phòng vào năm 1985. 20 phụ nữ ở phân xưởng sản xuất và 4 phụ nữ ở khu vực văn phòng đã bị ung thư xương trong khoảng thời gian từ 1985 – 2005. Nguy cơ tương đối phát triển ung thư xương ở những người ở phân xưởng sản xuất là:

A. 2

B. 4

@ C. 5

D. 8

63. Nghiên cứu can thiệp là một nghiên cứu có các đặc điểm sau, TRỪ:

A. Là một nghiên cứu thực nghiệm có kế hoạch

B. Thiết kế như một nghiên cứu thuần tập tương lai nhưng khác ở phân bố đối tượng vào nghiên cứu

@ C. Tình trạng phơi nhiễm ở đối tượng nghiên cứu được làm nghiên cứu chủ động chọn theo mục đích

D. Tình trạng phơi nhiễm ở đối tượng được làm nghiên cứu chỉ định một cách ngẫu nhiên

64. Nghiên cứu nào dưới đây không phải là nghiên cứu can thiệp:

A. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả thuốc điều trị

B. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả các phương pháp điều trị (Nội khoa, ngoại khoa, vật lý trị liệu...)

C. Nghiên cứu đánh giá can thiệp cộng đồng

@ D. Nghiên cứu xác định nguy cơ

65. Giai đoạn I trong thử nghiệm thuốc điều trị KHÔNG bao gồm:

A. Nghiên cứu tính an toàn

B. Thử nghiệm ở những người tình nguyện khỏe mạnh

@ C. Nghiên cứu tính hiệu quả

D. Xác định liều sử dụng thuốc hợp lý

66. Giai đoạn II trong thử nghiệm thuốc điều trị KHÔNG bao gồm:

A. Nghiên cứu tính an toàn của thuốc

B. Nghiên cứu tính hiệu quả của thuốc

@ C. Thử nghiệm trên phạm vi lớn

D. Thử nghiệm trên phạm vi nhỏ

67. Giai đoạn III trong thử nghiệm thuốc điều trị KHÔNG bao gồm:

A. Thử nghiệm trên phạm vi lớn

@ B. Thử nghiệm trên phạm vi nhỏ

C. So sánh hai nhóm điều trị

D. Quyết định có đưa thuốc và sử dụng lâm sàng hay không

68. Giai đoạn IV trong thử nghiệm thuốc điều trị KHÔNG bao gồm:

A. Giám sát các ảnh hưởng phụ của thuốc

B. Các nghiên cứu bổ sung lâu dài trên phạm vi lớn về tỷ lệ mắc bệnh

C. Các nghiên cứu bổ sung lâu dài trên phạm vi lớn về tỷ lệ tử vong

@ D. Đánh giá chi phí hiệu quả sử dụng của thuốc

69. Nguyên tắc chỉ định chế độ nghiên cứu trong nghiên cứu can thiệp là:

@ A. Phải được tiến hành ngẫu nhiên

B. Nhà nghiên cứu không chủ động chọn

C. Theo ý muốn của bệnh nhân

D. Không sử dụng bảng số ngẫu nhiên

70. Tích lũy đủ số người phát triển hậu quả bệnh trong nghiên cứu can thiệp bằng:

A. Lựa chọn quần thể có nguy cơ cao

B. Lựa chọn quần thể ở lứa tuổi trẻ

C. Giảm thời gian theo dõi

@ D. Thực hiện chế độ “chạy thử” trước khi phân bổ ngẫu nhiên

71. Tỷ suất hiện mắc của bệnh đái đường cao hơn năm trước khi bắt đầu tiến hành phát hiện và điều trị tích cực là do:

A. Giảm số trường hợp bệnh trước khi nghiên cứu mà không phát hiện được

B. Giảm các yếu tố nguy cơ mắc bệnh đái đường

@ C. Giảm số chết do mắc bệnh đái đường

D. Tăng tỷ lệ chết theo tỉ lệ bệnh đái đường

72. Những chỉ số dịch tễ học có ích lợi nhất trong việc xác định các yếu tố nguy cơ trên cơ sở đó đề ra các biện pháp can thiệp hiệu quả là:

@ A. Tỷ suất mới mắc bệnh ở những người có phơi nhiễm

B. Nguy cơ quy thuộc

C. Tỷ suất hiện mắc ở những người có phơi nhiễm

D. Nguy cơ tương đối của bệnh

73. Những chỉ số dịch tễ học có lợi ích nhất trong việc xác định các yếu tố nguy cơ trên cơ sở đó đề ra các biện pháp can thiệp hiệu quả

@ A. Tỷ suất mới mắc bệnh của những người có phơi nhiễm

B. Nguy cơ quy thuộc

C. Tỷ suất bị mắc bệnh của những người có phơi nhiễm

D. Nguy cơ tương đối của bệnh

74. Người ta có thể không chế sai số trong nghiên cứu can thiệp bằng các biện pháp sau trừ:

@ A. Cỡ mẫu nghiên cứu đủ lớn

B. Kỹ thuật ghép cặp

C. Kỹ thuật làm mù

D. Phân bổ ngẫu nhiên

75. Sai số hệ thống ít xảy ra trong nghiên cứu can thiệp

A. khi không phân tích tất cả những người tham gia nghiên cứu sau khi đã được chọn ngẫu nhiên và nghiên cứu

@ B. Khi loại bỏ những trường hợp không tuân thủ nghiên cứu ra ngoài kết quả

C. Khi người nghiên cứu không giám sát được sự tuân thủ trong nghiên cứu

D. Khi đối tượng điều tra được nhận placebo ở nhóm đối chứng

76. *Mù kệp là kỹ thuật*

A. Chỉ có điều tra viên biết chỉ định phân bổ vào các nhóm nghiên cứu
B. Chỉ có đối tượng nghiên cứu biết chỉ định phân bổ vào các nhóm nghiên cứu
C. Cả điều tra viên và đối tượng nghiên cứu đều không biết chỉ định phân bổ vào các nhóm nghiên cứu
@ D. Cả điều tra viên, đối tượng nghiên cứu và người phân tích đều không biết chỉ định phân bổ vào các nhóm nghiên cứu

77. *Yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất với tính giá trị của các kết luận rút ra từ một thử nghiệm lâm sàng:*

A. Số những người nhận thuốc điều trị và nhận placebo là như nhau
B. Theo dõi được 100% cá thể nghiên cứu
C. Phân bổ ngẫu nhiên các cá thể nghiên cứu
D. Tỷ suất mới mắc tương đối cao của bệnh trong quần thể nghiên cứu

78. *Người ta đã tiến hành thử nghiệm vaccin như sau: 1000 trẻ em 2 tuổi đã được chọn ngẫu nhiên để nhận một loại vaccin phòng một bệnh nào đó và được theo dõi trong 10 năm, trong số những trẻ em này, 80% trẻ đã không mắc bệnh. Trong những kết luận sau, kết luận nào đúng nhất có liên quan tới hiệu quả vaccin:*

A. Vaccin là rất tốt vì tỷ lệ trẻ gây miễn dịch cao
@ B. Không thể kết luận vì không nghiên cứu theo dõi những trẻ không được tiêm vaccin
C. Vaccin không có hiệu quả cao lắm vì nó phải tạo ra tỷ lệ trẻ có miễn dịch cao hơn nữa
D. Không thể kết luận được vì không làm kiểm dịch ý nghĩa thống kê

79. *Trong một nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, để đo lường tần số các triệu chứng phụ do dùng một thuốc điều trị, nhóm chứng nào dưới đây là phù hợp nhất:*

A. Nhóm đối chứng không dùng thuốc
@ B. Nhóm đối chứng nhận placebo
C. Nhóm chứng từ cộng đồng
D. Nhóm chứng là bệnh nhân khác trong bệnh viện

80. *Trong một nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, những điều kiện nào dưới đây là phù hợp với việc loại trừ đối tượng nghiên cứu ra khỏi nhóm nghiên cứu:*

A. Những người tuân thủ khám và xét nghiệm lâm sàng trước khi được chọn ngẫu nhiên
@ B. Những người không tuân thủ chế độ nghiên cứu sau khi đã được chọn ngẫu nhiên vào nhóm nghiên cứu
C. Những người chưa nhận các biện pháp can thiệp trước khi đã được chọn ngẫu nhiên vào nhóm nghiên cứu
D. Những người đã nhận các biện pháp can thiệp qua các bác sỹ tư của họ

81. *Nhận xét nào sau đây mô tả ưu điểm của thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên cả đối chứng, trù:*

A. Nó tránh được sai chệch quan sát
@ B. Nó rẻ tiền tiết kiệm thời gian
C. Nó mang lại kết quả có thể áp dụng được ở những bệnh nhân khác

D. Nó loại trừ được sự tự lựa chọn của đối tượng nghiên cứu và các nhóm điều trị khác

82. Tiêu chuẩn của một căn nguyên đối với bệnh nhân trùng theo định đề kach là như sau, trừ:

A. Chỉ thấy ở bệnh đó

B. Không thấy ở bệnh khác

C. Phân lập nupooi cây và gây bệnh thực nghiệm được

D. Có thể thay đổi theo địa dư

83. Kết hợp giả tạo có thể do các yếu tố nào sau đây:

A. May rủi

@ B. Sai số hệ thống

C. Nhiều

D. Tất cả các yếu tố trên

84. Hạn chế kết hợp giả tạo bằng các phương pháp sau đây, TRỪ:

@ A. Chọn ngẫu nhiên

B. Giới hạn cỡ mẫu nghiên

C. Không chế sai số nhớ lại

D. Không chế sai số do bỏ cuộc

85. Người ta nghiên cứu tỷ lệ quan hệ giữa hút thuốc lá và ung thư phổi. Bằng chứng nào sau đây khẳng định sự kết hợp giữa hút thuốc lá và ung thư phổi và đưa ra được bằng chứng về mối quan hệjnhuan quả?

A. Nguy cơ ung thư phổi tăng lên khi số hút thuốc lá hằng ngày tăng lên

B. Nguy cơ ung thư phổi tăng lên khi số hút thuốc lá hằng ngày tăng lên và thời gian hút thuốc lá dài

C. Những người bỏ hút thuốc lá có tỷ lệ ung thư phổi trung gian so với những người không hút thuốc lá và hiện đang hút thuốc lá

@ D. Tất cả những bằng chứng trên

86. Là một yếu tố có liên quan về nguyên nhân gây bệnh, một yếu tố bệnh căn phải thỏa mãn những điều kiện sau đây, TRỪ:

A. Yếu tố đó phổ biến ở bệnh nhân hơn là những người không bị bệnh

B. Phơi nhiễm với yếu tố đó phải xảy ra trước khi phát triển bệnh

C. Loại trừ yếu tố đó sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh

D. Yếu tố đó được thấy ở tất cả các bệnh nhân

87. Mức độ kết hợp giữa yếu tố nguy cơ và bệnh được đo lường tốt nhất bằng

A. Thời kỳ ủ bệnh

B. Tỷ suất mới mắc của một bệnh trong toàn bộ dân chúng

C. Nguy cơ quy thuộc

@ D. Nguy cơ tương đối

88. Không chế sai số hệ thống gồm các phương pháp sau, TRỪ:

A. Lựa chọn quần thể nghiên cứu thích hợp

B. Lựa chọn phương pháp và công cụ thu thập thông tin thích hợp

C. Lựa chọn và tập huấn điều tra viên

D. Chọn cỡ mẫu đủ lớn

89. Nhiều là những yếu tố có những đặc điểm sau, TRỪ:

@@@ A. Độc lập với những yếu tố phơi nhiễm

B. Làm thay đổi mức độ kết hợp giữa phơi nhiễm và bệnh

C. Có liên quan tới cả phổi nhiễm và bệnh

D. Trung gian giữa cả phổi nhiễm và bệnh
--

90. Biện pháp nào sau đây không phải biện pháp không chế phổi nhiễm:

A. Chọn ngẫu nhiên

B. Thu hẹp pháp vi nghiên cứu

@ C. Ghép cặp

D. Làm mù

91. Mục đích của kỹ thuật ghép cặp nhằm:

@ A. Kiểm soát các biến số đã được biết có ảnh hưởng tới sự phân bố của bệnh mà ta nghiên cứu ở cả hai nhóm bệnh và nhóm chứng
--

B. Phân biệt nghiên cứu bệnh chứng và nghiên cứu thuần tập
--

C. Nghiên cứu được ảnh hưởng của các biến số được ghép cặp
--

D. Đánh giá của sai số may rủi

92. Động vật ngấm nhám và chuột là nguồn truyền nhiễm của bệnh:

A. Sốt rét

@ B. Dịch hạch

C. Thủy đậu

D. Ho gà

93. Các loài chim là ổ chứa trong thiên nhiên của bệnh:

@ A. Viêm gan B

B. Sốt xuất huyết

C. Dịch hạch

D. Viêm não nhật bản

94. Bệnh có khả năng lây truyền từ cuối thời kỳ ủ bệnh là:

A. Dịch hạch

@ B. Bệnh sởi

C. Bệnh dại

D. Bệnh than

95. Bệnh lây truyền theo phương thức trực tiếp là:

@ A. Bệnh dại

B. Bệnh ly

C. Viêm gan B

D. Thương hàn

96. Các bệnh truyền nhiễm được phân loại dựa vào:

A. Đặc tính vi sinh vật gây bệnh

@ B. Vị trí cảm nhiễm thứ nhất của vi sinh vật gây bệnh

C. Vị trí cảm nhiễm thứ hai của vi sinh vật gây bệnh
--

D. Biểu hiện lâm sàng

97. Yếu tố thiên nhiên ảnh hưởng tới sự phát sinh và phát triển của quá trình dịch chủ yếu là qua:

@ A. Nguồn truyền nhiễm

B. Yếu tố truyền nhiễm

C. Tính cảm nhiễm

D. Tính miễn dịch

98. Dịch được định nghĩa là:

A. Một bệnh có tỉ lệ mắc thấp nhưng thường xuyên xảy ra ở một cộng đồng hay từ vùng

B. Bệnh có tỉ lệ tấn công 10/1000 dân

@ C. Sự xuất hiện của bệnh đó vượt quá số mong đợi trung bình của quần thể đó trong thời gian đó
--

D. Tỉ lệ mắc bệnh hằng năm /100000 dân
--

99. Nguồn truyền nhiễm của bệnh sởi là:

A. Động vật

@ B. Người khỏi mang vi rút bệnh

C. Người lành mang vi rút sởi	D. Người lành thể không điển hình
-------------------------------	-----------------------------------

100. Nguồn truyền nhiễm của bệnh thân từ:

A. Muỗi mang vi trùng than	B. Đất có chứa nha bào than
C. Trâu, bò, dê	@@@ D. Thực phẩm bị nhiễm vi trùng than

101. Bệnh lây truyền theo đường da và niêm mạc:

A. Bệnh thương hàn	B. Bệnh bạch hầu
@ C. Bệnh dại	D. Bệnh viêm não nhật bản

102. Yếu tố quyết định sự đào thải vi sinh vật gây bệnh ra khỏi vật chủ là:

A. Độc lực của vi sinh vật gây bệnh
@ B. Vị trí cảm nhiễm thứ nhất của vi sinh vật gây bệnh
C. Cơ chế truyền nhiễm
D. Vị trí cảm nhiễm thứ hai của vi sinh vật gây bệnh

103. Nguồn truyền nhiễm chính của viêm não nhật bản là:

A. Dê, cừu	B. Chó mèo
@ C. Chim, lợn	D. Người khỏe mang vi rút

104. Yếu tố chính gây bệnh sốt xuất huyết là:

A. Muỗi culex tritaeniorhynchus	@ B. Muỗi aedes acgypti
C. Muỗi Aedes albopictus	D. muỗi aedes niveus

105. Phương thức lây truyền HIV chủ yếu ở Việt Nam hiện nay là:

A. Tình dục đồng giới	B. Tình dục khác giới
C. Truyền máu và các sản phẩm từ máu	@ D. Tiêm chích ma túy

106. Chẩn đoán phát hiện sớm một bệnh nhân trong một vụ dịch cần phải dựa vào

A. Chẩn đoán lâm sàng	B. Chẩn đoán xét nghiệm
C. Điều tra dịch tễ học	@ D. Các phương pháp trên

107. Các biện pháp chủ yếu để phòng chống truyền nhiễm là:

A. Các biện pháp đối với nguồn truyền nhiễm
B. Các biện pháp đối với đường truyền nhiễm
C. Các biện pháp tăng cường sức đề kháng cho cộng đồng
@ D. Tất cả các biện pháp trên

108. Nếu được yêu cầu đến để điều tra một vụ dịch, điều đầu tiên anh/chị cần xác định là:

A. Phương thức lây truyền	B. Kiểm tra lại chẩn đoán, xác định ca bệnh
C. Phương pháp phòng chống	D. Giới hạn khu dịch

109. Biện pháp phòng chống có hiệu quả nhất đối với các bệnh truyền nhiễm đường tiêu hóa là:

A. Cách ly và thải trừ chất thải bỏ của bệnh nhân
B. Cắt bỏ đường truyền nhiễm
@ C. Phát hiện sớm và điều trị bệnh nhân
D. Tiêm vacxin phòng bệnh

110. Nhìn chung, biện pháp phòng chống có hiệu quả nhất đối với hầu hết các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp là:

- | |
|--|
| A. Phát hiện sớm và điều trị bệnh nhân |
| B. Cách ly và khử trùng chất thải bỏ của bệnh nhân |
| C. Cắt đường truyền nhiễm |
| @ D. Tiêm vaccin phòng bệnh |

111. Nhìn chung, biện pháp phòng chống có hiệu quả nhất đối với hầu hết các bệnh truyền nhiễm đường máu là:

- | |
|---|
| A. Phát hiện sớm và điều trị triệt để bệnh nhân |
| @ B. Cắt đường truyền nhiễm |
| C. Tiêm vaccin phòng bệnh |
| D. Điều trị dự phòng cho những người tiếp xúc với bệnh nhân |

112. Mục đích điều tra dịch tễ học tại ổ dịch là:

- | |
|--|
| A. Đánh giá hiệu quả của các biện pháp can thiệp |
| B. Chọn biện pháp thích hợp nhất để xử lý ổ dịch |
| C. Đánh giá trình độ chuyên môn của các cán bộ cơ sở |
| @@@ D. Tính tỉ suất hiện mắc |

113. Nhìn chung, biện pháp phòng chống có hiệu quả nhất đối với hầu hết các bệnh truyền nhiễm qua đường da và niêm mạc là:

- | |
|--|
| A. Phát hiện sớm và điều trị triệt để bệnh nhân |
| B. Cách ly và khử trùng chất thải bỏ của bệnh nhân |
| C. Tiêm vaccin phòng bệnh |
| @ D. Giáo dục sức khỏe và vệ sinh cá nhân |

114. Phương pháp có hiệu quả nhất phòng chống HIV/AIDS là:

- | |
|--|
| A. Phát hiện cách ly và điều trị sớm người nhiễm HIV |
| B. Thực hiện tốt kiểm dịch biên giới |
| C. Thanh toán các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm |
| @ D. Giáo dục thay đổi hành vi và xây dựng hành vi an toàn |

115. Đối với bệnh truyền nhiễm đường hô hấp có hiện tượng tăng bằng biện pháp phòng chống quan trọng là:

- | |
|---|
| A. Cách ly và khử trùng chất thải bỏ của bệnh nhân |
| @@@ B. Phát hiện sớm và điều trị triệt để bệnh nhân |
| C. Tăng cường giáo dục sức khỏe và các biện pháp dự phòng cấp 1 |
| D. Chẩn đoán và cách ly sớm |

116. Phương pháp phòng chống có hiệu quả nhất đối với bệnh nhân sởi là:

- | |
|--|
| A. Phát hiện sớm và điều trị triệt để bệnh nhân |
| B. Cách ly và khử trùng chất thải bỏ của bệnh nhân |
| @ C. Tiêm vaccin cho trẻ từ 9-11 tháng tuổi |
| D. Giáo dục sức khỏe và vệ sinh cá nhân |

117. Phương pháp phòng chống có hiệu quả nhất đối với bệnh viêm não Nhật Bản là:

- | |
|----------------------------|
| A. Tiêm vaccin cho lợn |
| B. Diệt muỗi bằng hóa chất |

@ C. Tiêm vaccin VNNB cho lứa tuổi cảm nhiễm ở vùng có lưu hành bệnh

D. Phát hiện sớm và điều trị triệt để bệnh nhân

118. *Vaccin tiêm cho phụ nữ có thai và phụ nữ độ tuổi sinh đẻ là:*

A. Vaccin BH-HG-UV

B. Vaccin sởi

C. Vaccin Sabin

@ D. Vavxin uốn ván

119. *Nguồn truyền nhiễm của nhóm bệnh lây truyền theo đường hô hấp là:*

A. Người bệnh thể điển hình

B. Người bệnh thể không điển hình

C. Người mang mầm bệnh

@ D. Tất cả các loại kể trên

120. *Nguồn truyền nhiễm của nhóm bệnh lây truyền theo đường tiêu hóa là:*

A. Người bệnh thể điển hình

B. Người bệnh thể không điển hình

C. Người mang mầm bệnh

@ D. Tất cả các loại kể trên