

Bệnh đặc hiệu: Giảm áp (khí phế thũng) thợ lặn, phóng xạ, nhiễm độc đặc thù, bụi đặc thù, đục thủy tinh thể (thối thủy tinh)

Bệnh không đặc hiệu: viêm pq mạn, đau thắt lưng-vai, thiếu máu - giun móc, ...

Review SKNN2 tin nhắn

SKNN

2016: 7 bệnh phổi, 10 bệnh nhĩ đ, 6 vật lý, 6 da, 5 nhĩ klưu

1. năm 2016: 5 bệnh da nghề nghiệp 7 Bụi, 10 độc, 5 lý, 5 da, 4NK - 2023 thêm COVID-19
2. Tỷ lệ bn được giảm định/ bn được phát hiện bnn: 1/4 phát hiện 22,3%; giảm định 26,4%
3. bệnh đặc hiệu: giảm áp ở thợ lặn
4. mấy cách phân loại bnn maybe 3: theo nhóm và theo đặc hiệu và ko đặc hiệu; và được hưởng bảo hiểm
5. Tiếng ồn dao động là tiếng ồn có cường độ âm thanh thay đổi không ngừng theo thời gian ✓ tr 98
6. thời gian tiếp xúc tối thiểu của diệc nghề nghiệp là 3 tháng, dưới 3 tháng => Tai nạn lao động (VN và Pháp quy định 6 tháng) tr 99
7. Mức gây hại của tiếng ồn theo ISO quốc tế: $90 + 2,5 \text{ dB}$ tr 99
8. Mức áp suất âm cho phép đối với tiếng ồn xung thấp hơn 5dB tr 100
9. Mức âm chung tại vị trí Buồng theo dõi, điều khiển từ xa CÓ THÔNG TIN BẰNG ĐIỆN THOẠI: 70 dB bằng 101
10. Giai đoạn thích nghi thính giác: ngưỡng nghe tăng 10-15 dB, trở về sau 2-3 phút tr 102
11. Gđ mệt mỏi thính giác: ngưỡng nghe tăng 15-30 dB, trở về sau 15-30 phút tr 102
12. Giai đoạn diệc nghề nghiệp:
 - Diệc Trung Bình: đo thính lực thể hiện diệc tiếp âm thể dấy, khả năng nghe nói thầm 2-3m trở lại tr 102
 - Diệc Nặng: Diệc tiếp âm toàn thể loa đạo, khả năng nghe nói thầm 1m trở lại tr 103
13. Nghiệm pháp mệt mỏi thính lực: - ngưỡng nghe tăng 5-10 dB => nghi ngờ mệt mỏi ngưỡng nghe tăng trên 10 dB => mệt mỏi thính lực tr 103
14. Đo thính lực sơ bộ: âm nền dưới 50dB ✓ tr 103 30 - 1000 và 60 - 4000
- Phát hiện giảm sức nghe từ 30dB ở 1000Hz và từ 60dB ở 4000 Hz => đo thính lực hoàn chỉnh ✓
15. Đo thính lực hoàn chỉnh: âm nền dưới 35 dB ✓ tr 104
16. Diệc do chấn thương âm: không tăng lên như diệc nghề nghiệp lui dần (ko CT xg đá, hoàn tàn (gây xg đá)
17. Dùng nút tai, chụp tai phối hợp bọc nguồn ồn: giảm ồn xuống 40-50 dB tr 110 chụp tai toàn bộ (giảm 10-20dB)
18. Rung chuyển là những tác hại của cơ thể trong quá trình làm việc khi tay hoặc toàn cơ thể bị chịu tác động rung chuyển trong 1 thời gian gây ra tổn thương cơ học tr 113
19. Con người có thể chịu đựng được rung chuyển với các loại tần số khác nhau, nhưng với điều kiện biên độ, vận tốc hay gia tốc tương ứng với tần số phải dưới giới hạn cho phép. tr 114
20. Rung chuyển nghề nghiệp: thời gian lao động liên tục không quá 3h, không liên tục không quá 5h tr 120 (biện pháp phụ trợ cá nhân) liên tục <= 3h; ko liên tục <= 5h
21. Xương là tổ chức lắng đọng chi nhiều nhất 91-95% tr 227
22. Định lượng delta ALA niệu bình thường: $2,91 \pm 1,04 \text{ mg/l}$ tr 236
23. Dấu hiệu lâm sàng nhiễm độc chì: hội chứng đau bụng chì; liệt cơ duỗi ngón tay và cơ nhỏ bàn tay; bệnh cấp tính về não có 1 hoặc nhiều triệu chứng khác về nhiễm độc chì tr 237
24. Số lượng hồng cầu hạt kiềm tính theo tỷ lệ phần vạn so với hồng cầu >= 10 bằng 18.1 tr 237
25. giải độc chì cấp bằng cách: rửa dạ dày với dung dịch kết tủa chì, dùng chất gắn để thải chì tr 238
26. Bụi silic gây bụi phổi silic: nld có nguy cơ mắc bệnh nếu tiếp xúc sau 5 năm tr 339
27. Bụi amiang => sau 10 năm tiếp xúc liên tục cấp 3 tháng, tt nhanh 2 năm, mạn 5 năm
28. kích thước các đám mờ nhỏ (tròn đều, không tròn đều), đám mờ lớn tr 336, 337
29. mật độ đám mờ, chia ra 4 phân nhóm chính, 3 phân nhóm phụ ✓ tr 337
30. Chức năng hô hấp trong bụi phổi silic: PaCO2 tăng lên tr 339, PaO2 giảm + (b: CO2: < 40%; O2: > 80mmHg, 95% bão hòa)
31. Trường hợp nld được chẩn đoán là bụi phổi silic cần đưa ra Hội đồng giám định y khoa ✓
32. Kháng tuyến ở bộ phận phát sinh bụi silic: không tuyển người mắc hô hấp, tim mạch, nội tiết ✓
33. Suy hô hấp => thở Oxy

Đại
cường

Diệc
nghe
giúp

Rung
chuyển

Chì

Bụi
phổi

- amphibole: silicat kép, nối cation, tạo sợi đặc, cứng, dễ gãy, khó tan H₂O
đường kính > chrysotilite
chrysotilite: bó sợi dễ gãy, tạo vụn sợi ngắn, mỏng, tan H₂O → chiếm 4%
34. Thờ khí kiểm: dự phòng cấp 1 } DP cấp 1
35. Rửa phổi: dự phòng cấp 2 }
36. Cấu trúc amiang nhóm amphybole là chuỗi kép ✓ đr 350
Rửa phổi là cấp 2
37. Amiang là chất không cháy, cách điện tốt, bền với nhiệt độ cao và các chất hoá học, lâu mòn đr 350
38. Màu sắc của các loại amiang: chrysotile (xanh), amosite (đen), crocidolite (xanh)
39. màng dày xơ hoá và canxi hoá màng phổi thường xuất hiện ở hai bên thành phổi và trên bờ hoành đr 354 (có thể bệnh sưng) thành ngực bên, thành trước, bờ hoành, trung thất
40. Đại thể GPB bụi phổi amiang: bệnh nhẹ hình dáng phổi bình thường, bệnh nặng phổi teo nhỏ lại màu xám và cứng như cao su đr 354 ✓
41. thể asbet dài 50-150 micromet đr 356, dài 5-10 micromet
42. Nghe phổi (amiang): rale nổ dưới đáy phổi, nhỏ hạt, cuối kỳ thở vào đr 357
43. Quang: xơ hoá phổi: đáy và giữa phổi 2/3 phổi dưới, nhồi là góc sườn hoành (P) Đỉnh phổi hiếm
44. Giám sát môi trường lao động: nồng độ trung bình trong 8h làm việc ≤ 1 sợi/m³ không khí hoặc 2 sợi trong 1 giờ, khu dân cư: 0 sợi đr 360
45. Khám tuyến: không tuyến người mắc hô hấp, tim mạch, nội tiết đr 360
46. Viêm gan virus: men SGOT và SGPT tăng cao hơn bình thường từ 10-200 lần, bạch cầu bình thường hoặc tăng nhẹ đr 375
47. 70-90% trường hợp sau điều trị viêm gan vr, không để lại di chứng đr 376
48. Định nghĩa của WHO, người mang VR viêm gan là người có kháng nguyên VR vg tồn tại quá 6 tháng đr 377
49. Chưa thấy có trường hợp mang VR vg A mạn tính đr 373

Viêm
gan

SKNN2 2023

Học sách mới của thư viện, sách của quán photo không đầy đủ
Học kỹ bài điếu của kỳ 1

Trúng test 70% nếu học kỹ test giấy và test HLinH. Đây là các câu không có trong test chỉ cho Tuyết Nhi biết:

1. Đáp án: BC bình thường hoặc tăng nhẹ ✓ bài cũ
2. Người già có tỷ lệ mắc ĐNN cao hơn trẻ ✓ già, trẻ em, Phụ nữ
3. XQ Xơ hoá phổi trong trong bụi P silic/amiang: học kỹ
4. Trong bụi P Amiang, không tuyến: người mắc tim mạch, hô hấp, nội tiết ✓
5. Tổn thương ốc tai, tk: do sóng dài hẹp ✓ vì gây kích thích mạnh
6. Mấy câu chỉ số Chingbeo ghi lại
7. Đáp án: tổn thương cơ dưới, cơ nhỏ bài rưng chuyễn ✓
8. Chụp Xquang P cho công nhân tiếp xúc với bụi P sau bao nhiêu năm? 5/10/20 maybe "BN tiếp xúc với amiang từ 10 năm trở lên cần khám chuyên khoa và XQ lồng ngực 3-5 năm lần"
9. Nồng độ Amiang cho phép trong môi trường lao động trong 8h: 1 sợi/ ✓ 1h : 2 sợi không dân cư : 0 sợi
10. Triệu chứng cơ năng của bụi P silic giống: Viêm P mạn/...
bệnh lý tắc nghẽn: Viêm pq mạn
11. Chỉ trong xương dài > xương dẹt ✓
12. Sau khi kết thúc ca làm công nhân phải: vòi tắm kk và thay quần áo/... tắm rửa thay quần áo ✓
13. Xử dụng PP ngăn chặn đường tiếp xúc của bụi nào trong điều kiện phân xưởng có 1 ca làm và các cửa mở: cách ly nguồn bao bọc nguồn/hút cục bộ
14. ĐNN mức trung bình là tổn thương thể ĐÂY ✓ mức nặng : toàn thể cơ thể
15. Triệu chứng của VGA và VGB: giống nhau/không thể phân biệt/... phân biệt đc ✓

Bài 1 Câu	Đại cương về bệnh nghề nghiệp	Đáp Án
	Chuẩn đoán bệnh nghề nghiệp thường A. Khó khăn (maybe) B. Rất khó khăn Tính đến năm 2016 có bao nhiêu bệnh <u>nhiễm độc</u> được bảo hiểm A. 8 B. 11 C. 6 D. 7 1. Có mấy cách phân loại bệnh nghề nghiệp: <i>BNN đặc hiệu/ko đặc hiệu</i> <i>BNN được bảo hiểm</i> <i>Tác nhân gây bệnh và vị trí tổn thương (theo nhóm yếu tố tác hại nghề nghiệp)</i> 2. Theo định nghĩa ATVSLĐ 2015, "bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh doĐiều kiện lao động..... có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động" A. Môi trường lao động B. Điều kiện lao động C. Tính chất lao động D. Khối lượng lao động 3. Hiện nay nước ta mới có bệnh ở trong danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm tính đến năm 2016 A. 20 B. 25 C. 30 D. 34 4. Việc giám sát và khống chế các yếu tố THNN là..... nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động. A. Cần thiết nhưng không cần cấp bách B. Cần thiết và cấp bách C. Cấp bách nhưng không cần thiết D. Không cần thiết 5. BỆNH NGHỀ NGHIỆP KHÔNG ĐẶC HIỆU - Người bình thường cũng có thể mắc - Người lao động dễ bị mắc bệnh hơn Gồm VPQ mạn, Đau vùng thắt lưng, thiếu máu do giun móc Một câu về VPQ là bệnh	3 B D B C

- A. Đặc hiệu
 B. **Không đặc hiệu**
6. Muốn chẩn đoán một trường hợp mắc BNN phải dựa vào mấy yếu tố B
 A. 2
 B. **3** *3 yếu tố*
 C. 4
 D. 5
- Tiếp xúc + Lâm sàng + cận lâm sàng**
7. Việc điều trị đa số bệnh nghề nghiệp có kết quả là C
 A. Chữa khỏi hoàn toàn
 B. *Làm chậm* quá trình tiến triển bệnh
 C. **Làm dừng** quá trình tiến triển bệnh
 D. Phục hồi các tổn thương.
8. Nguyên tắc đầu tiên của **điều trị bệnh nghề nghiệp** là C
 A. Thải chất độc ra khỏi cơ thể
 B. Điều trị triệu chứng
 C. **Tách bệnh nhân ra khỏi môi trường lao động**
 D. Điều trị dự phòng.
9. Bệnh nào sau đây thuộc nhóm bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm : **2006** D
 2006 có 4 bệnh: (1) hen NN, (2) độc CO; (3) nốt dầu; (4) viêm loét da quanh móng
 A. Bệnh hen phế quản nghề nghiệp
 B. Bệnh nhiễm độc monoxit cacbon nghề nghiệp
 C. Bệnh nốt dầu nghề nghiệp
 D. **Cả 3 bệnh trên đều đúng**
10. Bệnh nào sau đây thuộc nhóm bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm **1976** D
 1976 - 8 bệnh: (1) Silic; (2) amiang; (3) ĐNN; (4) Chì; (5) Hg; (6) xạ ion hóa; (7) benzen; (8) Mangan
 A. Bệnh bụi phổi - Silic
 B. Bệnh bụi phổi - amiăng
 C. Bệnh điếc nghề nghiệp
 D. **Cả 3 bệnh trên đều đúng + chì NN** *1976 : 3 bệnh học*
11. Đối với nguồn phát sinh, trong trường hợp THNN đã phát sinh cần áp dụng các biện pháp..... nguồn phát sinh chất độc hoặc trung gian giữa nguồn và người lao động. A
 A. **Bao vây; cắt đứt**
 B. Cô lập; cắt đứt
 C. Bao vây, can thiệp
 D. Cô lập, can thiệp
12. Đến 2016 có bao nhiêu bệnh NN nhóm bụi phổi và phế quản phổi 7
 (1) **Phổi 7** (2) **Nhiễm độc 10** (3) **Nhiễm khuẩn 5**
 (4) **Bệnh da 6** (5) **Yếu tố vật lý 6**

13. Có thể do các yếu tố môi trường sống tác động và yếu tố nghề nghiệp chỉ có tác động B

A. Một phần

B. Hoàn toàn

Việc xác định rõ ràng tác nhân nghề nghiệp đối với bệnh liên quan đến nghề nghiệp thườngđặc biệt liên quan đến việc quyết định tri trả BH và bồi thường.

a. Dễ hơn

b. Khó hơn@

c. Thấp hơn

14. bệnh bụi phổi là bệnh nghề nghiệp : D

A.đặc thù

B.đặc hữu

C.không đặc hiệu

D.Đặc hiệu

15. Nội dung SKNN: “Độc chất học nghiên cứu mối liên quan giữa cơ thể người lao động với chất độc,xác định giới hạn nồng độ tiếp xúc tối đa cho phép và dự phòng các nhiễm độc nghề nghiệp ” _____ (tr10)

A. Bệnh nhiễm độc nghề nghiệp cấp tính

B. Bệnh nhiễm độc nghề nghiệp mạn tính

C. Bệnh nhiễm độc nghề nghiệp @

D. Bệnh nghề nghiệp

16. BNN D

A. Có thể đặc hiệu

B. Có thể ko đặc hiệu

C. Vừa đặc hiệu, vừa ko đặc hiệu

D. Cả A và B @

17. Ở VN năm 2014 tỷ lệ bệnh nhân được giám định trên tổng số phát hiện BNN chỉ chiếm chưa đến 1/4 C

Tỷ lệ được giám định/số phát hiện là 26,4%

$\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{4}$

D. $\frac{1}{5}$

18. BNN hay gặp ở nhân viên y tế thuộc nhóm nào A

A. Nhiễm trùng @ vi khuẩn

B. Nhóm bụi phổi và phế quản

C. Yếu tố Vật lý

D. Ngộ độc

Bệnh đục thủy tinh thể thuộc nhóm BNN

A

☒ A. Yếu tố vật lý @

B. Bệnh về da

C. Nhiễm độc NN

Vật lý : phóng xạ ,điếc NN,rung chuyển NN,giảm áp NN,đục

TTT nghề nghiệp

19. Bệnh do bức xạ ion là bệnh:

D

A.đặc thù

B.đặc hữu

C.không đặc hiệu

☒ D.Đặc hiệu

→ bệnh phẩy xạ ở nh[~]ng làm việc trực tiếp
bức xạ ion hoá

Bệnh đặc hiệu : thủng chòm giảm áp thợ lặn,tiếp xúc bức xạ ion,nhiễm độc benzen nghề nghiệp ,bụi phổi silic -amian
,đục nhân mắt ở người làm nghề thổi thủy tinh

20. Để xác định Bệnh nghề nghiệp ko đặc hiệu cần quan sát,
phân tích kỹ điều kiện tiếp xúc tác hại trong quá trình

A

☒ A. Lao động

B . Vận hành

C. Lập kế hoạch

21. Nghề có nguy cơ cao bệnh NN

A

☒ A. Khai thác ks

B. Khai thác kim cương

C. Hàn xì

tỷ lệ mắc cao là ngành khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu
xây dựng, cơ khí, y tế, sản xuất và sử dụng hóa chất

22. BNN tiến triển trong thời gian dài, phải tiếp xúc với yếu tố có
hại trong một thời gian ____

A

☒ A.Đài

thời gian dài + thường xuyên

☒ B. Liên tục

C. Vài năm

D. Ngắn

23. Phòng ngừa bệnh NN cầncông việc lặp đi lặp lại

C

A.Giảm thiểu B.hạn chế ☒ C.loại bỏ D.tăng cường

24. Tác nhân gây bệnh NN không truyền nhiễm là :

A

☒ A. thực vật, bụi thực vật, phấn hoa, lông thú:gây dị ứng

B.Lao NN

C.Viêm gan VR + HIV NN

D.Leptospira NN

25. **Giới hạn tiếp xúc tối thiểu** là mức tiếp xúc..... với yếu tố có hại trong quá trình lao động để có thể gây nên bệnh nghề nghiệp B

a. Nhỏ nhất
☒ b. Thấp nhất@
 c. Ngắn nhất
 d. Lớn nhất

Thời gian tiếp xúc tối thiểu là thời gian... với yếu tố có hại trong quá trình lao động để có thể gây nên bệnh nghề nghiệp: C

a. Nhỏ nhất
 b. Thấp nhất
☒ c. Ngắn nhất@
 d. Lớn nhất

Thời gian bảo đảm Là khoảng thời gian kể từ khi người lao động đã thôi tiếp xúc với yếu tố có hại đến thời điểm vẫn còn khả năng phát bệnh do yếu tố có hại đó

26. -Bệnh nào được giám định nhiều nhất ở Việt Nam: A

☒ A. bệnh bụi phổi và phế quản: 78,1%
 B. Do yếu tố vật lý : 14,3%
 C. Do Ngộ độc Nghề nghiệp : 4,4 %
 D. Da nghề nghiệp : 2,5 %

27. Chẩn đoán xác định BNN được bảo hiểm do

☒ **Tiêu chuẩn của Bộ Y tế**
☒ **Hội đồng giám định Y khoa về BNN (cấp tỉnh, trung ương)**

28. khó chẩn đoán bệnh nghề nghiệp do thuốc bảo vệ thực vật: B

A Cấp tính
☒ B mạn tính
 C cấp và mạn
 D bán cấp

B2+3 Một mỗi trong lao Động + Stress Đáp Án

1. Thiếu vit B C gây suy dd hay mệt mỗi...
 2. Mệt mỗi mạn tính cần nghỉ ngơi yên tĩnh...
 3. Làm việc liên tục ngoài trời nghỉ giải lao sau bao lâu: A
- ☒ A. 1h B. 2h C. 3h D. 4h

Th nghỉ = 15% tg lao động , làm 1 giờ nghỉ 5 phút

- Nghỉ 15%
- Gây hưng phấn và thư giãn trong quá trình làm việc
- Luân ca làm

Một câu 1h nghỉ 15p, 2h nghỉ ...

☒ A. 30p

B. 20p

B

Tai Nạn Lao Động

Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.

1. -Do áp lực cao (nổi hơi) thuộc

A. chấn thương NN

B. Tai Nạn Lao Động...

2. Tác nhân sinh học của tai nạn lao động

D

a. Vi khuẩn, KST

b. Vi rút, nấm

c. Nấm, KST

☒ d. Súc vật cắn

Tác nhân truyền nhiễm : VK, VR, VSV

Ko truyền nhiễm nhưng dị ứng: thực vật, bụi thực vật, phấn hoa, lông thú

3. 1. Do chất nổ hóa chất, điện thuộc thuộc nguyên nhân

A

☒ A. năng lượng

B. vật lý

Gây điện giật

Gay bỏng, cháy

Tử vong khi cường độ > 0.05 A

2. Các nguy cơ do nguồn điện: A .giật, bỏng, cháy, tử vong

2-Bệnh cấp tính do hơi khí độc, bụi độc trong quá trình lao động được coi là

☒ A. TNLD

B. TN nghề nghiệp

C. Tai nạn khách quan

D. Do cố ý

3. Trên đường đi đến nơi làm việc và từ nơi làm việc về nhà gặp tai nạn được coi là TNLD (sgk)

A. TNLD

B. TN nghề nghiệp

C. Tai nạn khách quan

D. Tai nạn thương tích

4. TNLD do ánh sáng **lập lờ, chói mắt, thiếu ánh sáng** thường gây

A. vấp ngã

B. nhìn mờ

C. ko phân biệt được màu sắc

5. TNLD do chất độc

A. Cáp, B. mạn C. cấp hoặc mạn (hóa chất)

6. Bỏng, cháy nổ thuộc gì:

A. hỏa hoạn

B. chấn thương

C. TNLD

7. Co giật do nhiệt, mệt lả do nhiệt xếp vào: say nóng

A. TNLD -> vì khí hậu và nhiệt độ

B. chấn thương NN

C. Say nóng

D. BNN

4. Tai nạn lao động nhẹ số ngày nghỉ việc *nhẹ: > 1 ngày* A

A. 1 - 14 ngày @

B. > 14 ngày: Nặng

Khả năng: 1 - 9 ngày

Nặng: 10 ngày

5. Phoi bào, phoi tiện thường bắn vào gây tổn thương vị trí nào B

A. Đầu, chân

B. Đầu, tay (tr33 ghi mắt, tay)

C. Mắt, cổ

D. Mắt, chân

6. 1. TNLD nguyên nhân cơ học do phoi bào, phoi tiện bắn vào người, có thể do các lưỡi dao, lưỡi cưa A

A. Cắt vào tay hoặc dây cu roa quần lòi vào máy

Nguyên nhân kỹ thuật

3. Nguyên nhân cơ học TNLD

Mảnh văng từ máy đang chạy, do con thổi bắn ra khỏi máy lao vào người @ (tr33)

7. Nguyên nhân do **bố trí lắp đặt ,sắp xếp vị trí máy** móc thiết bị không đúng nguyên tắc an toàn gây TNLĐ thuộc nhóm nguyên nhân nào D
- ☒ A. Tổ chức lao động
 - ☐ B. Quản lý lao động
 - ☐ C. Vệ sinh công nghiệp?
 - ☐ D. Kỹ thuật
8. **Bố trí** phương tiện ko hợp lý, lối đi chật hẹp thuộc nguyên nhân gây tnld nào: B
- ☐ A. Kỹ thuật
 - ☒ B. tổ chức lao động
 - ☐ C. chủ quan của ng lao động
 - ☐ D. vệ sinh công nghiệp.
9. Điều trị thuốc long đờm, giảm ho, kháng sinh với mục tiêu B
- ☐ A. Điều trị biến chứng
 - ☒ B. Phục hồi khả năng lao động @ (tr 61)
 - ☐ C. Phục hồi thông khí
10. Mở cửa sổ **quạt thông gió làm loãng bụi** là biện pháp C
- ☐ A. Thông khí tự nhiên
 - ☐ B. Thông khí nhân tạo
 - ☒ C. Thông khí chung (sgk)
11. Không gian chật hẹp bí bách thuộc nhóm: C
- ☐ A. vệ sinh công nghiệp,
 - ☐ B. kỹ thuật,
 - ☒ C. tổ chức lao động
12. Nguyên nhân do thiết kế do máy móc ____ bộ phận che chắn A
- ☒ A. Thiếu @
 - ☐ B. Ít
 - ☐ C. Có
 - ☐ D. Hỏng
- NN kỹ thuật**
13. Nguyên nhân do **thiết kế -kỹ thuật TNLĐ**
- ☒ A. Thiếu các phương tiện cơ giới hoá, tự động hóa tại nơi làm việc nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm @ (tr33)

14. TNLD do tư thế mục vận chuyển bằng tay B
- A. Ko đối xứng
☒ B. Không cân bằng (sgk mục vận chuyển bằng tay)
 C. Cân bằng
 D. Nghiêng một chút.
15. Vị trí lao động phù hợp với: B
- A. Từng người lđ
☒ B. Từng loại lđ
 C. cơ chế lao động
16. Bố trí tối ưu mặt bằng sản xuất, an toàn và: D
- A. Hợp lý/
 B. Rộng rãi
 C. Thoáng đàng/
☒ D. Đủ lối đi
17. Định nghĩa về tai nạn lao động =>
 - hậu quả tác động bất ngờ của yếu tố bên ngoài-> CT/NĐ
 cấp trong quá trình SX /công việc lq SX
18. Sơn chứa gì (xylen?) thuộc: A
- xylen → cách điện
 chỗ gỉ → chữa rỉ*
- ☒ A. Sơn cách điện
 B. Sơn chống gỉ (chứa chì)
 C Sơn phát quang
19. Chiều sáng công nghiệp là nguy cơ gây TNLD vì:
- Ko nhìn rõ màu sắc tín hiệu an toàn
 - Ánh sáng lấp lóe, chói mắt hoặc ko đủ ánh sáng gây ☒ vấp ngã
 - Ánh sáng không đủ va đập vào các bộ phận chuyển động của máy.

B

Bệnh Bụi Phổi

1. Trong bệnh bụi phổi silic, tổn thương hay gặp ở ngoài rìa và đáy phổi là :
- ☒ A. khí thũng
 B. khí thũng và dày dính màng phổi
 C. Xơ hóa
 D. Vôi hóa
- dày mhp và calci hóa: thường ở các thành
 - Khí phế thũng: rìa và đáy phổi
- 2-Thời gian tiếp xúc tối thiểu với silic là bao lâu:
 A.1 năm, B. 3 năm, ☒ C.5 năm, D.10 năm(bụi amiang) ✓

3-Theo ILO 2000, thời gian tiếp xúc với sản xuất đá granit có nồng độ bụi silic tự do cao, thời gian ngắn nhất ;5-10 năm...

☒ A. 5 năm

B. 10 năm

C. 15 năm

4.Màng phổi trong bụi phổi silic thường dày dính ở đâu:

☒ A. Vùng bên và trước/

B.Cơ hoành/

C. Vùng đáy/...

4. VPQ mạn tính phổi hợp vs bệnh bụi phổi silic ở gđ phát triển gây ra: (trang 60)

☒ A. Viêm pq phổi cấp tính

B. Viêm pq phổi bán cấp

C. Viêm pq phế nang

6.Liều điều trị prednisolon trong bụi phổi silic

A. 20-30mg/ngày

B 15-20 mg/ngày

☒ C.5-10 mg/ngày

Viên 5 mg

* Hội chứng hạn chế xuất hiện khi dung tích sống giảm.

☒ A. DTS giảm, thể tích khí cặn tăng,

8- Mỗi phổi được chia làm 3 vùng (trên, giữa, dưới) bằng một đường kẻ qua điểm 1/3 và 2/3 của đường vuông góc nối giữa đỉnh phổi và cơ hoành

A. 1/3 và 1/3

☒ B. 1/3 và 2/3 @

9.Phân biệt Hemosiderosis nội sinh với bụi phổi Si

☒ A. Ko có tiền sử tiếp xúc Si, có ho ra máu, nghe tim có dấu hiệu hẹp van 2 lá, xét nghiệm đờm có tế bào chứa Fe @

B.Ko có tiền sử tiếp xúc Si, có ho ra máu, nghe tim có dấu hiệu hẹp van 2 lá, xét nghiệm đờm có tế bào chứa Si

tiêu chuẩn:
1. ko ts tx Silic
2. Ho có máu
3. Hẹp 2 lá
4. đờm Fe +

10.Bệnh hemosiderosis nội sinh: Do hẹp van 2 lá gây tình trạng vi xuất huyết trong phổi gây ứ đọng sắt ở ... (B)

A. Mạch máu phổi

☒ B. Mạch bạch huyết

12. Hạch rốn phổi có hình ảnh đặc trưng là : **vỏ trứng.**

- Quá phát, nhiễm sắc tố và xơ hoá. Hạch bị vôi hoá có hình ảnh “vỏ trứng”
Quá phát, nhiễm sắc tố và xơ hoá. Hạch bị vôi hoá có hình ảnh “vỏ trứng”

13. Các hạt chuyển động trên một đường thẳng, lắng đọng khi có sự đổi chiều dòng khí là cơ chế nào trong BP silic:

- a. Sự trầm lắng
- b. Sự va đập quán tính@**
- c. Chuyển động Brown
- d. Sự ngăn chặn

14. Bụi > 5 µm, lắng đọng ở đường hô hấp trên là:

- a. Mũi, họng, khí quản, phế quản@** của bụi amiang
- b. Mũi, khí quản, phế quản gốc if <5 µm thì ở phế nang
- c. Mũi họng khí quản, tiểu phế nang

15. Hạt silico điển hình gồm tổ chức xơ ở chính giữa, xung quanh là tế bào liên kết, các tế bào bụi xếp thành các lớp vỏ...

- a. Đồng tâm, vỏ tơi
- b. Đồng tâm, vỏ hành@**
- c. Hình vỏ trứng

16. Hạch rốn phổi vôi hóa trên Xquang trong BP silic có hình:

- a. Vỏ hành
- b. Vỏ trứng@**

17. Hạch rốn phổi hình vỏ trứng chiếm tỷ lệ mấy%:

- a. 2-6%
- b. 1-2%
- c. 4-6%
- d. 2-4%@**

18. Cho công nhân rửa phổi cấp mấy

- A. Dự phòng cấp 1 @**
- B. Dự phòng cấp 2**
- C. Dự phòng cấp 3
- D. Điều trị

19. Cho công nhân hít khí kiềm NaHCO₃ để thải bớt khí độc, là biện pháp

A. Dự phòng cấp 1 @

B. Dự phòng cấp 2

C. Dự phòng cấp 3

D. Điều trị

20. Khí công, dưỡng sinh trong silic

A. Tăng dung tích sống (sgk)

B. Tăng thể tích phổi

C. Tăng thể tích lưu thông

21. Những sợi bụi dài có kích thước **không đều**, khi vào đường hô hấp dễ bị mắc vào các phế quản nhỏ, nhất là vị trí phân nhánh, lắng đọng theo cơ chế

A. Trầm lắng: hạt bụi : <2 microm theo trọng lực

B. Sự ngăn chặn: hình không đều, hình sợi, chỗ phế quản nhỏ

C. Chuyển động Brown: <0.1 rất nhỏ ko ảnh hưởng tỷ trọng

D. Va đập quán tính: chỗ phân nhánh phế quản, : >10 ở mũi và pq

22. Trên phim X quang những nốt mờ nhỏ tròn đều có kích thước dưới 1,5 mm kí hiệu

A. p

B. t

C. s

D. q

	R	mm	I
p		-1,5	s
q		1,5 - 3	t
r		3 - 10	u

Tròn đều: p/q/r Không tròn đều s t u thứ tự <1.5 1.5-3 3-10 mm với mờ nhỏ

23. Trên phim X quang những nốt mờ nhỏ tròn đều kích thước 1,5-3 mm kí hiệu

A. p

B. t

C. u


D. q

24. Đám mờ ko đều, kích thước nhỏ hơn 1.5 mm: **s S**

25. Đám mờ lớn kích thước trên 50mm nhưng không vượt vùng trên phổi phải là:

A. Đám mờ A : 10-50mm,

B. Đám mờ B



C. Đám mờ C => vượt quá S vùng trên

-Mờ lớn: A 10-50mm or công lại đến không quá 50mm

-B trên 50mm, không vượt quá diện tích cu vùng trên Phổi P

-C vượt vùng trên PP

25. Đám mờ lớn loại C: **Lớn hơn diện tích vùng trên phổi Phải**

@

26.Điều trị bệnh phổi silic có biến chứng suy tim

A) nghỉ ngơi, ăn nhạt, lợi tiểu, digoxin => b/c suy tim

B nghỉ ngơi, ăn nhạt vừa, lợi tiểu, digoxin

C nghỉ ngơi, không ăn nhạt, digoxin

27.- P2O4 tác động như nào:**làm cho bề mặt thạch anh -bụi silic :**

A Vô hại cho đại thực bào

B Vô hại cho nguyên bào xơ

Cơ chế tác dụng của D-penicillamine trong đtri bụi phổi silic

A) Ức chế sự tổng hợp sợi tạo keo

Theo ILO 2000, xác định mật độ tổn thương dựa

Khi đọc phim chỉ dựa vào phân nhóm phụ để xác định mật độ tt

A) Tiêu chuẩn phụ @ (phân nhóm phụ)

Trong mật độ đám mờ, chia ra 4 nhóm chính,mỗi nhóm chính gồmnhóm phụ

A.3

B.4

C.5

D.6

DTS giảm ,thể tích khí cặn tăng,hội chứng hạn chế dung tích sống thực tế/lý thuyết dưới :

A.80%

- DTS tt/lt < 80% (do xơ hóa phổi)

- FEV1 tt/lt < 80% (viêm pg mạn, khí phế thũng)

B.85%

C.90%

D.75%

Áp lực riêng phần PaO₂

A. Giảm

B. Tăng

C. Không đổi

PaO₂ ↓ bt: > 80mmHg, 95% bão hòa

P_aCO₂ ↑ bt: <40%

PaCO₂

A/ tăng lên

- B. Giảm
- C. Không đổi

Bệnh bụi phổi silic có triệu chứng giống

- A. Tâm phế mạn
- B. Bệnh phổi mạn

C. Khí phế thũng

maybe Viêm pq mạn (HC tắc nghẽn)

Hạt silico, nằm trong các vách phế nang.

A. Hình tròn, ranh giới không rõ rệt

B. Hình tròn, ranh giới rõ rệt

C. Hình elip, ranh giới rõ rệt

Đại thể: đặc trưng: hạt silic, màu xám nhạt, kt 1-6 mm, rải rác khắp 2 phổi hay gặp ở vùng giữa

Màng phổi trong bụi phổi silic

A. biến đổi màu xám của nó và có thể bị xơ hóa rộng

B. biến đổi màu trong của nó và có thể bị xơ hóa rộng

C. biến đổi màu nâu của nó và có thể bị xơ hóa rộng

Một bệnh nhân có tổn thương phổi vùng trên ,giữa dưới chân

Đoán :

A. bụi phổi silic

B. bụi phổi than

C. bụi phổi sắt

D. bụi phổi amiang

Dày màng phổi :

A. thành bên, trước, cơ hoành và vùng trung thất

B. thành bên, trước, cơ hoành

C. thành bên, trước, vùng trung thất

2.

Amiang Amosite có BN SiO₂

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

Amiang

D

chrysotile : 2 SiO₂

3.

Amiang là dạng: rắn/dây. **Sợi**

4.

Crocidolite, là asbestos: xanh ✓

5.

Bệnh phẩm cắt ngang qua phổi thấy xơ hóa màng phổi lan

- vào...trong bụi phổi amiăng thấy tổn thương đến:
A.thuỷ phổi
B. rãnh liên thuỷ...
6. Tính chất amphibole: sợi đặc, cứng, dễ gãy, khó hoà tan trong nước ✓
7. Tính chất amiang:
A.là chất ko cháy, cách điện tốt, bền với nhiệt độ cao, và với các chất hoá học như axit và kiềm và rất lâu mòn ✓
8. Amiang kích thước ko vào được phế nang
A. 5 um @
B. 10 um A
9. Triệu chứng cơ năng amiang giống
A) Bệnh phổi mạn @
B. Bệnh phổi cấp
C. Bệnh phổi bán cấp
D. Hen phế quản A
10. Giai đoạn đầu bệnh phổi Amiang, lồng ngực
A. Giãn @
B. Bình thường
C. Co lại
-Giai đoạn muộn thì lồng ngực phía dưới bị co lại do xơ hóa và cân đối cả 2 bên lồng ngực. A
11. Bệnh bụi phổi amiang chẩn đoán dựa vào B
A. X quang
B. Tiền sử nghề nghiệp, X quang, thể asbest trong đờm @
C. Các dấu hiệu chức năng, thực thể và chức năng hô hấp
D. X quang, xét nghiệm sinh hóa máu và nước tiểu
Một câu nữa ngoài tiền sử tiếp xúc, chẩn đoán amiang cần:
A. X quang, đo chức năng hô hấp,, thể asbest trong đờm
C. Các dấu hiệu chức năng, thực thể và chức năng hô hấp
D. X quang, xét nghiệm sinh hóa máu và nước tiểu
12. Hình ảnh GPB đại thể bụi phổi amiang thể nhẹ hình dáng phổi:
A. Màu xám

- ☒ B. Bình thường (sgk)
 C. Teo
 D. Chắc như cao su : **thể nặng**
13. Actinolite màu D
 A. Xanh B. Trắng C. Nâu ☒ D. Vàng
14. Điều kiện ở nước đang phát triển như Việt Nam để khắc phục bụi amiang B
 A. Loại trừ nguyên liệu amiang
☒ B. Quy trình nước
 C. Đổi mới quy trình sx mở thành khép kín
 D. Đổi mới thành Bán khép kín
15. Sự tiêu hủy các đại thực bào chứa thạch anh sẽ giải phóng? Yếu tố sinh học "không... : B
 A. Protein
☒ B. Lipid
 C. Cholesterol/
 D. glucose
16. Bn bụi phổi khó thở cho... A
☒ A. Thở oxy
 B. Đặt nội khí quản
 C. Tiêm giãn phế quản
 D. Bóp bóng
17. Thành phần crocidolite gồm ... nhóm SiO₂: 2/ 4/ 6/ ☒ 8 D
 tất cả các nhóm thuộc amphibole có đều 8 nhóm, trừ chrysotile có 2 nhóm ✓
18. Sợi amiang nào lớn nhất:
 A. Chrysotile/ (nhỏ nhất)
☒ B. Anthophyllite/
 C. Actinolite/
 D. Tremolite
19. Màng phổi xơ hóa và canxi hóa ở.... : bụi amiang B
 A. 2 đáy phổi

20. **B** hai bên thành phổi và trên bờ hoành”
Kích thước Lớn nhất của nhóm amphibole B
- A. Chrysolite/ (nhỏ nhất)
☒ B. Anthophyllite/
 C. Actinolite/
 D. Tremolite
21. Khi đại thực bào nuốt thạch anh làm cho chúng giảm: A
☒ A. thẩm thấu => thuyết miễn dịch
 B thực bào
22. Tỷ lệ crocidolite trong quặng là: (B) B
 A. 6%
☒ B. 4 %
 C. 14
 D. 10
23. Chọn câu đúng : A
☒ A. chrysotile nhỏ nhất, có cấu trúc sợi rộng, mềm, dễ tan trong nước.
 B. chrysotile nhỏ nhất, có cấu trúc sợi rộng, mềm, khó tan trong nước.
 C. chrysotile nhỏ nhất, có cấu trúc sợi đặc, mềm, dễ tan trong nước.
24. Thể tích cận (RV) trong bụi phổi amiang: CV giảm A
☒ A. hơi giảm hoặc không đổi.
 B. Tăng
 Tỷ số RV/TLV tăng, Tỷ số Tiffeneau không thay đổi hoặc hơi tăng
25. Amiăng Actinolite là loại amiang B
☒ A. Trắng chrysolite
☒ B. Vàng
 C. Nâu amosite
 D. Xanh crocidolite
26. Trong BP amiang, Xquang có hình xơ hóa , phổi hình sợi B
 không đều khu trú ở 2/3 phổi dưới nhất là...
 a. Góc sườn hoành trái
☒ b. Góc sườn hoành phải @
 c. Góc đỉnh phổi trái
 d. Góc đỉnh phổi phải
27. 1 BN 1 năm trước chụp Xquang có hình đám mờ nhỏ 30x40 cm, đợt này BN tới khám nên làm: B

- a. Đo CN hô hấp
- ☒ b. Chụp Xquang phim 35x43cm@
- c. Đo khí máu
- d. XN máu

28. Triệu chứng lâm sàng của bụi asbest là
A. khạc đờm nhầy vào buổi sáng mỗi khi ngủ dậy. ✓
Nghe phổi ran nổ hay gập dưới đáy phổi

29. Khi BN XN đờm thấy thể Asbest, nghĩ BN đến có tiếp xúc với:

- ☒ a. **Amiang@**
- b. Silic
- c. Chì
- d. Bông

30. Thể asbest dài **50 – 150 micromet, dày... : 5 – 10 um** ✓

Thể asbest có màu : **vàng hoặc nâu.** ✓

Thể asbest có thể tìm thấy trong phổi sau tiếp xúc với amiăng: 2 tháng. ✓

Xét nghiệm đờm mục đích là tìm sợi amiang và thể asbest. ✓

31. Sợi nào lẫn trong mỏ khoáng talc

☒ **A. Anthophyllite** *Lẫn nhất*

B. Crocidolite

Đại thể của phổi trong amiang

☒ **A. màu xám và cứng như cao su**

B. Màu vàng và cứng như cao su

C. màu nâu và cứng như cao su

D. màu đen và cứng như cao su

Màng phổi trong amiang

C.biến đổi màu xám của nó và có thể bị xơ hóa rộng

☒ D. biến đổi màu trong của nó và có thể bị xơ hóa rộng

E. biến đổi màu nâu của nó và có thể bị xơ hóa rộng

Giai đoạn nặng trong amiang

☒ A. Ho rất nhiều, ho khan, ít đờm

B. Ho nhiều, ho khan, ít đờm

C. Ho ít, ho khan, ít đờm

D. Ho vừa, ho khan, ít đờm

Điều trị bụi phổi amiang chủ yếu dùng

A. Aspirin

B. Corticoid

C. Salycilat

32.

Cấu tạo của thể asbest :

A. gồm sợi amiăng bị bao bọc xung quanh từng phần hoặc toàn phần bằng một lớp protein có chứa sắt. ✓

bệnh Rung chuyển

1.

A

Rung cục bộ

☒ A. Về mùa rét ,mặc ấm ,nên ngâm **cẳng tay ,bàn tay vào nước ấm và xoa bóp ngay sau ca lao động**

B. Về mùa rét ,mặc ấm ,nên ngâm cẳng tay ,bàn chân vào nước ấm và xoa bóp ngay sau ca lao động

C. Về mùa rét ,mặc ấm ,nên ngâm bàn tay ,bàn chân vào nước ấm và xoa bóp ngay sau ca lao động

Một câu cần chụp X quang kiểm tra trong rung cục bộ:

A. cẳng tay

Chủ yếu là CỔ TAY và KHUỖU TAY

☒ B. Chi trên

C. Cẳng chân

D. Chi dưới

Tổn thương tích lũy chi trên do lao động bằng ____ lặp đi lặp lại nhiều lần, trong rung

☒ A. Tay @

B. Máy

2. Biểu hiện đau quanh vùng cột sống, do tư thế lao động bất buộc A
phối hợp với tác động đặc biệt của rung chuyển

A. Bất buộc @ (tr159)

B. Gò bó

C. Thoải mái

D. Bất tiện

3. Rung chuyển có tần số từ 40 đến 300Hz, biên độ hàng milimet, gây _____ đặc biệt ở bàn tay gây hội chứng Raynaud: A

A) Rối loạn vận mạch

B. RL cảm giác

dưới 40 Hz, biên độ lớn: gây tổn thương xương và khớp

trên 300 Hz, biên độ khoảng 0,01mm gây tổn thương cân, cơ, thần kinh, gặp ở bàn tay, cánh tay và vai.

4. Đau khớp xương trong rung chuyển cục bộ:

A. xuất hiện sau lao động hoặc ngược lại xuất hiện lúc bắt đầu rồi thay đổi hay ngừng đau trong ngày, ko bao giờ đau dữ dội

5. Giảm rung ở nguồn rung, dụng cụ hơi nén cần lưu ý trọng lượng của máy cho phù hợp và áp suất cũng không được quá cao(____ dưới ____), nơi thoát hơi nén ko để bên cạnh, tránh thổi vào bàn tay. B

A. 2atm

B) 3atm @ (tr162)

C. 4 atm

6. Rung chuyển ko phụ thuộc vào tần số nhưng phụ thuộc vào biên độ, vận tốc hoặc gia tốc đ/đ với tần số A

A) Gia tốc tương ứng với tần số rung @

B. Vận tốc tương ứng với tần số rung

C. Độ rời tương ứng với tần số rung

7. Tuổi nghề tối đa với người lao động rung: B

A. 15 NĂM

B) 20 năm: tuổi đời ko quá 50

C. 25 năm (sgk)

D. 30 năm

Rung toàn thân : thời gian tx tối thiểu 5 năm, bảo đảm 6 tháng

Cục bộ : 5 năm với tổn thg khớp khuỷu, 1 năm tổn thg khác

8. Bệnh rung nghề nghiệp, rung có thể tác động toàn thân hoặc tác động vào A

☒ A. Một bộ phận cơ thể (anh chọn cái này)

☐ B. Một vài cơ quan cơ thể

Không chắc chắn

☐ C. Một vài cơ quan nội tạng

☐ D. Tay, chân

9. trong rung, khi qua vị trí cân bằng, độ rời bằng 0 và tốc độ : ☒ A. cực đại B. cực tiểu A

- 10 Đa số rung chuyển đều không có biên độ và... cố định:

a. Cường độ

b. Tần số

☒ c. Vận tốc@

d. Gia tốc

* Khi độ rời đạt cực đại thì...:

☒ a. Vận tốc bằng không@

b. Vận tốc cực đại

c. Vận tốc không đổi

- 11 Ba đại lượng đặc trưng cho rung chuyển là:

☒ A. độ rời, vận tốc và gia tốc ✓

- 12 Rung liên tục thì làm mấy tiếng/ ngày. B

☐ A. 2h

☒ B. 3h

☐ C. 4h

☐ D. 5h : không liên tục

* Rung không liên tục thì không quá

A.8

B.7

C.6

☒ D.5

- 13 Rung chuyển nghề nghiệp là dao động hình sin: A

- A một điểm Cân bằng cố định
B một điểm không cân bằng cố định
- 14 Rung chuyển đơn giản nhất là chuyển động hình gì? **sin đơn thuần** ✓
- 15 Khởi đầu Raynaud có biểu hiện: A
- A Lạnh, cứng
B .nóng đau
C lạnh đau
- 16 Dụng cụ gây rung tần số 40-300 Hz, bề 0.5-5mm gây bệnh: A
- A. rối loạn vận mạch->Raynaud nghề nghiệp ✓
B. Rối loạn cảm giác
C. Tổn thương xương khớp
- 17 Khái niệm rung chuyển nghề nghiệp: Rung chuyển tác động lên toàn bộ cơ thể hoặc..... B
- A. Một phần cơ thể
B. Một phần chi trên (tay)
C. Chi trên và chi dưới
D. Một bộ phận
- 18 Tần số là số dao động đầy đủ trong... **1 giây.** ✓
- 19 Rung xóc xe cộ, thường rung với tần số: A
- A. 2-20Hz.
B. 20-300Hz
C. >300Hz
- BNN do rung toàn thân **2-20Hz** / cục bộ: 20-1000 Hz
Một câu rung cục bộ tần số
A. >20 Hz - 1000 Hz
B. <20
- 20 Nghiệm pháp lạnh: Ngâm 2 bàn tay vào chậu nước lạnh **15 độ trong 10 phút.** Rửa tay, dùng khăn khô thấm nhẹ, dương tính khi: A. ngón tay trắng bệch.
- 21 Không phải giới hạn về tần số mà là giới hạn về biên độ, vận tốc....
A. gia tốc tương ứng với tần số rung.
- 22 Cận lâm sàng của **rung cục bộ** là:

Raynaud:

1. GĐ đầu (thiếu máu cục bộ): trắng bệch → xanh nhợt, cảm giác lạnh và cứng
2. GĐ báo động: đau và dầm dứt ngón → đỏ bừng, tím tái; cng đau và nóng mãnh liệt

<40Hz: tt cơ xương khớp
40-300Hz, BĐ nhỏ: RL vận mạch, Raynaud
>300Hz, BĐ ~0.01mm: tt cân cơ, TK, bàn tay, cánh tay, vai

Rung toàn thân: 2-20Hz
Rung cục bộ: 20 - 1000Hz

- A. Khuyết xương, lồi xương, gai xương, thưa xương, nghiệm pháp lạnh dương tính
- 23 Đau khớp xương thường xuất hiện sau lao động hoặc ngược lại: đau sau lao động nhưng đau dai dẳng cả ngày, không bao giờ đau dữ dội. ✓
- 24 Bệnh Raynaud được phát hiện khi: A
- A. Làm lạnh cục bộ/
B. làm ấm cục bộ/
C. làm ấm toàn thân/
D. Cả 3
- 25 Tác hại rung chuyển phụ thuộc: A
- A. Tg tiếp xúc? /
B. quá trình tiếp xúc
C. quá trình làm việc/....
- 26 Nghề thợ cơ khí thì tổn thương rung chuyển A
- A. cánh tay- bàn tay
B. toàn thân:
- 27 Hậu quả của rung chuyển tần số 2-20Hz: *đàn ông* A
- A. đau quanh cột sống + biến dạng,
Đường tiêu hóa : Sa dạ dày, viêm loét DD, suy nhược TK
Đau Tk tọa
- 28 Rung cục bộ teo cơ nhẹ quanh khớp hông
- A. bình thường, không biến dạng, không sưng
B. Bất thường, biến dạng, không sưng
C. bình thường, không biến dạng, sưng
D. Bình thường, biến dạng, không sưng

Nhiễm độc chì vô cơ nghề nghiệp

1. Xương là tổ chức lắng đọng chì nhiều nhất từ... (91-95%) ✓ A
dưới dạng **phosphat k tan, k độc**. Chì trong xương chiếm
A 91-95%
2. Nhiệt độ sôi của chì là bao nhiêu : *1620 °C*
A 1620 độ C
Bay hơi từ **500 độ C**, nóng chảy **327 độ**.
3. Theo một ô nào đấy thì chẩn đoán xác định nhiễm độc chì khi chì niệu lớn trên *> 1000*
- A. 1200
B. 1100
C. 1300
D. 1400

- ❖ Ở người bình thường, lượng chì niệu trong 24 giờ là 500 - 700 μg .
- ❖ Chì niệu/ 24 giờ từ 700 - 800 μg là nghi ngờ nhiễm
- ❖ Trên 1000 μg / 24 giờ có nhiễm nguy hiểm.
- Định lượng chì tóc:
 - ❖ Theo Abdel, Arrz-El, Dakhakhy (1972) coi tóc như một con đường đào thải chì khỏi cơ thể. Chì tóc cao quá 30 $\mu\text{g/g}$ có thể coi là có sự tiếp xúc chì quá mức.

Xét nghiệm chì niệu để chẩn đoán

- A. Tiền nhiễm độc**
- B. Nhiễm độc
- C. Nhiễm độc thực thụ

Tiêu chuẩn chuẩn đoán xác định ngộ độc chì khi trên

- A. 1200
- B. 1100
- C. 1000**
- D. 900

➢ V. Chẩn đoán nhiễm độc chì

1. Tiền sử nghề nghiệp
2. Triệu chứng lâm sàng
3. Xét nghiệm
 - Nghiệm pháp tiếp xúc
 - Định lượng chì máu: Phản ánh mức độ hấp thu chì, có giá trị chỉ điểm không có giá trị tiên lượng.
 - Phần lớn tác giả chấp nhận ngưỡng chì máu là 60 - 80 $\mu\text{g}/100\text{ml}$.
 - Trên 80 $\mu\text{g}/100\text{ml}$ là có sự tiếp xúc nguy hiểm.

Chống sốc bằng

- A. Glucose 5%, NaCl 9‰**
- B. Glucose 10%, NaCl 9‰

Ảnh hưởng sự lắng đọng chì trong xương

- A. Ca**

- B.Fe
C.Na
D.Mg

4. **Định lượng chì niệu để** B

A. Đánh giá đào thải chì

B. Đánh giá thâm nhiễm chì

5. Trong nhà máy sx, chì trong không khí ở dạng:

A. sunfua chì

B. sunfat chì

C. silicat chì...

D. Oxit chì

6. Chì xâm nhập vào cơ thể dạng: (cả a và c đúng?)

a. Hợp chất vô cơ?

b. Hợp chất hữu cơ

c. Muối vô cơ

1. Hô hấp: oxit chì
2. Tiêu hóa: Muối vô cơ chì
3. Da: Muối vô cơ chì

7. * Triệu chứng nghĩ đến nhiễm độc chì

A. Đường viên chì Burton trên răng@ ✓

B. Đường viên ngang lợi

Đường viên Burton là một dấu hiệu điển hình của nhiễm độc chì mãn tính, xuất hiện dọc theo viền lợi gần chân răng, có màu xanh đen hoặc xám

C. Đường viên ở lưỡi

8. Chì gắn với hồng cầu chiếm % chì trong máu: 60/70/80/90 D

Chì trong cơ quan nào là đặc hiệu nhất : **tủy xương, gấp 50**

lần trong máu ,nơi tập trung muộn nhất

9. Chì ức chế các enzyme làm *ức động sản phẩm trung gian* nào A

A. delta ALA

các enzym bị ức chế: DeltaALadehydratase, coproporphyrinogen III, dercacbonxylase

B. delta ALA dehydratase

C. coproporphyrin

10. Đau bụng cấp tính trong nhiễm độc chì tính chất ntn:

hay gặp nhất

Cấp : đau thượng vị, đau bụng, nôn mửa

A. Nôn, táo bón

Mạn - Cơ đau bụng chì, các tiến triển:

1. Táo bón trước vài ngày

2. Đau quặn bụng quanh rốn dữ dội (+ toát mồ hôi, nôn lúc mới bắt đầu đau bụng)

3. Bụng mềm, ỉa chảy (+/-)

B. Nôn, buồn nôn

C. Táo bón hoặc tiêu chảy

11. Nghề tiếp xúc với chì: A

A. Luyện quặng chì và các kim loại có lẫn chì

Nghề nào gây nhiễm độc chì?

A. Sx và sửa chữa ắc qui.

12. * Từ kho dự trữ của xương trong những tình trạng nhất định của cơ thể, chì được huy động lại vào máu dưới dạng dễ phân ly, có độ hoà tan gấp _____ so với photphat chì C
 A. Vài lần
 B. Chục lần
 C. Trăm lần @ (tr112)
 D. Nghìn lần
13. Triệu chứng thứ 3 trong tiêu chuẩn chẩn đoán ngộ độc chì: A
 A. bệnh cấp tính não có một hoặc nhiều triệu chứng khác về nhiễm độc chì @ (tr116)
14. Chì có ái lực lớn đối với những nhóm thiol -SH là những nhóm hoạt động của một số hệ thống men xúc tác một số giai đoạn khác nhau của quá trình tổng hợp _____ và như vậy nó ức chế hoạt động của những men này. B
 A. HEM
 B. Hb @ (tr112)
15. Chì vào đường tiêu hóa + HCl thành A
 A. Muối dễ hấp thu @
 B. Muối ko hấp thu
 C. Muối nhanh hấp thu
16. Chì vào cơ thể chủ yếu theo con đường nào B
 A. Tiêu hóa (cô giăng thể): trẻ em
 B. Hô hấp
 C. Tiêu hóa +hô hấp
17. Bệnh viêm thận của nhiễm độc chì C
 A. Xuất hiện rất muộn
 B. Xuất hiện sớm
 C. Xuất hiện muộn (sgk) chỉ ở GD NĐộc nặng có biến chứng
18. Định lượng chì trong huyết thanh có giá trị : ✓
 A. chỉ có giá trị chỉ điểm/không có giá trị tiên lượng/ (SGH)
 B. chỉ có giá trị tiên lượng/
 B. không có giá trị tiên lượng/
 D. không có giá trị chỉ điểm

19. Chì đi được qua da: chất hữu cơ của chì B
- A. Muối vô cơ
☒ B. Muối hữu cơ
20. Lượng chì đào thải qua nước tiểu phụ thuộc vào: (A) A
- ☒ A. Chức năng thận
 B. độ lọc cầu thận
 C. chức năng bàng quang
 D. Tái hấp thu
21. Chì xâm nhập vào cơ thể chủ yếu bằng đường nào: A
- ☒ A. Hô hấp
 B. Tiêu hoá
 C. Da
 D. Tất cả các đáp án trên
22. * Nhiễm độc chì theo đg tiêu hóa là do: B
- a. Ăn, uống nước nhiễm chì, hút thuốc...
☒ b. Tay bẩn nhiễm chì bám vào thức ăn, nước uống, hút thuốc trong khi làm việc...@
- * thí : Ngưỡng chì huyết chấp nhận được là: C
- a. 50-80%
 b. 60-70%
☒ c. 60-80%@
 d. 80%-90%
- Theo Fourcade, lượng chì trong tóc thường từ:
- a. 10-20mcg/g
☒ b. 20-30mcg/g@
 c. 30-40mcg/g
- Chì xâm nhập qua da dưới dạng: A
- ☒ a. Oxit chì?
☒ b. Muối chì
 c. Hợp chất
1. Sơn chứa nhiều chì nhất là: sơn chống rỉ *chống rỉ?*
 2. Sản xuất men sứ là : silicat chì.

Trong nhiễm độc chì tại sao xuất hiện bạch cầu hạt: **do thiếu hồng cầu trưởng thành nên cơ thể huy động nhiều hồng cầu non**

Tai ng nghe tần số **16-20000Hz** ✓

Thính nhất ở **1000-3000 Hz** ✓

1000 - 3000 Hz
rõ nhất 500 - 2000 Hz

Điếc nghe nhẹ

Cường độ phụ thuộc mức áp xuất âm

Mức gây chói tai là

A.100

B.110

C.120

D.130

Mức áp âm:

- 7 - Nghe thấy 0dB, thính có thể -5dB
- cảm giác chói tai 130dB
- thủng màng nhĩ 140dB

Mức gây thủng màng nhĩ là **140dB**

Sóng cao tần thì ;70 dB đã gây hại

Trung tần và thấp : 80-90 dB gây hại

1. Điếc NN nhẹ, nếu đo thính lực âm, **chữ V thính lực** A
lỗi,...

A)

chưa rõ tổn thương.

chưa ảnh hưởng nhiều
- tt lời thường chậm hơn âm

B. Rõ tổn thương

-Khả năng nghe bình thường,

-Nghe được tiếng nói thầm.

Điếc NN Trung Bình giảm sức nghe ở cả tần số cao 4000Hz và tần số TB :

A. 500 đến 1000 Hz. ✓

Điếc mức độ trung bình Chữ V thính lực lõm xuống 10-50 dB ở giải tần số..... đỉnh là tần số 4000Hz. ✓

A.3000-6000

B.3000-5000

C.1000-3000

D.1000-4000

Điếc mức TB Khả năng nghe nói thầm giảm, chỉ nghe được ở khoảngmét trở lại.

A. 1-2 m

B. 2-3

C. 3-4

D. 4-5

-Điếc nặng Ngưỡng nghe ở tần số cao, tần số trung bình và ở cả tần số thấp.

☒ A. tăng cao

tất cả đều tăng trên 40dB

B.giảm

C.không đổi

2 câu này lặp lại sai ngu quá chọn giảm làm sai mk ddk có 7,9.

Điếc nặng Khả năng nghe nói thậm chí còn từ .1m... mét trở lại.

☒ A. 1m

B.2m

C.3m

D.4 m

Điếc mức TB ,Đo thính lực âm thể hiện rõ **điếc tiếp âm thể đáy**

☒ A. Đáy

B. thể ốc tai

C. Toàn loa đạo

D. đỉnh

2. Nghiệm pháp **một mỗi thính lực** cho nghe âm thanh ở tần số 1024Hz với cường độ 100 dB trong 3 phút, nghỉ 15s và sau đó xác định lại ngưỡng nghe ở 1024Hz: B

A. 1 phút

☒ B. 3 phút

C. 5 phút

D. 10 phút

Giai đoạn một mỗi thính giác ngưỡng nghe tăng **15-30** dB, thời gian hồi phục 15-30p ✓

Bắt đầu giảm cảm thụ âm thanh ở tần số 4000 Hz

-dưới mức 5 decibel. : TH bình thường

-Nghỉ ngơi: tăng từ 5- 10 decibel.

-Bệnh lý: tăng trên 10 decibel.

3. Đo thính lực sơ bộ giảm sức nghe trên 30 dB ở dải tần số 1000Hz và trên..... ở dải tần số 4000Hz: B

A. 50dB

☒ B. 60dB

C. 70dB

Đo ở bốn tần số 500, 1000, 4000 và 8000 Hz theo đường
khí.

4. Giai đoạn thích nghi thính giác Sau một thời gian tiếp xúc có hiện tượng _____ để tránh cho cơ quan thính giác khỏi bị tổn thương do kích thích quá mạnh của tiếng ồn

A. Thích nghi thính giác @
B. Thích nghi với tiếng ồn
C. Mệt mỏi thính giác

Ngưỡng nghe tăng 10-15 dB, sau ngừng tiếp xúc ngưỡng nghe trở về 2-3 phút

5. Buồng theo dõi, điều khiển từ xa ko có thông tin bằng điện thoại, các phòng thí nghiệm, thực tập, phòng thiết bị máy tính có nguồn ồn. Mức âm chung

A. 80 dB @
B. 78
C. 82

6. -Phòng chức năng, hành chính, kế toán, kế hoạch, thống kê có mức âm nền là:

a. 63 dB
b. 65dB @
c. 68dB
d. 73dB

-Phòng labo có mức âm lý tưởng là: ~ 55 dB

a. 35 dB @
b. 40dB
c. 45dB
d. 50dB

Phòng thí nghiệm lý thuyết, xử lý số liệu thực nghiệm, phòng lao động trí óc, NC thiết kế, thống kê

-Buồng theo dõi và điều khiển từ xa có thông tin bằng điện thoại, phòng điều phối, phòng lắp máy chính xác, đánh máy chữ. 70dB

-Các phòng lao động trí óc, nghiên cứu thiết kế, thống kê, lập chương trình máy tính, phòng thí nghiệm lý thuyết và xử lý số liệu thực nghiệm : 55dB

7. Giai đoạn mệt mỏi thính giác phát hiện được hiện tượng này rất quan trọng vì có thể ngăn không cho bệnh _____

A. Phát triển tiếp @ (tiền triển)
B. Ngừng phát triển

8. Điếc NN diễn biến rất chậm, thường hàng chục năm, tổn thương ngừng tiến triển khi ngừng tiếp xúc với tiếng ồn, A
- **A) Điếc ko hồi phục cả 2 bên @**
 B. Điếc ko hồi phục 1 bên
 C. Điếc có hồi phục 2 bên
9. Viêm tai giữa, viêm tai xương chũm là điếc truyền âm hoặc điếc hỗn hợp, trên thính lực đồ ko điển hình, **Điếc dẫn truyền hoặc Điếc hỗn hợp, có tổn thương thực thể ở màng nhĩ** C
- A. Ko tổn thương thực thể màng nhĩ
 B. Tổn thương xương búa, xương đe, xương bàn đạp
C) Có tổn thương thực thể màng nhĩ @
10. Chẩn đoán điếc do tổn thg thần kinh, ngộ độc, thuốc ... dựa vào tiền sử C
- A. Nghề nghiệp
 B. Gia đình
C) Bệnh tật
 D. Di truyền
11. Phân xưởng nào gây điếc nghề nghiệp:
 A xưởng rèn (búa máy) :tiếng búa rèn khoảng 100-120 dB
Luyện cán thép,máy nghiền quay
Dệt,cơ khí điện máy ,luyện kim
12. Chẩn đoán điếc do chấn thương sọ não, nhiễm trùng căn cứ vào tiền sử nào: **TS chấn thương** A
- A Bệnh tật
 B gia đình
 C Nghề nghiệp
13. Điếc Nghề nghiệp không hồi phục do tổn thg thực thể C
- A. ốc tai
 B. Lỗ bầu dục
C) Thần kinh thính giác
 D. Màng nhĩ

Điếc nghề nghiệp là do tác động của tiếng ồn trong một thời gian dài gây nên những tổn thương không hồi phục ở cơ quan corti và:

- ☒ A. dây thần kinh thính giác ở tai trong SGK
- B. xương búa, xương đe, xương bàn ở tai giữa
- C. xơ hóa cửa sổ bầu dục
- D. rách (thủng) màng nhĩ

- Yếu tố quyết định tác hại của tiếng ồn đến cơ quan

thính giác tăng lên khi tiếng ồn có, biên độ sóng âm lớn và tiếng ồn không ổn định, có xung.

A. Tần số cao

B. Tần số thấp

C. Giao động

D. Ngắt quãng

-Đặc điểm của điếc mạn tính do tiếng ồn trong môi trường lao động là:

- A. Điếc không hồi phục
- B. Điếc không tự tiến triển
- C. Điếc do tổn thương thực thể ở tổ chức thần kinh tai

☒ D. Cả 3 đặc điểm trên

- Biểu đồ sức nghe trong điếc nghề nghiệp cấp tính do tiếng ồn là kiểu:

- A. Điếc tiếp nhận
- B. Điếc dẫn truyền
- C. Điếc hỗn hợp

☒ D. Điếc tiếp nhận hoặc hỗn hợp

ĐNN cấp:

- đau, chảy máu tai
- chóng mặt
- ù tai, nghe kém → điếc

- đồng đều
- chênh lệch $\leq 5\text{dB}$
- phụ thuộc hướng ồn

=> Điếc tiếp nhận hoặc hỗn hợp

-Thời gian đảm bảo của điếc nghề nghiệp mạn tính là:

A. 2 năm

B. 4 năm : thời gian tx tối thiểu

C. 5 năm

D. Không quy định

Tần số cao sẽ tác dụng vùng đáy, tần số thấp ở vùng đỉnh ốc tai

14. Tần số có giá trị nhất trong ĐNN C

A.2000, B.3000, **C.4000**, D.8000

Một mỗi thính giác ngưỡng nghe giảm từ tần số nào: B

A.3000, **B.4000**, C.8000, D.1000

15. Thiết bị đc sắp xếp để phòng điếc C

A. Cách xa nhau

B. Hợp lý

C. Hợp lý, tránh gây ồn (sgk)

16. Tiêu chuẩn gây điếc do tiếp xúc tiếng ồn cao A

A) 90 + -2,5dba SGK

B 95+ -2,5 dba

C 85 + -2,5dba (tiếng ồn có xung)

17. Các nghề nghiệp, khâu có tiếp xúc tiếng ồn gây điếc nghề nghiệp A

A. Cơ khí/ dệt/ khai thác đá mỏ sd thuốc nổ

18. Đo thính lực hoàn chỉnh bằng cả khí đạo và cốt đạo ở những tần số nào: 500, ..., 4000, 8000(chỗ chấm là?) A

A) 1000

B.2000

19. Giai đoạn thích nghi tách ra khỏi môi trường đê: A

A. tránh chuyển thành điếc nghề nghiệp.

20. sau khi tiếp xúc với tiếng ồn thì hồi phục sau : A

A) 2-3 phút (giai đoạn thích nghi thính giác) , 15-30 p (mất m?e)

B. 3-4 phút

C. 4-5 phút (gđ mệt mỗi thính giác trong 15-30p)

21. Điếc NN Trung Bình giảm sức nghe ở cả tần số cao 4000Hz A
và tần số TB :

A. 500- 1000 Hz.

22. Điếc NN nhẹ chỉ giảm sức nghe ở những tần số cao, nhất là ở:

A. 1000 B. 2000 **C. 4000 Hz.** D. 500

23. Giai đoạn điếc nghề nghiệp diễn biến rất chậm, thường là:

A. 5 năm

B. hàng chục năm.

24. Đo thính lực sơ bộ, với phòng cách âm có âm nền **dưới:** D

a. 35dB

b. 40dB

c. 45dB

d. 50dB@ : **sơ bộ** < 50dB, hoàn chỉnh là < 35dB.

25. Theo tính chất vật lý, quy định tiếng **ồn ổn định** cường độ âm thay đổi :

A. < 5dB

B. < 6 dB

C. < 7dB

- ồn ổn định: cg độ thay đổi < 5dB suốt thời gian ồn

- Ổn ko ổn định: cg độ thay đổi > 5dB trong suốt thời ồn, (gồm dao động, ngắt quãng, xung)

- tiếng ồn xung chênh lệch > 5dB, có cường độ tăng lên đột ngột nhỏ = 1s

- Định nghĩa tiếng ồn dải rộng, dải hẹp theo mức năng

Dải rộng : năng lượng âm thanh phân bố đều ở tất cả các dải tần số hay tiếng ồn trắng

Dải hẹp: không phân bố đều trên các dải tần số (mức chênh > 6dB), tiếng ồn âm sắc.

26. Mức âm làm việc 8h không quá:

a. 85 dB@

b. 90dB

c. 95dB

Tần số tối đa cho phép ở dải tần số

1000Hz : 80 dB, 2000 : 78 dB, 4000 : 76dB

27. Thời gian tiếp xúc tiếng ồn càng kéo dài,...

- a. Càng nguy hiểm
b. Càng có hại@
c. Càng nặng
d. Không nguy hiểm
28. Thời gian làm việc ở nơi có tiếng ồn cao hơn tiêu chuẩn cho phép, tối thiểu tiếp xúc: A
A. 3 tháng.
B. 6 tháng
29. Thời gian tiếp xúc tối thiểu của tiếng ồn gây ra điếc nghề nghiệp được quy định là: B
A. 3 tháng
B. 6 tháng theo quy định của BH BNN ở Việt Nam @
C. 1 năm
30. < 3 tháng mà tiếng ồn đã gây hại gọi là A
A. tai nạn lao động do tiếng ồn.
B. Điếc NN
31. Đo thính lực sơ bộ thường đo ở đường: B
a. Đường xương
b. Đường khí@
c. Cả 2 đường → thính lực hoàn chỉnh
32. Nếu giảm 1 nửa tgian thì tăng ? dB (tăng 5dB nhé)
Mức áp suất âm cho phép đối với ồn xung thấp hơn 5dB
Mức cực đại không quá 115 dBA.
33. Âm thanh < 300 Hz: âm hạ tần, > 1000 (800) Hz là âm cao tần; còn lại là âm trung tần; 300 - 1000 Hz
34. Bệnh Điếc NN cấp tính :
tổn thương đồng đều hoặc chênh không quá 5 dB
Biểu đồ sức nghe: Điếc tiếp nhận hoặc hỗn hợp
Mạn tính :
Điếc tiếp âm, đối xứng 2 tai, ở từng tần số chênh lệch 2 tai không quá 10dB.
35. Quan trắc môi trường và sức khỏe người lao động

- 1) Giám sát y tế gồm mấy nội dung: A
A. 2 (quan trắc môi trường và giám sát sức khỏe người lao động)
- 2) Các yếu tố môi trường gặp trong lao động: A
A.yếu tố hóa học, vật lý, sinh học, tâm lý và khoa học lao động.
- 3) Với mục đích này việc đo đạc không chỉ là một phương pháp phân tích đơn giản các chất độc hóa học tồn tại ở nơi làm việc hoặc là cường độ các yếu tố vật lý mà nó cần phải dựa trên.....của con người: A
A. đặc trưng sinh học.
B. Đặc trưng hóa học
- 4) Liều/hậu quả là mối liên quan giữa liều tiếp xúc và....của tác động: tính tần trọng.
- 5) Liều/đáp ứng là mối liên quan giữa liều tiếp xúc và
Của nhóm tiếp xúc mắc một hậu quả đặc trưng: tỉ lệ %
- 6) Các mối liên quan liều/hậu quả và liều/ đáp ứng đặc biệt quan trọng trong dịch tễ học môi trường vì: là nền tảng để xây dựng các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh lao động.
- 7) Mục đích của giám sát tình trạng sức khỏe người lao động làrối loạn tình trạng sức khỏe: phát hiện sớm.
- 8) Trong phát hiện sớm rối loạn tình trạng sức khỏe người lao động dùng Loại chỉ số: 3 loại (chỉ số rối loạn chức năng, chỉ số sinh học, chỉ số tiếp xúc)
- 9) Lấy máu có thể làm bằng nhiều phương pháp khác nhau, đối với các chất hóa học việc lấy mẫu cần phải lưu ý những yếu tố sau: tính chất tác nhân gây độc, chọn mẫu, địa điểm lấy mẫu, tần số và thời gian lấy mẫu, thời kì lấy mẫu.
- 10) Các khái niệm về khả năng lặp lại, tính chính xác, độ chính xác, giới hạn nhận biết, các nhược điểm trang 114 sgk.

Hiện nay dựa vào thực nghiệm và nghiên cứu ng ta đã xác định được: D

- a. Virus viêm gan không A, không B
- b. Virus viêm gan B
- c. Virus viêm gan C
- d. Các loại virus@

Trong giai đoạn ..., kháng thể kháng viêm gan A được hình thành và tồn tại trong nhiều năm sau cơn bệnh: A

- A. cấp tính
- B. Mạn tính

Triệu chứng lâm sàng của viêm gan A và B, và C: A

A. khó phân biệt/

B. dễ phân biệt/

C. không thể pb/

Viêm gan virus không biến chứng thời gian ủ bệnh: A

A) 2-6 tuần. GĐ vàng da trong viêm gan ko biến chứng kéo dài 2-6 tuần

B. 1-2 tuần

Sau Khi hết vàng da, enzyme huyết thanh bình thường, người bệnh hoàn toàn bình thường: A

A) 6-12 tháng

B. 2- 6 tháng

Viêm gan VR ,Giai đoạn vàng da không biến chứng kéo dài: C

a. 1-2 tuần

b. 2-6 tháng

c. 2-6 tuần@

d. 2-4 tháng

Bệnh VG virus là một trong 34 bệnh.... được BH, B

- a. Truyền nhiễm
- b. Nghề nghiệp@
- c. Cấp tính

Qua kết quả điều tra trên 942 người viêm gan virus vào điều trị ở bệnh viện BM trong 5 năm, có 59 bệnh nhân là nhân viên y tế, chiếm tỷ lệ 6,26%. Kết quả điều tra ở những người trực tiếp làm việc ở khoa lây một số bệnh viện cho thấy tỷ lệ bệnh VGV khá cao (thí dụ khoa lây bệnh viện BM, tỷ lệ là 7,79%). Kết quả điều tra qua xét nghiệm HbsAg ở nhân viên y tế dương tính từ 17,65% đến 25%. Như vậy, có nhiều khả năng bệnh phát sinh do:

- a. Do thiếu kiến thức
- b. Do không được bảo hộ
- c. Tiếp xúc nghề nghiệp@
- d. Cả 3 đáp án

Gđ cấp vga thì tăng : IgM HAV (+)

-VGC thì bao nhiêu phần trăm thành mạn tính: 80% khá cao, 50-70%

1. Bệnh viêm gan virus (VGV) là một trong 25 bệnh ...được nhà nước ta bảo hiểm và cũng là một trong những bệnh truyền nhiễm hay gặp nhất và gặp trên toàn thế giới.

- A. Mãn tính
- B. Cấp tính
- C. Truyền nhiễm
- D. Nghề nghiệp

2. Bệnh viêm gan virus phải được điều trị như đối với một bệnh nặng vì quá trình lây lan và hay để lại *biến chứng*

- A. Ảnh hưởng tâm lý
- B. Ảnh hưởng kinh tế
- C. Những biến chứng muộn
- D. Tác động xã hội

3. Những trường hợp không phát hiện được viêm gan virus bao giờ cũng ở một tỷ lệ..... *cao* vì những triệu chứng điển hình không phải lúc nào cũng đầy đủ.

- A. Rất cao
- B. Cao
- C. Thấp
- D. Không đáng kể

4. Trong những năm gần đây, bệnh VGV được coi như một bệnh nghề nghiệp, tính quan trọng ngày càng tăng, đặc biệt là bệnh phát triển ở

- A. Đối tượng cán bộ công chức
- B. Phụ nữ và trẻ em
- C. Nhân viên y tế
- D. Người cao tuổi

5. Ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam, nơi có nhiều nguy cơ

phát triển bệnh, VGV được xếp vào danh mục bệnh
được bảo hiểm.

- A. Mãn tính
- B. Cấp tính
- C. Truyền nhiễm
- D. Nghề nghiệp**

2. Trên cơ sở những công trình nghiên cứu virus và miễn dịch học trong những năm gần đây, đã có nhiều thông tin mới về căn nguyên VGV, nên ngày nay, có thể phân biệt được:

- A. Bệnh viêm gan virus A (VGV.A)
- B. Bệnh viêm gan virus B (VGV.B)
- C. Bệnh viêm gan virus không A không B.
- D. Cả 3 ý trên đều đúng**

8. Virus *Bệnh viêm gan virus A* được thải ra qua phân, trước khi xuất hiện triệu chứng

- A. Gây sút cân
- B. Vàng da**
- C. Xuất huyết
- D. Cả 3 triệu chứng trên

9. Ngày nay, người ta *chưa phát hiện* loại virus này trong máu tuần hoàn của bệnh nhân.

- A. Phát hiện nhiều
- B. Phát hiện ít
- C. Phát hiện rất nhiều
- D. Chưa phát hiện**

10. Trong giai đoạn *cấp tính* của bệnh, kháng thể kháng viêm gan A (VGV.A) được hình thành và tồn tại trong nhiều năm sau cơn bệnh.

- A. Mãn tính
- B. Cấp tính**
- C. Cuối
- D. Cả 3 giai đoạn

11. Kháng thể kháng VGV.A giới hạn cơn bệnh trong một số năm, và có lẽ còn duy trì sự miễn dịch với bệnh VGV.A trong

- A. Vài tuần tiếp theo
- B. Vài tháng tiếp theo
- C. Suốt phần đời còn lại**
- D. Không duy trì

12. Cho đến nay người ta *không phát hiện* có trường hợp mang virus VGV.A mãn tính.

- A. Thấy nhiều
- B. Thấy ít

C. Thấy rất nhiều

☒ D. Không phát hiện

13. Thời kỳ ủ bệnh đối với bệnh VGV.A dao động trong khoảng

☒ A. 15-45 ngày

B. Vài tháng

C. Vài năm

D. 1-5 ngày

14. Trong giai đoạn virus được đào thải ra nhiều, vào trước khi xuất hiện vàng da, bệnh rất dễ.....

A. Điều trị

☒ B. Lây lan

C. Biến chứng

D. Cả 3 ý trên đều đúng

15. Sự lan truyền bệnh VGV.A theo đường

A. Hô hấp

B. Tiếp xúc da và niêm mạc

☒ C. Tiêu hóa

D. Cả 3 con đường trên

16. Sự lan truyền VGV.A có thể xảy ra
trong lúc virus bị thải ra.

A. Thức ăn

B. Nước uống

☒ C. Thức ăn nước uống bị ô nhiễm

D. Thức ăn nước uống nói chung

17. Nguyên nhân gây bệnh VG.Bs là do
viêm gan B.

A. Vi khuẩn

B. Ký sinh trùng

☒ C. Virus

D. Nấm

18. Sau khi nhiễm VG.Bs (kháng nguyên VG.Bs) xuất hiện sớm vào^{3 tuần} trước khi triệu chứng lâm sàng xuất hiện.

A. 2 tuần

☒ B. 3 tuần

C. 4 tuần

D. 5 tuần

19. Mật khác, kháng nguyên VG.Bs có thể tồn tại

.....^{nhì năm} sau khi mắc bệnh VG.Bs, trường hợp này coi như người mang kháng nguyên VG.Bs.

A. Nhiều tuần

B. Nhiều tháng

☒ C. Nhiều năm

D. Không tồn tại

20. Sự xuất hiện của kháng nguyên VG.Bs và men polymerasa DNS có thể hướng cho việc đánh giá

mức độ nhiễm bệnh.

A. Riêng rẽ

B. Đột ngột

C. Chu kì

☒ D. Đồng thời

21. Thời gian ủ bệnh của VG.Bs trong khoảng.

A. Vài giờ

☒ B. 25 – 180 ngày

C. 2-10 tháng

D. Vài năm

22. Bệnh truyền chủ yếu bằng đường tiêm truyền, dùng các dụng cụ nhiễm bẩn. Cơ chế tiêm truyền là tiêm máu hay huyết tương, dùng bơm tiêm hay dụng cụ

A. Vô khuẩn

B. Không tiết khuẩn

C. Tiết khuẩn chưa đủ

☒ D. Không tiết khuẩn hay tiết khuẩn chưa đủ

23. Kháng nguyên VG.Bs không phải chỉ lấy trong máu, mà còn thấy trong phân, nước tiểu, nước mắt, nước bọt, mồ hôi, mật, tinh dịch

A. Phân, nước tiểu

B. Nước mắt, nước bọt

C. Mồ hôi, mật, tinh dịch

☒ D. Cả 3 ý trên đều đúng

24. Miễn dịch chéo giữa VGV.A và VG.Bs.

A. Có tồn tại

B. Có tồn tại tùy trường hợp bệnh

☒ C. Không tồn tại

D. Rất phổ biến

25. Người ta nhận thấy rằng nhiều bệnh nhân được truyền máu và bị viêm gan virus, xét nghiệm huyết thanh lại thấy không phải là VGV.A hoặc VG.Bs. Loại viêm gan này được xếp vào loại

A. VGV. A

B. VG. Bs

☒ C. Không A không B

D. Cả A và B đều đúng

28. Bệnh viêm gan vius bắt đầu bằng giai đoạn sớm,

☒ A. Không có triệu chứng đặc trưng

B. Có đầy đủ triệu chứng đặc trưng

C. Có một vài triệu chứng đặc trưng

D. Có cả triệu chứng đặc trưng và không đặc trưng

29. Đặc biệt ở trẻ em và thanh niên, VGV có thể có.

A. Chán ăn

B. Mệt mỏi

☒ C. Sốt cao

D. Đau bụng

30. Trong quá trình diễn biến của bệnh VGV, nước tiểu
....., phân nhạt màu

- A. Nhạt màu
- B. Bình thường
- ☒ C. Sẫm màu
- D. Trong

31. Trong quá trình diễn biến bệnh VGV vàng da xuất hiện,

- A. Vàng ở màng kết hợp mắt
- B. Chỉ vàng ở da
- ☒ C. Vàng ở màng kết hợp mắt rồi vàng ở da
- D. Vàng không đặc trưng theo bộ phận cơ thể

32. Kết quả xét nghiệm VGV cho thấy kết quả thông thường sau đây bilirubin huyết thanh

- A. Giảm nhiều
- ☒ B. Tăng cao
- C. Không thay đổi
- D. Tăng ít

33. Kết quả xét nghiệm VGV cho thấy kết quả các men SGOT và SGPT cao hơn trị số *10-200 lần*
bình thường

- ☒ A. 10-200 lần
- B. 10-20 lần
- C. 1-2 lần
- D. Không đổi

34. Gamma-GT là enzym *cuối cùng* trong máu trở về mức bình thường và do đó là chỉ điểm quan trọng để đánh giá kết quả điều trị VGV.

- A. Đu tiên
- B. Duy nhất
- ☒ C. Cuối cùng
- D. Cả 3 ý trên đều đúng

35. Nồng độ sắt trong huyết thanh nói chung tăng tới

- A. 150 ug/dl
- b. 15-30 ug/dl
- ☒ C. 150-300 ug/dl
- D. 300 ug/dl

36. Xét nghiệm máu cho thấy bạch cầu

- A. Bình thường
- B. Tăng cao
- ☒ C. Bình thường hoặc tăng nhẹ
- D. Bình thường hoặc tăng cao

37. Qua kết quả điện di huyết thanh, gamma globulin

- A. Tăng không đáng kể
- ☒ B. Tăng rõ rệt
- C. Giảm không đáng kể
- D. Giảm rõ rệt

39. Giai đoạn vàng da trong VGV không biến chứng kéo dài từ

A. 1-2 tuần

B. 2-4 tuần

C. 4-6 tuần

D. 2-6 tuần

2-6 tuần

40. Sau khi hết vàng da, enzym huyết thanh bình thường. Sau bệnh VGV, người bệnh hoàn toàn bình thường sau

A. 1-3 tháng

B. 6-12 tháng

C. 1-2 năm

D. Trên 2 năm

41. Biến chứng là chứng loạn dưỡng gan cấp, phá hủy liên tục các tổ chức tế bào

A. Phổ biến nhất

B. Nhẹ nhất

C. Đáng sợ nhất

D. Ít để lại hậu quả

42. số trường hợp, sau khi điều trị, không để lại di chứng.

A. 30-50%

B. 50-60%

C. 70-90%

D. 100%

43. Di chứng nhất là bệnh chuyển sang VGV mãn tính

A. Ít nghiêm trọng

B. Nghiêm trọng

C. Ít phổ biến

D. Phổ biến

44. Nguy cơ mắc bệnh viêm gan đặc biệt nghiêm trọng cho

A. Nhân viên y tế,

B. Lâm sàng

C. Cận lâm sàng.

D. Cả 3 ý trên đều đúng

45. Nguy cơ nhiễm bệnh VGV nghề nghiệp càng cao ở các nước

A. Nhiệt đới

B. Ôn đới

C. Hàn đới

D. Tất cả các khu vực

46. Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới, người mang virus viêm gan là người có kháng nguyên VG.Bs tồn tại quá.

A. 3 tháng

B. 6 tháng

C. 9 tháng

D. 1 năm

47. Ngoài ra biện pháp tiêm phòng cần phải có những biện pháp dự phòng về vệ sinh để giảm nguy cơ nhiễm bệnh phải

được

A. Cách ly,

B. Các chất bài tiết, quần áo, dụng cụ ăn phải được tẩy uế.

C. Nhân viên y tế phải mặc quần áo bảo vệ và rửa tay thật sạch sẽ.

D. Cả 3 ý trên

48. Bệnh nhân VGV thực hiện một chế độ ăn cung cấp

A. Một lượng calo thích hợp,

B. Giàu đường và vitamin, ?

C. Ít chất béo.

D. Cả 3 ý trên

49. Các loại cần tránh dùng cho bệnh nhân VGV là

A. Rượu,

B. Thuốc giảm đau, thuốc ngủ, thuốc nhuận tràng

C. Sulphonamid phải tránh dùng.

D. Cả 3 ý trên

Review SKNN 2020

Đề hỏi từng chữ trong sách và slide, ngân hàng đề rộng, trùng r.v ít.

Độc chất học là nghiên cứu mối lq giữa cơ thể sống với chất độc,..., xác định nồng độ tiếp xúc tối đa cho phép và dự phòng:

- A. Các nhiễm độc cấp nghề nghiệp
- B. Các nhiễm độc nghề nghiệp**
- C. Các nhiễm độc mạn nghề nghiệp
- D. Các nhiễm độc cấp và mạn nghề nghiệp

Say nắng là do:

- A. Tia hồng ngoại
- B. Tia cực tím
- C. Tia tử ngoại**
- D. Tia bức xạ

Sự bay hơi sẽ tăng lên khi có sự chuyển động của không khí và chênh lệch ... phải đủ lớn để bốc hơi mồ hôi và có hiệu quả làm lạnh mồ hôi bay hơi:

- A. Nhiệt độ
- B. Độ ẩm**
- C. Tốc độ gió
- D. Bức xạ nhiệt

Nguyên tắc điều trị say nóng thể nặng:

- A. Hạ thân nhiệt xuống dần dần từng bước tạo điều kiện thăng bằng thân nhiệt
- B. Hạ thân nhiệt xuống càng nhanh càng tốt
- C. Hạ thân nhiệt xuống dần dần từng bước, càng sớm càng tốt**
- D. Hạ thân nhiệt xuống ngay

Nhiệt độ thân bình thường là 37 độ C, nhiệt độ thân cho phép trong môi trường nóng

- A. 37
- B. 37,5
- C. 38**
- D. 38,5

Sự mất mồ hôi trung bình trong MT nóng:

- A. 0,4-1 l/h
- B. 0,5-1,1 l/h**
- C. 0,6-1,2 l/h
- D. 0,7-1,3 l/h

Tai nạn lao động nhẹ là:

- A. Nghỉ việc >14 ngày
- B. Nghỉ việc 1 ngày
- C. Nghỉ việc từ 1-14 ngày**
- D. Nghỉ việc 7 ngày

Tỉ lệ được giám định lại sau khi phát hiện bệnh nghề nghiệp không quá:

- A. $\frac{1}{2}$
- B. $\frac{1}{3}$
- C. $\frac{1}{4}$
- D. $\frac{1}{5}$

Nguyên nhân gây tai nạn lao động:

- A. Thiếu các bộ phận phòng hộ cá nhân khi làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm.
- B. Thiếu các phương tiện cơ giới hóa, tự động hóa khi làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm.**
- C. Thiếu các phương tiện cơ giới hóa, tự động hóa khi làm việc trong môi trường không nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm.
- D. Cả ba đều sai

Nguyên nhân gây tai nạn lao động:

- A. Máy móc thiếu bộ phận che chắn**
- B. Máy móc không có bộ phận che chắn
- C. Máy móc ít bộ phận che chắn
- D. Máy móc hỏng bộ phận che chắn

Nguyên nhân gây tai nạn lao động:

- A. Do mảnh vỡ từ máy đang chạy, do con thoi bắn ra khỏi máy lao vào người**
- B. Do mảnh vỡ bắn ra lao vào người
- C. Do con thoi bắn ra từ máy đang chạy, mảnh vỡ bắn ra khỏi máy lao vào người
- D. Do con thoi vỡ ra từ máy đang chạy

Nguyên nhân gây tai nạn lao động:

- A. Do lưỡi dao, lưỡi cưa cắt vào chân hoặc dây cu roa quần lôi vào máy
- B. Do lưỡi dao, lưỡi cưa cắt vào tay hoặc dây cu roa quần lôi vào máy**
- C. Do lưỡi dao, lưỡi cưa cắt vào cẳng chân hoặc dây cu roa quần lôi vào máy
- D. Do lưỡi dao, lưỡi cưa cắt vào bàn chân hoặc dây cu roa quần lôi vào máy

Tai nạn lao động do phơi bào, phơi tiện bắn vào:

- A. Tay, chân
- B. Mắt, cổ
- C. Mắt, tay**

D. Đầu, cổ

Thiết kế, bố trí máy móc không khoa học, đến khi hỏng hóc thì ảnh hưởng đến các máy móc khác thì thuộc nhóm nguyên nhân

A. Kỹ thuật

B. Tổ chức lao động

C. Vệ sinh công nghiệp

D. Chủ quan người lao động

Khi tổ chức vị trí lao động cần đảm bảo việc thực hiện các thao tác lao động trong vùng ... của trường vận động

A. Tương thích

B. Tiếp cận

C. Tối ưu

D. Dễ tiếp cận

Trong thiết kế máy móc, dụng cụ, dụng cụ dễ cầm, có chiều dài ...

A. Thích hợp

B. Vừa phải

C. Phù hợp

D. Đảm bảo

Vị trí lao động phải ... cho từng loại lao động:

A. Phù hợp

B. Thích hợp

C. Đáp ứng

D. Đảm bảo

Chấn thương xảy ra ở bàn tay, cổ tay, cánh tay, thắt lưng và vai là do:

A. Chấn thương tích lũy ở chi trên

B. Đa chấn thương

C. Chấn thương căng thẳng lặp đi lặp lại

D. Tai nạn lao động

Khi làm việc trên máy tính, màn hình máy tính phải ở vị trí trước mặt, cạnh trên của màn hình ngang với ... ?

A. Cổ

B. Mắt

C. Đỉnh vành tai

D. Mũi

Trong bệnh bụi phổi silic, khi đọc phim người ta chỉ sử dụng ... để xác định mật độ tổn thương:

A. Phân nhóm chính

B. Phân nhóm trung gian

C. Phân nhóm phụ

D. Phân nhóm phụ, phân nhóm chính

Đám mờ không tròn đều kích thước nhỏ hơn 1,5 mm ký hiệu là:

A. q

B. p

C. s

D. t

Đám mờ loại C là đám mờ có diện tích lớn hơn diện tích ... ?

A. Vùng trên phổi phải

B. Vùng dưới phổi phải

C. Vùng trên phổi trái

D. Vùng dưới phổi trái

Liều Prednisolon trong điều trị bệnh bụi phổi silic

A. 5-10 mg/ngày

B. 10-15 mg/ngày

C. 15-20 mg/ngày

D. 20- 30 mg/ngày

Đối với bệnh lý cấp tính: Liều khởi đầu từ 20 - 40mg/ ngày, tương đương với 4 - 8 viên 5mg/ ngày.

Đối với bệnh lý mãn tính: 5 - 10mg/ ngày, tương đương từ 1 - 2 viên.

Đối với tình trạng dị ứng, thấp khớp cấp: Từ 20 - 30mg/ ngày, tương đương từ 4 - 6 viên.

Kết hợp các loại thuốc giãn phế quản long đờm và kháng sinh để:

A. Tăng dung tích sống

B. Điều trị phục hồi khả năng lao động

C. Phục hồi thông khí

D. Điều trị biến chứng

Crocidolite là Asbestos:

A. Trắng

B. Xanh

C. Vàng

D. Nâu

Đặc điểm của nhóm Amphibole

A. Sợi đặc, cứng, dễ gãy, khó hòa tan trong nước

B. Sợi rỗng, cứng, dễ gãy, khó hòa tan trong nước

C. Sợi đặc, mềm, dễ gãy, khó hòa tan trong nước

D. Sợi đặc, cứng, khó gãy, khó hòa tan trong nước

Tính chất lý hóa của Amiang:

A. Chất dễ cháy, cách điện tốt, bền với nhiệt độ cao và với các chất hóa học như acid và kiềm và rất lâu mòn

- B. Chất không cháy, cách điện kém, bền với nhiệt độ cao và với các chất hóa học như acid và kiềm và rất lâu mòn
- C. Chất không cháy, cách điện tốt, bền với nhiệt độ cao và với các chất hóa học như acid và kiềm và rất nhanh mòn
- D. Chất không cháy, cách điện tốt, kém bền với nhiệt độ cao và với các chất hóa học như acid và kiềm và rất lâu mòn**

Các sợi amiang không xâm nhập được sâu vào phế nang có kích thước lớn hơn:

- A. 50 micromet
- B. 1 micromet
- C. 5 micromet**
- D. 20 micromet

Triệu chứng cơ năng của amiang rất giống với:

- A. Bệnh phổi mạn tính**
- B. Hen phế quản mạn
- C. Bệnh hệ thống
- D. Bệnh Sarcoidosis

Chẩn đoán bệnh bụi phổi amiang ngoài tiền sử nghề nghiệp tiếp xúc với amiang thì còn:

- A. Lâm sàng, X-quang, thăm dò chức năng hô hấp
- B. Lâm sàng, X-quang, thăm dò chức năng hô hấp, tìm thấy thể asbest trong đờm**
- C. X-quang, thăm dò chức năng hô hấp
- D. Lâm sàng, X-quang

Nếu đã thiết kế hoàn chỉnh máy móc thiết bị, bước tiếp theo

- A. Thiết kế máy móc mới
- B. Sản xuất hàng loạt
- C. Thiết kế lại để thay đổi**
- D. Cả ba

Chỉ có ái lực lớn những nhóm thiol là những nhóm hoạt động của một số hệ thống men xúc tác có một số giai đoạn khác nhau của quá trình tổng hợp:

- A. Hemoglobin**
- B. Hem
- C. Hồng cầu
- D. Globin

Từ kho dự trữ của xương, chì được giải phóng vào máu dưới dạng dễ phân ly, độ hòa tan gấp So với phosphate chì:

- A. Vạn lần

B. Nghìn lần

C. Trăm lần

D. Mười lần

Tiêu chuẩn thứ ba trong tiêu chuẩn lâm sàng để chẩn đoán nhiễm độc chì:

A. Bệnh não cấp có một triệu chứng khác về nhiễm độc chì

B. Bệnh não cấp có một hoặc nhiều triệu chứng khác về nhiễm độc chì

C. Bệnh não mạn có nhiều triệu chứng khác về nhiễm độc chì

D. Bệnh não mạn có một hoặc nhiều triệu chứng khác về nhiễm độc chì

Buồng theo dõi, điều khiển từ xa không có thông tin bằng điện thoại, các phòng thí nghiệm, thực hành, phòng thiết bị có máy tính có nguồn ồn thì mức âm chi phép là:

A. 85 dB

B. 80 dB

C. 70 dB

D. 65 dB

Sau một thời gian tiếp xúc với tiếng ồn, cơ quan thính giác có hiện tượng ... để tránh khỏi bị tổn thương do kích thích quá mạnh của tiếng ồn:

A. Thích nghi thính giác

B. Thích nghi với tiếng ồn

C. Tăng thích nghi

D. Giảm thích nghi

Nghiệm pháp mệt mỏi thính lực là xác định ngưỡng nghe ở tần số 1024 Hz, sau đó cho nghe âm thanh ở tần số đó với cường độ ... trong 3 phút, nghỉ 15s sau đó xác định lại ngưỡng nghe ở 1024 Hz

A. 105 dB

B. 85 dB

C. 100 dB

D. 115 dB

Nếu phát hiện giảm sức nghe ở cường độ trên 30 dB ở tần số 1000 Hz và trên ... dB ở tần số 4000 Hz cần được đo thính lực hoàn chỉnh để phát hiện điếc nghề nghiệp:

A. 30

B. 40

C. 50

D. 60

Tiến triển của điếc: Diễn biến chậm, thường hàng chục năm. Tổn thương ngừng tiến triển khi ngừng tiếp xúc với tiếng ồn và...

A. Điếc không hồi phục một bên

B. Điếc không hồi phục hai bên

C. Điếc hồi phục một bên

D. Điếc hồi phục hai bên

Viêm tai giữa viêm xương chũm: Trên thính lực đồ không điển hình của bệnh điếc nghề nghiệp và ...

A. Có tổn thương thực thể cửa sổ bàn đạp, cửa sổ ốc tai

B. Có tổn thương ống tai ngoài

C. Có tổn thương thực thể màng nhĩ

D. Có tổn thương thực thể ốc tai

Cơ thể người có thể chịu đựng được rung chuyển ở các loại tần số khác nhau, nhưng với điều kiện biên độ, vận tốc hay ... tương ứng với tần số phải ở dưới giới hạn cho phép

A. Cường độ

B. Chu kì

C. Giới hạn

D. Gia tốc

Rung chuyển có tần số từ 40-300Hz gây ..., đặc biệt ở bàn tay gây hội chứng Raynaud

A. Rối loạn mạch máu

B. Rối loạn vận mạch

C. Rối loạn thần kinh

D. Tổn thương cơ, xương

Rung chuyển kết hợp với ... gây ra đau quanh vùng cột sống:

A. Tư thế gò bó

B. Tư thế lao động bất buộc

C. Tư thế vội ra trước

D. Tư thế vẹo người

Nghiệm pháp lạnh là cho tay vào nước lạnh ... độ C trong ... phút

A. 15,15

B. 15,10

C. 20,15

D. 30,20

Rung chuyển có tần số trên 300 Hz gây tổn thương cân, cơ, ..., hay gặp ở cẳng tay, bàn tay, cánh tay và vai

A. Thần kinh vận động

B. Thần kinh cảm giác

C. Thần kinh

D. Cả ba đều sai

Cá máy hơi nén cần quy định trọng lượng và gây tác hại ít nhất, áp suất không được vượt quá ... , nơi thoát hơi nén không để ở bên cạnh, tránh thổi vào bàn tay.

A. 1 atm

B. 2 atm

C. 3 atm

D. 4 atm

Còn lại giống review

Anh thi điểm thấp do không đọc sách kĩ, các em nhớ đọc sách không sót chữ nào và đọc slide nhớ là bản mới nhất của thầy cô giảng trong năm bọn em sẽ update thêm nhiều kiến thức mới và thi vào trong đấy.

Vịt HMU K114 ☺