

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ФАГЭКО ПОЛИВАЛЕНТНЫЙ

Торговое название препарата: ФАГЭКО ПОЛИВАЛЕНТНЫЙ

Действующее вещество (МНН): -

Лекарственная форма: жидкость для приёма внутрь

Состав препарата:

1 мл препарата содержит:

активные вещества: стерильно очищенный фильтрат фаголизатов бактерий *S. typhimurium*; *S. newport*; *S. enteritidis*; *S. moscow*; *S. paratyphi B*; *S. agama*; *S. java*; *Sh. flexneri* сероваров I, II, III, VI; *Sh. sonnei*; *Sh. boydii*; *Enterococcus faecalis*, *Proteus mirabilis*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* и различные серогруппы *Escherichia coli*. Титр фага не менее 10^5 КОЕ/мл.

вспомогательные вещества: консервант - 8-гидроксихинолин сульфат или 8-гидроксихинолин сульфат моногидрат в пересчете на 8-гидроксихинолин сульфат 0,00001 г/мл или 0,001% от объёма жидкого фага (содержание расчетное) и вода очищенная.

Описание: прозрачная жидкость от светло-жёлтого до светло-коричневого цвета, допускается зеленоватый оттенок.

Фармакотерапевтическая группа: Прочие препараты. Другие лечебные средства

Код АТХ: V03A

Фармакологические свойства

Бактериофаг ФАГЭКО ПОЛИВАЛЕНТНЫЙ – лекарственный препарат, обладающий специфическим бактерицидным действием в отношении штаммов: *S. typhimurium*; *S. newport*; *S. enteritidis*; *S. moscow*; *S. paratyphi B*; *S. agama*; *S. java*; *Sh. flexneri* сероваров I, II, III, VI; *Sh. sonnei*; *Sh. boydii*; *Enterococcus faecalis*, *Proteus mirabilis*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* и различные серогруппы *Escherichia coli* наиболее значимых в этиологии энтеральных заболеваний. Фаговые частицы прикрепляются к мембране чувствительной бактерии, проникают внутрь клетки и размножаются за счет её ресурсов. Вследствие этого происходит гибель клетки и выход зрелых вирулентных фаговых частиц, способных к заражению других чувствительных бактериальных клеток. Бактериофаг ФАГЭКО ПОЛИВАЛЕНТНЫЙ не влияет на другие бактерии, в частности не нарушает естественную микрофлору.

Показания к применению

Препарат применяется для лечения и профилактики, бактериальных энтеральных заболеваний обусловленных *S. typhimurium*; *S. newport*; *S. enteritidis*; *S. moscow*; *S. paratyphi B*; *S. agama*; *S. java*; *Sh. flexneri* сероваров I, II, III, VI; *Sh. sonnei*; *Sh. boydii*; *Enterococcus faecalis*, *Proteus mirabilis*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* и различные серогруппы *Escherichia coli* во всех возрастных и высокого риска группах.

Лечение:

- сальмонеллёз;

- бактериальная дизентерия;
- острая диарея;
- диспепсия;
- дисбактериоз;
- синдром раздражение кишечника (СРК);
- инфекционный гастрит: гастроэнтерит, гастроэнтероколит, энтерит, энтероколит и колит;
- лечение больных во всех возрастных и высокого риска группах;
- санация реконвалесцентов (бактерионосительство);
- профилактика инфекций желудочно-кишечного тракта.

Фагирование препаратом **ФАГЭКО ПОЛИВАЛЕНТНЫЙ** проводится среди детей и обслуживающего персонала в дошкольных учреждениях, в школах и в пионерских лагерях во время сезонного подъема заболеваемости. Оптимальная схема использования - ежедневный прием разовой лечебной дозы в зависимости от возраста (так же, как и в целях лечения). Продолжительность приёма препарата определяется условиями эпид. ситуации.

Способы применения и дозы

Важным условием эффективной фаготерапии является предварительное определение фагочувствительности возбудителя заболевания (определение чувствительности к препарату **ФАГЭКО ПОЛИВАЛЕНТНЫЙ** штаммов, выделенных от больного). Применение бактериофага является наиболее эффективным на раннем этапе заболевания. Препарат предназначен для приема внутрь и ректального введения. Для лечения препарат принимают внутрь 3 раза в день за 1 ч. до приема пищи с первого дня заболевания в течение 7-10 дней. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, характеризующихся слабовыраженным колитическим синдромом, и в период реконвалесценции рекомендуется сочетание двукратного приема внутрь с однократным ректальным введением разовой возрастной дозы препарата в виде клизмы после опорожнения кишечника.

Рекомендуемые дозировки препарата:

	Возраст	Per os (внутри)	Per rectum (клизмой)
1.	До 6 месяцев	5 мл на один приём 2-3 раза в день, в течение 7-10 дней	10 мл один раз в день, в течение 7-10 дней
2.	От 6 месяцев до 12 месяцев	10-15 мл на один приём 2-3 раза в день, в течение 7-10 дней	20 мл один раз в день, в течение 7-10 дней
3.	От 1 года до 3 лет	15-20 мл на один приём 2-3 раза в день, в течение 7-10 дней	20-30 мл один раз в день, в течение 7-10 дней
4.	От 3 лет до 8 лет	20-30 мл на один приём 2-3 раза в день, в течение 7-10 дней	30-40 мл один раз в день, в течение 7-10 дней
5.	От 8 лет и взрослые	30-40 мл на один приём 2-3 раза в день, в течение 7-10 дней	50-60 мл один раз в день, в течение 7-10 дней

Побочные действия

Препарат нетоксичен. Какие-либо побочные явления не выявлены. В крайне редких случаях, при приеме внутрь может вызывать легкую непродолжительную рефлекторную тошноту,

которое не требует отмены препарата. Препарат может содержать следы соевых белков, у гиперчувствительных пациентов могут возникнуть аллергические реакции.

Противопоказания

Гиперчувствительность к какому-либо компоненту препарата.

Лекарственные взаимодействия

Препарат можно применять совместно с препаратами любой группы.

Особые указания

- начинать лечение бактериофагом следует как можно раньше. Перед использованием препарат необходимо взболтать.

- ПРИ ПОМУТНЕНИИ ПРЕПАРАТ НЕ ПРИМЕНЯТЬ!

- если до применения бактериофага для обработки раны использовались химические антисептики, рану необходимо тщательно промыть стерильным 0,9% раствором натрия хлорида;

- в препарате содержится питательная среда, в которой могут развиваться бактерии из окружающей среды, при вскрытии флакона, отборе и хранении должны соблюдать следующие правила:

- руки следует тщательно вымыть;

- перед тем как снять колпачок с флакона, его следует обработать раствором спирта;

- колпачок следует снимать, не вынимая пробку;

- препарат из вскрытого флакона следует отбирать стерильным шприцом (путем прокола пробки);

- если при вскрытии флакона вместе колпачком была изъята пробка, флакон не следует оставлять открытым;

- вскрытый флакон необходимо хранить в холодильнике. Препарат из вскрытого флакона при соблюдении условий хранения, вышеперечисленных правил и отсутствии помутнения может быть использован в течение всего срока годности;

- пациентам пожилого возраста коррекция суточной дозы не требуется.

Беременность и период лактации

Применение данного препарата в период беременности и лактации возможно при наличии инфекции вызванных штаммами чувствительных к препарату (по рекомендации врача).

Влияние на способность управлять автомобилем и сложными механизмами

Не описаны.

Передозировка

Данные о передозировке не описаны.

Форма выпуска

5 флаконов по 10 мл, 4 флакона по 20 мл и 1 флакон на 100 мл в картонной коробке вместе с инструкцию по медицинскому применению на государственном и русском языках.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от солнечного света месте,

при температуре от +2 °С до +10 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель/Наименование и адрес организации, принимающий претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан:

ООО «AZIYA IMMUNOPREPARAT»,

100206, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район, 17-й квартал, СГМ Кадрдон, дом-4Д. Телефон +99895 170-46-16. Е-почта: info@mediphag.uz