

камайтириш) ва протромбин индексини назорат қилиш лозим.

Цефалоспорин катори антибиотикларини бир вақтда қўлланганида эсциннинг плазма оксиллари билан боғланиши ёмонлашади, бу эсциннинг ножўя самараларини ривожланиш хавфи билан бирга унинг қондаги эркин концентрациясини ошириши мумкин.

Махсус кўрсатмалар

Гепатохолецистити мавжуд айрим беморларда препарат буюрилганида, трансаминазалар ва билирубин (тўғри фракциялари) фаоллигининг қисқа муддатли ошиши кузатилиши мумкин, бу беморлар учун хавф туғдирмайди ва препарат бекор қилинишини талаб қилмайди.

Ҳомиладорлик ва лактация даврида қўлланилиши

Препаратни ҳомиладорлик ва эмизиш даврида қўллаш мумкин эмас (даволаш вақтида эмизишни тўхтатиш керак).

Автомобилни ва мураккаб механизмларни бошқариш қобилиятига таъсири

Ҳозирги вақтда маълумотлар йўқ, бироқ препаратни қўллашда асаб тизими томонидан тахмин қилинган ножўя реакциялар ривожланиши мумкинлигини ҳисобга олиш лозим.

Эҳтиёткорлик билан: алкоголизмда, шунингдек жигар касаллиги ва эпилепсия билан оғриган беморларда эҳтиёткорлик билан қўллаш лозим.

Дозани ошириб юборилиши

Симптомлари: қизиш, тахикардия, меноррагия, кўнгил айнаши, жиғилдон қайнаши, эпигастрал соҳада оғриқ кузатилиши мумкин.

Даволаш: симптоматик даволаш ўтказилади.

Чиқариш шакли

1 мг/мл инфузия учун эритма тайёрлаш учун концентрат 5 мл дан ампулаларда.

5 ёки 10 ампула ПВХ дан бўлган контур уяли ўрамда тиббиётда қўлланилишига доир йўриқномаси билан картон кутида.

Сақлаш шароити

Ёруғликдан ҳимояланган жойда, 25°C дан юкори бўлмаган ҳароратда сақлансин.

Болалар ололмайдиган жойда сақлансин.

Яроқлилиқ муддати

2 йил.

Яроқлилиқ муддати ўтгач қўлланилмасин.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецепт бўйича.

Ишлаб чиқарувчи/Ўзбекистон Республикаси ҳудудида дори воситаларининг сифати бўйича эътирозлар (таклифлар) ни қабул қилувчи ташкилотнинг номи ва манзили:

“BAYAN MEDICAL” МЧЖ,

Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш., Юнусобод тумани, Боғишамол кўчаси, 160-уй.

Тел.: +99871 207 89 98.

Эл. почта: info@bayanmedical.uz