

=====

INTERPRETACIÓN AUTOMÁTICA DE SENSIBILIDAD FAUNÍSTICA

=====

Se registró un total de ****15 especies sensibles**** pertenecientes a 2 clases y 13 familias taxonómicas. La mayor representación corresponde a:

- ****Clases más abundantes:****

Mammalia: 14, Clase: 1

- ****Familias con mayor número de especies:****

Felidae: 2, Phyllostomidae: 2, Canidae: 1, Bradypodidae: 1, Familia: 1

2. --- Estado de amenaza (IUCN, CITES, Res.0126) ---

La evaluación IUCN indica presencia de especies sensibles:

- VU: 1 especies

Regulaciones CITES detectadas:

- Apendice III: 4 especies

- Apendice II: 2 especies

- Apendice I: 1 especies

Especies protegidas bajo Resolución 0126:

- VU: 1 especies

3. --- Patrones de distribución ---

Las especies registradas abarcan los siguientes patrones biogeográficos:

- Cosmopolita: 10 especies

- Neotropical: 2 especies

- Distribución: 1 especies

- Endémica: 1 especies

- Restringida: 1 especies

Las distribuciones 'Cosmopolita' y 'Neotropical' suelen indicar especies ampliamente adaptadas, mientras que distribuciones 'Restringidas' pueden señalar especies vulnerables o de interés particular.

4. --- Patrones de migración ---

La comunidad presenta los siguientes patrones migratorios:

- Res: 9 especies

- Latitudinal: 3 especies

- Nomadismo: 2 especies

- Migración: 1 especies

Los patrones migratorios latitudinales y transcontinentales reflejan conectividad ecológica, mientras que el carácter residente indica uso permanente del hábitat.

5. --- Síntesis ecológica integrada ---

La estructura faunística registrada combina especies residentes, migratorias y de amplia distribución, junto con especies reguladas por CITES y algunas incluidas en categorías de amenaza. Esto indica que el área funciona como un nodo ecológico relevante para múltiples grupos funcionales.

La presencia de especies en CITES o con categoría IUCN eleva la importancia de conservación, mientras que los patrones migratorios sugieren que el área cumple funciones críticas dentro de corredores biológicos regionales y continentales.

Los patrones de distribución evidencian una mezcla de especies generalistas y especialistas, reflejando una comunidad ecológicamente diversa y funcionalmente estable.