

DESCRIPCIÓN ECOLÓGICA POR ÓRDENES

Totales generales: 7 órdenes, 16 familias, 30 especies y 224 individuos.

PÁRRAFO GLOBAL:

En general, el orden más representativo fue el orden **Carnivora**, con 10 especies, pertenecientes a familias como: Canidae (2 spp.), Procyonidae (3 spp.), Mustelidae (2 spp.), Felidae (2 spp.), Mephitidae (1 spp.). Este orden representó el 33.33% del total de especies (30). El segundo y siguientes órdenes más representativos fueron: **Chiroptera**, con 7 especies, pertenecientes a las familias Phyllostomidae, Vespertilionidae (23.33%); **Rodentia**, con 5 especies, pertenecientes a las familias Dasyproctidae, Cuniculidae, Sciuridae, Echimyidae, Erethizontidae (16.67%); **Didelphimorphia**, con 5 especies, pertenecientes a las familias Didelphidae (16.67%). Por consiguiente, los órdenes Cingulata, Galliformes, Pilosa, cada uno con 1 especie. La especie más abundante registrada en el muestreo fue **Dasyprocta punctata**, con 43 individuos.

DETALLE POR ORDEN (ordenado de mayor a menor riqueza específica):

El orden Carnivora agrupa un total de 10 especies (33.33% del total de especies), y suma 36 individuos, equivalente al 16.07% del total de individuos registrados (224). Este orden está representado por las siguientes familias: Canidae: 2 especies y 11 individuos; Procyonidae: 3 especies y 10 individuos; Mustelidae: 2 especies y 7 individuos; Felidae: 2 especies y 5 individuos; Mephitidae: 1 especie y 3 individuos. La familia con mayor riqueza específica dentro del orden fue Procyonidae (3 especies), mientras que la familia con mayor abundancia en individuos fue Canidae (11 individuos). Las especies más abundantes dentro de Carnivora fueron: 1. Cerdocyon thous (10 individuos) 2. Eira barbara (4 individuos) 3. Procyon cancrivorus (4 individuos).

El orden Chiroptera agrupa un total de 7 especies (23.33% del total de especies), y suma 25 individuos, equivalente al 11.16% del total de individuos registrados (224). Este orden está representado por las siguientes familias: Phyllostomidae: 5 especies y 22 individuos; Vespertilionidae: 2 especies y 3 individuos. La familia con mayor riqueza específica dentro del orden fue Phyllostomidae (5 especies), mientras que la familia con mayor abundancia en individuos fue Phyllostomidae (22 individuos). Las especies más abundantes dentro de Chiroptera fueron: 1. Carollia perspicillata (15 individuos) 2. Artibeus anderseni (4 individuos) 3. Myotis nigricans (2 individuos).

El orden Rodentia agrupa un total de 5 especies (16.67% del total de especies), y suma 110 individuos, equivalente al 49.11% del total de individuos registrados (224). Este orden está representado por las siguientes familias: Dasyproctidae: 1 especie y 43 individuos; Cuniculidae: 1 especie y 28 individuos; Sciuridae: 1 especie y 21 individuos; Echimyidae: 1 especie y 16 individuos; Erethizontidae: 1 especie y 2 individuos. La familia con mayor riqueza específica dentro del orden fue Dasyproctidae (1 especie), mientras que la familia con mayor abundancia en individuos fue Dasyproctidae (43 individuos). Las especies más abundantes dentro de Rodentia fueron: 1. Dasyprocta punctata (43 individuos) — **especie más abundante global** 2. Cuniculus paca (28 individuos) 3. Syntheosciurus granatensis (21 individuos). Cabe resaltar que **Dasyprocta punctata** es también la especie más abundante registrada en todo el muestreo (43 individuos).

El orden Didelphimorphia agrupa un total de 5 especies (16.67% del total de especies), y suma 41 individuos, equivalente al 18.3% del total de individuos registrados (224). Este

orden está representado por las siguientes familias: Didelphidae: 5 especies y 41 individuos. La familia con mayor riqueza específica dentro del orden fue Didelphidae (5 especies), mientras que la familia con mayor abundancia en individuos fue Didelphidae (41 individuos). Las especies más abundantes dentro de Didelphimorphia fueron: 1. *Didelphis marsupialis* (20 individuos) 2. *Gracilinanus marica* (10 individuos) 3. *Marmosa robinsoni* (5 individuos).

El orden Cingulata agrupa un total de 1 especie (3.33% del total de especies), y suma 9 individuos, equivalente al 4.02% del total de individuos registrados (224). Este orden está representado por las siguientes familias: Dasypodidae: 1 especie y 9 individuos. La familia con mayor riqueza específica dentro del orden fue Dasypodidae (1 especie), mientras que la familia con mayor abundancia en individuos fue Dasypodidae (9 individuos). Las especies más abundantes dentro de Cingulata fueron: 1. *Dasypus fenestratus* (9 individuos).

El orden Galliformes agrupa un total de 1 especie (3.33% del total de especies), y suma 2 individuos, equivalente al 0.89% del total de individuos registrados (224). Este orden está representado por las siguientes familias: Cracidae: 1 especie y 2 individuos. La familia con mayor riqueza específica dentro del orden fue Cracidae (1 especie), mientras que la familia con mayor abundancia en individuos fue Cracidae (2 individuos). Las especies más abundantes dentro de Galliformes fueron: 1. *Penelope argyrotis* (2 individuos).

El orden Pilosa agrupa un total de 1 especie (3.33% del total de especies), y suma 1 individuo, equivalente al 0.45% del total de individuos registrados (224). Este orden está representado por las siguientes familias: Bradypodidae: 1 especie y 1 individuo. La familia con mayor riqueza específica dentro del orden fue Bradypodidae (1 especie), mientras que la familia con mayor abundancia en individuos fue Bradypodidae (1 individuo). Las especies más abundantes dentro de Pilosa fueron: 1. *Bradypus variegatus* (1 individuo).
