


1. Curva de acumulación de especies (iNEXT)




1.1. Interpretación del análisis

En el Muestreo se registraron un total de 224 individuos y 30 especies observadas. El valor de cobertura de muestra ($SC = 0.9735$) indica que el muestreo fue altamente representativo del ensamble analizado. Se detectaron 6 especies con un solo individuo (singletons) y 6 con dos individuos (doubletons), lo que representa una proporción moderada de especies raras. El estimador asintótico de riqueza (Chao1) predice aproximadamente 32.99 especies, es decir, unas 2.99 más de las observadas, lo que confirma la alta completitud del inventario. El índice de Shannon aumentó de 16.54 a 17.9, y el índice de Simpson pasó de 11.41 a 11.97, lo que refleja la estructura de abundancias y equidad de la comunidad.

2. Curvas de números de Hills (iNEXT)

Curvas de Diversidad de Hills ($q = 0, 1, 2$)

Riqueza observada, interpolada y extrapolada con intervalos de confianza (95%)



2.1. Interpretación de los números de Hills

En el análisis de diversidad basado en números de Hills: - Para $q = 0$ (riqueza de especies), se observaron 30 especies, con una estimación asintótica de 33 ± 7.3 . Esto representa un 90.95% de completitud, lo que indica que el muestreo fue adecuado, aunque podrían registrarse algunas especies adicionales.. - Para $q = 1$ (diversidad de Shannon), el número efectivo de especies fue de 16.5 y la estimación asintótica alcanzó 17.9 ± 1.34 (92.43% de completitud). El muestreo fue adecuado, aunque podrían registrarse algunas especies adicionales.. - Para $q = 2$ (diversidad de Simpson), el número efectivo de especies dominantes fue de 11.4, con un valor esperado de 12 ± 1.12 , alcanzando un 95.33% de completitud. El muestreo fue suficiente; las curvas alcanzan una tendencia asintótica.. En conjunto, las tres curvas muestran una tendencia asintótica, evidenciando que el esfuerzo de muestreo fue adecuado para representar la mayoría de las especies presentes en la comunidad.