

=== INTERPRETACIÓN GENERAL DEL RANGO-ABUNDANCIA ===

El ensamblaje total está compuesto por 30 especies y un total de 448 individuos registrados. La curva rango-abundancia

Las especies más dominantes del paisaje general son:

- *Dasyprocta punctata* (43 individuos)
- *Cuniculus paca* (28 individuos)
- *Dasyprocta punctata* (25 individuos)
- *Syntheosciurus granatensis* (21 individuos)
- *Didelphis marsupialis* (20 individuos)

Estas especies determinan la pendiente inicial de la curva, indicando un patrón de dominancia pronunciado.

=== CLASIFICACIÓN DE ESPECIES SEGÚN SU ABUNDANCIA ===

- Especies de ****alta abundancia**** (≥ 7 individuos): 9 especies.
- Especies de ****abundancia intermedia****: 13 especies.
- Especies de ****baja abundancia**** (≤ 2 individuos): 21 especies.

Este patrón sugiere un ensamblaje con pocas especies dominantes y un número considerable de especies raras,

=== INTERPRETACIÓN POR COBERTURA ===

--- Cobertura: TOTAL ---

Esta cobertura contiene 30 especies y un total de 224 individuos. La estructura de abundancias muestra una dominancia

- *Dasyprocta punctata* (43 individuos)
- *Cuniculus paca* (28 individuos)
- *Syntheosciurus granatensis* (21 individuos)

La cobertura presenta 8 especies de alta abundancia y 12 especies raras, lo que permite inferir su estado ecológico

--- Cobertura: Bdatf ---

Esta cobertura contiene 24 especies y un total de 113 individuos. La estructura de abundancias muestra una dominancia

- *Dasyprocta punctata* (25 individuos)
- *Cuniculus paca* (15 individuos)
- *Syntheosciurus granatensis* (9 individuos)

La cobertura presenta 6 especies de alta abundancia y 13 especies raras, lo que permite inferir su estado ecológico

--- Cobertura: Bdbtf ---

Esta cobertura contiene 18 especies y un total de 95 individuos. La estructura de abundancias muestra una dominancia

- *Dasyprocta punctata* (16 individuos)
- *Cuniculus paca* (13 individuos)
- *Syntheosciurus granatensis* (12 individuos)

La cobertura presenta 5 especies de alta abundancia y 7 especies raras, lo que permite inferir su estado ecológico

--- Cobertura: Bfvs ---

Esta cobertura contiene 6 especies y un total de 16 individuos. La estructura de abundancias muestra una dominancia

- *Carollia perspicillata* (8 individuos)
- *Dasyprocta punctata* (2 individuos)
- *Neogale frenata* (2 individuos)

La cobertura presenta 4 especies de alta abundancia y 2 especies raras, lo que permite inferir su estado ecológico

=== SÍNTESIS FINAL DEL ENSAMBLAJE ===

El análisis de curvas de rango–abundancia revela un ensamblaje estructurado por unas pocas especies dominantes