

Model discret: Dinàmica paràsit-hoste

Model de Nicholson-Bailey.....	1
Model bionomial negatiu (Griffiths-May).....	1
Qüestions.....	1

Considerem un model discret on les poblacions del **paràsit** P_t i l'**hoste** H_t evolucionen al llarg del temps en intervals t . Considerem dos models.

Model de Nicholson-Bailey

$$H_{k+1} = RH_k e^{-aP_k}$$
$$P_{k+1} = SH_k (1 - e^{-aP_k})$$

on

- R : constant de creixement dels hostes;
- a : eficiència dels paràsits en cercar hostes; i
- S : promig d'ous viables dels paràsits per a cada hoste infectat.

Model bionomial negatiu (Griffiths-May)

Usant la mateixa notació que en el cas anterior, aquest model representa les poblacions d'hostes i paràsits seguint:

$$H_{k+1} = RH_k \left(1 + \frac{aP_k}{m}\right)^{-m}$$
$$P_{k+1} = SH_k \left(1 - \left(1 + \frac{aP_k}{m}\right)^{-m}\right)$$

on apareix el nou paràmetre m per controlar l'efecte de l'eficiència del paràsit.

Qüestions

1. Construeix gràfiques per al model de Nicholson-Bailey usant $R = 1.5$, $S = 1$ i $a = 0.023$ per als casos: a) $H_0 = 30$ i $P_0 = 20$ i b) $H_0 = 20$ i $P_0 = 20$ (Figura 2.8 dels apunts de models discrets). Com interpretes la diferència entre les dues?
2. Usant els mateixos paràmetres anteriors i també $m = 0.5$, repeteix els dos gràfics anteriors per al model binomial negatiu. Quina conclusió n'extreus?
3. Construeix un gràfic de fase (població dels paràsits en funció de la població dels hostes) per als diferents casos. Què observes?
4. Comprova gràficament l'estabilitat dels dos punts d'equilibri trobats a l'exemple 2.55 dels apunts de models discrets.