

Formulari i Taules de Química General

Jordi Villà i Freixa

4 de febrer de 2026

Índex

1	Fórmules	1
2	Constants	3
3	Unitats de mesura	3
4	Radi atòmic	5
5	Dades termodinàmiques	5
5.1	Calor de Combustió	7
6	Electroquímica	9
7	Reaccions àcid-base	11
8	Enllaç i propietats moleculars	12
9	Nomenclatura bàsica	13
10	Enllaços d'interès	14

1 Fórmules

Taula 1: Fórmules rellevants per a aquest curs

Fórmula	Descripció
$p = mv$	Moment lineal, la massa i la velocitat
$KE = \frac{1}{2}mv^2$	Energia cinètica d'un cos en moviment
$P = \frac{F}{A}$	Definició de pressió
$PV = nRT$	Llei dels gasos ideals
$\left(P + \frac{n^2a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$	Equació de van der Waals

$w = -P\Delta V$	Treball exercit sobre un gas
$U = q + w$	Primera llei de la termodinàmica
$H = U + PV$	Entalpia
$dS = \frac{dq_{rev}}{T}$	Definició d'entropia
$G = H - TS$	Energia lliure de Gibbs
$q_v = n\Delta U$	Calor a volum constant
$q_p = n\Delta H$	Calor a pressió constant
$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$	Canvi d'energia lliure de Gibbs
$\Delta G^\circ = -RT \ln K$	Energia lliure de Gibbs i constant d'equilibri
$E^\circ_{pila} = E^\circ_{càtode} - E^\circ_{ànode}$	Potencial estàndard de la pila
$E = E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln Q$	Equació de Nernst, f.e.m. (E) i quocient de reacció
$\Delta G = -nFE$	Energia lliure de Gibbs i potencial elèctric
$K = Q_{eq} = \frac{\prod_i^P [\text{productes}_i]^{\text{coef}_i}}{\prod_j^R [\text{reactius}_j]^{\text{coef}_j}}$	Constant d'equilibri
$K_p = K_c (RT)^{\Delta n}$	Constant d'equilibri (pressió-concentració)
$K_{sp} = \prod_i^{ions} [\text{ions}_i]^{\text{coef}_i}$	Producte de solubilitat
$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$	Constant d'acidesa
$K_b = \frac{[OH^-][BH^+]}{[B]}$	Constant de basicitat
$pK_a = -\log K_a$	Constant d'acidesa i pKa
$pH = -\log[H^+]$	Definició de pH
$K_w = [H^+][OH^-] = K_a \cdot K_b$	Producte iònic de l'aigua
$pK_w = pH + pOH$	pH, pOH i pKw
$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$	Equació de Henderson-Hasselbalch
$C_i = k_H \cdot P_i$	Llei de Henry
$C = \frac{n}{V}$	Concentració molar
$P_A = X_A P_A^\circ$	Llei de Raoult: pressió parcial component en solució
$X_A = \frac{n_A}{n_A + n_B}$	Fracció molar component solució
$m = \frac{n}{m_{\text{solvent}}}$	Definició de molalitat
$\Delta T_b = K_b \cdot m$	Elevació del punt d'ebullició
$\Delta T_f = K_f \cdot m$	Descens del punt de congelació
$V = IR$	Llei d'Ohm
$P = IV$	Potència elèctrica
$\Delta E = P\Delta t$	Energia elèctrica
$C_{cal} = \frac{q_{absorvit}}{\Delta T}$	Factor de calibratge del calorímetre (capacitat calorífica)
$\Delta E = h\nu$	Energia d'un fotó
$\lambda = \frac{h}{mv}$	Longitud d'ona de de Broglie
$\Delta E = \frac{hc}{\lambda}$	Relació entre energia, constant de Planck i longitud d'ona
$E_n = -\frac{Z^2 m_e e^4}{8\epsilon_0^2 h^2 n^2}$	Energia de l'òrbita n (model de Bohr)
$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{2}$	Principi d'incertesa de Heisenberg

2 Constants

Taula 2: Conversió de la constant dels gasos en diferents unitats

Valor de la constant dels gasos R	Unitats
0,082	atm L mol ⁻¹ K ⁻¹
8,3145	m ³ Pa K ⁻¹ mol ⁻¹ = J K ⁻¹ mol ⁻¹

Taula 3: Constants rellevants per a aquest curs

Constant	Valor
Número d'Avogadro	$6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Càrrega d'un electró	$1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$
Massa d'un electró	$9,109 \times 10^{-31} \text{ kg}$
Massa d'un protó	$1,673 \times 10^{-27} \text{ kg}$
Massa d'un neutró	$1,675 \times 10^{-27} \text{ kg}$
Constant de Planck	$6,626 \times 10^{-34} \text{ J s}$
$\hbar = \frac{h}{2\pi}$ (constant reduïda de Planck)	$1,055 \times 10^{-34} \text{ J s}$
Constant de Boltzmann	$1,381 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$
Constant dels gasos	$8,314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
Constant de Faraday	$96\,485 \text{ C mol}^{-1}$
Constant de gravitació universal	$6,674 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$
Constant de Coulomb	$8,988 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$
Constant de Rydberg	$1,097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$

3 Unitats de mesura

Taula 4: Algunes unitats del SI rellevants per a aquest curs, incloent la seva **anàlisi dimensional**. El sistema CGS (centímetre-gram-segon) és un sistema de mesura que utilitza el centímetre, el gram i el segon com a unitats bàsiques de longitud, massa i temps respectivament.

Magnitud	Unitat a SI	Símbol SI	Dimensió
Longitud	metre	m	L
Volum	litre	L	L ³
Massa	kilogram	kg	M
Temperatura	kelvin	K	
mol	mol	mol	N
temps	segon	s	T

Freqüència	hertz	Hz	T^{-1}
Energia	joule	J	ML^2T^{-2}
Força	newton	N	MLT^{-2}
Pressió	pascal	Pa	$ML^{-1}T^{-2}$
Potencial elèctric	volt	V	$ML^2T^{-3}I^{-1}$
Potència	watt	W	ML^2T^{-3}

Taula 5: Conversió d'unitats del sistema americà al Sistema Internacional (SI)

Magnitud	Unitat (EUA)	Equivalència en SI
Volum	1 in ³	16,387 cm ³
Volum	1 ft ³	28,317 L
Volum	1 gal (US)	3,785 L
Pressió	1 psi	6,895 kPa
Pressió	1 atm	101,325 kPa
Pressió	1 inHg	3,386 kPa
Temperatura	1 F	$T_C = (T_F - 32) \times \frac{5}{9}$
Massa	1 oz	28,35 g
Massa	1 lb	0,4536 kg
Massa	1 t (US)	907,184 kg

Taula 6: Comparació de les unitats de pressió amb 1 atmosfera

Unitat de Pressió	Pressió (en relació a 1 atm)
Atmosfera (atm)	1 atm
Pascal (Pa)	101325 Pa
Kilopascal (kPa)	101.325 kPa
Bar	1.01325 bar
Mil·límetre de mercuri (mmHg)	760 mmHg
Torra (Torr)	760 Torr
Pounds per square inch (psi)	14.696 psi

4 Radi atòmic

H 25																	He 32
Li 145	Be 105											B 85	C 70	N 65	O 60	F 50	Ne 69
Na 180	Mg 150											Al 125	Si 110	P 100	S 100	Cl 100	Ar 97
K 220	Ca 180	Sc 160	Ti 140	V 135	Cr 140	Mn 140	Fe 140	Co 135	Ni 135	Cu 135	Zn 135	Ga 130	Ge 125	As 115	Se 115	Br 115	Kr 110
Rb 235	Sr 200	Y 180	Zr 155	Nb 145	Mo 145	Tc 135	Ru 130	Rh 135	Pd 140	Ag 160	Cd 155	In 135	Sn 145	Sb 145	Te 140	I 140	Xe 130
Cs 260	Ba 215	La 195	Hf 155	Ta 145	W 135	Re 135	Os 130	Ir 135	Pt 135	Au 135	Hg 150	Tl 190	Pb 180	Bi 160	Po 190	At	Rn 145
Fr	Ra 215	Ac 195															

Figura 1: El radi d'un àtom. Distància entre el nucli d'un àtom i la seva capa exterior d'electrons. Aquesta no és una entitat fixa, per la qual cosa hi ha diverses definicions d'aquest terme, depenent de la mesura utilitzada. El radi atòmic difereix segons l'estat de l'enllaç d'un àtom (per exemple, un àtom no enllaçat d'un element enfront de l'element mateix dins d'un enllaç covalent). Radi empíric per als àtoms en enllaços covalents dels elements en picòmetres (pm) amb una precisió de 5 pm. (Els valors per a la columna de He fins a Xe són per als àtoms lliures.) Tingueu en compte les tendències en el radi atòmic dins de les períodes (files) i famílies (columnes) de la taula periòdica. No apareix cap número on no hi hagi dades disponibles.

5 Dades termodinàmiques

Taula 7: Calor de Fusió i Vaporització d'algunes substàncies pures (específic ΔH en J/g i Molar ΔH en kJ/mol)

Substància	Calor de Fusió		Calor de Vaporització	
	ΔH_{fus} (J/g)	ΔH_{fus} (kJ/mol)	ΔH_{vap} (J/g)	ΔH_{vap} (kJ/mol)
Alumini	321	8.66	11400	307.6
Benzè	127.4	10.0	390	30.5
Coure	207	13.2	5069	322.1
Or	67	13.2	1578	310.9
Ferro	209	11.7	6340	354.1
Plom	22.4	4.64	871	180.5
Metà	59	0.946	537	8.61
Mercuri	11.6	2.33	295	5.92
Metanol	98.8	3.17	1100	35.2
Nitrogen	25.5	0.715	200	5.60

Taula 7: Calor de Fusió i Vaporització d'algunes substàncies pures (específic ΔH en J/g i Molar ΔH en kJ/mol)

Substància	Calor de Fusió		Calor de Vaporització	
	ΔH_{fus} (J/g)	ΔH_{fus} (kJ/mol)	ΔH_{vap} (J/g)	ΔH_{vap} (kJ/mol)
Sodi	113	2.60	4237	97.42
Aigua	334	6.02	2260	40.7

La taula següent mostra els valors clau de termodinàmica per a diverses substàncies, extrets de la taula CODATA KEY VALUES FOR THERMODYNAMICS a [2, 3]. La taula inclou l'entalpia estàndard de formació a 298,15 K, l'entropia a 298,15 K i la quantitat H° (298,15 K) - H° (0 K). Un valor de 0 a la columna $\Delta_f H^\circ$ per a un element indica l'estat de referència per a aquest element. La pressió de l'estat estàndard és 10^5 Pa (1 bar).

Taula 8: Valors termodinàmics per a diverses substàncies [2]


Substància	$\Delta_f H^\circ$ (298.15 K) (kJ/mol)	S° (298.15 K) (J/K/mol)	H° (298.15 K) - H° (0) (kJ/mol)
Ar (g)	0	154.846 ± 0.003	6.197 ± 0.001
C (cr, graphite)	0	5.74 ± 0.10	1.050 ± 0.020
C (g)	716.68 ± 0.45	158.100 ± 0.003	6.536 ± 0.001
CO (g)	-110.53 ± 0.17	197.660 ± 0.004	8.671 ± 0.001
CO ₂ (aq, undissoc.)	-413.26 ± 0.20	119.36 ± 0.60	
CO ₂ (g)	-393.51 ± 0.13	213.785 ± 0.010	9.365 ± 0.003
CO ₃ ²⁻ (aq)	-675.23 ± 0.25	-50.0 ± 1.0	
H ₂ (g)	0	130.680 ± 0.003	8.468 ± 0.001
H ₂ O (g)	-241.826 ± 0.040	188.835 ± 0.010	9.905 ± 0.005
H ₂ O (l)	-285.830 ± 0.040	69.95 ± 0.03	13.273 ± 0.020
H ₂ PO ₄ ⁻ (aq)	-1302.6 ± 1.5	92.5 ± 1.5	
H ₂ S (aq, undissoc.)	-38.6 ± 1.5	126 ± 5	
H ₂ S (g)	-20.6 ± 0.5	205.81 ± 0.05	9.957 ± 0.010
N (g)	472.68 ± 0.40	153.301 ± 0.003	6.197 ± 0.001
NH ₃ (g)	-45.94 ± 0.35	192.77 ± 0.05	10.043 ± 0.010
NH ₄ ⁺ (aq)	-133.26 ± 0.25	111.17 ± 0.40	
NO ₃ ⁻ (aq)	-206.85 ± 0.40	146.70 ± 0.40	
N ₂ (g)	0	191.609 ± 0.004	8.670 ± 0.001
S (g)	277.17 ± 0.15	167.829 ± 0.006	6.657 ± 0.001
SO ₂ (g)	-296.81 ± 0.20	248.223 ± 0.050	10.549 ± 0.010
SO ₄ ²⁻ (aq)	-909.34 ± 0.40	18.50 ± 0.40	
C ₃ H ₈ (g)	-104.7 ± 0.4	269.91 ± 0.10	14.66 ± 0.05
H ₂ (g)	0	130.680 ± 0.003	8.468 ± 0.001
H ₂ O (g)	-241.826 ± 0.040	188.835 ± 0.010	9.905 ± 0.005
H ₂ O (l)	-285.830 ± 0.040	69.95 ± 0.03	13.273 ± 0.020

Taula 8: Valors termodinàmics per a diverses substàncies [2]


Substància	$\Delta_f H^\circ$ (298.15 K) (kJ/mol)	S° (298.15 K) (J/K/mol)	H° (298.15 K)– H° (0) (kJ/mol)
H ₂ PO ₄ [−] (aq)	−1302.6 ± 1.5	92.5 ± 1.5	
H ₂ S (aq, undissoc.)	−38.6 ± 1.5	126 ± 5	
H ₂ S (g)	−20.6 ± 0.5	205.81 ± 0.05	9.957 ± 0.010
N (g)	472.68 ± 0.40	153.301 ± 0.003	6.197 ± 0.001
NH ₃ (g)	−45.94 ± 0.35	192.77 ± 0.05	10.043 ± 0.010
NH ₄ ⁺ (aq)	−133.26 ± 0.25	111.17 ± 0.40	
NO ₃ [−] (aq)	−206.85 ± 0.40	146.70 ± 0.40	
N ₂ (g)	0	191.609 ± 0.004	8.670 ± 0.001
S (g)	277.17 ± 0.15	167.829 ± 0.006	6.657 ± 0.001
SO ₂ (g)	−296.81 ± 0.20	248.223 ± 0.050	10.549 ± 0.010
SO ₄ ^{2−} (aq)	−909.34 ± 0.40	18.50 ± 0.40	

5.1 Calor de Combustió

La calor de combustió d'una substància a 25°C es pot calcular a partir de les dades d'entalpia de formació ($\Delta_f H^\circ$). Podem escriure la reacció general de combustió com:



Per a un compost que conté només carboni, hidrogen i oxigen, la reacció és simplement:



i la calor estàndard de combustió $\Delta_c H^\circ$, que es defineix com el negatiu del canvi d'entalpia per a la reacció (és a dir, el calor alliberat en el procés de combustió), es dona per:

$$\begin{aligned} \Delta_c H^\circ &= -a\Delta_f H^\circ(CO_2, g) - \frac{b}{2}\Delta_f H^\circ(H_2O, l) + \Delta_f H^\circ(C_aH_bO_c) \\ &= 393.51a + 142.915b + \Delta_f H^\circ(C_aH_bO_c) \end{aligned}$$

Aquesta equació s'aplica si els reactius comencen en els seus estats estàndard (25°C i una atmosfera de pressió) i els productes tornen a les mateixes condicions. La mateixa equació s'aplica a un compost que conté un altre element si aquest element acaba en el seu estat de referència estàndard (per exemple, nitrogen, si el producte és N₂); en general, però, els productes exactes que contenen els altres elements han de ser coneguts per calcular el calor de combustió.

Taula 9: Calor estàndard de combustió de diverses substàncies. Adaptat de la taula Heat of Combustion a [3]

Fórmula Molecular	Nom	$\Delta_c H^\circ$ (kJ/mol)
C_3H_8O	1-Propanol (l)	2021.3
$C_3H_8O_3$	Glicerol (l)	1655.4
$C_4H_{10}O$	Èter dietílic (l)	2723.9
$C_5H_{12}O$	1-Pentanol (l)	3330.9
C_6H_6	Fenol (s)	3053.5
Substàncies Inorgàniques		
C	Carboni (grafit)	393.5
CO	Monòxid de carboni (g)	283.0
H_2	Hidrogen (g)	285.8
H_3N	Amoníac (g)	382.8
H_4N_2	Hidrazina (g)	667.1
N_2O	Òxid nítrós (g)	82.1
Compostos de Carbonil		
CH_2O	Formaldehid (g)	726.1
C_2H_2O	Cetè (g)	1366.8
C_2H_4O	Acetaldehid (l)	1460.4
C_3H_6O	Acetona (l)	1189.2
C_3H_6O	Propanal (l)	1822.7
C_4H_8O	2-Butanona (l)	2444.1
Hidrocarburs		
CH_4	Metà (g)	890.8
C_2H_2	Acetilè (g)	1301.1
C_2H_4	Etilè (g)	1411.2
C_2H_6	Età (g)	1560.7
C_3H_6	Propilè (g)	2058.0
C_3H_6	Ciclopropà (g)	2091.3
C_3H_8	Propà (g)	2219.2
C_4H_6	1,3-Butadiè (g)	2541.5
C_4H_{10}	Butà (g)	2877.6
C_5H_{12}	Pentà (l)	3509.0
C_6H_6	Benzè (l)	3267.6
C_6H_{12}	Ciclohexà (l)	3919.6
C_6H_{14}	Hexà (l)	4163.2
C_7H_8	Toluè (l)	3910.3
C_7H_{16}	Heptà (l)	4817.0
$C_{10}H_8$	Naftalè (s)	5156.3
Alcohols i Èters		
CH_4O	Metanol (l)	570.7
C_2H_6O	Etanol (l)	1025.4

Taula 9: Calor estàndard de combustió de diverses substàncies. Adaptat de la taula Heat of Combustion a [3]

Fórmula Molecular	Nom	$\Delta_c H^\circ$ (kJ/mol)
C_2H_6O	Èter dimetilic (g)	1166.9
$C_2H_6O_2$	Etilè glicol (l)	1789.9
Àcids i Èsters		
CH_2O_2	Àcid fòrmic (l)	254.6
$C_2H_4O_2$	Àcid acètic (l)	874.2
$C_2H_4O_2$	Formiat de metil (l)	972.6
$C_3H_6O_2$	Acetat de metil (l)	1592.2
$C_4H_8O_2$	Acetat d'etil (l)	2238.1
$C_7H_6O_2$	Àcid benzoic (s)	3226.9
Compostos de Nitrogen		
CHN	Cianur d'hidrogen (g)	671.5
CH_3NO_2	Nitrometà (l)	709.2
CH_5N	Metilamina (g)	1085.6
C_2H_3N	Acetonitril (l)	1247.2
C_2H_5NO	Acetamida (s)	1184.6
C_3H_9N	Trimetilamina (g)	2443.1
C_5H_5N	Piridina (l)	2782.3
C_6H_7N	Anilina (l)	3392.8

6 Electroquímica

Taula 10: Sèrie d'Activitat Redox Tipus[1].

Element
Fàcilment oxidats
Cesi (Cs)
Rubidi (Rb)
Potassi (K)
Sodi (Na)
Calci (Ca)
Magnesi (Mg)
Alumini (Al)
Titani (Ti)
Manganès (Mn)
Zinc (Zn)
Crom (Cr)
Ferro (Fe)
Níquel (Ni)

Element
Plom (Pb)
Coure (Cu)
Fàcilment reduïts
Or (Au)

Taula 11: Potencials REDOX seleccionats amb aplicacions en química automobilística[3]. Reaccions de reducció ordenades de major a menor potencial estàndard.

Reacció	E^0 (V) a 25 °C
$F_2 + 2 e^- \rightarrow 2 F^-$	2,870
$S_2O_8^{2-} + 2 e^- \rightarrow 2 SO_4^{2-}$	2,010
$PtO_3 + 2 H^+ + 2 e^- \rightarrow PtO_2 + H_2O$	1,700
$PbO_2 + SO_4^{2-} + 4 H^+ + 2 e^- \rightarrow PbSO_4 + 2 H_2O$	1,690
$Ce^{4+} + e^- \rightarrow Ce^{3+}$	1,610
$MnO_4^- + 8 H^+ + 5 e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4 H_2O$	1,507
$Cl_2 + 2 e^- \rightarrow 2 Cl^-$	1,360
$HCrO_4^- + 7 H^+ + 3 e^- \rightarrow Cr + 4 H_2O$	1,350
$Cr_2O_7^{2-} + 14 H^+ + 6 e^- \rightarrow 2 Cr^{3+} + 7 H_2O$	1,330
$Br_2 + 2 e^- \rightarrow 2 Br^-$	1,065
$VO_2^+ + 2 H^+ + e^- \rightarrow VO^{2+} + H_2O$	1,000
$NO_3^- + 4 H^+ + 3 e^- \rightarrow NO + 2 H_2O$	0,960
$Hg^{2+} + 2 e^- \rightarrow Hg$	0,851
$Hg_2^{2+} + 2 e^- \rightarrow 2 Hg$	0,799
$Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$	0,799
$Fe^{3+} + e^- \rightarrow Fe^{2+}$	0,770
$I_2 + 2 e^- \rightarrow 2 I^-$	0,535
$Cu^+ + e^- \rightarrow Cu$	0,521
$Cu^{2+} + 2 e^- \rightarrow Cu$	0,337
$Bi^{3+} + 3 e^- \rightarrow Bi$	0,200
$Sn^{4+} + 2 e^- \rightarrow Sn^{2+}$	0,154
$Fe_3O_4 + 8 H^+ + 8 e^- \rightarrow 3 Fe + 4 H_2O$	0,085
$2 H^+ + 2 e^- \rightarrow H_2$	0,000
$Fe^{3+} + 3 e^- \rightarrow Fe$	-0,037
$Pb^{2+} + 2 e^- \rightarrow Pb$	-0,126
$CrO_4^{2-} + 4 H_2O + 3 e^- \rightarrow Cr(OH)_3 + 5 OH^-$	-0,130
$Sn^{2+} + 2 e^- \rightarrow Sn$	-0,136
$Fe_2O_3 + 6 H^+ + 6 e^- \rightarrow 2 Fe + 3 H_2O$	-0,160
$Ni^{2+} + 2 e^- \rightarrow Ni$	-0,250
$Co^{2+} + 2 e^- \rightarrow Co$	-0,277
$PbSO_4 + 2 e^- \rightarrow Pb + SO_4^{2-}$	-0,360
$Cd^{2+} + 2 e^- \rightarrow Cd$	-0,403
$Fe^{2+} + 2 e^- \rightarrow Fe$	-0,447

Reacció	E^0 (V) a 25 °C
$\text{Zn}^{2+} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Zn}$	-0,763
$\text{Cr}^{3+} + 3 \text{e}^- \rightarrow \text{Cr}$	-0,744
$\text{Fe}(\text{OH})_3 + \text{e}^- \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_2 + \text{OH}^-$	-0,560
$\text{Sb}^{3+} + 3 \text{e}^- \rightarrow \text{Sb}$	-0,510
$\text{CO}_2 + 2 \text{H}^+ + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{CO} + \text{H}_2\text{O}$	-0,110
$2\text{H}_2\text{O} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{H}_2 + 2 \text{OH}^-$	-0,827
$\text{Al}^{3+} + 3 \text{e}^- \rightarrow \text{Al}$	-1,662
$\text{Al}(\text{OH})_3 + 3 \text{e}^- \rightarrow \text{Al} + 3 \text{OH}^-$	-2,310
$\text{Mg}^{2+} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Mg}$	-2,370
$\text{Na}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Na}$	-2,710
$\text{Ca}^{2+} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Ca}$	-2,870
$\text{Ba}^{2+} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Ba}$	-2,910
$\text{Li}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Li}$	-3,040

7 Reaccions àcid-base

Taula 12: Constants d'acidesa d'alguns àcids a 25 °C

Àcid	K_a (mol dm ⁻³)	pK_a
Àcid perclòric (HClO ₄)	molt gran	-
Àcid clòric (HClO ₃)	molt gran	-
Àcid nítric (HNO ₃)	molt gran	-
Àcid iodhídric (HI)	molt gran	-
Àcid bromhídric (HBr)	molt gran	-
Àcid clorhídric (HCl)	molt gran	-
Àcid sulfúric (H ₂ SO ₄)	molt gran	-
Àcid hidrònic (H ₃ O ⁺)	1.00	0.00
Àcid tricloroacètic (CCl ₃ COOH)	5.9×10^{-2}	1.23
Àcid dicloroacètic (CHCl ₂ COOH)	1.40×10^{-2}	1.85
Àcid cloroacètic (CH ₂ ClCOOH)	1.30×10^{-3}	2.89
Àcid fluorhídric (HF)	6.46×10^{-4}	3.19
Àcid fòrmic (HCOOH)	1.77×10^{-4}	3.75
Àcid acètic (CH ₃ COOH)	1.80×10^{-5}	4.75
Àcid benzoic (C ₆ H ₅ COOH)	6.30×10^{-5}	4.19
Àcid carbonic (H ₂ CO ₃)	4.30×10^{-7}	6.37
Àcid sulfhídric (H ₂ S)	9.10×10^{-8}	7.04
Àcid cianhídric (HCN)	6.30×10^{-10}	9.31
Aigua (H ₂ O)	1.80×10^{-16}	15.76

Taula 13: Constants de basicitat d'algunes bases a 25 °C

Base	K_b (mol dm ⁻³)	pK_b
Ió òxid (O ²⁻)	molt gran	-
Ió hidrur (H ⁻)	molt gran	-
Ió amida (NH ₂ ⁻)	9.1×10^{-3}	2.04
Ió sulfur (S ²⁻)	5.9×10^{-3}	2.23
Ió hidrogen sulfur (HS ⁻)	3.7×10^{-4}	3.33
Ió fosfat (PO ₄ ³⁻)	5.4×10^{-4}	3.27
Ió hidrogen fosfat (HPO ₄ ²⁻)	2.1×10^{-5}	4.68
Metilamina (CH ₃ NH ₂)	4.19×10^{-4}	3.68
Dimetilamina ((CH ₃) ₂ NH)	5.4×10^{-4}	3.27
Trimetilamina ((CH ₃) ₃ N)	6.1×10^{-5}	4.75
Ió carbonat (CO ₃ ²⁻)	1.8×10^{-4}	3.75
Amoníac (NH ₃)	1.79×10^{-5}	4.75
Hidrazina (N ₂ H ₄)	9.8×10^{-7}	6.01
Piridina (C ₅ H ₅ N)	1.8×10^{-9}	8.75
Anilina (C ₆ H ₅ NH ₂)	4.3×10^{-10}	9.37

8 Enllaç i propietats moleculars

Taula 14: Moments dipolars i polaritzabilitats de molècules comunes.

Molècula	Moment Dipolar (D)	Polaritzabilitat (α , Å ³)
H ₂	0.00	0.80
He	0.00	0.20
Ar	0.00	1.64
Xe	0.00	4.04
N ₂	0.00	1.77
CO ₂	0.00	2.63
CO	0.11	1.98
HF	1.82	0.51
HCl	1.08	3.70
HBr	0.82	5.60
HI	0.42	7.10
CCl ₄	0.00	10.5
H ₂ O	1.85	1.48
NH ₃	1.47	2.26
CH ₄	0.00	2.60
C ₂ H ₅ OH	1.69	4.40
C ₆ H ₆	0.00	10.3
O ₂	0.00	1.60
SO ₂	1.63	4.00



Molècula	Moment Dipolar (D)	Polaritzabilitat (α , Å ³)
C ₃ H ₆ O	2.91	6.70




Taula 15: Propietats de diversos dissolvents: punts de congelació, punts d'ebullició i constants crioscòpiques i ebulloscòpiques.

Dissolvent	Fórmula	T_f (°C)	K_f (°C mol ⁻¹)	T_b (°C)	K_b (°C mol ⁻¹)
Aigua	H ₂ O	0	1.86	100	0.52
Benzè	C ₆ H ₆	5.5	5.12	80.1	2.53
Etanol	C ₂ H ₅ OH	-114.6	1.99	78.4	1.22
Àcid acètic	CH ₃ COOH	16.6	3.90	117.9	2.95
Tetraclorur de carboni	CCl ₄	-23		76.5	5.03
Cloroform	CHCl ₃	-63.5		61.7	3.63

9 Nomenclatura bàsica

Taula 16: Nomenclatura dels alcans

Àtoms de carboni	Nom	Estructura
1	metà	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{H} \end{array}$
2	età	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{H} - \text{C} - \text{C} - \text{H} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$
3	propà	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \quad \\ \text{H} - \text{C} - \text{C} - \text{C} - \text{H} \\ \quad \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \end{array}$
4	butà	CH ₃ — CH ₂ — CH ₂ — CH ₃
5	pentà	CH ₃ — CH ₂ — CH ₂ — CH ₂ — CH ₃
6	hexà	
7	heptà	

Àtoms de carboni	Nom	Estructura
8	octà	
9	nonà	
10	decà	

10 Enllaços d'interès

A part de les referències incloses en aquest document, es pot trobar més informació rellevant en les següents fonts:

- Sobre els errors en les mesures i la seva propagació: [4].

Referències

- [1] Geoffrey M. Bowers i Ruth A. Bowers. Understanding Chemistry through Cars. en. CRC Press, nov. de 2014. ISBN: 978-1-4665-7184-6. DOI: [10.1201/b17581](https://doi.org/10.1201/b17581). URL: <https://www.taylorfrancis.com/books/9781466571846>.
- [2] J. Cox, D. Wagman i V. Medvedev. "CODATA key values for thermodynamics". A: 1989. URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/CODATA-key-values-for-thermodynamics-Cox-Wagman/c2c548403f0478b44fb007d0b0d2acb313aeb3> (cons. 22-02-2025).
- [3] David R Lide et al. CRC Handbook of Chemistry and Physics. en. Boca Raton, FL: CRC Press, 2005.
- [4] Vern Lindberg. Uncertainties and Error Propagation. 2000. URL: <http://www.geol.lsu.edu/jlorenzo/geophysics/uncertainties/Uncertaintiespart1.html> (cons. 22-02-2025).