

Appunti di Analisi 1

UNIPD - Federico Cacciafesta (Modulo A)
UNIPD - Giulia Treu (Modulo B)

FILIPPO GARGIULO

Ottobre 2025 - Giugno 2026

Indice

I	Modulo A	3
1	Numeri Reali	3
1.1	Intervalli	3
1.2	Principio di archimede e densità	6
1.3	Topologia della retta	7
1.4	Funzioni reali di variabile reale	10
2	Successioni	12
2.1	Limiti di Successioni	12
2.2	Teoremi di confronto	13
2.3	Algebra dei limiti	14
2.4	Calcolo di forme indeterminate	17
2.4.1	Limiti notevoli e criteri utili	18
2.4.2	Numero di Nepero	21
2.5	Bolzano-Weierstrass e Complementi di Analisi	24
2.6	Successioni definite per ricorrenza	26
3	Limiti di Funzione	28
3.1	Continuità	29
3.2	Limiti destro e sinistro	30
3.3	Calcolo dei limiti	31
4	Continuità	33
4.1	Funzioni continue definite su intervalli	33
4.2	Classificazione delle discontinuità	35
4.3	Complementi sulla continuità	35
4.4	Ordini di infinitesimo	40
5	Calcolo Differenziale	42
5.1	regole di derivazione	44
5.2	Proprietà locali e teoremi sulle derivate	45
5.3	Conseguenze del Teorema di Lagrange	48
5.4	Convessità	50

II	Modulo B	52
6	Calcolo Differenziale - continuato	52
6.1	Teorema di De l'Hôpital	52
6.2	I polinomi di Taylor/McLaurin	54
6.3	Il resto di Lagrange	57
7	Serie numeriche	58
7.1	Criteri elementari: asintotico, radice e rapporto	61
7.2	Criteri avanzati: condensazione, Abel-Dirichlet e Leibniz	63
7.3	Commutatività	67
7.4	Prodotto di Cauchy	70
8	Integrali di Riemann	73
8.1	Partizioni e definizione	73

Parte I

Modulo A

§1 Numeri Reali

Definizione 1.1 (Numeri Reali). Una sezione di Dedekind è una coppia (A, B) di sottoinsiemi di $\mathbb{Q}$ non vuoti e tali che:

- $A \cap B = \emptyset$.
- $A \cup B = \mathbb{Q}$.
- $\forall a \in A, \forall b \in B, \quad a \leq b$.

Allora definiamo $\mathbb{R}$ come l'insieme di tutte le sezioni di Dedekind.

In realtà in modo rigoroso le sezioni di dedekind andrebbero introdotte in modo vagamente diverso:

Definizione 1.2 (Sezioni di Dedekind). Una sezione di Dedekind di $\mathbb{Q}$ è un sottoinsieme $A \subseteq \mathbb{Q}$ tale che:

- Se $b \in A$ e $a \leq b$, allora $a \in A$.
- A è superiormente limitato.
- $A \neq \emptyset$.
- A non ha un massimo.

Che rende un po' più agili le dimostrazioni di alcune proprietà interessanti di $\mathbb{R}$, come l'ordinamento totale, la somma, la densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$, il principio di archimede e l'assioma di Dedekind.

Proposizione 1.3 (Assioma di Dedekind)

Siano A e B due sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ tali che per ogni $a \in A$ e $b \in B$ vale:

$$a \leq b$$

allora esiste sempre un numero reale x tale che per ogni $a \in A$ e $b \in B$ vale:

$$a \leq x \leq b$$

Si noti che questa è la proprietà più caratteristica di $\mathbb{R}$, ed è quella che lo rende un campo completo, infatti su $\mathbb{Q}$ questo non è vero.

Si può dimostrare in modo più o meno lungo e più o meno intuitivo (ma sicuramente molto fondativo) che i reali sono un campo. Per riferimento c'è il capitolo delle dispense della normale o gli appunti di complementi di analisi.

§1.1 Intervalli

Definizione 1.4 (intervallo limitato). Un *intervallo* di $\mathbb{R}$ è un sottoinsieme $I \subseteq \mathbb{R}$ tale che per ogni $x, y \in I$ se $x < t < y$ allora $t \in I$.

Gli intervalli limitati possono essere:

- chiusi $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$
- aperti $]a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$

Definizione 1.5. Diamo alcune definizioni utili. Se $[a, b]$ è un intervallo, si dicono:

- a, b estremi,
- $a - b$ ampiezza,
- $\frac{b-a}{2}$ raggio,
- $\frac{b+a}{2}$ centro.

Definizione 1.6 (Retta Reale Estesa). Definiamo come $\pm\infty$ oggetti tali che $\forall x \in \mathbb{R}$

$$-\infty < x < +\infty$$

quindi definiamo la retta reale estesa come $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$.

Definizione 1.7 (Intervalli illimitati). Chiamiamo intervalli illimitati gli insiemi del seguente tipo:

$$\begin{aligned}]-\infty, a] &= \{x \in \mathbb{R} \mid a \geq x\} \\ [a, \infty[&= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x\}. \end{aligned}$$

Definizione 1.8 (Limitatezza superiormente e inferiormente). Un sottoinsieme A di $\mathbb{R}$ si dice limitato se esistono due numeri $m, M \in \mathbb{R}$ tali che per ogni $x \in A$:

$$m \leq x \leq M$$

Se esiste solo M l'insieme si dice superiormente limitato, se esiste solo m l'insieme si dice inferiormente limitato.

Definizione 1.9 (Massimo e Minimo). Sia $A \subseteq \mathbb{R}$. Un maggiorante di A che appartiene ad A si dice massimo di A . Un minorante di A che appartiene ad A si dice minimo di A . Si scrive

$$\begin{aligned} M &= \max(A) \\ m &= \min(A) \end{aligned}$$

Definizione 1.10 (Maggioranti e Minoranti). Sia A un sottoinsieme di $\mathbb{R}$. Un elemento M si chiama maggiorante di A se per ogni $x \in A$ vale $x \leq M$. Analogamente si definisce il minorante.

Definizione 1.11 (Estremo superiore e inferiore). Sia $A \subseteq \mathbb{R}$. Un elemento $S \in \mathbb{R}$ si dice estremo superiore di A se S è il minimo dell'insieme dei maggioranti di A . Analogamente si definisce l'estremo inferiore. Si scrive:

$$\begin{aligned} S &= \sup(A) = \min(\{x \in \mathbb{R} \mid \forall a \in A, a \leq x\}) \\ s &= \inf(A) = \max(\{x \in \mathbb{R} \mid \forall a \in A, a \geq x\}) \end{aligned}$$

Osservazione 1.12. Se esistono massimo e minimo, sono unici.

Osservazione 1.13. Se A ammette max, allora $\max(A) = \sup(A)$. Analogamente vale per l'inf.

Non sempre massimo e minimo esistono, ma per gli insiemi dei maggioranti e dei minoranti sì.

Teorema 1.14 ($\mathbb{R}$ è completo)

Ogni $A \subseteq \mathbb{R}$ superiormente limitato, ammette sup. Analogamente vale per l'inf.

Dimostrazione. Sia $A \subseteq \mathbb{R}, A \neq \emptyset$. Sia M_A l'insieme dei maggioranti, dato che A è superiormente limitato M_A è non vuoto. Inoltre per ogni $M \in M_A$ e $a \in A$ vale $a \leq M$ dunque per l'assioma di Dedekind esiste un elemento ξ tale che:

$$a \leq \xi \leq M$$

e dunque è proprio il minimo dell'insieme M_A . □

IN $\mathbb{Q}$ QUESTO NON È VERO!!

Infatti possiamo dare la definizione seguente:

Definizione 1.15 (Campo ordinato). Un campo ordinato è un campo K dotato di un ordinamento totale $\leq$ tale che per ogni $x, y, z \in K$:

- $x \geq y$ implica $x + z \geq y + z$.
- $z, y \geq 0_K$ implica $x \cdot y \geq 0_K$.

Definizione 1.16 (Campo Ordinato Completo). Si dice ordinato completo un campo ordinato in cui ogni sottoinsieme non vuoto e ordinato limitato superiormente (o inferiormente) ha sup.

Possiamo caratterizzare $\mathbb{R}$ come l'unico campo ordinato completo (a meno di isomorfismi). Per approfondire si guardi Complementi di Matematica della SNS.

Lemma 1.17 (Definizione Alternativa di sup e inf)

Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto e superiormente (inferiormente) limitato. Allora:

$$S = \sup(A) = \begin{cases} S \geq a, \forall a \in A \\ \forall \varepsilon > 0, \exists a \in A \mid a > S - \varepsilon \end{cases}$$

analogamente vale per l'inf, ma con $a < s + \varepsilon$:

$$s = \inf(A) = \begin{cases} s \leq a, \forall a \in A \\ \forall \varepsilon > 0, \exists a \in A \mid a < s + \varepsilon \end{cases}$$

Dimostrazione. Dimostriamo il lemma per il sup, tenendo conto che per l'inf è uguale. Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ e S il suo sup. Allora per la definizione di sup abbiamo

$$S = \min(\{x \in \mathbb{R} \mid \forall a \in A, x \geq a\})$$

quindi scegliamo un $\varepsilon > 0$ e consideriamo $S - \varepsilon$. Abbiamo che

$$S - \varepsilon < S < a \quad \forall a \in A$$

dunque avremo anche che

$$S - \varepsilon \neq S,$$

dunque se per assurdo $S - \varepsilon$ appartenesse all'insieme dei maggioranti di A , esso avrebbe due minimi distinti, assurdo. Dunque $S - \varepsilon$ non è un maggiorante di A , ovvero (dato che l'ordinamento di $\mathbb{R}$ è totale) deve esistere almeno un elemento di A tale che $a > S - \varepsilon$. $\square$

§1.2 Principio di archimede e densità

Teorema 1.18 (Principio di Archimede)

Siano $a, b \in \mathbb{R}$ con $a > 0$, allora esiste un $n \in \mathbb{N}$ tale che

$$na > b$$

Dimostrazione. Fissiamo $a \in \mathbb{R}$ con $a > 0$, supponiamo per assurdo che l'insieme A formato dai numeri della forma na sia limitato superiormente. Allora sia S il sup di A , usando la definizione operativa di sup abbiamo che $\forall \varepsilon > 0$ esiste un elemento xa di A tale che:

$$S - \varepsilon < xa$$

in particolare quindi scegliamo $\varepsilon = a$ e otteniamo

$$S - a < xa \iff S < (x+1)a$$

assurdo in quanto $S = \sup(A)$, e $(x+1)a \in A$. $\square$

Teorema 1.19 (Densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$)

Presi $a, b \in \mathbb{R}$ (WLOG $a > b$) esiste sempre un numero razionale r tale che:

$$a > r > b$$

Dimostrazione. Ci riduciamo prima di tutto a dimostrare che vi sono sempre almeno due numeri naturali $p, q \in \mathbb{N}$ tali che

$$qa < p < qb$$

notiamo che questo sarebbe verificato se $qb - qa > 1$, infatti se così fosse avremmo $qa < \lceil qa \rceil < qa + 1 < qb$ dunque $\lceil qa \rceil$ è intero e soddisfa le richieste. D'altro canto è vero che possiamo sempre trovare un $q \in \mathbb{N}$ tale che

$$q(a - b) > 1$$

per il principio di archimede, e dunque questo conclude la dimostrazione. $\square$

§1.3 Topologia della retta

Definizione 1.20 (Sottoinsieme aperto). Un $A \subseteq \mathbb{R}$ si dice *aperto* se è unione numerabile di intervalli aperti (da entrambi i lati). Ovvero

$$\exists I_a, I_a \text{ aperti} : A = \bigcup_a I_a$$

Calibriamo un attimo questa definizione con un po' di esempi di insiemi aperti

- $\mathbb{R} =]-\infty, \infty[$
- $\emptyset$
- $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$
- $\mathbb{R}^* = \mathbb{R}/\{0\}$

Definizione 1.21 (Topologia). L'insieme dei sottoinsiemi aperti di un insieme è la sua topologia.

Definizione 1.22 (Sottoinsieme chiuso). Un sottoinsieme $A \subseteq \mathbb{R}$ si dice *chiuso* se il suo complementare è aperto.

anche qui facciamo un po' di esempi:

- $\mathbb{R}$ è chiuso.
- $\emptyset$ è chiuso.
- $[a, b]$ è chiuso.
- $\{x\}$ è chiuso.
- $[a, \infty[$ è chiuso.

Intuitivamente il modo di visualizzare gli insiemi aperti è il seguente:

Proposizione 1.23 (Caratterizzazione degli insiemi aperti)

Un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ è aperto se per ogni $x \in A$ esiste un $\varepsilon > 0$ tale che $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subseteq A$.

Osserviamo che l'insieme $A = [0, 1[$ non è aperto, perchè se scegliamo come $x = 0$ non possiamo trovare un intorno di x completamente incluso in A . Tuttavia A non è neanche chiuso, perchè il suo complementare è unione di intervalli aperti, dunque A non è né aperto né chiuso.

Lemma 1.24 (Proprietà degli aperti)

Per gli insiemi aperti valgono le seguenti proprietà:

1. $\mathbb{R}$ e $\emptyset$ sono aperti.
2. Se $A_1, \dots, A_n$ sono finiti sottoinsiemi aperti, allora anche la loro intersezione è aperta.
3. Se $A_1, \dots, A_n, \dots$ sono (anche infiniti) sottoinsiemi aperti, allora anche la loro unione è aperta.

Osservazione 1.25. L'intersezione infinita di aperti non è necessariamente aperta, infatti:

$$A = \bigcap_{n \geq 1} \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n} \right) = \{0\}$$

Dimostrazione. Sicuramente $0 \in]-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}[$ per ogni $n \in \mathbb{N}^*$. Inoltre non esiste alcun numero minore di 0 tale che

$$k > -\frac{1}{n}$$

per ogni $n \in \mathbb{N}^*$ analogamente si ha per i numeri maggiori di 0. $\square$

Lemma 1.26 (Proprietà dei chiusi)

Per gli insiemi chiusi valgono le seguenti proprietà:

1. $\emptyset, \mathbb{R}$ sono chiusi.
2. L'intersezione infinita di chiusi è chiusa.
3. Unione infinita di chiusi non è necessariamente chiusa.

$\mathbb{Q}$ è aperto o chiuso? Sicuramente non può essere chiuso, perchè se così fosse $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ dovrebbe essere aperto, ma ciò è assurdo per la densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$. Ma d'altro canto non può essere aperto, perchè altrimenti dovrebbe contenere un intervallo di numeri reali, ma ciò è assurdo sempre per la densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$.

Esempio 1.27

L'insieme

$$X = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^* \right\}$$

è aperto o chiuso?

Chiaramente non può essere aperto. Per chiederci se sia chiuso prendiamo il suo complementare, e notiamo che considerando un intervallino di ampiezza ε centrato in 0, non importa quanto esso sia piccolo, conterrà sempre almeno un elemento di X , dunque non potrà essere tutto contenuto in $\mathbb{R} - X$, e dunque X non può essere aperto. Se consideriamo tuttavia l'insieme $X \cup \{0\}$, questo è chiuso.

Definizione 1.28 (Intorno). Sia $x_0 \in \mathbb{R}$, un intorno di x_0 è un qualunque sottoinsieme di $\mathbb{R}$ che contiene un aperto che contiene x .

Per quanto ci riguarda tuttavia possiamo benissimo trattare un intorno come un intervallo aperto che contiene x_0 . In particolare gli intorni di $\pm\infty$ sono intervalli illimitati rispettivamente a destra o sinistra. L'insieme di tutti gli intorni di un elemento x_0 è $\mathcal{I}_{x_0}$

Definizione 1.29 (Intorno Sferico). Se $x_0 \in \mathbb{R}$ chiamiamo intorno sferico di x_0 con raggio r l'insieme $I_r(x_0) =]x_0 - r, x_0 + r[$.

Proposizione 1.30 (Gli intorni sferici non fanno perdere generalità)

Preso comunque un intorno U di x_0 esiste un intorno sferico di x_0 contenuto in esso.

Dimostrazione. Assumiamo la definizione semplificata di intorno. Sia quindi $]a, b[$ un intorno di x_0 . WLOG $|x_0 - a| < |x_0 - b|$ allora semplicemente l'intorno I_a è un intorno sferico contenuto in $]a, b[$. $\square$

Definizione 1.31 (Intorno destro/sinistro). Si definiscono intorni destri/sinistri di $x_0 \in \mathbb{R}$ gli intervalli aperti aventi come estremo superiore/inferiore x_0 . In particolare gli intorni destri/sinistri non sono strettamente intorni.

Proposizione 1.32 (Proprietà di separazione)

Siano $x, y \in \overline{\mathbb{R}}$. Esistono due insiemi $U \in \mathcal{I}_x, V \in \mathcal{V} : y$ tali che $U \cap V = \emptyset$.

Questo è banale da dimostrare per la topologia che abbiamo definito qui, ma non è scontato che valga su qualunque topologia.

Definizione 1.33 (Punti Interni/Esterni/Bordo). Classifichiamo i punti di $\mathbb{R}$ rispetto ad un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ nel seguente modo:

- Si dice che x è *interno* ad A se esiste $U \in \mathcal{I}_x : U \subseteq A$. L'insieme dei punti interni di A si denota con $\dot{A}$.
- Si dice che x è *esterno* ad A se esiste $U \in \mathcal{I}_x : U \cap A = \emptyset$.
- Se x non è nè interno nè esterno si dice *di frontiera* o *di bordo*. L'insieme dei punti di frontiera di A si denota con ∂A .

Definizione 1.34 (Punti Isolati/Aderenti/Accumulazione). Sia $A \subseteq \mathbb{R}$, allora:

- Si dice che $x \in A \subseteq \mathbb{R}$ si dice *isolato* se e solo se esiste un suo intorno U tale che $U \cap A = \{x\}$.
- Sia $x \in \overline{\mathbb{R}}$ si dice che x è *aderente* ad A se per ogni intorno U di x l'intersezione tra U e A non è mai vuota. L'insieme dei punti di aderenza si chiama *chiusura* o *aderenza* e si denota con $\overline{A}$ (non a caso, la chiusura di $\mathbb{R}$ è proprio $\overline{\mathbb{R}}$).
- Dato $x \in \overline{\mathbb{R}}$ si dice che x è un *punto di accumulazione* per A se per ogni intorno U di x :

$$(U \setminus \{x\}) \cap A \neq \emptyset$$

Osservazione 1.35. Queste definizioni si confondono molto tra loro, notiamo le seguenti distinzioni:

- Un punto aderente o è isolato o è di accumulazione.
- Punto di frontiera implica punto aderente.
- Punto di accumulazione implica punto aderente.
- Punto interno implica punto aderente.

Proposizione 1.36 (Definizioni equivalente di punto di accumulazione)

Se $A \subseteq \mathbb{R}$ con infiniti elementi, e $x \in \overline{\mathbb{R}}$ è un punto di accumulazione di A , ogni intorno di x contiene infiniti elementi di A .

Denotiamo con $\text{Acc}(A)$ l'insieme dei punti di accumulazione di A .

§1.4 Funzioni reali di variabile reale

Da qui in poi dominio e codominio di tutte le funzioni sono intesi come sottoinsiemi di $\mathbb{R}$.

Definizione 1.37 (Composizione). Definiamo la composizione tra due funzioni $f : X \rightarrow Y$ e $g : V \rightarrow W$ tali che $Y \cap V \neq \emptyset$ come:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

a questo scopo il simbolo di composizione si può leggere come "dopo", ovvero si legge la scrittura sopra come " f dopo g ".

Definizione 1.38 (Dominio Naturale). Data una funzione $f : X \rightarrow Y$ chiamiamo *dominio naturale* il più grande sottoinsieme di $\mathbb{R}$ tale che nei suoi elementi il valore assunto da f è ben definito.

Definizione 1.39 (Monotonicità). Una funzione $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ si dice *monotonamente crescente* sse

$$x_1 > x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2)$$

analogamente f è *monotonamente decrescente* sse

$$x_1 > x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2).$$

Sono *strettamente* crescenti o decrescenti se al posto dei maggiore o uguale/minore o uguale mettiamo maggiori e minori stretti.

Lemma 1.40 (Composizione di funzioni monotone)

sia f monotonamente crescente e g monotonamente decrescente. Allora $f \circ f$ e $g \circ g$ sono monotonamente crescenti, mentre $f \circ g$ e $g \circ f$ sono monotonamente decrescenti.

Lemma 1.41 (Inversa di funzioni monotone)

Se f è invertibile e monotona, f^{-1} è a sua volta monotona dello stesso tipo.

Definizione 1.42 (funzioni pari e dispari). Se $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ si dice:

- *pari* una funzione tale che $f(x) = f(-x)$ per ogni $x \in D$.
- *dispari* una funzione tale che $f(-x) = -f(x)$ per ogni $x \in D$.

Definizione 1.43 (Funzioni Periodiche). Sia $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione non costante. Allora f si dice *periodica* se $\exists T > 0$:

- Se $x \in D$ allora $x + T, x - T \in D$.
- $f(x) = f(x + T) = f(x - T)$ per ogni $x \in D$.

Definizione 1.44 (Funzione Limitata). Sia $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, f si dice *limitata* se $\text{Im}(f) \subseteq \mathbb{R}$ è un sottoinsieme limitato.

Definizione 1.45 (Sup e Inf di una funzione). Sia $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, si dicono *sup*, *inf*, *max* e *min* i *sup*, *inf*, *max* e *min* dell' $\text{Im}(f)$. Se esistono *max*/*min* della funzione si dicono *estremi* di f . In particolare

- Se $\exists x_M : f(x_M) = M = \max(f)$ allora x_M è detto punto di massimo di f .
- Se $\exists x_m : f(x_m) = m = \min(f)$ allora x_m è detto punto di minimo di f .

Definizione 1.46 (Funzioni + e -). Si definiscono le funzioni

$$x^+ := \max(x, 0)$$

$$x^- := -\min(x, 0)$$

§2 Successioni

Definizione 2.1 (Alcuni Avverbi). Sia $P(n)$ un predicato definito sui numeri naturali. Si dice che

- Un'affermazione è *definitivamente* vera se esiste un valore n_0 tale che per ogni $n \geq n_0$, $P(n)$ è vera.
- Un'affermazione è *frequentemente* vera se per ogni $n \in \mathbb{N}$ esiste un $n' > n$ tale che $P(n')$ è vera.

Proposizione 2.2 (Proposizioni definitivamente vere contemporaneamente)

Se $P_1, P_2, \dots, P_n$ è definitivamente vera, allora anche $P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n$ è definitivamente vera.

Definizione 2.3 (Successione). Si dice successione una qualunque applicazione definita su una semiretta di $\mathbb{N}$. Se il codominio è l'insieme A si dice che la successione è a valori in A , o che è una successione di elementi di A . Denoteremo con $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tutta la successione, e a_n l'elemento n -esimo della successione.

Definizione 2.4. Si dice sottosuccessione (o successione estratta) della successione $\{a_n\}$ la composizione $f \circ k$ con la funzione f che definisce la successione, di una qualunque funzione

$$k : S \subseteq \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

monotonamente crescente e definita su S semiretta.

Cominciamo a dimostrare alcune proprietà sulle successioni

Proposizione 2.5 (Definitivamente limitata implica limitata)

Sia $\{a_n\}$ una successione tale che esiste una costante $M \in \mathbb{R}$ tale che definitivamente vale $a_n < M$ allora $\{a_n\}$ è limitata.

Dimostrazione. Chiaramente esiste un n_0 tale che per $n \geq n_0$ abbiamo $a_n \leq M$. A questo punto consideriamo l'insieme degli elementi fino ad n_0 , esso è un insieme finito di numeri naturali, dunque avrà un massimo M' . Dunque se prendiamo $\max(M, M')$ abbiamo un maggiorante della successione. $\square$

§2.1 Limiti di Successioni

Definizione 2.6 (Limite). Diciamo che la successione $\{a_n\}$ ha limite $l \in \overline{\mathbb{R}}$ se

$$\forall U \in \mathcal{I}_l, \exists V \in \mathcal{I}_{+\infty} : \forall n \in V \cap \mathbb{N}, a_n \in U$$

Definizione 2.7 (Convergenza/Divergenza). Diamo le seguenti definizioni:

- Se il limite di $\{a_n\}$ è un numero reale, essa si dice *convergente*. Se in particolare $l = 0$ la successione si dice *infinitesima*.
- Se il limite di una successione è uno tra $\pm\infty$, allora la successione si dice *divergente* e *regolare*, se non ha limite si dice *irregolare*.

Diamo una definizione equivalente di limite.

Proposizione 2.8 (Definizione del Liceo di Limite)

Una successione $\{a_n\}$ converge se e solo se

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon : \forall n \geq n_\varepsilon \quad |a_n - l| < \varepsilon.$$

Una successione $\{a_n\}$ diverge a $+\infty$ (rispettivamente a $-\infty$) se e solo se:

$$\forall M > 0, \exists n_M : \forall n \geq n_M \quad a_n \geq M$$

(analogamente si ha per $-\infty$).

Teorema 2.9 (Unicità del limite)

Se una successione ha un limite l , allora questo è unico.

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che esistano due valori l_1 ed l_2 che soddisfano la definizione di limite. Per il teorema di separazione posso scegliere due intorno $U_1 \cap U_2 = \emptyset$. Allora per la definizione di limite a_n deve appartenere definitivamente a U_1 , e definitivamente a U_2 . Dunque deve appartenere all'intersezione, il che è assurdo. $\square$

Proposizione 2.10 (Successione convergente implica sottosuccessioni convergenti)

Sia $\{a_n\} : a_n \rightarrow l$. Allora ogni sua sottosuccessione converge a l .

Dimostrazione. Prendiamo un intorno del limite $U \in \mathcal{I}_l$. Sia $\{a_{k_n}\}$ una sottosuccessione. Allora per definizione $k_n \geq n$ dunque se a_n appartiene definitivamente a U , anche a_{k_n} apparterrà definitivamente a U . Dunque la sottosuccessione converge. $\square$

Equivalentemente vale la contronominale:

Proposizione 2.11 (Criterio di non convergenza)

Se una successione ha almeno due sottosuccessioni che non convergono (o che convergono a limiti diversi), allora non converge.

Ci chiediamo allora adesso se data una successione che non converge esistono sempre due sottosuccessioni che convergono a due limiti diversi. Approfondiremo la questione poi.

§2.2 Teoremi di confronto**Proposizione 2.12** (Convergente implica limitato)

Sia $\{a_n\}$ una successione convergente. Allora $\{a_n\}$ è limitata.

Dimostrazione. Per la definizione di limite la successione è definitivamente limitata, ma questo per quanto dimostrato prima in 2.5 ci dà immediatamente la tesi. $\square$

Teorema 2.13 (Permanenza del segno)

Se una successione $a_n \rightarrow l \neq 0$ allora a_n ed l hanno definitivamente lo stesso segno.

Dimostrazione. Per definizione di limite possiamo scegliere un $|l| > \varepsilon > 0$ tale che la successione definitivamente appartenga a $(l - \varepsilon, l + \varepsilon)$, ma tutti i numeri in questo intervallo hanno lo stesso segno di l , e dunque in particolare anche tutti gli a_n avranno lo stesso segno. $\square$

Proposizione 2.14 (Confronto all'infinito)

Siano $\{a_n\}, \{b_n\}$ due successioni tali che $a_n \leq b_n$ definitivamente. Allora se a_n diverge a ∞ , anche b_n diverge a ∞ .

Dimostrazione. Consideriamo un intorno di infinito $U \in (k, \infty)$, allora se a_n appartiene definitivamente a U anche b_n appartiene definitivamente ad U (poichè $k < a_n \leq b_n \implies k < b_n$). Dunque anche b_n divergerà come richiesto. $\square$

Teorema 2.15 (Teorema dei carabinieri)

Siano $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ tre successioni tali che

- Definitivamente vale $a_n \leq b_n \leq c_n$.
- Vale $a_n \rightarrow l$ e $b_n \rightarrow l$ per qualche $l \in \overline{\mathbb{R}}$.

Allora anche $b_n \rightarrow l$.

Dimostrazione. Il caso $l = \pm\infty$ è stato dimostrato in 2.14. Prendiamo quindi $l \in \mathbb{R}$. Fissiamo un intorno di $(l - \varepsilon, l + \varepsilon) = U \in \mathcal{I}_l$ tale che $a_n, b_n \in U$ definitivamente (possiamo sempre farlo in quanto definitivamente entrambe le successioni appartengono a tutti gli intorni). Allora valgono sicuramente

$$l - \varepsilon < a_n$$

$$c_n < l + \varepsilon$$

e quindi mettendo insieme tutte le disuguaglianze che abbiamo, otteniamo che definitivamente:

$$l - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < l + \varepsilon$$

che era quanto volevamo mostrare. $\square$

§2.3 Algebra dei limiti

Anzitutto dobbiamo capire come funziona l'algebra di $\overline{\mathbb{R}}$. Per ogni $x \in \overline{\mathbb{R}}$ abbiamo

- $x + (+\infty) = +\infty$ per tutti gli $x > -\infty$.
- $x + (-\infty) = -\infty$ per tutti gli $x < +\infty$.
- $x \cdot (\pm\infty) = \pm\infty$ per tutti gli $x > 0$.

- $x \cdot (\pm\infty) = \mp\infty$ per tutti gli $x < 0$.

Restano fuori le somme tra infiniti diversi, e il prodotto tra 0 e $\pm\infty$. Tuttavia il nostro obbiettivo è quello di definire un'algebra su $\mathbb{R}$ che ci permetta di "distribuire" i limiti di successione; per questo non possiamo attribuire un significato univoco ai prodotti sopra, perché esistono successioni che danno risultati diversi quando moltiplicate, nonostante convergano agli stessi valori. Dunque le operazioni sopra sono dette **forme indeterminate**. Formalizziamo quindi quanto fatto finora:

Teorema 2.16 (Algebra dei limiti - somme e prodotti non indeterminati)

Siano $\{a_n\}, \{b_n\}$ due successioni e $l_a, l_b \in \mathbb{R}$ i loro limiti. Allora

- Se ha senso^a l'espressione $l_a + l_b$ allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = l_a + l_b$$

- Se ha senso^a l'espressione $l_a l_b$ allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = l_a l_b$$

^a ovvero, non è una forma indeterminata.

Dimostrazione. Per definizione di limite abbiamo che per ogni $\varepsilon > 0$ valgono definitivamente

$$|a_n - l_a| < \varepsilon$$

$$|b_n - l_b| < \varepsilon$$

dunque sommando e applicando la disuguaglianza triangolare

$$|(a_n + b_n) - (l_a + l_b)| \leq |a_n - l_a| + |b_n - l_b| < 2\varepsilon$$

che è equivalente alla prima tesi.

Per dimostrare la seconda tesi come prima partiamo dal fatto che definitivamente, per ogni $\varepsilon > 0$ valgono:

$$|a_n - l_a| < \varepsilon$$

$$|b_n - l_b| < \varepsilon$$

tuttavia in questo caso vogliamo stimare dall'alto la quantità

$$|a_n b_n - l_a l_b|$$

per fare ciò sommiamo e sottraiamo una quantità conveniente, ovvero

$$|a_n b_n - l_a l_b| = |(a_n - l_a)(b_n - l_b) + l_a b_n + l_b a_n - 2l_a l_b| = |(a_n - l_a)(b_n - l_b) + l_a(b_n - l_b) + l_b(a_n - l_a)|$$

a questo punto applicando la disuguaglianza triangolare

$$|a_n b_n - l_a l_b| = \dots \leq |(a_n - l_a)(b_n - l_b)| + |l_a(b_n - l_b)| + |l_b(a_n - l_a)|$$

ma ora usando il fatto che il modulo distribuisce sui prodotti, e che $a_n - l_a$ e $b_n - l_b$ sono in modulo boundati da ε , come sopra, otteniamo

$$|a_n b_n - l_a l_b| = \dots \leq \varepsilon^2 + \varepsilon(|l_a| + |l_b|)$$

che chiaramente tende a 0 ed è sempre positivo per ε che tende a 0, quindi abbiamo esattamente la tesi. $\square$

In realtà possiamo fare di meglio, in effetti se una delle due successioni non ha limite possiamo dire

Proposizione 2.17 (infinito + limitato = infinito)

Se $a_n \rightarrow \infty$ e b_n è limitata inferiormente, allora $a_n + b_n \rightarrow \infty$. Analogamente vale se una successione tende a $-\infty$ e l'altra è limitata superiormente.

Dimostrazione. Per ogni $n \in \mathbb{N}$ abbiamo che

$$a_n + b_n \geq a_n + m$$

con m un minorante di b_n . Allora chiaramente $a_n + m$ converge a più infinito, dunque per il 2.14 abbiamo finito. $\square$

Proposizione 2.18 (infinitesimo per limitata uguale infinitesimo)

Sia a_n una successione limitata e b_n una successione infinitesima, allora la successione $a_n b_n$ è infinitesima.

Dimostrazione. Sia $M \in \mathbb{R}$ tale che per ogni $n \in \mathbb{N}$:

$$|b_n| \leq M$$

allora possiamo boundare

$$-Ma_n \leq a_n b_n \leq Ma_n$$

ma le successioni a destra e a sinistra vanno chiaramente a 0, quindi per il teorema dei carabinieri (2.15) anche $a_n b_n$ tenderà a 0. $\square$

Parliamo ora del quoziente. Non possiamo direttamente definire delle operazioni tra elementi di $\overline{\mathbb{R}}$ come prima, abbiamo prima bisogno di:

Definizione 2.19 (Segno di una successione rispetto al limite). Sia $l \in \mathbb{R}$. Si dice che

$$a_n \rightarrow l^+$$

(rispettivamente l^-) se $a_n \rightarrow l$ e definitivamente $a_n > l$ (rispettivamente $a_n < l$).

quindi abbiamo finalmente i seguenti risultati, che enunciamo senza dimostrazione:

Proposizione 2.20 (Algebra dei limiti - inversi)

Se $a_n \rightarrow l \in \overline{\mathbb{R}}$ allora

- Se $l = \pm\infty$ allora $\frac{1}{a_n} \rightarrow 0^\pm$.
- Se $l \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ allora $\frac{1}{a_n} \rightarrow \frac{1}{l}$
- Se $l = 0^\pm$ allora $\frac{1}{a_n} \rightarrow \pm\infty$
- Se $l = 0$ ma non ha segno, allora $\frac{1}{a_n}$ è irregolare.

Proposizione 2.21 (Algebra dei limiti - quozienti non indeterminati)

Siano a_n, b_n due successioni con limiti l_a, l_b allora il limite della successione

$$\frac{a_n}{b_n} \rightarrow l$$

- $l = \pm\infty$ se $a_n \rightarrow \pm\infty$ e $b_n \rightarrow 0^\mp$.
- $l = 0^\pm$ se $a_n \rightarrow 0^\mp$ e $b_n \rightarrow \pm\infty$.

§2.4 Calcolo di forme indeterminate

Partiamo dai limiti di polinomi. A questo punto sono abbastanza facili da calcolare, in quanto ci basterà un fatterello e l'algebra dei limiti

Proposizione 2.22 (Limiti di monomi)

Sia $a_n = n^k$ con $k \in \mathbb{N}^*$ allora $a_n \rightarrow \infty$.

Dimostrazione. Per induzione nel modo che ti aspetteresti. □

a questo punto sappiamo calcolare il limite di tutti i monomi grazie a 2.16. Se proviamo a calcolare il limite di un polinomio per ora otteniamo semplicemente una forma indeterminata del tipo $\infty - \infty$ (a meno che tutti i coefficienti non abbiano lo stesso segno, in quel caso possiamo usare semplicemente l'algebra dei limiti).

L'idea è cercare il termine dominante, scriviamo

$$P(n) = \sum_{i=0}^k c_i n^i = c_k n^k + \sum_{i=0}^{k-1} c_i n^i = c_k n^k \left(1 + \sum_{i=0}^{k-1} \frac{c_i}{c_k n^{k-i}} \right)$$

ma adesso sì che possiamo applicare l'algebra dei limiti, perchè tutti i monomi ai denominatori vanno all'infinito, quindi i loro inversi vanno tutti a 0. Tutti i termini della sommatoria dunque vanno a 0, tranne 1 che va ad 1, dunque abbiamo che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} c_k n^k = \frac{c_k}{|c_k|} \infty$$

con un piccolo abuso di notazione per il segno.

Passiamo ora al limite di rapporti tra polinomi

Esempio 2.23

Siano $P(n) = 3n^2 - n + 1$ e $Q(n) = 2n^4 + n^2 - 3$ due successioni. Calcoliamo il limite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P(n)}{Q(n)}$$

come prima abbiamo una forma indeterminata, questa volta $\frac{\infty}{\infty}$.

Definizione 2.24 (Notazione o piccolo). un modo molto compatto di scrivere quanto stiamo facendo è dire che se abbiamo due successioni $f(n)$ e $g(n)$ e

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$$

(o equivalentemente che il rapporto tra le due si avvicina arbitrariamente a 0 all'aumentare di n) possiamo scrivere

$$f(n) = o(g(n)).$$

questa notazione è comodissima perché ci permette di scrivere

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P(n)}{Q(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 - n + 1}{2n^4 + n^2 - 3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{o(n^4)}{2n^4 + o(n^4)} = 0$$

§2.4.1 Limiti notevoli e criteri utili

Lemma 2.25 (Limiti Notevoli Trigonometrici)

Se x_n è una successione tale che $x_n \rightarrow 0$ allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(x_n)}{x_n} = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos(x_n)}{x_n} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos(x_n)}{x_n^2} = \frac{1}{2}$$

Dimostrazione. geometricamente nel modo ovvio. □

Lemma 2.26 (Limiti notevoli della funzione potenza)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \begin{cases} \infty & q > 1 \\ 1 & q = 1 \\ 0 & |q| < 1 \\ \not\exists & q \leq -1 \end{cases}$$

Dimostrazione. bernoulli nel modo ovvio. □

Abbiamo capito come fare limiti di polinomi cercando il termine dominante. Ma per funzioni arbitrarie? Possiamo adoperare una nuova notazione, che ci definirà una *gerarchia degli infiniti*.

Definizione 2.27 (Molto maggiore). Siano $\{a_n\}, \{b_n\}$ due successioni, allora diciamo che a_n è *molto maggiore* di b_n e scriviamo

$$a_n \gg b_n$$

se e solo se vale

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$$

notiamo che per l'algebra dei limiti questo implica che $b_n = o(a_n)$.

Lemma 2.28 (Criterio del rapporto)

Se $\{a_n\}$ è una successione a termini positivi ed esiste il

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l$$

allora se $0 \leq l < 1$ la successione converge a 0, altrimenti se $l > 1$ la successione diverge a infinito (se $l = 1$ sfortunatamente il criterio non ci dice nulla).

Dimostrazione. Nel primo caso, scegliamo un $\varepsilon > 0$ tale che $l + \varepsilon < 1$, allora esisterà un n_0 tale che per $n \geq n_0$ vale

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < l + \varepsilon$$

a questo punto dato che a_n è una successione a termini positivi possiamo moltiplicare da entrambi i lati per a_n , e otteniamo

$$0 < a_{n+1} < a_n(l + \varepsilon)$$

ma allora per induzione non è difficile vedere che vale

$$0 < a_{n_0+k} < a_{n_0}(l + \varepsilon)^k.$$

A questo punto la successione a destra tende a 0 per quanto dimostrato nel 2.26, quindi abbiamo per il teorema dei carabinieri che anche a_{n_0+k} tende a 0, come richiesto.

Nel secondo caso scegliendo un $\varepsilon > 0$ tale che $l + \varepsilon > l - \varepsilon > 1$ abbiamo che per ogni $n \geq n_0$ vale

$$l - \varepsilon < \frac{a_{n+1}}{a_n} < l + \varepsilon$$

e come prima possiamo moltiplicare da entrambi i lati per a_n :

$$a_n(l - \varepsilon) < a_{n+1} < a_n(l + \varepsilon)$$

come prima allora si dimostra per induzione che

$$a_{n_0}(l - \varepsilon)^k < a_{n_0+k} < a_{n_0}(l + \varepsilon)^k$$

e anche in questo caso abbiamo finito per il teorema dei carabinieri, dato che $l + \varepsilon > l - \varepsilon > 1$ e quindi le due successioni tendono entrambe a ∞ . $\square$

Lemma 2.29 (Gerarchia degli infiniti)

Usando la notazione di prima, abbiamo

$$n^n \gg n! \gg q^n \gg n^k \gg \log_e n$$

per $q > 1$.

Dimostrazione. Dimostriamo ogni cosa una alla volta

potenza maggiore di log posticipato a quando definiremo appropriatamente il log.

esponenziale maggiore di potenza vogliamo calcolare il limite di

$$a_n := \frac{q^n}{n^k}$$

utilizzando il criterio del rapporto abbiamo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \dots = \left(\frac{n}{n+1} \right)^k q$$

che è finito e strettamente maggiore di 1, dunque $a_n \rightarrow \infty$ come richiesto.

fattoriale maggiore esponenziale Anche qui il criterio del rapporto ci dà

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{q} = \infty$$

che come prima ci dà la tesi.

bipotenza maggiore di fattoriale questa volta abbiamo una cosa un po' sus, perchè

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \dots = \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$$

che vedremo essere uguale ad $e > 1$.

□

Questo lemma ci dà un sacco di modi ulteriori per calcolare limiti, tuttavia non tutto è ancora sistemato. Per esempio ci serve ancora il

Lemma 2.30 (Radici n -esime)

Se $q > 0$ allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^{\frac{1}{n}} = 1$$

Dimostrazione. Calcoliamo la successione $\{a_n\} = q^{\frac{1}{n}} - 1$ con Bernoulli e troviamo che tende a 0, dunque per l'algebra dei limiti troviamo direttamente la tesi. □

In realtà c'è un risultato più forte in merito, ovvero

Lemma 2.31 (Criterio della radice per le successioni)

Se $a_n > 0$ allora se esiste il limite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l$$

Con $l \in \mathbb{R}$ allora possiamo anche dire che il limite della seguente successione esiste ed è uguale a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = l$$

Dimostrazione. ¹ Cominciamo con il considerare la successione

$$b_n := \ln \left(a_n^{\frac{1}{n}} \right) = \frac{\ln a_n}{n}$$

Per il teorema di Cesàro abbiamo che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{n} \stackrel{\text{Cesàro}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_{n+1} - \ln a_n}{n+1-n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

ma questo per la continuità del logaritmo² implica proprio che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{a_{n+1}}{a_n} = \ln l$$

ma questo, sempre per la continuità del logaritmo (e dell'esponenziale) implica che

$$a_n^{\frac{1}{n}} \rightarrow \exp \left(\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \right) = l$$

come volevasi dimostrare □

Notiamo che questo non è tristemente vero per $l \in \overline{\mathbb{R}}$. Questo in un modo o nell'altro è come dire che ∞^0 e 0^∞ sono forme indeterminate.

§2.4.2 Numero di Nepero

Abbiamo incontrato in precedenza la successione

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$$

e abbiamo visto che ci farebbe molto comodo dimostrare che converge. In effetti possiamo farlo dicendo

Lemma 2.32 (Esistenza di e)

La successione a_n è monotonamente crescente, inoltre è limitata dal basso da 2 e dall'alto da 4.

Dimostrazione. Vogliamo mostrare che

$$a_{n+1} > a_n$$

ovvero

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$$

allora scriviamo con molta pazienza

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\left(1 + \frac{1}{n+1} \right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n} = \left(\frac{n(n+2)}{(n+1)^2} \right)^n \left(1 + \frac{1}{n+1} \right)$$

¹Questa dimostrazione non è stata trattata a lezione e usa strumenti più avanzati, per più informazioni sul teorema di Cesàro ci si riferisca agli appunti di Complementi di Analisi.

²La continuità verrà definita meglio e approfondita più avanti.

ovvero sommando e sottraendo 1:

$$\left(\frac{n(n+2)}{(n+1)^2}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) = \left(\frac{(n+1)^2 - 1}{(n+1)^2}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) = \left(1 - \frac{1}{(n+1)^2}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)$$

ordunque usiamo bernoulli e otteniamo

$$\dots \geq \left(1 - \frac{n}{(n+1)^2}\right) \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)$$

svolgendo i prodotti quindi

$$\dots = 1 + \frac{-n^2 - n + (n+1)^2 - n}{(n+1)^3}$$

che si vede molto chiaramente essere > 1 , quello che volevamo mostrare.

Ora vogliamo mostrare che a_n è limitata, per fare ciò prendiamo la successione

$$b_n := \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

chiaramente $a_n < b_n$ per tutti gli n . Inoltre facendo lo stesso identico conto di prima dimostriamo che b_n è decrescente. A questo punto allora b_n è sicuramente limitata dall'alto, ma $b_0 \geq b_n > a_n$ per ogni n , dunque a_n è limitata dall'alto da b_0 , che è 4. D'altro canto dato che a_n è crescente a_n sarà limitata inferiormente da $a_0 = 2$. $\square$

Questo ci è utile perchè insieme al seguente lemma

Lemma 2.33 (Limitata e monotona implica convergente)

Ogni successione monotona ha limite in $\overline{\mathbb{R}}$. In particolare se una successione è monotona e limitata tende al suo sup (o inf in base ai casi).

Dimostrazione. Svolgiamo solo il caso in cui la successione è monotonamente crescente, tenendo conto che l'altro caso è totalmente analogo. Sia L il sup (in $\overline{\mathbb{R}}$) di a_n (che esiste sempre per la completezza di $\overline{\mathbb{R}}$). Allora per definizione di sup se $L' < L \in \overline{\mathbb{R}}$ esisterà un $n_0 \in \mathbb{N}$ tale che

$$L' < a_{n_0} < L$$

Ora per la monotonia sappiamo che

$$L' < a_{n_0} < a_n$$

per ogni $n \geq n_0$. Ma sappiamo anche per la definizione di sup che

$$a_n \leq L$$

per ogni $n \in \mathbb{N}$, dunque a_n appartiene definitivamente a $(L', L]$ che è a sua volta contenuto in un intorno di L . Dato che possiamo scegliere L' arbitrariamente vicino a L segue che la successione ha limite proprio uguale a L (in particolare se $L = \infty$ l'intervallo sopra è (L', ∞) un intorno di infinito con L' arbitrariamente grande). $\square$

ci dice che la successione a_n converge.

Proposizione 2.34 (Definizione di funzione esponenziale)

Per ogni $x \in \mathbb{R}$ le due successioni

$$l_n(x) = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$$

$$b_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$$

convergono allo stesso limite.

Dimostrazione. Vedi appunti di complementi di analisi. $\square$

Chiamiamo allora $l(x)$ il limite della successione $l_n(x)$. Dimostriamo che $l(x)$ è proprio la funzione esponenziale!

Proposizione 2.35 (La funzione esponenziale è proprio la funzione esponenziale)

Abbiamo le seguenti

- $l(0) = 1, l(1) = e$
- $l(x+y) = l(x)l(y)$
- per due numeri interi m, n vale $l\left(\frac{m}{n}\right) = (l(1))^{\frac{m}{n}}$

Dimostrazione. Vedi appunti di complementi di analisi. $\square$

dunque questa è proprio e^x sui razionali. Definiamo dunque:

Definizione 2.36 (Funzione esponenziale). Definiamo $\exp(x) = e^x$ la funzione

$$\exp(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$$

Per questa funzione valgono esattamente tutte le proprietà che conosciamo, tipo il fatto che $e^{\ln(x)} = x$ o alcuni limiti notevoli:

Lemma 2.37 (Limiti notevoli esponenziali)

Se $x_n \rightarrow 0$ è una successione che tende a 0 allora valgono

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{x_n} - 1}{x_n} = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + x_n)}{x_n} = 1$$

Dimostrazione. Per il primo limite scriviamo semplicemente

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=0}^n \frac{x_n^k}{k!} - 1}{x_n}$$

ma notiamo che vale la seguente identità

$$\sum_{k=0}^n \frac{x_n^k}{k!} = 1 + x_n \sum_{k=0}^{n-1} \frac{x_n^k}{(k+1)!} \leq 1 + x_n \sum_{k=0}^{n-1} \frac{x_n^k}{k!}$$

quindi la successione di cui stiamo cercando di calcolare il limite è stimata dall'alto da:

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{x_n^k}{k!} \geq \frac{\sum_{k=0}^n \frac{x_n^k}{k!} - 1}{x_n}$$

e per $n \rightarrow \infty$ questa tende a

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{x_n^k}{k!} \rightarrow e^{x_n} \rightarrow 1$$

d'altro canto se scriviamo la successione utilizzando l'altra definizione di esponenziale, e applicando Bernoulli:

$$\frac{(1 + \frac{x_n}{n})^n - 1}{x_n} \geq \frac{1 + n \frac{x_n}{n} - 1}{x_n} = 1$$

e dunque per il teorema dei carabinieri abbiamo finito. Il secondo limite è una mera conseguenza del primo, infatti se definiamo una successione a_n tale che

$$a_n := \ln(x_n + 1) \iff x_n = e^{a_n} - 1$$

chiaramente abbiamo che $a_n \rightarrow 0$ se $x_n \rightarrow 0$, dunque possiamo riscrivere il limite come

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(x_n + 1)}{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{e^{a_n} - 1}$$

e dunque abbiamo finito per la continuità della funzione x^{-1} :

$$\dots = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{a_n} - 1}{a_n} \right)^{-1} = 1^{-1} = 1$$

che era esattamente quanto volevamo dimostrare. □

§2.5 Bolzano-Weierstrass e Complementi di Analisi

Teorema 2.38 (Bolzano-Weierstrass)

Una successione $\{a_n\}$ limitata dall'alto e dal basso ammette sempre una sottosuccessione convergente.

Dimostrazione. Costruiamo due successioni α_n e β_n tali che α_0 è un maggiorante di a_n , β_0 è un minorante di a_n e definite ricorsivamente come:

$$\begin{cases} \alpha_n := \frac{\alpha_{n-1} + \beta_{n-1}}{2} & \text{se nell'intervallo } [\alpha_n, \beta_{n-1}] \text{ cadono infiniti valori di } a_n \\ \alpha_n := \alpha_{n-1} & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \beta_n := \frac{\alpha_{n-1} + \beta_{n-1}}{2} & \text{se nell'intervallo } [\alpha_{n-1}, \beta_n] \text{ cadono infiniti valori di } a_n \text{ (ma non in } [\alpha_n, \beta_{n-1}]) \\ \beta_n := \beta_{n-1} & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

A questo punto notiamo che abbiamo generato una successione di insiemi

$$A_n := \{a_n\} \cap [\alpha_n, \beta_n]$$

di cardinalità infinita da cui possiamo scegliere una sottosuccessione b_n di a_n (anche senza assioma della scelta in realtà) tale che

$$\alpha_n \leq b_n \leq \beta_n$$

ma notiamo che α_n è una successione monotona e limitata e quindi converge. Non è difficile vedere come (per induzione) la successione β_n debba convergere allo stesso limite. Dunque per il teorema dei carabinieri anche b_n converge a quello stesso limite, e abbiamo finito. $\square$

Definizione 2.39 (Punto limite). Un $l \in \overline{\mathbb{R}}$ si dice punto limite della successione $\{a_n\}$ se esiste una sottosuccessione di a_n che ha l come limite.

Abbiamo visto che se ci sono almeno due punti limite allora la successione non converge. Ma è vero anche il contrario? Ovvero, se esiste uno e un solo punto limite, allora la successione necessariamente converge? In effetti

Teorema 2.40 (Criterio di convergenza)

Una successione ha un limite se e solo se ha uno e un solo punto limite.

Dimostrazione. Dobbiamo dimostrare due cose:

solo un punto limite implica convergenza: Sia l l'unico punto di limite della successione.

Supponiamo per assurdo che la successione non converga. Allora per almeno un $\varepsilon > 0$ esiste una sottosuccessione che definitivamente non appartiene a $(l - \varepsilon, l + \varepsilon)$. Non solo, possiamo spezzare questa successione in due ulteriori sottosuccessioni, una limitata dal basso da $l + \varepsilon$ e l'altra limitata dall'alto da $l - \varepsilon$. Di conseguenza per il teorema di Bolzano-Weierstrass una di queste due sottosuccessioni deve avere una sottosuccessione a sua volta convergente. Ma il limite di queste successioni non può essere l in quanto per entrambe sicuramente

$$|a_n - l| > \varepsilon$$

per ogni a_n elemento di una delle due sottosuccessioni. Dunque dovranno convergere a un limite diverso da l , assurdo in quanto abbiamo assunto che l fosse l'unico punto di limite.

convergenza implica un solo punto limite: È già stato dimostrato in precedenza (2.10).

Dunque le due proposizioni sono proprio equivalenti, e abbiamo finito. $\square$

In effetti se consideriamo l'insieme di tutti i punti limite, si può dimostrare che questo è chiuso, ovvero esistono sempre il massimo e il minimo di questo insieme. Possiamo allora definire

Definizione 2.41 (Maxlim e Minlim). Sia $\{a_n\}$ una successione, allora esistono sempre il massimo e il minimo dell'insieme dei punti di limite, e si denotano con

$$\max \lim a_n$$

$$\min \lim a_n$$

di base abbiamo

$$\max \lim a_n \geq \min \lim a_n$$

e se e solo se la successione ammette limite abbiamo

$$\max \lim a_n = \min \lim a_n = \lim a_n$$

In realtà il modo in cui di solito la si pone di solito è parlando di limsup e liminf. Consideriamo una successione $\{a_n\}$ a termini in $\mathbb{R}$, definendo le due successioni ausiliarie

$$a'_n = \sup \{a_k : k \geq n\}$$

$$a''_n = \inf \{a_k : k \geq n\}$$

Essendo che ad ogni passo stiamo semplicemente rimuovendo elementi dagli insiemi, entrambe le successioni saranno monotone, dunque entrambe convergeranno. In questo modo possiamo definire il limite di queste due successioni come il limsup e il liminf:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a'_n$$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a''_n$$

e sono un'estensione naturale del concetto di maxlim e minlim, in effetti coincidono con maxlim e minlim quando parliamo di successioni in $\mathbb{R}$.

Vi è una ulteriore caratterizzazione del concetto di limite:

Definizione 2.42 (Successioni di Cauchy). Una successione $\{a_n\}$ si dice di Cauchy se per ogni ε esiste un n_0 tale che

$$\varepsilon > |a_m - a_n|$$

per ogni $m, n \geq n_0$.

In effetti questo ci permette di dire che una successione converge senza sapere necessariamente *a cosa converge*, un grosso buco operativo della definizione di convergenza data in precedenza.

Teorema 2.43 (Completezza di $\mathbb{R}$ come spazio metrico)

Una successione $\{a_n\}$ a valori in $\mathbb{R}$ converge se e solo se è di Cauchy.

Dimostrazione. Ref appunti di complementi di analisi. □

In pratica questo ci dà un modo ancora più fine delle sezioni di Dedekind (anche se purtroppo autologico, senza assumerle) per definire $\mathbb{R}$. $\mathbb{R}$ è l'insieme di tutti i limiti di tutte le successioni di Cauchy a valori in $\mathbb{Q}$. Insomma $\mathbb{R}$ è il *completamento* di $\mathbb{Q}$ come spazio metrico.

§2.6 Successioni definite per ricorrenza

Le successioni di questo tipo sono meglio descritte con un esempio:

Esempio 2.44 (Fibonacci)

Definiamo una successione nel seguente modo:

$$\begin{cases} a_0 = 1 \\ a_1 = 1 \\ a_{n+1} = a_n + a_{n-1} \end{cases}$$

come calcoliamo il limite di questa successione? Beh in questo caso è abbastanza semplice, è una successione monotona a valori in $\mathbb{N}$ e dunque sarà sicuramente

$$a_n \geq n$$

(si dimostra per induzione nel modo ovvio), quindi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$$

In generale per calcolare il limite di successioni per ricorsione la strategia è fatta di due step:

Verifico che il limite esiste di solito con argomenti di monotonia e limitatezza, dimostrati per induzione o affini.

Trovo il limite anche usando argomenti non esattamente rigorosi, mi serve solo a capire davvero qual è il limite. In particolare di solito se la ricorrenza è del tipo

$$a_n = f(a_{n-1})$$

per trovare il limite è sufficiente imporre

$$f(l) = l$$

e risolvere l'equazione.

Dimostro che il limite è quello Una volta che è chiaro quale sia il limite dimostrare che è quello non è difficile, di solito usando il fatto che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n)$$

e invocando la continuità di f .

§3 Limiti di Funzione

Per le successioni aveva senso davvero solo fare un limite che tende a $+\infty$. Vediamo cosa vuol dire per una funzione tendere a $+\infty$:

Definizione 3.1 (Limite di una funzione all'infinito). Sia ∞ è un punto di accumulazione del dominio di f . Diciamo che

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \in \overline{\mathbb{R}}$$

se e solo se per ogni $U \in \mathcal{I}_L$ esiste un $\bar{x}$ tale che per ogni x in

$$[\bar{x}, \infty) \cap \text{dom}(f)$$

vale $f(x) \in U$.

Se per le successioni quindi scrivevamo semplicemente $a_n \rightarrow l$ sottintendendo che la il limite era all'infinito, per una funzione dobbiamo scrivere

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} l$$

Analogamente definiamo il limite a $-\infty$. La caratterizzazione più utile di questa definizione in realtà è quella in cui ogni intorno è supposto sferico, e esplicitiamo ogni raggio, ovvero

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

se e solo se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un $\bar{x}$ tale che

$$x \geq \bar{x} \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Il vero succo arriva con i limiti che tendono a punti di accumulazione diversi da $\pm\infty$.

Definizione 3.2 (Limite di funzione che tende a valore finito). Sia x^* un punto di accumulazione del dominio di f . Allora scriviamo

$$\lim_{x \rightarrow x^*} f(x) = L$$

se e solo se per ogni $U \in \mathcal{I}_L$ esiste un $V \in \mathcal{I}_{x^*}$ tale che

$$\forall x \in (V \setminus \{x^*\}) \cap \text{dom}(f) \implies f(x) \in U$$

anche qui la definizione operativa è quella con gli intorni sferici con raggi espliciti.

Teorema 3.3 (Limite di funzione dai limiti di successione)

Data una funzione f , sia x^* un punto di accumulazione per il dominio di f . Le due proposizioni seguenti sono equivalenti

1. Il seguente limite

$$\lim_{x \rightarrow x^*} f(x) = L$$

2. Per ogni $\{x_n\}$ successione a valori in $\text{dom}(f) \setminus \{x^*\}$ vale

$$x_n \rightarrow x^* \implies f(x_n) \rightarrow L$$

Dimostrazione. Che la prima implichi la seconda è chiaro, infatti comunque presa una successione $x_n \rightarrow x^*$ e un $\varepsilon > 0$ per la definizione di limite sappiamo che esiste un $\delta > 0$ tale che

$$x \in (x^* - \delta, x^* + \delta) \implies f(x) \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon)$$

dunque per la convergenza di x_n sappiamo che definitivamente x_n appartiene a $(x^* - \delta, x^* + \delta)$, quindi $f(x_n)$ apparterrà definitivamente a $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$, che era esattamente la tesi.

Supponiamo ora la seconda proposizione sia vera, e supponiamo per assurdo che la prima sia falsa. Allora esiste un $\varepsilon > 0$ tale che per ogni $\delta > 0$ almeno un $x \in (x^* - \delta, x^* + \delta)$ è tale che $f(x_n)$ non appartiene a $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$. Presi allora $\delta = \frac{1}{n}$ definiamo una successione x_n tale che

$$x_n \in (x^* - \delta, x^* + \delta)$$

$$f(x_n) \notin (L - \varepsilon, L + \varepsilon)$$

questa successione tende a x^* , quindi per ipotesi la successione $f(x_n)$ dovrebbe appartenere definitivamente a $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$, tuttavia per definizione $f(x_n)$ non appartiene a $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$ per ogni n , dunque abbiamo un assurdo, da cui si deduce la tesi. $\square$

In effetti questo teorema è molto utile come contronominale, ovvero se troviamo una successione $x \rightarrow x^*$ ma $f(x_n)$ non tende a L abbiamo dimostrato che la funzione non tende ad L . Non solo, ma se troviamo due successioni a_n e b_n tali che $f(a_n)$ e $f(b_n)$ convergono a due limiti diversi, allora il limite della funzione non esiste.

§3.1 Continuità

Abbiamo già implicitamente usato che se $f(x) = |x|$ e a_n ha un limite in $\mathbb{R}$ allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n\right)$$

Ci chiediamo allora, per quali altre funzioni questa cosa è soddisfatta? Le funzioni di questo tipo ci sembrano interessanti, quindi definiamo

Definizione 3.4 (Continuità). Una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ si dice *continua in* $x_0 \in A$ se per ogni successione $\{x_n\}$ a valori nel dominio di f tale che

$$x_n \rightarrow x_0$$

allora

$$f(x_n) \rightarrow f(x_0)$$

se f è continua per ogni elemento di A si dice *continua* e si scrive $f \in C(A)$.

Enunciamo due teoremi senza dimostrazione che non ci stupiranno più di tanto:

Teorema 3.5 (Continuità delle funzioni elementari)

Tutte le funzioni elementari, e le loro inverse, sono continue.

Teorema 3.6 (Somma prodotto e quoziente di funzioni continue)

Se f, g sono continue in x_0 allora anche

$$f \pm g$$

$$f \cdot g$$

$$\frac{f}{g} \text{ (se } g(x_0) \neq 0\text{)}$$

sono continue in x_0 .

In effetti ci sono davvero tanti modi di esprimere la continuità, e sono tutti equivalenti. La definizione del liceo di continuità è

Proposizione 3.7 (Definizione del liceo di continuità)

Una funzione f reale di variabile reale è continua nel punto x_0 punto di accumulazione del dominio se e solo se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Dimostrazione. Segue abbastanza chiaramente dalla 3.3. □

in realtà questa definizione aggiunge la condizione che x_0 sia punto di accumulazione del dominio, quindi non è esattamente equivalente alla 3.4. Questo teorema ci garantisce che per ogni funzione esiste sempre:

Definizione 3.8 (Prolungamento di f). Sia f una funzione reale di variabile reale tale che $x^* \notin \text{dom}(f)$ e che x^* sia punto di accumulazione del dominio di f . Allora possiamo definire il *prolungamento* o *l'estensione per continuità* di f la funzione

$$\tilde{f} : \text{dom}(f) \cup \{x^*\} \rightarrow \mathbb{R}$$

tale che

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & x \in \text{dom}(f) \\ f(x^*) & x = x^* \end{cases}$$

e questa funzione è sempre continua in x^* .

§3.2 Limiti destro e sinistro

I limiti destro e sinistro sono un modo per esprimere il fatto che una funzione che non ha limite in $x_0 \in \mathbb{R}$ avrebbe limite se solo "potessimo avvicinarci solo da destra o solo da sinistra". Dunque

Definizione 3.9 (Limiti destri e sinistri). Se f è una funzione tale che $x_0 \in \mathbb{R}$ è un punto di accumulazione per

$$\text{dom}(f) \cap \{x \in \mathbb{R} : x > x_0\}$$

allora diciamo che il limite destro di $f(x)$ che tende a x_0 è L e scriviamo

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L$$

se e solo se la restrizione di f all'intervallo (x_0, ∞) soddisfa

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \Big|_{(x_0, \infty)} = L$$

analogamente vale per il limite sinistro.

Proposizione 3.10 (Fare un limite equivale a farlo sia da destra che da sinistra)

Se f ammette limite da destra e da sinistra in x_0 allora il limite in x_0 esiste solo se i due limiti (destro e sinistro) sono uguali.

come conseguenza di ciò abbiamo che se i limiti da destra e da sinistra sono diversi, allora il limite della funzione non esiste. Come fatto prima definiamo anche i limiti $+$ e $-$:

Definizione 3.11 (Limiti $+$ e $-$). Sia una f una funzione tale che

$$\lim_{x \rightarrow x^*} f(x) = L$$

allora diciamo che

$$\lim_{x \rightarrow x^*} f(x) = L^+$$

se esiste un intorno U di x^* tale che per ogni $x \in U \setminus x^*$ vale

$$f(x) \geq L$$

analogamente possiamo fare per il limite $-$.

Finalmente abbiamo chiarito tutte le principali differenze tra i limiti di funzione e i limiti di successione, e per il 3.3 possiamo essenzialmente "importare" tutti i risultati ragionevoli che abbiamo ricavato per le successioni, ai limiti di funzione.

§3.3 Calcolo dei limiti

Alcune regolette che dovranno essere corroborate con tanti esercizi

- Imparare i limiti fondamentali.
- Fare molta attenzione alla gerarchia (è molto diversa da quella delle successioni, per esempio non c'è $x!$, le funzioni non all'infinito fanno cose strane...).

un altro strumento molto utile a nostra disposizione è il cambio di variabile. In generale ci chiediamo come si calcolino limiti del tipo

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x))$$

(questo non potevamo farlo per le successioni, perché le successioni avevano purtroppo solo $\mathbb{N}$ come dominio). In generale possiamo dire che se

$$f(x) \rightarrow y^*$$

per $x \rightarrow x_0$ e invece

$$g(x) \rightarrow l$$

per $x \rightarrow y^*$, allora abbiamo

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = l$$

in generale questo si può fare se $g(x)$ è continua in x^* (questo è sufficiente ma non necessario).

Una proprietà che non è stata direttamente importata dalle successioni è la seguente:

Teorema 3.12 (Limiti di funzioni monotone)

Se f è una funzione monotonamente crescente e

$$\sup \operatorname{dom}(f) = b$$

$$\inf \operatorname{dom}(f) = a$$

allora

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \inf(\operatorname{Im}(f))$$

$$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \sup(\operatorname{Im}(f))$$

in particolare quindi quei limiti esistono sempre in $\overline{\mathbb{R}}$. Analogamente vale per le monotonamente decrescenti.

§4 Continuità

Trattiamo qui la continuità da un punto di vista più serio. Cominciamo con il dare una definizione più chiara di continuità:

Definizione 4.1 (Continuità per interni). Sia $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $x_0 \in A$. Allora diciamo che $f(x)$ è *continua in* x_0 se e solo se per ogni

$$U \in \mathcal{I}_{f(x_0)}$$

esiste un

$$V \in \mathcal{I}_{x_0}$$

tale che per ogni $x \in V \cap A$ si abbia $f(x) \in U$. Una funzione si dice *continua* se è continua in tutti i punti del suo dominio.

Questa definizione è essenzialmente quello che si ottiene parafrasando la definizione del liceo utilizzando la definizione di limite. In effetti è un po' più generale perché con questa definizione la funzione risulta continua anche sui punti isolati del dominio, in quanto x_0 non deve necessariamente essere un punto di accumulazione. Ovviamente le definizioni con gli interni diventano sempre più operative se usiamo raggi espliciti.

§4.1 Funzioni continue definite su intervalli

Teorema 4.2 (degli zeri)

Se una funzione $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ è continua, allora se esistono due valori $x_1, x_2 \in (a, b)$ tali che $f(x_1)f(x_2) \leq 0$ allora esiste un valore in $[x_1, x_2]$ tale che f vale 0.

Dimostrazione. Con una binary search e la definizione di successione di Cauchy nel modo chiaro. $\square$

Teorema 4.3 (dei valori intermedi)

Una funzione f continua manda intervalli in intervalli.

Dimostrazione. Supponiamo che f sia definita sull'intervallo $[a, b]$ (non necessariamente chiuso, ma la dimostrazione nell'altro caso è del tutto analoga). Consideriamo $A = f_*([a, b])$, se A ha un solo elemento è un intervallo, altrimenti se ha almeno due elementi y_1, y_2 tali che $f(x_1) = y_1, f(x_2) = y_2$ dimostriamo che comunque scelto un $y_1 \leq y \leq y_2$ abbiamo $y \in f_*([a, b])$. Consideriamo la funzione

$$g(x) := f(x) - y$$

questa è chiaramente continua, inoltre abbiamo

$$g(x_1) = f(x_1) - y \leq 0$$

$$g(x_2) = f(x_2) - y \geq 0$$

e quindi per il teorema degli zeri esisterà almeno un $x \in [a, b]$ tale che

$$g(x) = 0 \iff f(x) - y = 0 \iff f(x) = y$$

che era quanto volevamo dimostrare. $\square$

per dimostrare il teorema della funzione inversa dobbiamo prima dimostrare i seguenti due lemmi:

Lemma 4.4 (Iniettiva equivale monotona sulle funzioni continue)

Se f è una funzione continua allora f strettamente monotona è equivalente a f iniettiva.

Dimostrazione. Un verso è ovvio, dimostriamo che se una funzione è iniettiva e continua allora è anche monotona. Assumiamo per assurdo che non sia strettamente monotona, allora avremo sicuramente almeno tre valori $x_1 < x_2 < x_3$ nel dominio di f tali che

$$f(x_1) \leq f(x_3) \leq f(x_2)$$

ora, se per assurdo le disuguaglianze non fossero strette avremmo la negazione dell'iniettività, e avremmo finito. D'altro canto se tutte le disuguaglianze sono strette per il teorema dei valori intermedi esisterà un $k \in (x_1, x_2)$ (quindi in particolare $k < x_3$) tale che $f(x_3) = f(k)$. Dunque f non è iniettiva, e dall'assurdo si deduce la tesi. $\square$

Lemma 4.5 (Caratterizzazione della continuità sulle funzioni monotone)

Una funzione f monotona è continua se e solo se manda intervalli in intervalli.

Dimostrazione. Un verso è implicato direttamente dal teorema dei valori intermedi. Supponiamo ora che f mandi intervalli in intervalli e che sia (WLOG) monotonamente crescente. Supponiamo per assurdo che f sia non continua in un punto x_0 , dato che f è monotona ammette limite destro e sinistro in x_0 , quindi

$$l^- = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \leq f(x_0) \leq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l^+$$

ma notiamo che almeno una delle due disuguaglianze deve essere stretta, altrimenti avremmo che f è continua in quel punto, supponiamo WLOG $l^- < f(x_0)$. Allora abbiamo che l'immagine di f contiene $f(x_0)$, contiene $l^- - \varepsilon$ (per qualche ε) ma non contiene $(l^-, f(x_0))$ (si dimostra per assurdo usando il fatto che f è monotona). Dunque l'immagine di f non è un intervallo, ma questo è assurdo, e dunque abbiamo chiuso. $\square$

con questi lemmi possiamo quindi finalmente dimostrare:

Teorema 4.6 (della funzione inversa)

Se f è una funzione continua e invertibile definita su un intervallo I (in senso di funzioni reali di variabile reale, quindi iniettiva) anche la sua inversa è continua.

Dimostrazione. Per il lemma 4.4 abbiamo che f è strettamente monotona. Ma allora anche f^{-1} è strettamente monotona (si dimostra prendendo i contronominati e escludendo il caso di uguaglianza per iniettività). Non solo, ma dato che per il teorema dei valori intermedi abbiamo che $\text{Im}(f)$ è un intervallo, quindi avremo

$$f_*^{-1}(\text{Im}(f)) = I$$

ovvero la funzione f^{-1} manda intervalli in intervalli. Dunque per il lemma 4.5 abbiamo finito. $\square$

Teorema 4.7 (Weierstrass)

Sia $f \in C^0([a, b])$ allora f ammette sempre massimo e minimo.

Dimostrazione. Trattiamo solo il max, considerando che per il min la cosa è analoga. Sia M il sup dell'immagine. Definiamo una successione a_n che approssima arbitrariamente M , e questo lo possiamo fare esplicitamente perchè sappiamo che l'immagine di f è un intervallo (dato che $[a, b]$ è un intervallo). Ora ci sono vari modi per chiudere, uno sarebbe semplicemente invocare il teorema dei valori intermedi, l'altro è ricordarsi che per la definizione di sup, per ogni a_n della successione varrà senza dubbio che esiste un elemento dell'immagine $f(x_n)$ tale che

$$a_n < f(x_n) < M$$

poichè a_n è costruita in modo da essere sempre minore di M . Ma allora avremo per i carabinieri

$$f(x_n) \rightarrow M$$

ma se consideriamo la successione x_n questa appartiene a $[a, b]$, che è limitato per ipotesi, e quindi per bolzano weierstrass una sua sottosuccessione tenderà ad un elemento k (sempre del dominio, dato che è chiuso), dunque x'_n soddisferà

$$x'_n \rightarrow k \in \text{dom}(f)$$

ma d'altro canto per continuità

$$f(x'_n) \rightarrow f(k)$$

ma sappiamo che $f(x_n) \rightarrow M$, e quindi per i vari teoremi di unicità del limite (di sottosuccessioni etc) abbiamo $f(k) = M$, e quindi abbiamo finito. $\square$

§4.2 Classificazione delle discontinuità

Sia x_0 un punto del dominio di f , classifichiamo le varie possibili discontinuità che possono presentarsi:

Prima Specie In questo caso i limiti destro e sinistro esistono e sono finiti, ma sono diversi.

Seconda Specie In questo caso i limiti destro e sinistro esistono, ma uno o più dei due sono infiniti.

Eliminabile In questo caso i limiti destro e sinistro esistono sono finiti e coincidono, ma il valore della funzione in x_0 è diverso dai limiti.

§4.3 Complementi sulla continuità

Definizione 4.8 (Funzioni Lipschitziane). Una funzione f si dice *lipschitziana* se e solo se esiste una costante $L \geq 0$ tale che per ogni $x, y \in \mathbb{R}$ vale

$$|f(x) - f(y)| \leq L |x - y|$$

Capiremo solo poi davvero perchè le funzioni lipschitziane sono così importanti. La prima cosa interessante che notiamo è (oltre al fatto che implicano la continuità) che questa è una caratteristica di **tutti** i punti della funzione, non è puntuale come la continuità.

Lemma 4.9 (Lipschitziana implica continua)

Ogni funzione Lipschitziana è anche continua.

Dimostrazione. Sia f una funzione lipschitziana. Allora esiste una costante L che soddisfa la definizione. Prendiamo un qualunque punto x_0 del dominio di f , dobbiamo dimostrare che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un $\delta > 0$ tale che

$$|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

in effetti dato che f è lipschitziana abbiamo:

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y| < L\delta$$

quindi scegliendo $\delta = \varepsilon/L$ abbiamo finito. $\square$

abbiamo detto prima che per una funzione essere lipschitziana è una proprietà globale, a differenza della continuità. Riformuliamo allora la continuità in modo che sia una condizione globale:

Definizione 4.10 (Uniforme Continuità). Si dice che f è uniformemente continua su $A \subseteq \text{dom}(f)$ se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un $\delta > 0$ tale che comunque scelti due elementi $x, y \in A$ se

$$|x - y| < \delta$$

allora

$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Chiaramente l'uniforme continuità su A implica la continuità su A .

Ovvero la scelta di delta **non dipende dal punto specifico**, questa è una proprietà più forte della continuità, ed è anche questa implicata dalla lipschitzianità. Ci chiediamo se questa definizione sia effettivamente equivalente alla continuità. Una caratterizzazione dell'uniforme continuità ci viene data da:

Teorema 4.11 (Heine-Cantor)

Se f è una funzione continua su un A chiuso e limitato, allora è anche uniformemente continua su A .

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che f non sia uniformemente continua su A . La negazione della uniforme continuità è che esista un $\varepsilon > 0$ tale che per ogni $\delta > 0$ esiste una coppia di punti in A tali che

$$|x - y| < \delta$$

ma allo stesso tempo

$$|f(x) - f(y)| > \varepsilon$$

allora scegliamo una sequenza di δ_n tale che

$$\delta_n = \frac{1}{n}$$

per ognuno di questi delta esisterà (per l'assunzione) una coppia di punti x_n, y_n entrambi in A tali che

$$|x_n - y_n| < \frac{1}{n}, |f(x_n) - f(y_n)| > \varepsilon$$

ma le successioni x_n e y_n appartengono sempre ad un compatto, quindi esisteranno sottosuccessioni x_{k_n} e y_{k_n} convergenti. Supponiamo che $x_{k_n} \rightarrow x^* \in A$ allora per disuguaglianza triangolare:

$$|y_{k_n} - x^*| = |y_{k_n} - x_{k_n} + x_{k_n} - x^*| \leq |y_{k_n} - x_{k_n}| + |x_{k_n} - x^*| < \delta_n + |x_{k_n} - x^*|$$

ma dato che $x_{k_n} \rightarrow x^*$ tutto il modulo è boundato da un infinitesimo, e quindi abbiamo $y_{k_n} \rightarrow x^*$ a questo punto siamo *cucinati*, perchè

$$x_{k_n} \rightarrow x^*$$

$$y_{k_n} \rightarrow x^*$$

implica, per la continuità di f :

$$f(x_{k_n}) \rightarrow f(x^*)$$

$$f(y_{k_n}) \rightarrow f(x^*)$$

ma allora la loro differenza tende a 0, assurdo. □

Cosa succede invece sui non chiusi e non limitati? Per prima cosa abbiamo due condizioni necessarie:

Teorema 4.12 (Criterio di non uniforme continuità)

Se f è definita su un insieme aperto limitato B è uniformemente continua allora esiste una f' continua (e quindi uniformemente continua, per Heine-Cantor) definita su $\overline{B}$ tale che in B coincide con f .

Il contronominale di ciò è che se f non ammette un'estensione per continuità, allora f non è uniformemente continua.

Dimostrazione. Costruiamo esplicitamente f' . Sugli elementi di B è chiaro che f' debba coincidere con f , prendiamo quindi un punto x appartenente a $\overline{B}$ ma non a B , ovvero un punto di accumulazione di B . Per definizione di punto di accumulazione esisterà una successione $\{x_n\}$ di punti in B che tende a x . Dato che B è limitato, anche la sua chiusura è limitata, in particolare x è finito, ma allora x_n converge, dunque è di Cauchy. Ma allora comunque preso un $\delta > 0$ definitivamente avremo che

$$|x_n - x_m| < \delta$$

ma dato che x_n, x_m sono punti di B per l'uniforme continuità abbiamo che per ogni $\varepsilon > 0$ per un $\delta' > 0$ abbastanza piccolo se

$$|x_n - x_m| < \delta'$$

allora

$$|f(x_n) - f(x_m)| < \varepsilon$$

definitivamente. Dunque scegliendo sempre $0 < \delta < \delta'$ abbastanza piccoli (cosa che possiamo fare, dato che x_n è di Cauchy), abbiamo che anche $f(x_n)$ è di Cauchy. Ma allora $f(x_n)$ convergerà ad un valore L , definiamo quindi

$$f'(x) := L$$

a questo punto notiamo che L non dipende dalla scelta di x_n , infatti se per assurdo esistessero due successioni x_n e y_n tali che tendano entrambe a x , e inoltre

$$f(x_n) \rightarrow L$$

$$f(y_n) \rightarrow L'$$

allora avremmo che esiste un $\varepsilon > |L - L'|$ tale che definitivamente:

$$|f(x_n) - f(y_n)| > |L - L'| - \varepsilon$$

ma per l'uniforme continuità esisterà un $\delta > 0$ tale che

$$|x_n - y_n| < \delta \implies |f(x_n) - f(y_n)| < |L - L'| - \varepsilon$$

e dato che x_n e y_n tendono allo stesso limite, avremo che definitivamente la loro differenza sarà minore di δ , dunque l'unica possibilità è che $L = L'$. A questo punto ci resta da verificare che f' sia continua in x , ma abbiamo appena dimostrato che comunque presa una sequenza

$$x_n \rightarrow x$$

abbiamo

$$f'(x_n) = f(x_n) \rightarrow L = f'(x)$$

che per il 3.4 è esattamente equivalente alla continuità, e quindi abbiamo finito. $\square$

Teorema 4.13 (della Farfalla)

Sia f una funzione uniformemente continua definita su un insieme B illimitato, allora esistono due costanti $m, q > 0$ tali che

$$|f(x)| \leq m|x| + q$$

per ogni $x \in B$.

Dimostrazione. Prendiamo una f uniformemente continua e dimostriamo soltanto il caso $x > 0$ e $f(x) > 0$, tenendo a mente che gli altri casi sono analoghi. Fissiamo un $\varepsilon > 0$, dato che f è uniformemente continua esisterà un $\delta' > 0$ tale che per ogni scelta di x, y vale:

$$|x - y| < \delta' \implies |f(x) - f(y)| < \delta'.$$

Definiamo a questo punto $\delta := \delta'/2$ e dividiamo $\mathbb{R}_{\geq 0}$ negli intervalli

$$A_n := [n\delta, (n+1)\delta]$$

questi chiaramente sono tutti chiusi e limitati, quindi per il teorema di Weierstrass la funzione continua f avrà un massimo in ciascuno di questi intervalli, definiamo allora la successione

$$a_n := \arg \max_{x \in A_n} f(x)$$

Ovvero, ogni a_n è il valore in A_n per cui f assume il massimo. Vogliamo dimostrare che per $x, y \in A_n$ per ogni n vale la seguente disuguaglianza

$$f(y) \leq \frac{\varepsilon}{\delta}x + f(a_0)$$

procediamo per induzione su n . Il passo base è $x \in A_0$, ma è chiaro che

$$f(y) \leq f(a_0) \leq \frac{\varepsilon}{\delta}x + f(a_0)$$

quindi abbiamo quanto volevamo mostrare. Supponiamo ora per induzione che la tesi sia vera fino ad un certo A_k , allora abbiamo per $x, y \in A_k$

$$f(y) \leq \frac{\varepsilon}{\delta}x + f(a_0)$$

in particolare quindi questa disuguaglianza varrà per $y = a_k$ ovvero

$$f(a_k) \leq \frac{\varepsilon}{\delta}x + f(a_0)$$

ma notiamo che per come abbiamo definito gli A_k abbiamo che

$$a_{k+1} - a_k \leq (k+2)\delta - k\delta = 2\delta = \delta'$$

quindi per l'uniforme continuità di f abbiamo

$$f(a_{k+1}) - f(a_k) \leq |f(a_{k+1}) - f(a_k)| \leq \varepsilon$$

che implica direttamente

$$f(a_{k+1}) - \varepsilon \leq f(a_k) \leq \frac{\varepsilon}{\delta}x + f(a_0)$$

cioè abbiamo appena dimostrato che per ogni $x \in A_k$ vale

$$f(a_{k+1}) \leq \frac{\varepsilon}{\delta}(x + \delta) + f(a_0)$$

ma questa era proprio la tesi che volevamo dimostrare, infatti abbiamo che per ogni $y \in A_{k+1}$ vale

$$f(y) \leq f(a_{k+1}) \leq \frac{\varepsilon}{\delta}(x + \delta) + f(a_0)$$

e inoltre $x \in A_k \iff x + \delta \in A_{k+1}$, dunque abbiamo chiuso per induzione. A questo punto la tesi originale si ottiene imponendo $x = y$, $m = \varepsilon/\delta$ e $q = f(a_0)$. $\square$

questo teorema ci dice subito che tutto quello che asintoticamente cresce più che linearmente non è uniformemente continuo. Non è vero purtroppo che se la funzione è boundata in quel modo, allora è uniformemente continua. Un esempio elementare è la funzione $\sin(x^2)$. Vediamo infine una condizione sufficiente per l'uniforme continuità:

Teorema 4.14 (Dell'asintoto)

Sia f una funzione continua definita su un insieme B limitato solo da un lato e chiuso, allora se f ha un asintoto orizzontale (o obliquo) è uniformemente continua.

Dimostrazione. Consideriamo il caso più generale di asintoto obliquo, il caso di asintoto orizzontale seguirà di conseguenza. Assumiamo WLOG che B sia limitato da sinistra. Fissiamo un $\varepsilon > 0$, dobbiamo dimostrare che esiste un delta che soddisfi la definizione di continuità uniforme. Sia $mx + q$ l'asintoto di f , allora sappiamo che per ogni $\varepsilon' > 0$ esiste un $M \in B$ tale che

$$x \in (M, \infty) \cap B \implies |f(x) - mx - q| < \varepsilon'$$

scegliamo allora $\varepsilon' = \varepsilon/3$, possiamo scrivere B come unione disgiunta dei due insiemi

$$I := (M, \infty) \cap B$$

$$K := B \setminus I$$

in particolare abbiamo che K è chiuso e limitato, quindi f sarà uniformemente continua su K , ovvero esisterà un δ_K che soddisfa la definizione di continuità uniforme per ε se $x, y \in K$. Se $x, y \in I$ abbiamo che, definito

$$\delta_I := \frac{\varepsilon}{3|m|}$$

se $|x - y| < \delta_I$ possiamo scrivere, sommando e sottraendo una quantità conveniente, che

$$|f(x) - f(y)| = |f(x) - mx - q - (f(y) - my - q) + m(x - y)|$$

a questo punto quindi applicando la disuguaglianza triangolare

$$|f(x) - f(y)| = \dots \leq \varepsilon' + \varepsilon' + |m(x - y)| \leq 2\varepsilon' + |m| \frac{\varepsilon}{3|m|} = \varepsilon.$$

Rimane solo il caso $x \in K$ e $y \in I$, ma dato che f è continua in M esisterà un δ_M tale che

$$x \in (M - \delta_M, M + \delta_M) \implies |f(x) - f(M)| < \varepsilon/2$$

e quindi per la disuguaglianza triangolare

$$|x - y| < \delta_M/2 \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

E quindi per concludere ci basta scegliere

$$\delta = \min \{\delta_K, \delta_I, \delta_M/2\}$$

perchè soddisfi la definizione di continuità uniforme, come desiderato. $\square$

§4.4 Ordini di infinitesimo

Vogliamo formalizzare e generalizzare ulteriormente la notazione o piccolo introdotta in precedenza.

Definizione 4.15 (Gerarchia degli infinitesimi). Siano f e g due funzioni infinitesime per x che tende a x^* . Si dice che f è *infinitesima di ordine superiore* rispetto a g sse

$$\lim_{x \rightarrow x^*} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

e scriviamo

$$o(g(x)) = f(x)$$

analogamente diciamo che f e g hanno lo stesso ordine di infinitesimo se e solo se il loro rapporto tende ad un limite finito, in questo caso si dice che f è asintotico a g e si scrive

$$f(x) \sim_{x^*} g(x)$$

attenzione che questa notazione non è da intendersi transitiva (esempio, se $x^2 = o(x)$ e $x^3 = o(x)$ non è vero che $x^2 = x^3$).

Proposizione 4.16 (Principio di sostituzione)

Sia $f_1 = o(g_1)$ e $f_2 = o(g_2)$ (per $x \rightarrow x_*$) allora le due funzioni

$$\frac{f_1 + g_1}{f_2 + g_2}$$

e

$$\frac{g_1}{g_2}$$

hanno lo stesso limite per $x \rightarrow x_*$.

Possiamo persino definire un'algebra degli o-piccoli:

Proposizione 4.17 (Algebra degli o-piccoli)

Valgono le seguenti

$$k \cdot o(f) = o(f)$$

$$o(f) + o(f) = o(f)$$

$$o(o(f)) = o(f)$$

$$o(f + o(f)) = o(f)$$

$$f \cdot o(g) = o(fg)$$

$$o(f)o(g) = o(fg)$$

Esempio 4.18

Possiamo allora scrivere

$$\sin(x) = x + o(x)$$

per $x \rightarrow 0$. Per questo se proviamo a calcolare il limite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$$

possiamo direttamente brutalmente sostituire e otteniamo:

$$\dots = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + o(x) - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x)}{x^3}$$

Definizione 4.19 (Ordine di infinitesimo). In generale se possiamo scrivere una funzione φ come

$$\varphi(x) = l(x - x_*)^d + o((x - x_*)^d)$$

si dice che φ è un *infinitesimo di ordine d* per x che tende a x_* . Inoltre $l(x - x_*)^d$ prende il nome di *parte principale* di φ mentre le potenze di $(x - x_*)$ si dicono *infinitesimi campione* di φ .

§5 Calcolo Differenziale

Definizione 5.1 (Rapporto Incrementale). Sia $x_0 \in \text{dom}(f)$ chiamiamo *rapporto incrementale* di f in x_0 la funzione

$$R(x, x_0) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

definita su $\text{dom}(f) \setminus \{x_0\}$.

Definizione 5.2 (Derivata). Sia $x_0 \in \text{dom}(f)$, chiamiamo *derivata* di f in x_0 il valore del limite (se esiste):

$$\lim_{x \rightarrow x_0} R(x, x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

una funzione si dice *derivabile* in x_0 se e solo se la sua derivata esiste in x_0 ed è finita. Una funzione si dice derivabile su un insieme se è *derivabile* su tutti i suoi punti. Dall'unicità del limite discende facilmente l'unicità della derivata.

Proposizione 5.3 (Retta che approssima meglio il grafico)

Una funzione f è derivabile in x_0 se e solo se possiamo scrivere

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$$

Dimostrazione. Se la funzione è derivabile ci basta portare a destra il numero $f'(x_0)$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) \iff \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) + (x - x_0)f'(x_0)}{x - x_0} = 0$$

dunque per definizione di o -piccolo abbiamo

$$o(x - x_0) = f(x) - f(x_0) + (x - x_0)f'(x_0)$$

che rigirando ci dà proprio la tesi. Analogamente se abbiamo

$$f(x) = f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$$

troviamo riarrangiando i termini che

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) + \frac{o(x - x_0)}{x - x_0}$$

che prendendo il limite per $x \rightarrow x_0$ ci dà proprio la tesi. $\square$

Definizione 5.4 (Derivate unilaterali). Come per i limiti, presa una funzione f e un punto x_0 interno al dominio possiamo definire le derivate *destra* e *sinistra* nel modo seguente

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \\ \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \end{aligned}$$

Proposizione 5.5 (destra + sinistra = convergenza)

Una funzione è derivabile in x_0 se e solo se le derivate destra e sinistra esistono e coincidono.

I punti di non derivabilità come ci ricordiamo sono di tre tipi: punto angoloso, punto di cuspid e punto a tangente verticale.

Definizione 5.6 (Funzione Derivata e derivate successive). Data una funzione f possiamo definire la *funzione derivata* $f' : \text{dom}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ tale che

$$x_0 \mapsto f'(x_0)$$

se a questo punto $f'(x)$ è a sua volta derivabile, possiamo definire a sua volta la sua funzione derivata, e questa prende il nome di *derivata seconda*. In generale questa nozione si può estendere fino alla derivata n -esima:

$$\frac{d^n f}{dx^n} = \frac{d}{dx} \frac{d^{n-1} f}{dx^{n-1}}$$

Definizione 5.7 (Classe di continuità). Presa una funzione f se esistono e sono continue sul dominio A le funzioni

$$f, f', f'', \dots, f^{(k)}$$

allora diciamo che $f \in C^k(A)$. Se tutte le derivate di f sono continue allora diciamo che

$$f \in C^\infty(A)$$

Proposizione 5.8 (Derivabile implica continua)

Se f è derivabile in x_0 allora f è continua in x_0 .

Dimostrazione. Se f è derivabile possiamo scrivere

$$f(x) - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$$

ma allora facendo il limite che tende a x_0 otteniamo

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) = 0$$

quindi dato che $f(x_0)$ è un numero possiamo scrivere

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

e abbiamo finito. □

tuttavia è chiaro che non valga il contrario, esistono funzioni continue in tutti i punti che hanno punti di non derivabilità (si prenda un $|x|$ ad esempio).

§5.1 regole di derivazione

Teorema 5.9 (Regole di derivazione)

Siano $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ entrambe derivabili nel punto x_0 . Allora

$$\begin{aligned}(f + g)'(x_0) &= f'(x_0) + g'(x_0) \\ (f \cdot g)'(x_0) &= f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0) \\ \left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) &= \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)}\end{aligned}$$

Dimostrazione. Dimostriamo solo la derivata del prodotto in quanto le altre non sono particolarmente edificanti. Abbiamo

$$(f \cdot g)'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0}$$

a questo punto sommando e sottraendo $f(x)g(x_0)$ otteniamo molto convenientemente:

$$\begin{aligned}\dots &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x) - f(x)g(x_0) + f(x)g(x_0) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} = \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} + g(x_0) \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}\end{aligned}$$

che si riduce a quello che volevamo dimostrare perchè f, g sono derivabili e $f(x), g(x_0)$ sono numeri. $\square$

un'applicazione carina è

Corollario 5.10 (Derivata n -esima di un prodotto)

Per calcolare la derivata n -esima di un prodotto possiamo scrivere:

$$(f \cdot g)^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x)$$

Teorema 5.11 (Chain rule)

Se f è derivabile in x_0 e g è derivabile in $f(x_0)$ allora $g \circ f$ è derivabile in x_0 e vale

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0))f'(x_0)$$

Dimostrazione. Dobbiamo dimostrare che

$$g(f(x)) - g(f(x_0)) = g'(f(x_0))f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$$

le ipotesi che abbiamo invece sono

$$g(f(x)) - g(f(x_0)) = g'(f(x_0))(f(x) - f(x_0)) + o(f(x) - f(x_0))$$

$$f(x) - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$$

ma quindi notiamo che sostituendo brutalmente una nell'altra (importante, dobbiamo sostituire anche nell'o-piccolo e usare le proprietà dimostrate prima) otteniamo direttamente la tesi. $\square$

questa cosa è molto facilmente generalizzabile per induzione. Ci manca da capire come si comporta la derivata rispetto all'inversione:

Teorema 5.12 (Derivata della funzione inversa)

Sia $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ continua e strettamente monotona. Sia $x_0 \in (a, b)$ tale che f è derivabile in x_0 e vale $f'(x_0) \neq 0$. Allora la funzione f^{-1} risulta derivabile in $y_0 = f(x_0)$ e vale

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

o equivalentemente

$$(f^{-1})'(x_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x_0))}$$

Dimostrazione. Semplicemente vogliamo calcolare la derivata di

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(f^{-1})(y) - (f^{-1})(y_0)}{y - y_0}$$

ma brutalmente sostituendo $y = f(x)$, $f^{-1}(y) = x$ e analoghi e usando il fatto che $1/x$ è continua abbiamo immediatamente la tesi. $\square$

§5.2 Proprietà locali e teoremi sulle derivate

Uno dei motivi principali per cui ci interessa definire e studiare la derivata di una funzione è per lo studio dei suoi punti stazionari. Definiamo allora:

Definizione 5.13 (Massimi e minimi locali). Sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ e $x \in A$. Diciamo che x è un punto di *minimo locale* se e solo se esiste un intorno U di x tale che

$$f(x) = \min_{t \in U \cap A} f(t)$$

analogamente si definisce per il *massimo locale*.

Definizione 5.14 (Punto stazionario). Se f è una funzione derivabile in x_0 e $f'(x_0) = 0$ allora diciamo che x_0 è un *punto stazionario* di f .

Proposizione 5.15 (Monotona implica derivata non zero)

Sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione monotonamente crescente e derivabile in x_0 , allora $f'(x_0) \geq 0$. Un risultato analogo vale per le monotonamente decrescenti.

Dimostrazione. Prendendo semplicemente

$$R(x) = \frac{f(x_0) - f(x)}{x_0 - x}$$

notiamo che

$$x \geq x_0 \implies f(x) \geq f(x_0) \implies R(x) \geq 0$$

$$x \leq x_0 \implies f(x) \leq f(x_0) \implies R(x) \geq 0$$

dunque il rapporto è sempre positivo, e facendo tendere $x \rightarrow x_0$ abbiamo la tesi. $\square$

Il primo risultato importante di questa sezione è il seguente:

Teorema 5.16 (Fermat)

Preso $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile in x_0 , se x_0 è un punto di massimo o minimo locale interno ad A allora $f'(x_0) = 0$.

Dimostrazione. Dimostriamo il teorema solo nel caso in cui x_0 è un punto di minimo, tenendo a mente che l'altro caso è analogo. Prendiamo un intorno di x_0 in cui x_0 è il minimo di f . Abbiamo che, dato che x_0 è interno ad A esisteranno valori in A minori di x_0 e maggiori di x_0 , dunque:

$$x \leq x_0 \implies \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$$

$$x \geq x_0 \implies \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$$

ma allora passando al limite abbiamo che

$$f'_+(x_0) \geq 0$$

$$f'_-(x_0) \leq 0$$

ma visto che x_0 è derivabile

$$0 \geq f'_-(x_0) = f'(x_0) = f'_+(x_0) \geq 0$$

ovvero $f'(x_0) = 0$. $\square$

Questo teorema è molto più forte di quanto non ci si aspetti, perchè si presta ad essere generalizzato con i seguenti due:

Teorema 5.17 (Rolle)

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione definita sull'intervallo chiuso e limitato $[a, b]$. Se sono soddisfatte:

- La funzione è continua su tutto $[a, b]$.
- La funzione è derivabile su (a, b) .
- $f(a) = f(b)$.

Allora esiste un punto $\xi \in (a, b)$ tale che $f'(\xi) = 0$.

Dimostrazione. Per il teorema di Weierstrass esisteranno due punti m e M tali che

$$f(m) = \min_{x \in [a, b]} f(x)$$

$$f(M) = \max_{x \in [a, b]} f(x)$$

prima di tutto notiamo che se $m = M$ la funzione è costante, e quindi la sua derivata è identicamente nulla su tutto $[a, b]$. Assumiamo allora $m \neq M$, se entrambi sono punti di bordo abbiamo WLOG

$$m = a$$

$$M = b$$

ma sappiamo che $f(a) = f(b)$ quindi di nuovo la funzione è costante. Infine, se uno tra m ed M è un punto interno, per il teorema di Fermat abbiamo che $f'(m) = 0$ o $f'(M) = 0$, come richiesto. $\square$

Teorema 5.18 (Lagrange)

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definita su un chiuso e limitato, continua su tutto il dominio e derivabile in (a, b) . Allora esiste un $\xi \in (a, b)$ tale che

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Dimostrazione. L'idea fondamentale è che possiamo ricondurci a Rolle sottraendo la retta passante per i punti $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$. Consideriamo quindi la funzione

$$g(x) := f(x) - f(a) - (x - a) \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

questa è continua in $[a, b]$, derivabile in (a, b) e soddisfa $g(a) = g(b) = 0$, dunque per Rolle esisterà un $\xi \in (a, b)$ che ne annulla la derivata, ovvero

$$0 = g'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

che muovendo un po' i termini diventa

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

come desiderato. $\square$

Questo teorema è finalmente una forma sufficientemente generale da poter essere applicato per dimostrare una vasta gamma di teoremi. Vedremo una sezione composta solo da applicazioni di questo teorema, ma prima consideriamo una ulteriore generalizzazione:

Teorema 5.19 (Cauchy)

Siano $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, con $[a, b]$ chiuso e limitato, due funzioni continue su $[a, b]$ e derivabili su (a, b) allora esisterà un ξ tale che

$$[f(b) - f(a)] g'(\xi) = [g(b) - g(a)] f'(\xi)$$

o equivalentemente se $g'(x) \neq 0$ per ogni x allora

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

Dimostrazione. Costruiamo la funzione

$$h(x) = [f(b) - f(a)]g(x) - [g(b) - g(a)]f(x)$$

questa chiaramente soddisfa le ipotesi del teorema di Rolle, inoltre

$$h(a) = f(b)g(a) - g(b)f(a)$$

$$h(b) = f(b)g(a) - g(b)f(a)$$

quindi per il teorema di Rolle abbiamo uno $\xi \in [a, b]$ tale che

$$h'(\xi) = 0$$

che era esattamente quanto volevamo mostrare. Inoltre se $g'(x) \neq 0$ per ogni $x \in [a, b]$, per la contronominale del teorema di Rolle abbiamo che g è iniettiva, quindi anche $g(a) - g(b) \neq 0$, che ci dà la seconda tesi. $\square$

§5.3 Conseguenze del Teorema di Lagrange

Proposizione 5.20 (Primitiva di 0)

Se f è derivabile su I un intervallo ed è tale che $f'(x) = 0$ per ogni $x \in I$ allora f è costante su I .

Dimostrazione. Siano $x_1 < x_2 \in I$ allora per Lagrange esiste

$$f'(\xi) = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}$$

e dato che la derivata è identicamente nulla e $x_1 \neq x_2$ abbiamo che

$$f(x_1) = f(x_2)$$

da cui abbiamo che f è costante. $\square$

Proposizione 5.21 (Caratterizzazione della monotonia con le derivate)

Se f è derivabile su I intervallo e per ogni $x \in I$ interno all'intervallo si ha che $f'(x) \geq 0$ se e solo se f è monotona crescente (e analogamente vale per $f'(x) \leq 0$).

Dimostrazione. Un verso è ovvio usando la definizione di derivata come rapporto incrementale. L'altro verso si fa considerando due punti $x_1 < x_2 \in I$ e dunque applicando Lagrange

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi)$$

ma allora

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1)$$

e quindi abbiamo che il RHS è positivo, e dunque lo sarà anche il LHS. Questa è la definizione di monotonia, e quindi abbiamo finito. $\square$

Proposizione 5.22 (Caratterizzazione di massimi e minimi con le derivate)

Se f è derivabile in I intervallo, $x_0 \in I$ interno con $f'(x_0) = 0$ allora abbiamo due casi:

- Se $f'(x) < 0$ in un intorno sinistro di x_0 e $f'(x) > 0$ in un intorno destro di x_0 allora x_0 è un punto di minimo localmente stretto per f . Analogamente vale per il max-
- Se $f'(x)$ non cambia segno in un intorno di x_0 allora f è monotona in quell'intorno.

Dimostrazione. Segue da quanto appena dimostrato. □

Questa cosa si può generalizzare con

Proposizione 5.23 (Trovare massimi e minimi con le derivate)

Se f è derivabile in I intervallo e $x_0 \in I$ è un punto interno con $f'(x_0) = 0$ ed esiste la derivata seconda in x_0 allora se $f''(x_0) > 0$ allora x_0 è un punto di minimo locale, viceversa è un punto di massimo locale.

Proposizione 5.24 (Caratterizzazione delle Lipschitziane con le derivate)

Sia f una funzione derivabile su un intervallo I allora f è lipschitziana su I con costante minore o uguale a L se e solo se

$$|f'(x)| \leq L$$

Dimostrazione. Un verso è facile, ci basta far tendere $x \rightarrow y$ nella definizione di Lipschitziana. L'altro verso è dato da Lagrange: prendiamo $x_1 \neq x_2 \in I$ allora per Lagrange

$$f'(\xi) = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}$$

quindi prendendo i moduli

$$\frac{|f(x_1) - f(x_2)|}{|x_1 - x_2|} = |f'(\xi)| \leq L \iff |f(x_1) - f(x_2)| \leq L |x_1 - x_2|$$

che è la definizione di Lipschitziana. □

Definizione 5.25 (Primitiva). Se f è una funzione definita su un intervallo I , si dice che $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ è una *primitiva* di f se F è derivabile in I e

$$F'(x) = f(x)$$

per ogni $x \in I$.

Proposizione 5.26 (Le primitive sono definite a meno di una costante)

Se f è derivabile in I e F, G sono due sue primitive, allora esiste una costante k tale che per ogni $x \in I$ vale

$$F(x) + k = G(x)$$

Dimostrazione. Prendendo la differenza delle primitive abbiamo

$$[F(x) - G(x)]' = F'(x) - G'(x) = f(x) - f(x) = 0$$

quindi per quanto detto prima $F - G$ è a derivata 0, quindi è costante, ovvero la tesi. $\square$

§5.4 Convessità

Definizione 5.27 (Convessità). Una funzione f si dice *convessa* sull'intervallo $[a, b]$ se e solo se comunque presi due punti del grafico, il segmento che unisce i due punti sta "sopra" il grafico, ovvero per ogni $\lambda \in [0, 1]$ e ogni scelta di $x, y \in [a, b]$ vale:

$$\lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) \geq f(\lambda x + (1 - \lambda)y)$$

equivalentemente una funzione è *convessa* se e solo se il suo *epigrafico* è convesso. Infine una funzione si dice *concava* se $-f$ è convessa.

Proposizione 5.28 (Caratterizzazione della convessità con il rapporto incrementale)

Una funzione f è convessa su un intervallo I se e solo se per ogni $x_0 \in I$ il rapporto incrementale $R(x_0, x)$ è crescente su I .

Dimostrazione. Dimostriamo che comunque preso un punto $x_2 \in I$ e un punto $x_1 \in [x_0, x_2]$ allora la retta passante per x_0, x_1 è sempre sotto la retta passante per x_0, x_2 . Vogliamo dimostrare che per ogni $t_1, t_2 \in [0, 1]$ vale

$$f(x_0)t_1 + f(x_1)(1 - t_1) \leq f(x_0)t_2 + f(x_2)(1 - t_2)$$

ma dato che queste sono rette ci basta dimostrare che questa relazione è verificata nei punti x_0 e x_1 . Tuttavia questo è chiaro per la convessità, e quindi abbiamo finito. L'altro verso è analogo. $\square$

Proposizione 5.29 (Caratterizzazione della convessità con le derivate)

Sia f una funzione convessa sull'intervallo I , se x_0 è interno ad I , valgono le seguenti:

- In x_0 esistono finite le derivate destra e sinistra e si ha

$$f'_-(x_0) \leq f'_+(x_0).$$

- Se f è derivabile allora $f'(x)$ è crescente in I .
- Se f è derivabile 2 volte allora f è convessa se e solo se $f''(x) > 0$.

Dimostrazione. Dimostriamo una cosa alla volta

- Siccome per quanto visto prima $R(x_0, x)$ è crescente presi due punti $x < y$ e due incrementi $h > 0$ e $k < 0$ possiamo scrivere

$$R(x, x+h) < R(x+h, y+k) < R(y, y+k)$$

ma allora facendo tendere h e k a 0 otteniamo le derivate destra e sinistra di f che soddisfano la disugugaglianza che volevamo dimostrare.

gli altri due punti sono semplicemente conseguenza di quanto appena visto. □

Proposizione 5.30 (Una funzione convessa sta sempre sopra le sue tangenti)

Sia f una funzione convessa su I . Allora preso $x_0 \in I$ se f è derivabile in x_0 si ha

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

per ogni $x \in I$.

Dimostrazione. Guardiamo $f'_+(x_0)$. Prendiamo due punti $x_0 < y < x$, sappiamo che

$$R(x_0, y) \leq R(x_0, x)$$

se fissiamo x abbiamo

$$f'_+(x_0) = \lim_{y \rightarrow x_0} R(x_0, y) \leq R(x_0, x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

ma dato che f è derivabile riarrangiando i termini otteniamo esattamente la tesi. □

Definizione 5.31 (Punto di flesso). Sia $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ se x_0 è un punto interno del dominio si dice che è un *punto di flesso* per f se una delle due cose è soddisfatta:

1. f è derivabile in x_0 e "cambia concavità" in x_0 , ovvero se prima di x_0 la derivata decresce e poi cresce, o viceversa.
2. $f'_+(x_0) = f'_-(x_0) = \pm\infty$ in x_0 e f cambia concavità in x_0 come sopra.

Parte II

Modulo B

§6 Calcolo Differenziale - continuato

§6.1 Teorema di De l'Hôpital

Il famosissimo teorema di De l'Hôpital ci sarà essenziale per ricavare le espressioni dei polinomi di Taylor e per calcolare molti limiti. Esistono molte varianti del teorema, le enunciamo e dimostriamo tutte:

Teorema 6.1 (De L'Hôpital - caso $\frac{0}{0}$)

Siano $f, g : I \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$ due funzioni continue e derivabili tali che

- $g'(x) \neq 0$ per ogni x in un intorno di x_0 , con x_0 escluso.
- Abbiamo

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$$

- Il limite

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l \in \overline{\mathbb{R}}$$

esiste in $\overline{\mathbb{R}}$.

Allora vale

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = l.$$

Dimostrazione. Cominciamo estendendo per continuità le funzioni $f, g, f'/g'$ grazie alle ipotesi:

$$f(x_0) := 0$$

$$g(x_0) := 0$$

$$\frac{f'(x_0)}{g'(x_0)} := l.$$

D'altra parte per il teorema di Cauchy, preso un punto x nel dominio di f e g possiamo trovare un $\xi \in (x, x_0)$ tale che

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} = \frac{f(x)}{g(x)}$$

da cui, facendo tendere $x \rightarrow x_0$ abbiamo la tesi. $\square$

Teorema 6.2 (De L'Hôpital - caso $\frac{0}{0}$ per il limite infinito)

Siano $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ due funzioni continue e derivabili tali che

- $g'(x) \neq 0$ per ogni x in un intorno di ∞ .
- Abbiamo

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$$

- Il limite

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l \in \overline{\mathbb{R}}$$

esiste in $\overline{\mathbb{R}}$.

Allora vale

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = l.$$

Dimostrazione. Ci si riconduce facilmente al caso prima sostituendo $x = \frac{1}{t}$. $\square$

Il seguente teorema è comunemente noto come "caso $\frac{\infty}{\infty}$ ", anche se l'unica ipotesi davvero necessaria del teorema è che $g(x) \rightarrow \infty$, senza assumere nulla davvero sulla funzione f , a parte il fatto che sia continua e derivabile.

Teorema 6.3 (De L'Hôpital - caso $\frac{\infty}{\infty}$)

Sia $x_0 \in \mathbb{R}$ un punto di accumulazione del dominio. Siano $f, g : I \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$ due funzioni continue e derivabili tali che

- $g'(x) \neq 0$ per ogni x in un intorno di x_0 , con x_0 escluso.
- Abbiamo

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty.$$

- Il limite

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l \in \overline{\mathbb{R}}$$

esiste in $\overline{\mathbb{R}}$.

Allora vale

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = l.$$

Dimostrazione. Assumiamo $x_0 \in \mathbb{R}$, abbiamo visto prima come ricondursi agli altri casi. Per ipotesi sappiamo che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un $\delta_1 > 0$ tale che

$$l - \varepsilon < \frac{f'(x)}{g'(x)} < l + \varepsilon$$

per ogni $x \in (x_0, x_0 + \delta_1)$. Applicando il teorema di Cauchy allora abbiamo che esiste un

$$x_0 < \xi < x < x_0 + \delta_1$$

tale che

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(x) - f(x_0 + \delta_1)}{g(x) - g(x_0 + \delta_1)}$$

quindi in particolare abbiamo

$$l - \varepsilon < \frac{f(x) - f(x_0 + \delta_1)}{g(x) - g(x_0 + \delta_1)} < l + \varepsilon$$

a questo punto vorremmo isolare la frazione $f(x)/g(x)$, il trucco è moltiplicare per $\frac{g(x) - g(x_0 + \delta_1)}{g(x)}$ da entrambi i lati, cosa che possiamo fare solo se

$$\frac{g(x) - g(x_0 + \delta_1)}{g(x)} \geq 0 \iff g(x) \geq g(x_0 + \delta_1)$$

d'altra parte possiamo sfruttare l'ipotesi che g tenda a infinito in x_0 per scegliere un δ_2 tale che

$$g(x) \geq g(x_0 + \delta_1)$$

per ogni $x \in (x_0, x_0 + \delta_2)$. Quindi facendo il prodotto e spostando un po' di cose

$$(l - \varepsilon) \left(1 - \frac{g(x_0 + \delta_1)}{g(x)}\right) + \frac{f(x_0 + \delta_1)}{g(x)} < \frac{f(x)}{g(x)} < \frac{f(x_0 + \delta_1)}{g(x)} + (l + \varepsilon) \left(1 - \frac{g(x_0 + \delta_1)}{g(x)}\right)$$

ovvero i due bound sono rispettivamente

$$l - \varepsilon + \frac{(l - \varepsilon)g(x_0 + \delta_1) + f(x_0 + \delta_1)}{g(x)}$$

$$l + \varepsilon + \frac{(l + \varepsilon)g(x_0 + \delta_1) + f(x_0 + \delta_1)}{g(x)}$$

che evidentemente tendono a $l + \varepsilon$ per $g(x) \rightarrow \infty$, quindi esisterà un δ_3 tale che

$$\frac{(l - \varepsilon)g(x_0 + \delta_1) + f(x_0 + \delta_1)}{g(x)} < \varepsilon$$

$$\frac{(l + \varepsilon)g(x_0 + \delta_1) + f(x_0 + \delta_1)}{g(x)} < \varepsilon$$

ovvero abbiamo che per $x_0 < x < x_0 + \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$

$$l - 2\varepsilon < \frac{f(x)}{g(x)} < l + 2\varepsilon$$

ovvero il limite destro in x_0 soddisfa la tesi. Il limite sinistro si fa allo stesso modo, e quindi abbiamo finito. $\square$

§6.2 I polinomi di Taylor/McLaurin

Abbiamo già visto introducendo le derivate che una caratterizzazione della derivata è proprio

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$$

in un certo senso quindi abbiamo trovato "il miglior polinomio di primo grado che approssima la funzione in quel punto". Questo è sicuramente potente, ma alle volte ci piacerebbe avere più precisione, e trovare polinomi di grado più alto che approssimino meglio la funzione.

Definizione 6.4 (Polinomio di Taylor). Sia $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e x_0 un punto interno dell'intervallo I , si dice che il polinomio

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n = \sum_{k=0}^n a_k(x - x_0)^k$$

è un polinomio di Taylor per f centrato in x_0 se

$$f(x) = P_n(x) + o((x - x_0)^n)$$

Teorema 6.5 (Unicità del polinomio di Taylor)

Sia $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e x_0 un punto interno dell'intervallo I . Se abbiamo due polinomi $P_n(x)$ e $Q_n(x)$ di Taylor per f centrati in x_0 allora

$$P_n(x) = Q_n(x)$$

Dimostrazione. Esplicitamente i due polinomi saranno

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k(x - x_0)^k$$

$$Q_n(x) = \sum_{k=0}^n b_k(x - x_0)^k$$

d'altra parte, usando la definizione di polinomio di Taylor abbiamo che

$$P_n(x) - Q_n(x) = o(x - x_0)^n$$

che per definizione di o -piccolo è equivalente a

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P_n(x) - Q_n(x)}{(x - x_0)^n} = 0.$$

Ora, sostituendo le espressioni esplicite per P e Q :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{a_0 - b_0 + \sum_{k=1}^n (a_k - b_k)(x - x_0)^k}{(x - x_0)^n} = 0$$

ma d'altra parte la sommatoria sopra si cancella per $x \rightarrow x_0$, quindi il limite è

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{a_0 - b_0}{(x - x_0)^n} = 0$$

che implica $a_0 = b_0$. Sostituendo questa condizione nel limite originale otteniamo che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(a_1 - b_1)(x - x_0) + \sum_{k=2}^n (a_k - b_k)(x - x_0)^k}{(x - x_0)^n}$$

ma come prima, semplificando un $x - x_0$ sopra e sotto, otteniamo $a_1 = b_1$. Reiterando questo ragionamento per induzione abbiamo la tesi. $\square$

Ora ci piacerebbe tanto avere anche un teorema di esistenza, in effetti

Teorema 6.6 (Taylor)

Se f è una funzione derivabile $n - 1$ volte, x_0 è un punto interno al suo dominio, ed esiste $f^{(n)}(x_0)$ allora il suo polinomio di Taylor è

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o(x - x_0)^n$$

per ogni n .

Dimostrazione. Procediamo per induzione su n . Supponiamo per induzione che tutti i polinomi di Taylor di grado $\leq n$ siano di quella forma. Vogliamo dimostrare che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k}{(x - x_0)^n} \stackrel{?}{=} 0$$

ma notiamo che questo è un limite della forma $\frac{0}{0}$ che soddisfa le ipotesi del teorema di De L'Hopital, quindi se deriviamo sopra e sotto abbiamo

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{(k-1)!} (x - x_0)^{k-1}}{n(x - x_0)^{n-1}} = 0$$

ma notiamo che la sommatoria sopra è esattamente il polinomio di Taylor di ordine $n - 1$ per la funzione $f'(x)$, che continua a soddisfare le ipotesi del teorema, e quindi abbiamo proprio, per ipotesi induttiva

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{(k-1)!} (x - x_0)^{k-1}}{n(x - x_0)^{n-1}} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{n} 0 = 0$$

che era la tesi. Ci rimane solo il caso base, ma segue dalla definizione di derivata, e quindi abbiamo finito. $\square$

Esempio 6.7

Il polinomio di Taylor centrato in 0 della funzione e^x è

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n)$$

Esempio 6.8

Il polinomio di Taylor centrato in 0 della funzione $\sin x$ è

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} (-1)^k + o(x^n)$$

notiamo che se n è pari, il polinomio di Taylor di ordine n è uguale al polinomio di Taylor di ordine $n + 1$.

§6.3 Il resto di Lagrange

Finora abbiamo detto soltanto che il resto di del polinomio di Taylor è un o piccolo. Cerchiamo di essere un po' più quantitativi:

Teorema 6.9 (Resto di Lagrange)

Se $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione derivabile $n + 1$ volte in I e x_0 è un punto interno di I allora per ogni x esiste un ξ compreso tra x e x_0 tale che:

$$f(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1} + \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$$

in particolare il primo termine si dice *resto di Lagrange*.

Dimostrazione. Procediamo per induzione. Nel caso base $n = 0$ la formula che dobbiamo dimostrare è semplicemente

$$f(x) = f'(\xi)(x-x_0) + f(x_0)$$

che è equivalente a

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(\xi)$$

che è semplicemente l'enunciato del teorema di Lagrange. Supponiamo ora che per una funzione derivabile n volte valga la tesi. Prendiamo una funzione derivabile $n + 1$ volte, vogliamo dimostrare che esiste un ξ compreso tra x e x_0 tale che

$$\frac{f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k}{\frac{(x-x_0)^{n+1}}{(n+1)!}} \stackrel{?}{=} f^{(n+1)}(\xi)$$

d'altra parte se definiamo

$$g(x) := f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$$

$$h(x) := \frac{(x-x_0)^{n+1}}{(n+1)!}$$

abbiamo che $g(x)$ e $h(x)$ sono derivabili e soddisfano le ipotesi del teorema di Cauchy, inoltre dato che $g(x_0) = h(x_0) = 0$ abbiamo che esiste un ξ compreso tra x e x_0 tale che:

$$\frac{g(x)}{h(x)} = \frac{g(x) - g(x_0)}{h(x) - h(x_0)} = \frac{g'(\xi)}{h'(\xi)}$$

cioè

$$\frac{f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k}{\frac{(x-x_0)^{n+1}}{(n+1)!}} = \frac{f'(\xi) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k+1)}(\xi)}{k!}(x-x_0)^k}{\frac{(\xi-x_0)^n}{n!}}$$

ma d'altra parte quella a destra è proprio l'espressione del resto del polinomio di Taylor per la funzione $f'(x)$ derivabile n volte valutata in ξ , dunque esisterà un ξ' compreso tra ξ e x_0 (e quindi anche tra x e x_0) tale che

$$\frac{f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k}{\frac{(x-x_0)^{n+1}}{(n+1)!}} = \frac{f'(\xi) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k+1)}(\xi)}{k!}(x-x_0)^k}{\frac{(\xi-x_0)^n}{n!}} = \frac{d^n f'}{d^n x}(\xi') = f^{(n+1)}(\xi')$$

come volevasi dimostrare. $\square$

§7 Serie numeriche

Definizione 7.1 (Serie). Data una successione a_n la sua serie è definita come il limite

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n := \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N a_n$$

si dice che la serie è *convergente*, se tale limite esiste finito, *divergente* se esiste infinito e *irregolare* se non esiste.

Definizione 7.2 (Assoluta convergenza). Sia a_n una successione. Diciamo che la sua serie è *assolutamente convergente* se

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$$

converge ad un valore finito (notiamo che il limite esisterà sempre in quanto monotona crescente), il punto è capire se il valore è limitato.

Il primo fatto che useremo estensivamente è

Teorema 7.3 (Criterio del confronto)

Siano a_n e b_n due successioni tali che definitivamente

$$b_n \geq a_n \geq 0$$

allora abbiamo

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \geq \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

dunque in particolare se la serie dei b_n converge convergerà anche a_n , e se la serie degli a_n diverge divergerà anche quella dei b_n .

Dimostrazione. Senza perdere di generalità possiamo assumere che $0 \leq a_n \leq b_n$ (se così non è semplicemente portiamo fuori dalle somme i termini che non soddisfano la disuguaglianza e li trattiamo indipendentemente). Definiamo semplicemente le due quantità

$$\sigma_N := \sum_{n=1}^N a_n$$

$$s_N := \sum_{n=1}^N b_n$$

a questo punto abbiamo che

$$s_N \geq \sigma_N$$

per ogni n , dunque per il teorema dei carabinieri

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \lim_{N \rightarrow \infty} s_N \geq \lim_{N \rightarrow \infty} \sigma_N = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

il che completa la dimostrazione. □

Da qui abbiamo immediatamente che:

Lemma 7.4 (Convergenza assoluta è più forte di convergenza)

Sia

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n$$

una serie che converge assolutamente. Allora converge anche normalmente.

Dimostrazione. Consideriamo le somme parziali

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{a_n \geq 0}^N a_n + \sum_{a_n < 0}^N a_n \right)$$

ma notiamo che al variare di N le due successioni che abbiamo scritto all'interno sono monotone, quindi saranno entrambe limitate. D'altro canto sappiamo che la seguente serie converge, ed è maggiore o uguale di

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| &\geq \sum_{a_n \geq 0}^{\infty} |a_n| = \sum_{a_n \geq 0}^{\infty} a_n \\ \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| &\geq \sum_{a_n < 0}^{\infty} |a_n| = - \sum_{a_n < 0}^{\infty} a_n \iff - \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| \leq \sum_{a_n < 0}^{\infty} a_n \end{aligned}$$

quindi le successioni sono anche limitate (rispettivamente dall'alto e dal basso), e quindi convergeranno. Dato che entrambe le successioni convergono anche la loro somma convergerà, e quindi abbiamo la tesi. $\square$

Tuttavia il contrario non è necessariamente vero, infatti:

Esempio 7.5 (Serie di Leibniz)

Un esempio di serie che converge, ma non converge assolutamente è

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n}$$

infatti

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

converge, mentre la sua versione assoluta è molto famosamente

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

che diverge.

Lemma 7.6 (Una serie convergente è una successione infinitesima)

Se a_n è associata ad una serie che converge, allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Dimostrazione. Sia k il limite della serie degli a_n . Per definizione di limite abbiamo che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un n_0 tale che per ogni $n \geq n_0$:

$$-\varepsilon < k - \sum_{i=0}^n a_i < \varepsilon$$

quindi in particolare varrà anche

$$-\varepsilon < k - \sum_{i=0}^{n+1} a_i < \varepsilon \iff \varepsilon > \sum_{i=0}^{n+1} a_i - k > -\varepsilon$$

che combinata con la condizione di prima ci dà che per ogni $n \geq n_0$ vale

$$-2\varepsilon < a_{n+1} < 2\varepsilon$$

che era la tesi. $\square$

Esempio 7.7 (Serie telescopica)

La serie di *Mengoli* è un esempio molto famoso di serie telescopica:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

possiamo calcolarne il limite usando l'identità

$$\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)}$$

con cui la serie si riduce a

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n(n+1)} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{N+1} \right) = 1$$

le serie che, tramite l'utilizzo di identità simili, si possono semplificare in questo modo si dicono *telescopiche*.

Esempio 7.8 (Serie Geometrica)

La serie geometrica di ragione $q \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ è definita come

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n$$

questa può essere facilmente ricondotta al limite della successione

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N q^n = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1 - q^{N+1}}{1 - q}$$

che abbastanza chiaramente converge sse $|q| < 1$, ovvero

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N q^n = \frac{1}{1 - q}$$

§7.1 Criteri elementari: asintotico, radice e rapporto

Teorema 7.9 (Confronto asintotico)

Siano a_n e b_n due successioni tali che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

allora la serie degli a_n converge assolutamente se e solo se converge assolutamente la serie dei b_n .

Dimostrazione. Per ogni $\varepsilon > 0$ sappiamo che definitivamente vale:

$$\left| \frac{a_n}{b_n} - L \right| < \varepsilon$$

ma allora per la disuguaglianza

$$||x| - |y|| < |x - y|$$

abbiamo che per ogni $\varepsilon > 0$ definitivamente

$$\left| \frac{|a_n|}{|b_n|} - |L| \right| < \left| \frac{a_n}{b_n} - L \right| < \varepsilon$$

cioè

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|b_n|} = |L|$$

scegliamo $\varepsilon = |L|/2$ abbiamo che per ogni $n \geq n_0$ vale

$$\frac{1}{2} |L| |b_n| < |a_n| < \frac{3}{2} |L| |b_n|$$

il che vuol dire che

$$\frac{1}{2} |L| \sum_{n=n_0}^{\infty} |b_n| < \sum_{n=n_0}^{\infty} |a_n| < \frac{3}{2} |L| \sum_{n=n_0}^{\infty} |b_n|$$

che implica direttamente la tesi. □

Teorema 7.10 (Criterio della Radice per le serie)

Sia a_n una successione a valori positivi tale che

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = L$$

allora se

- $L < 1$ la serie degli a_n converge.
- $L > 1$ la serie degli a_n diverge.

Dimostrazione. Dobbiamo dimostrare due cose:

- $L < 1$: la condizione sul limsup vuol dire che definitivamente $\sqrt[n]{a_n} < L$. Ma questo vuol dire che esiste un n_0 tale che per ogni $n \geq n_0$ abbiamo

$$\sqrt[n]{a_n} < L \iff a_n < L^n$$

il che vuol dire che

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n < \sum_{n=n_0}^{\infty} L^n = \frac{1}{1-L} - \sum_{n=0}^{n_0-1} L^n$$

che quindi implica che la successione converge.

- $L > 1$: la condizione sul limsup vuol dire che per ogni $\varepsilon > 0$ la successione a_n è frequentemente

$$\sqrt[n]{a_n} > L - \varepsilon$$

sia quindi b_n la successione degli a_n che soddisfano questa condizione abbiamo

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \geq \sum_{n=0}^{\infty} b_n \geq \sum_{n=0}^{\infty} (L - \varepsilon)^n$$

ma d'altra parte scegliendo un $L - 1 > \varepsilon > 0$ abbiamo che quella a destra è una serie geometrica divergente, e quindi la serie degli a_n diverge.

Dunque abbiamo dimostrato la tesi in entrambi i casi, e abbiamo finito. $\square$

Un corollario immediato di ciò è:

Corollario 7.11 (Criterio del rapporto per le serie)

Sia a_n una successione reale positiva, e sia

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$$

allora se

- $L < 1$ la serie degli a_n converge.
- $L > 1$ la serie degli a_n diverge.

Dimostrazione. Per il criterio della radice per le successioni 2.31 ci riconduciamo immediatamente al criterio della radice. $\square$

In realtà il criterio della radice che abbiamo enunciato sopra è fin troppo stringente, infatti a noi basterebbe avere il limsup di $\sqrt[n]{a_n}$, mentre 2.31 ci dà direttamente il limite. Possiamo quindi rilassare leggermente le ipotesi del criterio del rapporto grazie al teorema di Cesàro, che ci garantisce che per ogni a_n e b_n vale

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{\Delta x_n}{\Delta y_n} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\Delta x_n}{\Delta y_n}$$

a questo punto vorremmo trovare due x_n e y_n tali che

$$\frac{x_n}{y_n} = \sqrt[n]{a_n}$$

$$\frac{\Delta x_n}{\Delta y_n} = \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

d'altra parte scegliendo $x_n = \ln a_n$ e $y_n = n$ abbiamo proprio

$$\exp \frac{x_n}{y_n} = \exp \left(\ln \left(a_n^{1/n} \right) \right) = \sqrt[n]{a_n}$$

$$\exp \frac{\Delta x_n}{\Delta y_n} = \exp (\ln a_{n+1} - \ln a_n) = \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

che per la continuità e la monotonia di $\exp$ ci permettono di applicare effettivamente Cesàro, da cui otteniamo la versione forte del criterio del rapporto per le serie:

Teorema 7.12 (Criterio del rapporto forte per le serie)

Sia a_n una successione reale positiva, abbiamo due casi:

- La serie converge se

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1.$$

- La serie diverge se

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1.$$

§7.2 Criteri avanzati: condensazione, Abel-Dirichlet e Leibniz

Per alcune serie sia il criterio della radice che del rapporto falliscono. In questi casi ci dobbiamo arrangiare in altri modi, per esempio con:

Teorema 7.13 (Criterio di condensazione di Cauchy)

Data una successione a_n non negativa monotona decrescente, la sua serie converge se e solo se converge la sua serie *condensata*, ovvero

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty \iff \sum_{n=0}^{\infty} 2^n a_{2^n} < \infty.$$

Dimostrazione. L'idea chiave è scrivere la serie originale nel modo seguente:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=2^{n-1}}^{2^n-1} a_k$$

in questo modo usando il fatto che la successione è monotonamente decrescente ogni termine può essere stimato dall'alto con il termine di indice più basso della successione, cioè

$$\sum_{k=2^{n-1}}^{2^n-1} a_k \leq a_{2^{n-1}} (2^n - 2^{n-1}) = 2^{n-1} a_{2^{n-1}}$$

quindi abbiamo un verso della tesi, ovvero

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=2^{n-1}}^{2^n-1} a_k \leq \sum_{n=0}^{\infty} 2^n a_{2^n}$$

d'altra parte per stimare dal basso ci basta prendere il termine di indice più grande, cioè

$$\sum_{k=2^{n-1}}^{2^n-1} a_k \geq a_{2^{n-1}} (2^n - 2^{n-1}) \geq a_{2^n} 2^{n-1}$$

da cui abbiamo che

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=2^{n-1}}^{2^n-1} a_k \geq \sum_{n=1}^{\infty} 2^{n-1} a_{2^n} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$$

dunque abbiamo che

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_n \geq \sum_{n=1}^{\infty} a_n \geq \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$$

che implica la tesi. $\square$

Una prima applicazione di questo criterio consiste nel

Esempio 7.14 (Serie armonica generalizzata)

Dato $\alpha \in \mathbb{R}$ dimostrare che la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$$

converge se e solo se $\alpha > 1$.

Soluzione. Applicando il criterio di condensazione di Cauchy abbiamo che la convergenza equivale a

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{2^{n\alpha}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n(\alpha-1)}}$$

che è una serie geometrica di ragione $\frac{1}{2^{\alpha-1}}$ e quindi converge se e solo se la ragione è minore di 1, ovvero

$$\frac{1}{2^{\alpha-1}} < 1 \iff \alpha - 1 > 0 \iff \alpha > 1$$

che era la tesi. $\square$

Esempio 7.15 (Serie logaritmiche)

Dato $\alpha \in \mathbb{R}$ studiare la convergenza della seguente serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \log^\alpha n}.$$

Soluzione. Di nuovo applicando Cauchy vogliamo studiare la convergenza della serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{2^n \log^\alpha(2^n)}$$

cioè

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha \log^\alpha 2} = \frac{1}{\log^\alpha 2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$$

che quindi converge se e solo se $\alpha > 1$. $\square$

Ora vogliamo studiare le serie a segno possibilmente variabile, del tipo

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{in\theta}$$

ovvero serie con un termine "di rotazione". Notiamo che questo generalizza molto bene cose del tipo le serie a segni alterni, i cui il termine generale di solito ha una forma simile a $(-1)^n a_n$. Abbiamo

Teorema 7.16 (Criterio di Abel-Dirichlet)

Data una successione $a_n \in \mathbb{R}$ monotonamente decrescente e infinitesima e una successione $b_n \in \mathbb{C}$ la cui *primitiva* è limitata, cioè tale che esista una costante M tale che:

$$\left| \sum_{n=1}^N b_n \right| \leq M$$

allora la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$$

converge.

Dimostrazione. Applicando la formula di somma per parti³ abbiamo

$$\sum_{n=1}^N a_n b_n = a_0 b_0 - a_N B_N - \sum_{n=1}^N B_n (a_{n+1} - a_n)$$

d'altra parte dato che B_N è limitata, prendendo il limite da entrambi i lati evidentemente $a_N B_N \rightarrow 0$, e quindi vorremmo che la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} B_n (a_{n+1} - a_n)$$

converga. Tuttavia possiamo dimostrare qualcosa di più forte, ovvero che converge assolutamente, infatti possiamo ricondurci ad una serie telescopica con:

$$\sum_{n=1}^{\infty} |B_n (a_{n+1} - a_n)| \leq M \sum_{n=1}^{\infty} |a_{n+1} - a_n| = M \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1}) = M a_1$$

dunque la serie convergerà anche semplicemente, e la tesi segue. $\square$

In effetti questo criterio si può generalizzare giocando un po' con le ipotesi anche al caso di serie completamente complesse, abbiamo:

³Vedi gli appunti di Complementi di Analisi.

Teorema 7.17 (Abel-Dirichlet complesso)

Se la successione infinitesima $a_n \in \mathbb{C}$ è tale che

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n - a_{n+1}| < \infty$$

e la successione $b_n \in \mathbb{C}$ è tale che la sua primitiva è limitata, allora la successione

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$$

converge.

Dimostrazione. Essenzialmente analoga alla precedente applicando la formula di somma per parti e ragionando sulla convergenza assoluta. $\square$

E infine un corollario di ciò è il criterio di Leibniz:

Corollario 7.18 (Criterio di Leibniz)

Sia a_n una successione reale decrescente infinitesima, allora la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$$

converge.

Dimostrazione. Bovina applicazione di Abel-Dirichlet. $\square$

Quindi infine facciamo quanto ci eravamo prefissati:

Esempio 7.19 (Pseudo-Fourier)

Studiamo la convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{in\theta}}{n^\alpha}$$

al variare di $\alpha, \theta \in \mathbb{R}^+$.

Soluzione. Per $\theta = 0$ ci riconduciamo alla serie armonica generalizzata. Notiamo inoltre che la serie è periodica rispetto a θ , di periodo 2π , dunque ci restringiamo al caso $\theta \in (0, 2\pi)$. Vorremmo applicare Abel-Dirichlet, per fare ciò ci basta dimostrare che

$$S_N = \sum_{n=1}^N e^{in\theta}$$

è boundata. In effetti abbiamo che, usando un trucco simile a quello della serie geometrica:

$$e^{i\theta} \sum_{n=1}^N e^{in\theta} = \sum_{n=2}^N e^{in\theta}$$

ovvero

$$e^{i\theta} S_N = S_N + (e^{i(N+1)\theta} - 1)$$

da cui

$$S_N = \frac{e^{i\theta(N+1)} - 1}{e^{i\theta} - 1}$$

che è molto facile da boundare con la disuguaglianza triangolare e viene

$$|S_N| = \left| \frac{e^{i\theta(N+1)} - 1}{e^{i\theta} - 1} \right| \leq \frac{2}{|e^{i\theta} - 1|}$$

che implica che la serie converge per tutti gli α se $\theta \neq 2\pi k$ per qualche $k \in \mathbb{Z}$. $\square$

Un caso particolare di ciò sono le serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n\theta)}{n^\alpha}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\theta)}{n^\alpha}$$

che convergono per tutti i θ non multipli di 2π .

§7.3 Commutatività

Sappiamo che se sommiamo un numero finito di numeri, non importa in che ordine decidiamo di risolvere le operazioni, il risultato sarà sempre lo stesso. Vale lo stesso anche quando sommiamo un numero infinito di numeri? Vediamo:

Teorema 7.20 (Commutatività nelle serie assolutamente convergenti)

Prendiamo una serie che converge assolutamente

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n.$$

Sia poi $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ un *riordinamento* dei numeri naturali, ovvero una bigezione dai naturali ai naturali. Allora anche

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_{\sigma(n)}$$

converge assolutamente, e inoltre

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_{\sigma(n)} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n.$$

Dimostrazione. Abbiamo per ipotesi che esiste un $k \in \mathbb{R}$ tale che

$$k = \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$$

ovvero, dato che la serie dei valori assoluti è per forza monotona, per ogni $\varepsilon > 0$ avremo che esiste un N_0 tale che per ogni $N \geq N_0$ si ha:

$$k - \varepsilon < \sum_{n=0}^N |a_n| < k$$

ora, dato che σ è bigettiva, esisterà un $M \leq N$ tale che tra i termini $a_{\sigma(1)}, \dots, a_{\sigma(M)}$ siano presenti tutti i termini dell'insieme $a_1, \dots, a_N$. Ma allora avremo

$$\sum_{n=0}^N |a_n| \leq \sum_{n=0}^M |a_{\sigma(n)}|$$

ma d'altro canto esisterà anche un $N' \geq M$ tale che tra i termini $a_1, \dots, a_{N'}$ siano presenti tutti i termini dell'insieme $a_{\sigma(1)}, \dots, a_{\sigma(M)}$, e quindi avremo:

$$\sum_{n=0}^M |a_{\sigma(n)}| \leq \sum_{n=0}^{N'} |a_n|$$

e quindi abbiamo che

$$k - \varepsilon < \sum_{n=0}^N |a_n| \leq \sum_{n=0}^M |a_{\sigma(n)}| \leq \sum_{n=0}^{N'} |a_n| < k$$

e quindi la serie riordinata converge assolutamente proprio a k . Ci manca da dimostrare che le serie convergono semplicemente allo stesso valore. Supponiamo che la serie degli a_n converga ad s , allora per ogni $\varepsilon > 0$ vogliamo trovare che esiste un N_0 tale che per ogni $N \geq N_0$ vale

$$\left| s - \sum_{n=1}^N a_{\sigma(n)} \right| < \varepsilon$$

d'altra parte notiamo che la somma a destra è finita, e quindi possiamo permutare i termini come vogliamo, in particolare dato che σ è biettiva possiamo trovare un $\bar{n}$ tale che

$$\sum_{n=1}^N a_{\sigma(n)} = \sum_{n=1}^{\bar{n}} a_n + \sum_{\substack{n=1 \\ \sigma(n) > \bar{n}}}^N a_{\sigma(n)}$$

e per $N \rightarrow \infty$ abbiamo che $\bar{n} \rightarrow \infty$. Allora usando la disuguaglianza triangolare

$$\left| s - \sum_{n=1}^{\bar{n}} a_n - \sum_{\substack{n=1 \\ \sigma(n) > \bar{n}}}^N a_{\sigma(n)} \right| \leq \left| s - \sum_{n=1}^{\bar{n}} a_n \right| + \sum_{\substack{n=1 \\ \sigma(n) > \bar{n}}}^N |a_{\sigma(n)}|$$

d'altra parte abbiamo che

$$\sum_{\substack{n=1 \\ \sigma(n) > \bar{n}}}^N |a_{\sigma(n)}| \leq \sum_{n=\bar{n}}^N |a_n| \leq \sum_{n=\bar{n}}^{\infty} |a_n|$$

e quindi dato che la serie degli a_n converge assolutamente e converge semplicemente a s abbiamo che per ogni $\varepsilon > 0$ esisterà un $\bar{n}$ tale che

$$\left| s - \sum_{n=1}^{\bar{n}} a_n \right| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\sum_{n=\bar{n}}^{\infty} |a_n| < \frac{\varepsilon}{2}$$

e quindi possiamo finire le stime

$$\left| s - \sum_{n=1}^N a_{\sigma(n)} \right| < \cdots < \left| s - \sum_{n=1}^{\bar{n}} a_n \right| + \sum_{\substack{n=1 \\ \sigma(n) > \bar{n}}}^N |a_{\sigma(n)}| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

da cui abbiamo la tesi. $\square$

Teorema 7.21 (Riemann)

Sia ora una serie che converge, ma **non** assolutamente:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

Allora per ogni $L \in \mathbb{R}$ esiste un riordinamento dei naturali σ tale che

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)} = L.$$

Dimostrazione. Facciamo solo il caso in cui $L \in \mathbb{R}$. Assumiamo WLOG che $a_n \neq 0$ per ogni n . A questo punto dividiamo a_n in due sottosuccessioni:

$$b_1, b_2, b_3, \dots$$

costituita da tutti i termini positivi di a_n , e

$$c_1, c_2, c_3, \dots$$

costituita da tutti i termini negativi di a_n , cambiati di segno. La prima cosa che si vede è che

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \infty$$

e allo stesso tempo

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = \infty$$

infatti se entrambe convergessero, convergerebbe anche la somma, ovvero la serie convergerebbe assolutamente. Se una delle due convergesse e l'altra non convergesse, avremmo che la serie originale non converge, allo stesso modo assurdo. Prendiamo allora un $L \in \mathbb{R}$, costruiamo σ :

$$a_{\sigma(1)} := \begin{cases} b_1 & \text{se } L \geq 0 \\ -c_1 & \text{se } L < 0 \end{cases}$$

procediamo allora per induzione, supponiamo di aver già definito tutti i $\sigma(k)$ per ogni $0 < k < n$ usando i termini in b fino ad $\bar{k}$ e i termini in c fino a $\bar{h}$. Definiamo allora

$$a_{\sigma(n)} := \begin{cases} b_{\bar{k}+1} & \text{se } \sum_{j=1}^{n-1} a_{\sigma(j)} \leq L \\ -c_{\bar{h}+1} & \text{se } \sum_{j=1}^{n-1} a_{\sigma(j)} > L \end{cases}$$

ma questo riordinamento è chiaramente iniettivo (perchè ogni immagine viene chiamata sempre solo una volta), ed è suriettivo, perchè se per assurdo non copriremmo un certo $a_{\sigma(k)}$ avremmo scelto solo un numero finito di a_n positivi (o negativi) e un numero infinito di a_n negativi (o positivi), e dunque la serie che stiamo costruendo diverge a $-\infty$ (o a $+\infty$) per quanto dimostrato prima sulle serie associate a c_n e b_n .

Ora fissiamo un $\varepsilon > 0$:

- per quanto detto nel lemma 7.6 avremo che esiste un $\bar{n}$ tale che per ogni $n \geq \bar{n}$ vale

$$|a_{\sigma(n)}| < \varepsilon$$

infatti, noi sappiamo che per ogni $m \in \mathbb{N}$ esiste un $k \in \mathbb{N}$ tale che per ogni $n \geq k$ vale

$$\sigma(n) > m$$

quindi definitivamente $\sigma(n)$ è maggiore del valore oltre il quale la successione a_n appartiene definitivamente ad $(-\varepsilon, \varepsilon)$.

- Esiste un $\bar{n} \in \mathbb{N}$ tale che

$$\sum_{k=0}^{\bar{n}} a_{\sigma(k)} \geq L$$

infatti se per assurdo fossimo sempre sotto L staremmo sommando all'infinito termini di b_i , e quindi staremmo divergendo all'infinito.

Dunque concludiamo dimostrando che

$$L - \varepsilon < \sum_{k=1}^n a_{\sigma(k)} < L + \varepsilon$$

che è equivalente alla tesi. Infatti per quanto abbiamo appena visto la serie a un certo punto dovrà salire sopra L , e (analogamente) dovrà scendere sotto a L . Se il passaggio da sopra L a sotto L accade con $n \geq \bar{n}$ allora sicuramente il valore della serie troncata ad n dovrà appartenere a $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$, dato che $|a_{\sigma(n)}|$ è minore di ε . Dunque abbiamo finito. $\square$

§7.4 Prodotto di Cauchy

Per le somme finite potevamo fare il prodotto utilizzando la proprietà distributiva:

$$\left(\sum_{n=1}^N a_n \right) \left(\sum_{n=1}^N b_n \right) = \sum_{n=1}^{2N} \sum_{k=\max(1, n-N)}^{\min(N, n)} a_k b_{n-k}$$

Per le somme infinite questa formula continua ad essere vera? Definiamo prima di tutto

Definizione 7.22 (Prodotto secondo Cauchy/Convoluzione). Date due successioni $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definiamo la loro *convoluzione* la successione:

$$c_n := \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k}$$

e in particolare denotiamo la cosa con

$$a_n * b_n = c_n.$$

Questo ci serve, date due serie $\sum a_n$ e $\sum b_n$ per definire il loro *prodotto secondo Cauchy*:

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n\right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n\right) := \sum_{n=1}^{\infty} (a_n * b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k}$$

enfaticizziamo che quello scritto a destra non è l'usuale prodotto tra numeri reali, è un'operazione nuova puramente formale che soddisfa la definizione data sopra.

Dunque dimostriamo che il prodotto di Cauchy è proprio il prodotto tra numeri reali sotto alcune assunzioni:

Teorema 7.23 (Mertens)

Siano $\sum a_n$ e $\sum b_n$ due serie convergenti in $\mathbb{C}$, di cui almeno una delle due assolutamente convergente, allora il prodotto delle serie a_n e B_n secondo Cauchy converge al prodotto dei valori a cui convergono le due serie $\sum a_n$ e $\sum b_n$, ovvero se a_n converge ad A e b_n converge a B si ha

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k} = AB$$

ed in particolare la serie prodotto converge.

Dimostrazione. Facciamo il prodotto di due somme parziali:

$$\left(\sum_{k=1}^N a_k\right) \left(\sum_{n=1}^N b_n\right) = \sum_{k=1}^N a_k \sum_{n=1}^N b_n$$

e facendo un cambio di variabile conveniente

$$\sum_{k=1}^N a_k \sum_{n=1}^N b_n = \sum_{k=1}^N \sum_{n=k+1}^{N+k} a_k b_{n-k} = \sum_{k=1}^N \sum_{n=k}^N a_k b_{n-k} + \sum_{k=1}^N \sum_{n=N+1}^{N+k} a_k b_{n-k}$$

A questo punto notiamo che la prima sommatoria a meno di un cambio di indici è proprio la formula che stiamo cercando (vedi Figura 1), e quindi otteniamo infine:




Figura 1: Cambiare l'ordine di sommazione ci riconduce alla formula che stavamo cercando.

$$\sum_{n=1}^N \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k} + \sum_{k=1}^N a_k (B_N - B_{N-k})$$

dove B_n è la primitiva della successione b_n . A questo punto ci resta da dimostrare soltanto che la successione dei resti

$$R_N := \sum_{k=1}^N a_k (B_N - B_{N-k})$$

è definitivamente minore di $\varepsilon > 0$ per ogni ε . Stimiamo la serie introducendo un estremo $M \leq N$ indipendente:

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^N a_k (B_N - B_{N-k}) \right| &= \left| \sum_{k=1}^M a_k (B_N - B_{N-k}) + \sum_{k=M+1}^N a_k (B_N - B_{N-k}) \right| \leq \\ &\leq \left| \sum_{k=1}^M a_k (B_N - B_{N-k}) \right| + \left| \sum_{k=M+1}^N a_k (B_N - B_{N-k}) \right| \leq \\ &\leq \sum_{k=1}^M |a_k| |B_N - B_{N-k}| + \sum_{k=M+1}^{\infty} |a_k| |B_N - B_{N-k}|. \end{aligned}$$

Assumiamo senza perdita di generalità che $\sum a_n$ converga assolutamente, allora dato che $\sum b_n$ converge esisterà una costante $C > 0$ tale che le somme parziali

$$|B_n| \leq C$$

per ogni n . Dunque abbiamo che la parte infinita di quella sommatoria è

$$\sum_{k=M+1}^{\infty} |a_k| |B_N - B_{N-k}| \leq \sum_{k=M+1}^{\infty} |a_k| (|B_N| + |B_{N-k}|) \leq 2C \sum_{k=M+1}^{\infty} |a_k|$$

e dato che $\sum a_n$ converge assolutamente possiamo scegliere un M indipendentemente da N tale che quella serie sia definitivamente minore di $\varepsilon > 0$. Non ci resta che stimare il pezzo iniziale, che però a questo punto è diventato

$$\sum_{k=1}^M |a_k| |B_N - B_{N-k}|$$

in cui M è costante e minore di N , quindi per N che tende a ∞ chiaramente $B_N - B_{N-k}$ tenderà a 0, in quanto la successione delle somme parziali di b_n è di Cauchy dato che $\sum b_n$ converge. Quindi abbiamo boundato definitivamente con un infinitesimo il resto, e dunque abbiamo finito. $\square$

§8 Integrali di Riemann

Cominciamo questa sezione introducendo alcuni esempi di oggetti problematici, che ci fanno venire voglia di generalizzare il concetto di serie:

Esempio 8.1 (Insieme di Cantor)

Consideriamo l'intervallo $[0, 1]$. L'*insieme di Cantor* è un suo sottoinsieme definito come

$$\mathcal{C} = \bigcap_{n=0}^{\infty} \bigcup_{k=0}^{\frac{3^n-1}{2}} \left[\frac{2k}{3^n}, \frac{2k+1}{3^n} \right]$$

questo può anche essere scritto come rimozione graduale di intervalli, e in questo modo si trova facilmente che la "lunghezza" dell'insieme è

$$1 - \sum_{n=0}^{\infty} 2^n l_n = 1 - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{3^{n+1}} = 1 - \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{3^n} = 1 - \frac{1}{3} \frac{1}{1 - \frac{2}{3}} = 1 - 1 = 0.$$

Un altro esempio è il cosiddetto fiocco di Koch, una curva non rettificabile.

§8.1 Partizioni e definizione

D'ora in poi lavoreremo su funzioni limitate definite su compatti, quindi assumiamo che tutte le nostre funzioni siano più o meno della forma

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

con a, b finiti, e inoltre assumiamo che f sia limitata.

Definizione 8.2 (Partizione). Dato un intervallo $[a, b]$ una sua *partizione n -esima* è l'insieme di intervalli generati da una lista di $n + 1$ numeri reali x_n tali che

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$$

in particolare quindi abbiamo che

$$D = \{I_n \subseteq \mathbb{R} : I_n = [x_n, x_{n+1}]\}.$$

Chiamiamo $\mathcal{D}[a, b]$ l'insieme di tutte le partizioni dell'intervallo $[a, b]$.

Definizione 8.3 (Lunghezza di un intervallo). Dato un intervallo $I = [a, b]$ definiamo la sua lunghezza come

$$|I| := b - a.$$

Definizione 8.4 (Somme inferiori e superiori). Data una partizione di $[a, b]$ e una funzione limitata $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definiamo le *somme di Riemann inferiori e superiori* le seguenti quantità

$$s(f, D) := \sum_{I \in D} |I| \inf_{x \in I} f(x)$$

$$S(f, D) := \sum_{I \in D} |I| \sup_{x \in I} f(x)$$

dove x_n sono gli elementi di D .

A questo punto allora possiamo definire una nozione di ordine parziale tra partizioni:

Definizione 8.5 (Ordine parziale tra partizioni). Date due partizioni D e D' di uno stesso intervallo $[a, b]$ chiuso e limitato diciamo che D' è *più fine* di D e lo denotiamo con $D' \succ D$ se per ogni intervallo $I' \in D'$ esiste un intervallo $I \in D$ tale che $I' \subset I$. Equivalentemente diciamo che D' è *più grossolana* di D . È facile vedere che questo determina un ordine parziale tra le partizioni di $[a, b]$.

E infine definiamo, per riottenere una struttura simile a quella degli insiemi (con cui sappiamo lavorare):

Definizione 8.6 (Unione di partizioni). Date due partizioni D e D' di $[a, b]$ definiamo la loro unione come

$$D \# D' := \{K \in \mathcal{P}([a, b]) : K = I \cap J, I \in D \wedge J \in D'\}$$

dove il simbolo $\#$ è stato introdotto per non fare confusione con il simbolo di unione insiemistica $\cup$, che è comunque valido per le partizioni.

Proposizione 8.7 (Proprietà delle somme di Riemann)

Comunque data una funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ limitata abbiamo:

1. $s(D, f) \leq S(D, f)$.
2. Le somme sono monotone rispetto alla finezza delle partizioni, ovvero se $D' \succ D$ abbiamo:

$$s(D, f) \leq s(D', f)$$

$$S(D, f) \geq S(D', f).$$

3. Per ogni coppia di partizioni D_1, D_2 di $[a, b]$ generiche vale la seguente disuguaglianza:

$$s(D_1, f) \leq S(D_2, f).$$

4. Si ha sempre:

$$\inf_{D \in \mathcal{D}[a, b]} S(D, f) \geq \sup_{D \in \mathcal{D}[a, b]} s(D, f).$$

Dimostrazione. La prima tesi segue semplicemente considerando le due somme finite e migliorando termine a termine gli inf con i sup. La seconda tesi segue considerando $\square$

Dunque siamo pronti a dare la definizione di integrale di Riemann:

Definizione 8.8 (Integrale di Riemann). Una funzione limitata definita su un compatto $[a, b]$ si dice *Riemann integrabile* se le somme di Riemann inferiori e superiori soddisfano

$$\inf_{D \in \mathcal{D}[a, b]} S(D, f) = \sup_{D \in \mathcal{D}[a, b]} s(D, f).$$