Appunti di Analisi 2

Davide Vittone (Modulo A) - UNIPD
Annalisa Massaccesi (Modulo B) - UNIPD

Filippo Gargiulo*

Settembre 2026 - Giugno 2027

Indice

I Modulo A **2**

1 Spazi metrici **2**
1.1 Spazi Normati e metrici . . . 3
1.1.1 Limiti in spazi arbitrari . . . 5
1.1.2 Continuità su spazi arbitrari . . . 7
1.2 Topologia degli spazi metrici . . . 9
1.2.1 Caratterizzazione topologica della continuità . . . 12
1.3 Completezza . . . 16
1.4 Compattezza . . . 18
1.4.1 Continuità e compattezza . . . 20
1.5 Connessione . . . 21
1.5.1 Connessione per archi . . . 23
1.5.2 Semicontinuità . . . 25

2 Spazi di Banach **28**
2.1 Alcuni esempi . . . 28
2.2 Operatori su spazi infinito dimensionali . . . 33
2.2.1 Teorema delle contrazioni . . . 35
2.2.2 Alcune disuguaglianze notevoli . . . 37
2.3 Compattezza sequenziale equivale a compattezza . . . 38
2.4 Ascoli-Arzelà e applicazioni . . . 42

II Modulo B **47**

*Mail per segnalare errori: filippo.gargiulo@studenti.unipd.it

Parte I
Modulo A

§1 Spazi metrici

Definizione 1.1 (Spazio Metrico)**.** Uno spazio metrico è un insieme X equipaggiato con una funzione $d : X \times X \to \mathbb{R}$ tale che, per ogni $x, y, z \in X$ si abbia

- La distanza è sempre positiva, a meno che i punti coincidano, ovvero
$$d(x, y) \geq 0$$
con uguaglianza se e solo se $x = y$.
- La distanza è simmetrica, cioè
$$d(x, y) = d(y, x).$$
- La disuguaglianza triangolare
$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y).$$

La funzione d si chiama appunto *distanza* dello spazio.

Alcuni esempi sono

Esempio 1.2 ($\mathbb{R}$ con varie distanze)
L'insieme $\mathbb{R}$ equipaggiato con
$$d(x, y) := |x - y|$$
è uno spazio metrico. Così come
$$d(x, y) := \sqrt{|x - y|}$$
e in generale qualunque distanza della forma
$$d(x, y) := |x - y|^{\alpha}$$
con $\alpha \in (0, 1]$.

Esempio 1.3 ($\mathbb{C}$)
L'insieme $\mathbb{C}$ con la funzione
$$d(z, w) := |z - w|$$
è uno spazio metrico.

Un esempio più strano è per esempio:

Esempio 1.4 (Distanza discreta)
Qualunque insieme X equipaggiato con la distanza

$$d(x,y) = 1 - \delta_{xy}$$

è uno spazio metrico.

Mentre uno ancora più classico è

Esempio 1.5
Lo spazio $\mathbb{R}^n$ è uno spazio metrico con la distanza

§1.1 Spazi Normati e metrici

Definizione 1.6 (Spazio normato)**.** Uno *spazio normato* è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ equipaggiato con una funzione *norma* $||\cdot|| : V \to [0,\infty)$ tale che, per ogni $x, y \in V$ e $\lambda \in \mathbb{R}$ abbiamo

- La norma è sempre positiva, cioè

  $$||x|| \geq 0$$

  con uguaglianza se e solo se x è nullo.
- La norma è omogenea, ovvero

  $$||\lambda x|| = |\lambda| \, ||x|| \, .$$
- La norma è subadditiva, ovvero

  $$||x + y|| \leq ||x|| + ||y|| \, .$$

L'ultima proprietà in particolare può essere vista come un caso particolare della disuguaglianza triangolare.

Proposizione 1.7 (Ogni spazio normato è metrico)
Se V con la norma $||\cdot||$ è uno spazio normato, allora lo spazio V equipaggiato con la distanza

$$d(x,y) := ||x - y||$$

è uno spazi metrico.

Dimostrazione. Il fatto che la distanza sia semidefinita positiva segue immediatamente dal fatto che la norma sia semidefinita positiva. La simmetria segue dalla omogeneità per scalari negativi. La parte interessante è la disuguaglianza triangolare, per cui abbiamo

$$d(x,y) = ||x - y|| = ||(x - z) + (z - y)|| \leq ||x - z|| + ||z - y||$$

usando la subadditività, da cui abbiamo la tesi. □

Esempio 1.8 (ℓ^1)
Possiamo equipaggiare $\mathbb{R}^2$ con la norma

$$||(x_1, x_2)||_1 = |x_1| + |x_2|$$

per renderlo uno spazio normato.

Esempio 1.9 (ℓ^∞)
Possiamo equipaggiare $\mathbb{R}^2$ con la norma

$$||(x_1, x_2)||_\infty = \max\{x_1, x_2\}$$

per renderlo uno spazio normato.

Abbiamo visto a geometria che tutti gli spazi con prodotto interno sono anche normati, e di conseguenza sono anche metrici. A questo proposito ricordiamo la disuguaglianza di Cacuchy-Schwarz:

Teorema 1.10 (Cauchy-Schwarz)
In tutti gli spazi con prodotto V abbiamo, per ogni x, y:

$$|\langle x, y\rangle| \leq ||x||\,||y||$$

con uguaglianza se e solo se x, y sono linearmente dipendenti.

Dimostrazione. Una dimostrazione alternativa consiste nel considerare il polinomio:

$$P(t) := ||x + ty||^2 = ||x||^2 + 2t\langle x, y\rangle + t^2\,||y||$$

ma essendo che questo polinomio è sempre maggiore o uguale di 0 abbiamo che il suo determinante deve essere non positivo, ovvero

$$0 \geq \Delta = 4\langle x, y\rangle^2 - 4\,||x||^2\,||y||^2$$

che era la tesi. □

Da questa è immediata dimostrare che $\mathbb{R}^n$ è uno spazio normato.

Corollario 1.11 ($\mathbb{R}^n$ è metrico)
Lo spazio $\mathbb{R}^n$ equipaggiato con la distanza indotta dalla norma indotta dal prodotto scalare standard è metrico.

Dimostrazione. Basta mostrare che è normato, le prime due proprietà seguono dalle proprietà del prodotto scalare, la subadditività invece segue da Cauchy-Schwarz:

$$||x + y||^2 = ||x||^2 + 2\langle x, y\rangle + ||y||^2 \leq ||x||^2 + 2\,||x||\,||y|| + ||y||^2 = (||x|| + ||y||)^2$$

da cui la subadditività, e quindi la tesi. □

In uno spazio metrico ha senso definire:

Definizione 1.12 (Palla aperta)**.** In uno spazio metrico (X, d) per ogni $x \in X$ e $r \in \mathbb{R}$ non negativo definiamo la palla aperta di raggio r come

$$B(x, r) := B_r(x) := \{y \in X : d(x, y) < r\}.$$

Esempio 1.13 (Ferrovie francesi)

Possiamo equipaggiare $\mathbb{R}^2$ con la seguente distanza per renderlo uno spazio metrico:

$$d(x, y) = \begin{cases} ||x - y|| & \text{se } x,\ y \text{ sono linearmente dipendenti} \\ ||x|| + ||y|| & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Che forma hanno le palle in questo spazio metrico? Beh se $r < ||x||$ abbiamo che $B_r(x)$ è semplicemente un segmento centrato in x di ampiezza $2r$ e allineato con 0. D'altra parte se $r \geq ||x||$ si aggiunge una palla centrata nell'origine di raggio $r - ||x||$.

Possiamo definire un concetto di *sottostruttura* in uno spazio metrico, ovvero

Definizione 1.14 (Spazio metrico restrizione)**.** Uno spazio metrico (X, d) può essere *ristretto* ad uno spazio $Y \subseteq X$ restringendo la funzione $d_{|Y \times Y}$. Le palle in questo caso soddisfano

$$B_Y(x, r) = B_X(x, r) \cap Y.$$

§1.1.1 Limiti in spazi arbitrari

Uno spazio metrico ci dà tutti gli strumenti per parlare degli oggetti che abbiamo incontrato finora in analisi, in particolare

Definizione 1.15 (Successione)**.** Una successione in uno spazio metrico (X, d) è una funzione $x_n : \mathbb{N} \to X$, denotata con $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Definizione 1.16 (Limite)**.** Una successione a_n a valori in X si dice convergere a un punto $x \in X$ se vale

$$\lim_{n \to \infty} d(x_n, x) = 0$$

abbiamo quindi tradotto la nozione di limite su spazi arbitrari mutuandola da $\mathbb{R}$, su cui sapevamo lavorare. In questo caso allora possiamo scrivere $x_n \to x$ oppure

$$\lim_{n \to \infty} x_n = x.$$

Proposizione 1.17 (Unicità del limite)

In qualunque spazio metrico (X, d) se una successione x_n ha limite x, questo è unico.

Dimostrazione. Supponiamo che la successione abbia due limiti x e y, allora

$$0 \leq d(x, y) \leq d(x, x_n) + d(x_n, y)$$

per ogni $n \in \mathbb{N}$. D'altra parte facendo andare $n \to \infty$ abbiamo che entrambi gli addendi al RHS vanno a 0, dunque

$$0 \leq d(x, y) \leq 0$$

da cui $x = y$ per fedeltà della distanza. □

Siamo interessati a lavorare soprattutto in $\mathbb{R}^n$, ovvero:

Proposizione 1.18 (Limiti in $\mathbb{R}^m$)

Sia $X = \mathbb{R}^m$ con la distanza euclidea, definiamo la successione

$$\mathbf{x}_n = \left(x_n^1, x_n^2, \dots, x_n^m\right)$$

allora

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \mathbf{x} = \left(x^1, x^2, \dots, x^n\right)$$

se e solo se

$$\lim_{n\to\infty} x_n^i = x^i$$

per ogni i.

Dimostrazione. Un verso è facile, abbiamo

$$\left|x_n^i - x^i\right| \leq ||x_n - x|| = \sqrt{\sum_{i=1}^{m} \left(x_n^i - x^i\right)^2}$$

da cui abbiamo che se la successione converge in $\mathbb{R}^n$ ogni componente converge individualmente a quello che deve convergere. D'altra parte il contrario è molto facile da dimostrare in modo analogo, e quindi abbiamo finito. □

Come fatto su $\mathbb{R}$ abbiamo:

Definizione 1.19 (Punto di accumulazione)**.** Sia (X, d) è uno spazio metrico e $A \subseteq X$. Un punto $x_0 \in X$ si dice *punto di accumulazione* di A se $\forall r > 0$ si ha

$$[A \cap B(x_0, r)] \setminus \{x_0\} \neq \varnothing.$$

É facile mostrare ora, forse assumendo l'assioma della scelta purtroppo

Proposizione 1.20 (Approssimabilità dei punti di accumulazione)

Se x_0 è un punto di accumulazione di $A \subseteq \mathbb{R}^n$ allora esisterà una successione $x_n \in A$ tale che $x_n \neq x_0$ per ogni n e tale che $x_n \to x_0$.

Da cui possiamo finalmente definire la nozione di limite di funzione:

Definizione 1.21 (Limite di funzione)**.** Dati due spazi metrici (X, d_X) e (Y, d_Y) e una funzione

$$f : A \subseteq X \to Y$$

diremo che, dato un punto di accumulazione x_0 di A, il limite di f per x che tende a x_0 si scrive come

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = y_0 \in Y$$

se e solo se, per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un $\delta > 0$ tale che tutti i punti δ-vicini a x_0 vengono mandati da f in punti ε-vicini a y_0.

E possiamo anche ritrovare il teorema-ponte dato ad Analisi 1:

Teorema 1.22 (Caratterizzazione sequenziale del Limite)

Se X, Y, f, A, x_0 sono insiemi e funzioni come sopra allora sono equivalenti le seguenti:

A) Per $x \to x_0$ la funzione f tende a y_0, ovvero

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = y_0.$$

B) Per ogni successione $x_n \to x$ in X si ha che la successione $f(x_n)$ in Y tende a y_0.

Dimostrazione. Dimostriamo che A implica B. Dato un $\varepsilon > 0$ possiamo trovare un $\delta > 0$ tale che

$$d(x_n, x_0) < \delta \implies d(f(x_n), y_0) < \varepsilon$$

d'altra parte presa una $x_n \to x_0$ abbiamo che definitivamente si avrà $d(x_n, x_0) < \delta$, allora definitivamente si avrà

$$d(f(x_n), y_0) < \varepsilon$$

che è proprio la definizione di $f(x_n) \to y_0$.
Dimostriamo ora il contrario, procedendo per assurdo. Se per assurdo esistesse un $\bar{\varepsilon} > 0$ tale che non esista alcun $\delta > 0$ per cui la condizione del limite si verifica, per definizione di limite allora abbiamo che

$$d(x_n, x_0) < \frac{1}{n}$$

è definitivamente vera, d'altra parte

$$d(f(x_n), x_0) \geq \bar{\varepsilon}$$

è frequentemente vera, il che è assurdo, e dunque abbiamo finito. □

Come per il caso in una variabile possiamo dimostrare tutti i risultati su somme e prodotti di limiti, che quindi non ripeteremo.

§1.1.2 Continuità su spazi arbitrari

Definizione 1.23 (Continuità)**.** Siano X, Y due spazi metrici e $f : X \to Y$ una funzione tra essi. Diciamo che f è *continua* in $x_0 \in X$ se

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).$$

Un modo alternativo di vedere questo è che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un $\delta > 0$ tale che

$$f\left(B_X\left(x_0, \delta\right)\right) \subseteq B_Y\left(f(x_0), \varepsilon\right)$$

insomma ogni δ-palla in X centrata in x_0 viene mandata in una ε-palla centrata in $f(x_0)$. Come al solito inoltre diremo che una funzione f è continua su un insieme $A \subseteq X$ se è continua in ogni punto di A.

Una cosa che possiamo fare immediatamente da qui dunque è

Proposizione 1.24 (Caratterizzazione sequenziale della continuità)

Una funzione $f : X \to Y$ è continua in x_0 se e solo se per ogni successione $x_n \to x_0$ si ha che $f(x_n) \to f(x_0)$.

Euristicamente la continuità non è altro che la nozione che ci permette di scambiare i limiti con le funzioni, cioè

$$f\left(\lim_{x\to x_0} x\right) = \lim_{x\to x_0} f(x)$$

se e solo se f è continua. Come sopra abbiamo che

Proposizione 1.25 (Algebra delle funzioni continue)
Se $f, g : X \to \mathbb{R}$ sono continue in x_0 allora somme, prodotti, rapporti e composizioni (a meno di denominatori nulli) di f e g sono continue.

Vediamo qualche esercizio divertente:

Problema 1.26 (Tutte le funzioni sono continue)**.** Sia (X, d) un insieme equipaggiato con la distanza discreta, allora qualunque funzione $f : X \to \mathbb{R}$ è continua.

Soluzione. Dato $\varepsilon > 0$ vogliamo dimostrare che esiste un $\delta > 0$ tale che

$$f(B_X(x_0, \delta)) \subseteq B_{\mathbb{R}}(f(x_0), \varepsilon)$$

d'altra parte scegliendo un $\delta < 1$ abbiamo che la palla a sinistra è semplicemente il singoletto $\{x_0\}$, e quindi abbiamo proprio

$$\{f(x_0)\} \subseteq B_{\mathbb{R}}(f(x_0), \varepsilon)$$

per definizione di palla, dunque abbiamo finito. □

Il viceversa invece è più strano:

Problema 1.27 (Quasi nessuna funzione è continua)**.** Sia (X, d) un insieme equipaggiato con la distanza discreta, allora se $f : \mathbb{R} \to X$ è una funzione continua, f è costante.

Soluzione. Per continuità sappiamo che per ogni $\varepsilon > 0$ abbiamo che esiste un $\delta > 0$ tale che

$$f(B_{\mathbb{R}}(x_0, \delta)) \subseteq B_X(f(x_0), \varepsilon)$$

d'altra parte se $\varepsilon < 1$ abbiamo che la palla a destra è il singoletto

$$B_X(f(x_0), \varepsilon) = \{f(x_0)\}$$

cioè abbiamo dimostrato che f su $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ è costante. Insomma è *localmente costante*. Definiamo allora la quantità

$$R := \sup\{\delta > 0 : f(t) = f(0) \quad \forall t \in (-\delta, \delta)\}$$

sappiamo per quanto dimostrato finora che R è strettamente positivo, il nostro obbiettivo è dimostrare che è infinito.
Supponiamo per assurdo R finito, allora f è costante in $(-R, R)$, tuttavia dato che f è continua dobbiamo avere, data una successione $x_n \to R$ da sinistra

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(R)$$

d'altra parte tutti i termini della succesione $f(x_n)$ sono uguali a $f(0)$, quindi $f(R) = f(0)$. Analogamente si fa per $f(-R)$, dunque abbiamo mostrato che f è costante in $[-R, R]$. Infine invocando la locale costanza di f in R possiamo trovare che f è costante in $[-R, R + \delta]$, contraddicendo la massimalità di R. □

Soluzione alternativa. Possiamo definire la funzione $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tale che

$$g(t) := d_X\left(f(t), f(0)\right)$$

a questo punto vorremmo dimostrare che questa è continua, in tal caso avremmo che per il teorema dei valori intermedi non può assumere sia valori 0 che valori 1 dunque deve essere costante, in particolare dato che $g(0) = 0$ deve essere costante a 0, cioè f è costante.
Per dimostrare che questa è continua usiamo il fatto che composizione di funzioni continue è a sua volta continua: dobbiamo solo dimostrare che

$$d(-, x_0) : X \to \mathbb{R}$$

è continua. Riassumiamo questo risultato in un lemma.

Lemma 1.28 (La distanza è lipschitziana)
Sia (X, d) uno spazio metrico, allora per ogni x_0 la funzione $f : X \to \mathbb{R}$ definita come

$$f(x) = d(x, x_0)$$

è una funzione continua.

Proof. Prendiamo un $\varepsilon > 0$, guessiamo che $\delta = \varepsilon$, allora per disuguaglianza triangolare abbiamo

$$f(x) - f(y) = d(x, x_0) - d(y, x_0) \leq d(x, y)$$

d'altra parte scambiando i valori di x e y abbiamo che la disuguaglianza rimane valida, quindi

$$|f(x) - f(y)| \geq d(x, y)$$

il che vuol dire qualcosa di più forte della continuità, ovvero abbiamo dimostrato che f è *lipschitziana*. ■

con questo abbiamo finalmente finito. □

§1.2 Topologia degli spazi metrici

Definizione 1.29 (Interno)**.** Dato uno spazio metrico X e un $A \subseteq X$, un punto $x \in X$ si dice *punto interno* ad A se esiste un $r \in \mathbb{R}$ positivo tale che

$$B(x, r) \subseteq A$$

in questo caso A si dice un *intorno* di x. Definiamo inoltre la *parte interna*, come

$$\overset{\circ}{A} := \{x \in X : x \text{ è interno ad } A\}$$

cioè l'insieme di tutti i punti interni ad A.

Definizione 1.30 (Aperto)**.** Un insieme A si dice *aperto*, se ogni suo punto è interno, cioè $A = \overset{\circ}{A}$.

Abbiamo definito le *palle aperte*, ora possiamo dimostrare che queste sono effettivamente aperte:

Proposizione 1.31 (Le palle aperte sono aperte)
Per ogni $x_0 \in X$ e $r \in \mathbb{R}$ abbiamo che $B(x_0, r)$ è aperto.

Dimostrazione. Se $x \in B(x_0, r)$ vogliamo dimostrare che esiste una palla centrata in x contenuta in $B(x_0, r)$. Il candidato migliore è proprio

$$B(x, r - d(x, x_0))$$

prendiamo allora un $y \in B(x, r - d(x, x_0))$, dobbiamo dimostrare che $d(y, x_0) < r$, ma d'altra parte questa è semplicemente un'applicazione della disuguaglianza triangolare

$$d(y, x_0) \leq d(x, x_0) + d(y, x) < r - d(x, x_0) + d(x, x_0) = r$$

come volevamo. □

Una volta definiti gli aperti possiamo, sempre con la metrica, i chiusi:

Definizione 1.32 (Chiusura)**.** Sia X uno spazio metrico e $A \subseteq X$ un insieme. Un punto $x \in X$ si dice *punto di chiusura* di A se $\forall r > 0$ si ha che

$$B(x, r) \cap A \neq \varnothing$$

e allo stesso modo definiamo la *chiusura* di A come

$$\bar{A} = \{x \in X : x \text{ è di chiusura per } A\}$$

cioè l'insieme di tutti i punti di chiusura di A.

Osserviamo che non tutti i punti di chiusura sono punti di accumulazione (basti pensare ai punti isolati), ma il viceversa è sempre vero.

Definizione 1.33 (Chiuso)**.** Un insieme A tale che la chiusura sia l'insieme stesso è detto *chiuso*, ovvero A è chiuso se e solo se $A = \bar{A}$.

Osservazione 1.34 (Ordine interno-insieme-chiusura)**.** Vale la pena notare che

$$\mathring{A} \subseteq A \subseteq \bar{A}$$

per ogni $A \subseteq X$.

Come corollario abbiamo

Corollario 1.35 (Chiusura della palla aperta)
In $\mathbb{R}^n$ la chiusura della palla aperta di raggio r è la palla chiusa di raggio r.

Quanto sopra non vale necessariamente per ogni spazio metrico! E questo è illustrato dal seguente esempio:

Esempio 1.36 (Una palla aperta la cui chiusura non è la palla chiusa)

Prendiamo l'insieme $X = (-\infty, -1) \cup \{0\} \cup (1, \infty)$ con la distanza usuale. Consideriamo allora

$$B(2, 2) = (1, 4)$$

la palla centrata in 2 di raggio 2. Allora la sua chiusura è $[1, 4]$, ma la palla chiusa di raggio 2 centrata in 2 contiene anche lo 0, e quindi abbiamo che la chiusura della palla non è la palla chiusa.

Vediamo ora la normale relazione topologica tra aperti e chiusi:

Proposizione 1.37 (Aperti e chiusi sono complementari)

Per ogni $A \subseteq X$ abbiamo che A è aperto se e solo se $X \setminus A$ è chiuso.

Dimostrazione. Per definizione di aperto abbiamo che

$$A = \{x \in X : \exists r > 0\}$$

□

Come corollario di ciò troviamo che per qualunque spazio metrico X sia lo spazio intero X che il vuoto $\varnothing$ sono sia aperti che chiusi. Una caratterizzazione ulteriore di interno e chiusura è la seguente:

Proposizione 1.38 (Chiusura della chiusura e apertura dell'interno)

Per ogni A l'interno di A è sempre aperto e la chiusura di A è sempre chiusa.

Dimostrazione. Per ogni $x \in \overset{\circ}{A}$ vogliamo trovare una palla tutta contenuta al suo interno. D'altra parte sappiamo che esiste una palla

$$B(x, \tilde{r}) \subseteq A$$

ci basta quindi dimostrare che per ogni $y \in B(x, \tilde{r})$ la palla

$$B(y, \tilde{r} - d(x, y))$$

sta tutta in A, d'altra parte questa è un'applicazione della disuguaglianza triangolare che abbiamo visto prima, e quindi abbiamo finito. Il secondo enunciato si dimostra □

Proposizione 1.39 (Caratterizzazione insiemistica di chiusura e interno)

Per ogni $A \subseteq X$ abbiamo che

$$\overset{\circ}{A} = \bigcup \{B \subseteq A : B \text{ è aperto}\}$$

e analogamente per la chiusura

$$\overline{A} = \bigcap \{B \supseteq A : B \text{ è chiuso}\}$$

Dimostrazione. Per dimostrare la prima cosa, osserviamo anzitutto che, dato che $\overset{\circ}{A}$ è aperto abbiamo chiaramente

$$\overset{\circ}{A} \subseteq \bigcup \{B \subseteq A : B \text{ è aperto}\}$$

d'altra parte abbiamo anche l'inclusione opposta, infatti se $x \in \bigcup \{B \subseteq A : B \text{ è aperto}\}$ allora apparterrà ad almeno un aperto $\mathcal{O} \subseteq A$, ovvero esisterà un $r > 0$ tale che

$$B(x, r) \subseteq \mathcal{O} \subseteq A$$

cioè x è interno. L'altra tesi segue prendendo i complementari. □

Definizione 1.40 (Frontiera)**.** Dato un insieme A, la sua *frontiera* o *bordo* è l'insieme

$$\partial A = \left\{ x \in X : \forall r > 0, B(x, r) \cap A \neq \varnothing \wedge B(x, r) \cap A^{\complement} \neq \varnothing \right\}$$

cioè è l'insieme dei punti per cui ogni palla interseca sia A che il suo complementare.

Una caratterizzazione consiste in

Osservazione 1.41 (Caratterizzazione della frontiera)**.** Per ogni $A \subseteq X$ abbiamo

$$\partial A = \partial \left(X \setminus A \right) = \overline{A} \cap \overline{X \setminus A}.$$

Ulteriormente possiamo scrivere

Osservazione 1.42 (Relazione frontiera-chiusura)**.** Per ogni $A \subseteq X$ abbiamo che

$$\overline{A} = A \cup \partial A = \overset{\circ}{A} \sqcup \partial A$$

Definizione 1.43 (Parte esterna)**.** Per ogni $A \subseteq X$ la *parte esterna* di A è l'insieme dei punti x per cui esiste un $r > 0$ tale che $B(x, r) \cap A = \varnothing$. Tale insieme si denota con $\text{ext}(A)$.

Osservazione 1.44. Per ogni $A \subseteq X$ possimao decomporre X in modo disgiunto come

$$X = \text{ext}A \sqcup \partial A \sqcup \overset{\circ}{A}.$$

§1.2.1 Caratterizzazione topologica della continuità

Cerchiamo di essere un po' più formali riguardo alla topologia:

Definizione 1.45 (Topologia metrica)**.** La *topologia* di uno spazio metrico (X, d) è la famiglia $\tau(X)$ degli insiemi aperti in X, ovvero

$$\mathcal{P}(X) \supseteq \tau(X) := \{A \subseteq X : A \text{ è aperto}\}.$$

Possiamo dimostrare allora

Proposizione 1.46 (Proprietà fondamentali della topologia)

Per ogni (X, d) abbiamo che la topologia di X soddisfa:

1. Sia $\varnothing$ che X sono aperti.
2. Se $A_1, A_2, \dots, A_n \in \tau(X)$ allora anche
$$A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n \in \tau(X)$$
ovvero la topologia è chiusa rispetto a intersezioni finite.
3. La topologia è chiusa rispetto ad unioni arbitrarie, cioè per ogni insieme di indici I, arbitrariamente grande, e data una successione $A_i \in \tau(X)$, arbitrariamente grande, di aperti, abbiamo:
$$\bigcup_{i \in I} A_i \in \tau(X).$$

Dimostrazione. Il primo punto è stato già mostrato. Per il secondo, per ogni punto $x \in \bigcap A_i$ ci basta considerare le palle $B(x, r_i)$ tali che

$$B(x, r_i) \subseteq A_i$$

che esistono per ogni i per definizione di aperto. Dunque abbiamo semplicemente che l'intersezione finita di queste palle è a sua volta una palla, e ha la proprietà che

$$B\left(x, \min_{i \leq n} r_i\right) \subseteq \bigcap_{i=1}^{n} A_i$$

ovvero l'intersezione è aperta. Infine l'ultima proprietà è ancora più facile da mostrare, in quanto se $x \in \bigcup_{i \in I} A_i$ allora esisterà un i tale che $x \in A_i$, ma questo vuol dire che esiste una palla tale che

$$B(x, r) \subseteq A_i \subseteq \bigcup_{i \in I} A_i$$

da cui la tesi. □

Notiamo che l'ipotesi che le intersezioni siano finite è necessaria, infatti:

Esempio 1.47 (Topologia non chiusa per intersezioni arbitrarie)

La topologia non è chiusa per intersezioni arbitrarie, infatti gli insiemi

$$A_i := \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)$$

sono aperti per ogni n, ma

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \{0\}$$

che è evidentemente non aperto (in particolare è chiuso) e quindi abbiamo finito.

Dal teorema sopra discende immediatamente:

Corollario 1.48 (Proprietà dei chiusi)

Per ogni (X, d) abbiamo che l'insieme dei chiusi di X soddisfa:

1. Sia $\varnothing$ che X sono chiusi.
2. L'insieme dei chiusi è chiuso rispetto ad unioni finite.
3. L'insieme dei chiusi è chiuso rispetto ad intersezioni arbitrarie.

Da queste proprietà in realtà possiamo dedurre il punto di partenza della topologia generale:

Definizione 1.49 (Topologia generale)**.** Dato un insieme arbitrario X (non necessariamente uno spazio metrico). Chiamiamo *topologia* una famiglia $\tau(X) \subseteq \mathcal{P}(X)$ che verifica le proprietà 1,2,3 dimostrate sopra. La coppia (X, τ) dunque si dice *spazio topologico*.

É importante notare che una topologia sia un concetto strettamente più debole di una metrica, infatti esistono spazi topologici i cui aperti possono non essere indotti da una metrica, e questi si dicono *non metrizzabili*.
Nonostante ciò, finora abbiamo trattato la nozione di continuità come intrinsecamente *metrica*. Questo non è vero, anzi la topologia nasce proprio come studio delle funzioni continue, che fungono da morfismi nello studio degli spazi topologici:

Teorema 1.50 (Caratterizzazione topologica della continuità)

Siano X e Y due spazi metrici e $f : X \to Y$ una funzione tra essi. Allora sono equivalenti le seguenti cose:

1. La funzione f è continua.
2. Per ogni aperto $A \subseteq Y$ abbiamo che $f^{-1}(A)$ è aperto in X.
3. Per ogni chiuso $C \subseteq Y$ abbiamo che $f^{-1}(C)$ è chiuso in X.

Dimostrazione. Dimostriamo 1 implica 2. Prendiamo allora un aperto A, e consideriamo un $x_0 \in f^{-1}(A)$, allora dobbiamo mostrare che $x \in \int (f^{-1}(A))$. Ma d'altra parte per definizione di aperto questo vuol dire che esiste un $\varepsilon > 0$ tale che

$$B_Y(f(x_0), \varepsilon) \subseteq A$$

e per continuità questo vuol dire che esiste un $\delta > 0$ tale che

$$f(B(x_0, \delta)) \subseteq B_Y\left(f(x_0), \varepsilon\right) \subseteq A$$

allora

$$B_X(x, \delta) \subseteq f^{-1}(A)$$

che è esattamente quello che volevamo mostrare.
Dimostriamo ora che 2 implica 1. Se $f^{-1}(A)$ è aperto per ogni A abbiamo che, dato un $x_0 \in X$ possiamo considerare la palla aperta $B_Y(f(x_0), \varepsilon)$, questa per ipotesi ha preimmagine aperta, dunque esisterà un $\delta > 0$ tale che

$$f\left(B(x_0, \delta)\right) \subseteq B\left(f(x_0), \varepsilon\right)$$

ma questa è proprio la definizione di continuità, quindi abbiamo finito. □

Con questa caratterizzazione alle spalle è molto facile dimostrare che

Corollario 1.51 (Composizione di funzioni continue)
Date due funzioni $f : X \to Y$ e $g : Y \to Z$ continue abbiamo che $g \circ f$ è continua.

Dimostrazione. Brutale applicazione della caratterizzazione sopra. □

Vediamo un esercizio a riguardo:

Problema 1.52 (Sottoinsieme importantissimo!! di $\mathbb{R}^3$)**.** Prendiamo il sottoinsieme di $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tale che

$$\arctan x + e^z + \log(1 + y^2) \leq e^{x^2+z^2} - 2026$$

dimostrare che questo insieme è chiuso.

Soluzione. Semplicemente introducendo la funzione in 3 variabili:

$$f(x, y, z) := \arctan x + e^z + \log(1 + y^2) - e^{x^2+z^2}$$

abbiamo che l'insieme considerato è la preimmagine rispetto a f (che è continua) dell'insieme

$$(-\infty, -2026]$$

che essendo chiuso, ci dà la tesi. □

che è generalizzabile molto facilmente a insiemi e funzioni arbitrari.

Problema 1.53. Prendiamo una $f : \mathbb{R} \to [-M, M]$ limitata, allora il grafico di f è chiuso se e solo se f è continua.

Soluzione. contenuto... □

Problema 1.54. Sia (X, d_X) uno spazio metrico e sia $Y \subseteq X$ un suo sottospazio metrico con $d_Y := d_{X|Y\times Y}$, allora $A \subseteq Y$ è un aperto in Y se e solo se esiste un $B \subseteq X$ aperto in X tale che

$$B \cap Y = A.$$

Soluzione. Un verso è facile, infatti se $B \subseteq X$ è un aperto di X tale che

$$A := B \cap Y$$

allora per ogni $x_0 \in A \subseteq B$ esisterà un $r > 0$ tale che $B_X(x_0, r) \subseteq B$, ma dato che

$$B_Y(x_0, r) = B_X(x_0, r) \cap Y \subseteq B \cap Y = A$$

abbiamo che A è proprio aperto. Il contrario si dimostra considerando un A aperto in Y, allora per ogni $x \in A$ esisterà un $r_x > 0$ tale che $B_Y(x, r_x) \subseteq A$, da cui possiamo definire un aperto come

$$B := \bigcup_{x\in A} B_X(x, r_x)$$

e questo fa proprio il servizio che vogliamo perchè sicuramente

$$A \subseteq B \cap Y$$

dato che in B ci sono tutti i punti di A, ma d'altra parte se $x \in B$ esisterà una palla $B_X(x, r_x)$ a cui appartiene, e quindi dato che

$$B_X(x, r_x) \cap Y = B_Y(x, r_x) \subseteq A$$

abbiamo che ogni punto di $B \cap Y$ appartiene ad A, che termina la dimostrazione. □

§1.3 Completezza

Avviciniamoci a quello che ci interessa effettivamente quando facciamo analisi, ovvero:

Definizione 1.55 (Successione di Cauchy)**.** Una successione $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in (X,d) si dice di *Cauchy* se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un $\overline{n}$ tale che se $m, n \geq \overline{n}$ allora

$$d(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

E dunque

Definizione 1.56 (Completezza metrica)**.** Lo spazio (X,d) si dice *completo*, se ogni successione di Cauchy è convergente.

Abbiamo già visto che in $\mathbb{R}$ essere convergente ed essere di Cauchy sono equivalenti, dunque, da questo discende facilmente che $\mathbb{R}$ è completo, e di conseguenza (ragionando componente per componente) anche $\mathbb{R}^n$ è completo.
Vogliamo arrivare al teorema di completamento degli spazi metrici. Per farlo abbiamo bisogno di un paio di cose prima:

Definizione 1.57 (Isometria)**.** Dati due spazi X, Y una funzione $f : X \to Y$ si dice *isometria* se preserva le distanze, ovvero

$$d_X(x, x') = d_Y\left(f(x), f(x')\right).$$

Due spazi X, Y si dicono *isometrici* se esiste un'isometria biettiva.

Una prima conseguenza di ciò è che un'isometria è sempre iniettiva. D'altra parte non è detto che questa sia suriettiva.

Esempio 1.58 (Isometrie tra reali)
Esiste un'isometria che inserisce $\mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$, ma questa *non può essere iniettiva* (il perché richiede strumenti più avanzati).

Osservazione 1.59. Se $f : X \to Y$ è un'isometria allora f è sempre iniettiva e continua.

Definizione 1.60 (Completamento)**.** Sia (X, d_X) uno spazio metrico. Allora uno spazio (Y, d_Y) si dice *completamento* di X se:

1. Y è completo
2. Contiene una copia isometrica di X, cioè esiste una isometria $f : X \to Y$.
3. L'immagine isometrica a X in Y, ovvero $f(X)$, è densa in Y.

L'ultimo punto ci serve perchè vogliamo che il completamento sia "il più piccolo" sovraspazio completo di X. Se non includessimo la terza proprietà potremmo avere che $\mathbb{R}^2$ è completamento di $\mathbb{Q}$, e questo sarebbe un po' strano.

Esercizio 1.61 (Distanza esponenziale)**.** Consideriamo $\mathbb{R}$ equipaggiato con la distanza

$$d(x, y) := |e^x - e^y|$$

si dimostri che questo è uno spazio metrico, che non è completo, e calcolarne il completamento.

Soluzione. La prima richiesta è lasciata come esercizio. Costruiamo ora una successione di Cauchy non convergente:

$$x_n := -n$$

questa è chiaramente di Cauchy in quanto

$$d(x_n, x_m) = \left|e^{-n} - e^{-m}\right| \leq e^{-m} + e^{-n}$$

che tende chiaramente a 0 come vogliamo. Supponiamo ora per assurdo che $x_n \to x_0$, allora

$$d(x_n, x_0) = \left|e^{-n} - e^{-x_0}\right| \to e^{x_0}$$

ma questa distanza è strettamente positiva, quindi la successione non può tendere a x_0. Il completamento di questo spazio è quindi l'insieme $Y = \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ con la distanza

$$d_Y(x, y) := \begin{cases} |e^x - e^y| & \text{se } x, y \in \mathbb{R} \\ e^x & \text{se } x \in \mathbb{R} \text{ e } y = -\infty \end{cases}$$

e chiaramente $d(-\infty, -\infty) = 0$. Supponiamo allora che $x_n \in Y$ sia di Cauchy, questo vuol dire che definitivamente

$$|e^{x_n} - e^{x_m}| < \varepsilon$$

ma questo vuol dire che la successione e^{x_n} è di Cauchy in $\mathbb{R}$ equipaggiato con la distanza euclidea. Ma allora $e^{x_n} \to t \in [0, \infty)$ converge ad un certo valore t nella metrica di $\mathbb{R}$ euclideo. Questo vuol dire che, per continuità del logaritmo

$$x_n \to \begin{cases} \log t & \text{se } t > 0 \\ -\infty & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

nella distanza di y, □

Il teorema quindi (che non dimostreremo formalmente) è:

Teorema 1.62 (Completamento di uno spazio metrico)

Ogni spazio metrico (X, d) ammette uno e un solo completamento (a meno di isometrie).

Dimostrazione. Consideriamo l'insieme

$$A := \{(x_n)_{n\in\mathbb{N}} : x_n \text{ è di Cauchy in } X\}$$

allora definiamo una relazione di equivalenza tale che

$$x_n \sim y_n \iff d(x_n, y_n) \to 0.$$

Allora il nostro candidato completamento è

$$Y := {}^{A}\!/_{\sim} = \{[(x_n)_{n\in\mathbb{N}}] : (x_n) \in A\}$$

con la distanza

$$d_Y([x_n], [y_n]) := \lim_{n\to\infty} d(x_n, y_n).$$

Ci manca un'isometria $f : X \to Y$, ma questa semplicemente è

$$\begin{aligned} f : X &\to Y \\ x &\mapsto [x_n \equiv x]. \end{aligned}$$

E ora dovremmo dimostrare che questo è un completamento. Non lo faremo. □

Lemma 1.63 (Lemma dei compatti)

Si dimostri che, in uno spazio metrico completo X, data una successione K_n di chiusi decrescente e tale che il diametro tenda a 0 allora

$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}} K_n = \{x\}$$

con $x \in X$.

Dimostrazione. Vedere il lemma dei compatti sugli Appunti di Complementi di Analisi. □

§1.4 Compattezza

Definizione 1.64 (Compattezza sequenziale)**.** Dato uno spazio metrico (X, d), un suo sottoinsieme $K \subseteq X$ si dice *sequenzialmente compatto* se per ogni successione x_n a valori in K, questa ammette una sottosuccessione convergente in K.

Ricordiamo ora che per un insieme E essere *limitato* vuol dire che esiste una palla tale che

$$E \subseteq B(x, r)$$

o analogamente $\operatorname{diam}(E) < \infty$.

Proposizione 1.65 (Sequenzialmente compatto implica chiuso e limitato)

Se un insieme K è sequenzialmente compatto allora è chiuso e limitato.

Dimostrazione. Dobbiamo mostrare che $K = \overline{K}$, prendiamo allora un $x \in \overline{K}$, per definizione esisterà una successione convergente $x_n \to x$ a valori in K. D'altra parte sappiamo per compattezza sequenziale che x_n ammette un punto limite in K, ma visto che x_n converge l'unico punto limite è per forza x, e quindi abbiamo proprio $x \in K$.
Rimane da mostrare che K è limitato. Supponiamo che sia illimitato, allora preso un $x_0 \in K$ abbiamo che per ogni $n \in \mathbb{N}$ si ha

$$K \not\subseteq B(x_0, n)$$

ma questo vuol dire che per ogni $n \in \mathbb{N}$ esiste un $x_n \notin B(x_0, r)$ ma $x_n \in K$. Abbiamo quindi costruito una successione a valori in K, che per compattezza deve avere almeno un punto limite, sia $x_{n_i} \to x$ la sottosuccessione convergente, allora per la disuguaglianza triangolare

$$d(x, x_0) \geq d(x_0, x_{n_i}) - d(x_{n_i}, x)$$

dunque per definizione di x_{n_i} abbiamo che il RHS tende a infinito, mentre il LHS è un numero reale, assurdo, da cui la tesi. □

In $\mathbb{R}^n$ in realtà possiamo fare di meglio, ovvero:

Teorema 1.66 (Heine-Borel)

In $\mathbb{R}^m$ abbiamo che sequenzialmente compatto e chiuso e limitato sono equivalenti.

Dimostrazione. Un vero lo abbiamo già mostrato con la proposizioni prima. Rimane da dimostrare che se $K \subseteq \mathbb{R}^m$ è chiuso e limitato, allora è sequenzialmente compatto. Prendiamo una successione

$$\mathbf{x}_n := \begin{pmatrix} x_n^1 \\ x_n^2 \\ \vdots \\ x_n^m \end{pmatrix}$$

dato che K è limitato avremo che ogni componente di questa successione di punti è limitata, dunque per ogni i possiamo trovare un punto limite per la successione x_n^i. Sia allora $(\mathbf{x}_{n_h})_h$ la successione avente come componenti le sottosuccessioni estratte per ciascuna componente, allora abbiamo

$$\mathbf{x}_{n_h} \to x = \left(x^1, x^2, \dots, x^n\right)$$

rimarrebbe da dimostrare che questo è in K, ma d'altra parte essendo K chiuso conterrà tutti i suoi punti di accumulazione, ed essendo $\mathbf{x}$ proprio un punto di accumulazione di K abbiamo la tesi. □

In spazi metrici arbitrari questo non è necessariamente vero, e dovremmo ricorrere a caratterizzazioni di altro tipo.

Esempio 1.67 (Uno spazio chiuso e limitato che non è compatto)
Lo spazio $\mathbb{R}$ equipaggiato con la distanza

$$d(x, y) = |e^x - e^y|$$

incontrato prima è chiuso e limitato, ma chiaramente non è compatto, in quanto ogni sottosuccessione di $x_n := -n$ non converge.

Quello di cui abbiamo bisogno è ancora di un po' di topologia:

Definizione 1.68 (Ricoprimenti e sottoricoprimenti)**.** Una famiglia di insiemi $\mathcal{F}$ si dice un *ricoprimento* di K se abbiamo

$$K \subseteq \bigcup_{A \in \mathcal{F}} A$$

un ricoprimento si dice *aperto* se composto solo da insiemi aperti, e si dice *finito* se composto da un numero finito di elementi. Un *sottoricoprimento* è una sottofamiglia $\mathcal{F}' \subseteq \mathcal{F}$ di un ricoprimento di A, tale che sia ancora un ricoprimento di A.

Dunque possiamo dare la definizione topologica di compattezza:

Definizione 1.69 (Compattezza topologica)**.** Un sottoinsieme $K \subseteq X$ di uno spazio metrico si dice *compatto* se ogni suo ricoprimento aperto ammette un sottoricoprimento finito.

Teorema 1.70 (Caratterizzazione topologica della compattezza)
In uno spazio X un insieme K è sequenzialmente compatto se e solo se è compatto.

§1.4.1 Continuità e compattezza

Ancora meglio è il seguente fatto:

Teorema 1.71 (Le funzioni continue preservano la compattezza)
Sia $f : X \to Y$ una funzione continua tra gli spazi metrici X e Y, allora se X è compatto anche $f(X)$ è compatto.

Dimostrazione. Prendiamo un ricoprimento aperto A_i di $f(X)$. Allora abbiamo che

$$X = f^{-1}(f(X)) \subseteq f^{-1}\left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) = \bigcup_{i\in I} f^{-1}(A_i)$$

ma per la continuità di f abbiamo che ciascuno degli $f^{-1}(A_i)$ è aperto, cioè abbiamo trovato un ricoprimento di X, ovvero $f^{-1}(A_i)$. Ma per la compattezza di X abbiamo che possiamo estrarre un sottoricoprimento finito, ovvero

$$\bigcup_{i=1}^{n} f^{-1}(A_i) \supseteq X$$

da cui ricaviamo che

$$\bigcup_{i=1}^{n} A_i \supseteq f(X)$$

cioè la tesi. □

Analogamente avremmo potuto fare usando la compattezza sequenziale. Un corollario importante di ciò è

Corollario 1.72 (Weierstrass)
Sia X uno spazio metrico compatto e $f : X \to \mathbb{R}$ una funzione continua. Allora f ammette massimo e minimo.

Dimostrazione. Per quanto appena mostrato abbiamo che $f(X)$ è compatto, ma per Heine-Borel questo vuol dire che è chiuso e limitato. Il fatto che sia limitato ci assicura che abbia sup e inf, mentre il fatto che sia chiuso ci assicura che questi siano un massimo e un minimo. □

Ricordiamo ora la nozione di uniforme continuità:

Definizione 1.73 (Continuità uniforme)**.** Una funzione $f : X \to Y$ si dice *uniformemente continua* se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un $\delta > 0$ tale che, per ogni $x_1, x_2 \in X$ si ha

$$d(x_1, x_2) < \delta \implies d(f(x_1), f(x_2)) < \varepsilon.$$

E recuperiamo quanto sapevamo da analisi 1:

Teorema 1.74 (Heine-Cantor)
Sia $f : X \to Y$ una funzione continua tra spazi metrici. Allora se X è compatto f è uniformemente continua.

Dimostrazione. Se per assurdo f non fosse uniformemente continua allora avremmo che esiste un $\overline{\varepsilon} > 0$ per cui nessun $\delta > 0$ soddisfa la definizione di uniforme continuità. Allora in particolare avremo che esistono due successioni x_n e y_n di punti in X tali che

$$d_X(x_n, y_n) < \frac{1}{n}$$

ma

$$d_Y\left(f(x_n), f(y_n)\right) \geq \overline{\varepsilon}.$$

Per compattezza sequenziale a questo punto abbiamo che esisterà una sottosuccessione $x_{n_i} \to x_0$ d'altra parte questo vuol dire che anche $y_{n_i} \to x_0$ ma allora dobbiamo avere che

$$\overline{\varepsilon} \leq \lim_{i\to\infty} d\left(f(x_{n_i}), f(y_{n_i})\right)$$

ma d'altra parte abbiamo, per disuguaglianza triangolare

$$\lim_{i\to\infty} d\left(f(x_{n_i}), f(y_{n_i})\right) \leq \lim_{i\to\infty} \left[d\left(f(x_{n_i}), f(x_0)\right) + d\left(f(y_{n_i}), f(x_0)\right)\right]$$

che per continuità della distanza tende a 0! Cioè abbiamo la tesi, per assurdo. □

§1.5 Connessione

Diamo la nozione di connessione:

Definizione 1.75 (Connessione)**.** Uno spazio (X, d) si dice *connesso* se, avendo

$$X = A_1 \sqcup A_2$$

dove A_1 e A_2 sono aperti, allora si ha necessariamente che $A_1 = \varnothing$ o $A_2 = \varnothing$. In altre parole X è uno spazio connesso se e solo se gli unici insiemi sia aperti che connessi al suo interno sono $\varnothing$ e X.

Analogamente possiamo dire che un sottoinsieme di $X \supseteq Y$ è connesso se e solo se è connesso come spazio metrico equipaggiato con la distanza indotta da X.

Proposizione 1.76 (Caratterizzazione della connessione in $\mathbb{R}$)
Un insieme $I \subseteq \mathbb{R}$ è connesso se e solo se è un intervallo.

Dimostrazione. Supponiamo che I sia connesso e supponiamo per assurdo che non sia un intervallo, allora esisteranno tre punti $x < y < z$ tali che $x \in I$ e $z \in I$ ma $y \notin I$. Allora possiamo scrivere I come

$$I = (I \cap (-\infty, y)) \sqcup (I \cap (y, \infty))$$

E visto che gli aperti di I sono per definizione l'intersezione tra gli aperti di $\mathbb{R}$ e I abbiamo che i due insiemi che abbiamo in quell'uguaglianza sono aperti. Tuttavia sono anche non vuoti, e quindi I è sconnesso, assurdo.
Supponiamo ora per assurdo che I sia un intervallo, ma esistano due aperti B_1, B_2 di $\mathbb{R}$ non vuoti, tali che $I \cap B_1$ e $I \cap B_2$ siano ancora non vuoti, e:

$$I = (B_1 \cap I) \sqcup (B_2 \cap I).$$

Prendiamo allora $x \in I \cap B_1$ e $y \in I \cap B_2$, e supponiamo WLOG che $x < y$. Consideriamo allora l'insieme

$$\overline{x} := \sup \left\{ x \in I_{[}x, t) \subseteq I \cap B_1 \right\}$$

questo insieme è sicuramente non vuoto in quanto $I \cap B_1$ è aperto, dunque abbiamo che

$$y > \overline{x} > x$$

ma visto che I è un intervallo abbiamo che $\overline{x} \in I$, dunque questo deve appartenere ad uno tra $I \cap B_1$ e $I \cap B_2$. Se stesse in $I \cap B_1$ avremmo un assurdo, perchè essendo $I \cap B_1$ aperto esiste un $\delta > 0$ tale che

$$(\overline{x}, \overline{x} + \delta) \subseteq I \cap B_1$$

contraddicendo la definizione di sup. D'altronde se $\overline{x} \in I \cap B_2$ abbiamo di nuovo che esiste un $\delta > 0$ tale che

$$(\overline{x} - \delta, \overline{x}) \subseteq I \cap B_2$$

che porta di nuovo ad un assurdo. □

Come per la compattezza anche la connessione è una proprietà conservata da mappe continue:

Teorema 1.77 (Invarianza della connessione per continuità)
Data una $f : X \to Y$ continua tra spazi metrici abbiamo che se X è connesso anche $f(X)$ è connesso.

Dimostrazione. Supponiamo che

$$f(X) = [f(X) \cap B_1] \sqcup [f(X) \cap B_2]$$

con B_1, B_2 aperti di Y. Allora

$$X = f^{-1}(f(X)) = \left(X \cap f^{-1}(B_1)\right) \sqcup \left(X \cap f^{-1}(B_2)\right) = f^{-1}(B_1) \sqcup f^{-1}(B_2)$$

ma per continuità questi due insiemi sono entrambi aperti, e quindi uno dei due deve essere vuoto, da cui discende la tesi. □

Dimostrare che le cose non sono connesse di solito si fa riconducendosi al caso di $\mathbb{R}$:

Esempio 1.78 (Spazio senza un piano)
L'insieme

$$X = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : x_1 \neq 0\}$$

non è connesso, infatti la funzione continua

$$f(\mathbf{x}) = x_1$$

ha immagine $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ che non è connessa, e dunque neanche X può esserlo.

Infine un'applicazione di ciò è:

Corollario 1.79 (Dei valori intermedi)
Sia $f : X \to \mathbb{R}$ una funzione continua con X connesso, allora se

$$\inf f < t < \sup f$$

allora esiste un $x \in X$ tale che $f(x) = t$.

Dimostrazione. Semplicemente l'immagine deve essere un intervallo, e dunque segue la tesi. □

§1.5.1 Connessione per archi

In realtà quella che abbiamo appena dato non è l'unica definizione ragionevole di connessione, un'altra è:

Definizione 1.80 (Connessione per archi)**.** Uno spazio metrico (X, d) si dice *connesso per archi* se per ogni $x, y \in X$ esiste una *curva continua* che li congiunge, ovvero esiste una funzione continua

$$\gamma : [0, 1] \to X$$

tale che $\gamma(0) = x$ e $\gamma(1) = y$.

Questa condizione è in effetti più forte della connessione topologica data sopra:

Teorema 1.81 (Connesso per archi è più forte di connesso)
Sia (X, d) uno spazio metrico, allora se X è connesso per archi è anche connesso.

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che X non sia connesso, dunque esistono due aperti non vuoti A_1, A_2 tali che

$$X = A_1 \sqcup A_2$$

prendiamo allora un $x \in A_1$ e un $y \in A_2$, dato che X è connesso per archi deve esistere una curva che connette x con y. Possiamo allora spezzare il dominio della curva come

$$[0, 1] = \Big([0, 1] \cap \gamma^{-1}(A_1)\Big) \sqcup \Big([0, 1] \cap \gamma^{-1}(A_2)\Big)$$

d'altra parte questa è una decomposizione in aperti disgiunti dello spazio metrico $[0, 1]$, ma questo vuol dire che $[0, 1]$ non è connesso, assurdo. □

Il viceversa tuttavia non è necessariamente vero, infatti:

Esempio 1.82 (Seno del topologo)
Consideriamo il sottoinsieme di $\mathbb{R}^2$:

$$X = \left\{ \left(x, \sin \frac{1}{x} \right) : x \in (0, 1] \right\} \cup \{(0, y) : y \in [-1, 1]\} = G \cup S$$

equipaggiato con la distanza euclidea. Allora X è connesso, ma non è connesso per archi.

Dimostrazione. Supponiamo di avere due aperti B_1, B_2 di $\mathbb{R}^2$ tali che

$$G, S \subseteq X \subseteq (X \cap B_1) \sqcup (X \cap B_2)$$

D'altra parte sia G che S sono connessi per archi, e quindi sono anche connessi. Questo vuol dire che dobbiamo avere che uno dei due aperti contiene completamente G, e l'altro ha intersezione nulla con questo. Questo vale anche per S, e supponiamo quindi WLOG che

$$S \subseteq B_1$$

allora in B_1 ci deve essere anche il punto $(0,0)$. Ma visto che B_1 è aperto dobbiamo avere che esiste un $r > 0$ per cui

$$B(r, (0,0)) \subseteq B_1$$

ma visto che G si avvicina arbitrariamente ad S nell'origine dobbiamo avere che $B(r,(0,0)) \cap G \neq \varnothing$ e dunque $B_1 \supseteq G$, da cui abbiamo proprio che $G \cup S$ è connesso.
Dimostriamo ora che $G \cup S$ non è connesso per archi. Supponiamo per assurdo che ci sia una curva $\gamma : [0,1] \to G \cup S$ tale che

$$\gamma(0) = (1, \sin 1)$$
$$\gamma(1) = (0,0)$$

scriviamo allora

$$\gamma(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t))$$

con γ_1, γ_2 continue. Sia allora

$$\bar{t} := \inf \{t \in (0,1] : \gamma_1(u) = 0,\ u \in [t,1]\}$$

ma allora per continuità dobbiamo avere che

$$\gamma(\bar{t}) = (0, \bar{y})$$

cioè quell'inf è un minimo in realtà. Allora abbiamo che esiste un $\delta > 0$ tale che

$$|\gamma_2(t) - \bar{y}| < \frac{1}{100}$$

per ogni $y \in [\bar{t} - \delta, \bar{t}]$. Ma dobbiamo avere che

$$\gamma_1\left([\bar{t} - \delta, \bar{t}]\right)$$

è un intervallo (dato che è l'immagine di un intervallo sotto una funzione continua). D'altra parte visto che il seno del topologo si avvicina arbitrariamente a tutti i punti di S abbiamo

$$\gamma_2\left([\bar{t} - \delta, \bar{t}]\right) = [-1, 1]$$

che contraddice esplicitamente il bound di $\frac{1}{100}$ che abbiamo dato prima, e quindi $G \cup S$ non è connesso per archi. □

Tuttavia c'è anche una buona notizia:

Teorema 1.83 (Gli aperti sono connessi per archi)
Per ogni $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, abbiamo che A è connesso se e solo se è connesso per archi.

Dimostrazione. Dimostreremo qualcosa di più forte, ovvero che A è connesso per *poligonali*. Supponiamo allora che A sia connesso, e consideriamo per un certo $x_0 \in A$ l'insieme

$$A_1 := \{x \in A : \exists \gamma : [0,1] \to A \text{ poligonale } \gamma(0) = x_0 \wedge \gamma(1) = x\}$$

adesso l'idea è mostrare che A_1 è aperto, ma anche il suo complementare è aperto. Da questo seguirà la tesi per connessione. Prendiamo allora un $x \in A_1$, allora dato che $x \in A$ che è aperto esisterà un raggio $r > 0$ tale che

$$B(r, x) \subseteq A$$

ma questo vuol dire che tutti i punti in questa palletta stanno in A_1, infatti ci basta concatenare la poligonale che arrivava fino a x con il raggio della palla che stiamo considerando. Abbiamo quindi mostrato che A_1 è aperto, prendiamo il suo complementare $A_2 := A_1^{\complement}$, e dimostriamo che è aperto.
Prendiamo nuovamente $x \in A_2$, come prima ci sarà una palla

$$B(x, r) \subseteq A$$

se questa appartiene tutto ad A_2 abbiamo finito, altrimenti vuol dire che esiste almeno un $y \in A_1$. Ma questo vuol dire che esiste una poligonale anche da x_0 a y, basterà nuovamente concatenare la poligonale fino a y con il raggio della palla.
Abbiamo scritto allora A come unione disgiunta di due aperti, quindi uno di questi deve essere vuoto. Tuttavia $x_0 \in A_1$, e quindi $A = A_1$, e abbiamo finito. □

§1.5.2 Semicontinuità

Definizione 1.84 (Semicontinuità)**.** Una funzione $f : X \to \mathbb{R}$ si dice *semicontinua inferiormente* se per ogni $x \in X$ si ha che

$$f(x) \leq \liminf_{x \to y} f(x)$$

ovvero abbiamo che

$$f(x) \leq \lim_{r \to 0^+} \inf \{f(t) : t \in B(x, r) \setminus \{x\}\}$$

per tutti i punti $x \in X$. Allo stesso modo si definisce la semicontinuità superiormente, come

$$f(x) \geq \limsup_{y \to x} f(y)$$

per ogni $x \in X$.

Si può caratterizzare ulteriormente la semicontinuità dal basso sostituendo al $\liminf$ il minlim, ovvero usando la caratterizzazione sequenziale del liminf di funzioni. Il motivo per cui ci interessano le funzioni semicontinue è il seguente:

Teorema 1.85 (Criterio del minimo)

Sia $f : X \to \mathbb{R}$ una funzione semicontinua dal basso su uno spazio X compatto, allora f assume minimo su X.

Dimostrazione. Definiamo come

$$I := \{f(x) : x \in X\}$$

allora esisterà una successione $x_n \in X$ tale che

$$f(x_n) \to I$$

inoltre per compattezza esisterà una $x_{n_k} \to \bar{x} \in X$. Ora se x_{n_k} è definitivamente uguale a $\bar{x}$ abbiamo finito, altrimenti abbiamo che esisterà un'ulteriore sottosuccessione $x_{n_{k_i}}$ tale che per ogni i è diversa da $\bar{x}$, in questo modo possiamo usare la caratterizzazione sequenziale del $\liminf$ (e la semicontinuità) per ottenere

$$I \leq f(\bar{x}) \leq \liminf_{y \to x} f(y) \leq \lim_{i \to \infty} f\left(x_{n_{k_i}}\right) = I$$

da cui abbiamo proprio che questo è un minimo. □

Analogamente si può fare per semicontinuità superiore e massimo.

Esercizio 1.86 (Palle compatte)**.** Dimostrare che $\mathbf{S}^1$ è connessa e compatta. Usare questo fatto per dimostrare che se $f : \mathbf{S}^1 \to \mathbb{R}$ è continua allora esiste uno $z \in \mathbf{S}^1$ tale che $f(z) = f(-z)$.

Soluzione. Il primo punto è più o meno facile. Per il secondo definiamo una funzione $F : \mathbf{S}^1 \to \mathbb{R}$ continua tale che

$$F(z) := f(z) - f(-z)$$

allora avremo che $F(\mathbf{S}^1)$ è un intervallo, ma allora consideriamo $F(1,0)$, se questo è nullo abbiamo trovato

$$f(1,0) = f(-1,0)$$

e quindi abbiamo finito. D'altra parte se $F(1,0)$ è non nullo sarà positivo o negativo, e quindi

$$F(-1,0)$$

avrà segno opposto al suo. Ma questo vuol dire proprio che, visto che l'immagine è un intervallo, ci sarà almeno uno z tale che

$$F(z) = 0$$

e dunque abbiamo la tesi. □

Esercizio 1.87 (Ereditarietà della compattezza)**.** Se X è compatto e $Y \subseteq X$ è chiuso allora Y è compatto.

Dimostrazione. Consideriamo un ricoprimento aperto A_n di Y, allora definiamo

$$B_n := A_n \cup (X \setminus Y)$$

questi sono sempre aperti, perchè $X \setminus Y$ è il complementare di un chiuso, e inoltre è un ricoprimento di X. Allora esisterà un sottoricoprimento finito di B_n, con gli indici I. Ma questo vuol dire che

$$X \subseteq (X \setminus Y) \cup \bigcup A_i$$

ma visto che la prima parte è fuori da Y questo vuol dire che la seconda è proprio un ricoprimento di Y, da cui abbiamo la tesi. □

§2 Spazi di Banach

Definizione 2.1 (Spazio di Banach)**.** Uno spazio vettoriale V equipaggiato con una norma $||\cdot||$ si dice uno *spazio di Banach*, se è completo rispetto alla distanza indotta dalla norma.

In realtà gli spazi di Banach sono sorprendentemente più comuni di quanto non si pensi:

Definizione 2.2 (Equivalenza tra norme)**.** Due norme $||\cdot||_1$ e $||\cdot||_2$ si dicono *equivalenti* se esistono due costanti $A, B \in \mathbb{F}$ tali che

$$A\,||\cdot||_1 \leq ||\cdot||_2 \leq B\,||\cdot||\,.$$

Proposizione 2.3 ($\mathbb{R}^n$ è unico come spazio di Banach)
Date due norme su $\mathbb{R}^n$, queste sono equivalenti.

Dimostrazione. Ci basta mostrare che tutte le norme sono equivalenti alla norma euclidea $|\cdot|$. Chiamiamo allora

$$f(x) := ||x||$$

se f fosse continua avrebbe massimo e minimo in $\mathbb{S}^{n-1}$, siano questi A, B. Allora abbiamo, per ogni norma $||\cdot||_2$:

$$A \leq \left|\left|\frac{x}{|x|}\right|\right|_2 = \frac{||x||_2}{|x|} \leq B$$

da cui moltiplicando per il modulo da entrambi i lati abbiamo la tesi.
Ci basta quindi mostrare che f è continua. D'altra parte dati $x, h \in \mathbb{R}^n$ abbiamo per subadditività

$$|f(x+h) - f(x)| = |||x+h||_2 - ||x||_2| \leq ||h||_2 = \sum_{i=1}^{n} |h_i|\,||e_i||_2 \leq nM\,|h|$$

dove $M > 0$ è un certo reale maggiore della norma di tutti i vettori nella base canonica. Questo mostra che f è Lipschitziana, e quindi abbiamo finito. □

Proposizione 2.4 (Completezza di spazi normati)
Dato uno spazio vettoriale V su $\mathbb{R}$ equipaggiato con una norma $||\cdot||$, se questo è finito dimensionale allora è uno spazio di Banach.

Dimostrazione. Dato che V è finito dimensionale su $\mathbb{R}$ ci sarà un isomorfismo $V \to \mathbb{R}^n$. Questo vuol dire che tutte le norme su V sono equivalenti, e quindi in particolare saranno equivalenti alla norma euclidea su $\mathbb{R}^n$, da cui concludiamo. □

§2.1 Alcuni esempi

Vediamo subito un po' di esempi di spazi di Banach:

Esempio 2.5 (Convergenza uniforme)

Prendiamo X uno spazio metrico. Denotiamo con $C(X)$ lo spazio vettoriale delle funzioni continue $f : X \to \mathbb{R}$. Definiamo inoltre

$$||f||_\infty := \sup_{x \in X} |f(x)|$$

allora $C(X)$ equipaggiato con questa norma è quasi uno spazio di Banach, in realtà così rischiamo di avere punti con norma infinita. Per questo abbiamo bisogno di restringerci a $C_b(X)$, l'insieme delle funzioni continue e limitate $f : X \to \mathbb{R}$.

Proposizione 2.6 (La convergenza uniforme è uno spazio di Banach)

Se X è uno spazio metrico qualunque allora $(\mathcal{C}_b(X), ||\cdot||_\infty)$ è uno spazio di Banach. In particolare questo è vero se X è compatto.

Dimostrazione. Sia $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di Cauchy rispetto a $||\cdot||_\infty$. Allora per ogni $x \in X$ abbiamo che $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ è di Cauchy in $\mathbb{R}$ equipaggiato con la norma euclidea. Ma quindi abbiamo

$$f_n(x) \to y_x$$

per ogni x (per completezza di $\mathbb{R}$) e dunque definendo la funzione limite come

$$f(x) := y_x$$

abbiamo proprio che $f_n \to f$ uniformemente, da cui segue che f è continua, e quindi abbiamo mostrato che tutte le successioni di Cauchy convergono in $C(X)$. Rimane da mostrare che $f \in C_b(X)$. D'altra parte per subadditività della norma abbiamo

$$||f||_\infty \leq ||f_{\bar{n}}|| + ||f - f_{\bar{n}}||$$

e visto che il secondo termine tende a 0 abbiamo proprio che f è boundata. □

Insomma questa è una riformulazione molto elegante del concetto di convergenza uniforme.

Esempio 2.7 (Funzioni $\mathcal{C}^1$)

Lo spazio $\mathcal{C}^1([a, b])$ equipaggiato con la norma

$$||f||_{\mathcal{C}^1} := ||f||_\infty + ||f'||_\infty$$

è uno spazio di Banach.

Dimostrazione. Il fatto che quello sia uno spazio normato segue dal fatto che la norma infinita è effettivamente una norma. Per la completezza prendiamo una successione di Cauchy f_n. Allora questo vuol dire che sia f_n che f_n' convergono uniformemente a due funzioni f e g. Vorremmo ora dimostrare che

$$||f_n' - f'||_\infty \to 0.$$

D'altra parte

$$\int_a^x f_n'(t)\mathrm{d}t \to \int_0^x g(t)\mathrm{d}t$$

per il teorema di passaggio al limite sotto al segno di integrale; il lato sinistro a questo punto è proprio $f_n(x) - f(a)$, e quindi queste convergono a $f(x) - f(a)$. Questo dimostra proprio che $g = f'$, e quindi abbiamo finito. □

Definizione 2.8 (Norma ℓ^p)**.** Sia $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ l'insieme delle successioni a valori reali, allora su di esso definiamo, per ogni $1 \leq p < \infty$ la *norma* ℓ^p come, per $x \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$:

$$||x||_p := \left(\sum_{i=1}^{\infty} x_i^p \right)^{1/p}.$$

Inoltre questo spazio è uno spazio di Banach.

La parte difficile nell'esempio sopra non è dimostrare che quello è uno spazio completo, ma dimostrare che quella norma è effettivamente una norma. In particolare la subadditività è una disuguaglianza non banale, e va sotto il nome di disuguaglianza di Minkowski:

Teorema 2.9 (Minkowski)
Se $x, y \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ abbiamo

$$||x + y||_p \leq ||x||_p + ||y||_p.$$

Per introdurre il prossimo esempio richiamiamo la definizione di Lipschitzianità:

Definizione 2.10 (Funzione Lipschitziana)**.** Dati due spazi metrici X, Y una funzione $f : X \to Y$ si dice *lipschitziana* su $A \subseteq X$ se esiste una costante $L > 0$ tale che per ogni $x, y \in A$ abbiamo

$$d(f(x), f(y)) \leq L d(x, y)$$

inoltre l'estremo inferiore di tutte le costanti L tali che soddisfano quella disuguaglianza per ogni $x, y \in A$ si dice *costante di Lipschitz*, e si denota con $\mathrm{Lip}(f)$.

Come nel caso di $\mathbb{R}$, qui valgono tutti i teoremi che abbiamo visto ad analisi 1 sulle funzioni lipschitziane.

Proposizione 2.11 (Formula per la costante di Lipschitz)
Per una funzione $f : I \to \mathbb{R}$ derivabile (dove $I \subseteq \mathbb{R}$) si ha che la costante di Lipschitz è esattamente uguale a

$$\mathrm{Lip}(f) = ||f'||_\infty.$$

Dimostrazione. Un verso è facile, semplicemente

$$|f'(x)| = \lim_{y \to x} \left| \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \right| \leq \mathrm{Lip}(f)$$

da cui abbiamo che $\mathrm{Lip}(f) \geq ||f'||_\infty$. Per la disuguaglianza inversa osserviamo che, per il teorema di Lagrange esisterà uno $\xi \in I$ tale che

$$\left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right| = |f'(\xi)| \leq ||f'||_\infty$$

e dunque abbiamo $\mathrm{Lip}(f) \leq ||f'||_\infty$. □

Lo abbiamo già visto, ma scriviamo ora meglio una proprietà molto importante della distanza:

Proposizione 2.12 (La distanza è lipschitziana)

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$, se definiamo per ogni $x \in \mathbb{R}^n$ la funzione

$$d_A(x) := \inf_{z \in A} |z - x|$$

è 1-lipschitziana.

Dimostrazione. Abbiamo, per definizione di d_A:

$$d_A(x) \leq |x - z| \leq |x - y| + |y - z|$$

per ogni $z \in \mathbb{R}^n$. Ma allora in particolare prendendo l'inf di $y - z$ abbiamo

$$d_A(x) \leq |x - y| + d_A(y) \implies d_A(x) - d_A(y) \leq |x - y|$$

ma d'altra parte scambiando x e y troviamo proprio che

$$|d_A(x) - d_A(y)| \leq |x - y|$$

che era la tesi. □

Siamo quindi tentati di dire che $\mathrm{Lip}(f)$ sia una norma sullo spazio delle funzioni lipschitziane, denotato con $\mathrm{Lip}(A)$. Purtroppo questo non è vero, perché una funzione costante $f(x) \equiv k$ ha costante di Lipschitz 0, ma può non essere necessariamente $f(x) \equiv 0$. Una funzione che soddisfa tutte le proprietà della norma, tranne la fedeltà si dice una *seminorma*. La definizione giusta è:

Esempio 2.13 (Norma sulle Lipschitziane)

Sullo spazio delle funzioni Lipschitziane e definite su un **compatto** A, denotato con $\mathrm{Lip}(A)$, la seguente norma

$$||f||_{\mathrm{Lip}(A)} := ||f||_\infty + \mathrm{Lip}(A)$$

induce uno spazio di Banach.

Dimostrazione. Il fatto che quella sia una norma a questo punto è chiaro. Rimane da mostrare che la metrica indotta è completa, allora prendiamo una successione di Cauchy f_n, e la sua funzione limite f nella metrica della convergenza uniforme. Vogliamo mostrare che

$$||f_n - f|| \to 0$$

d'altra parte l'unica cosa che ci serve davvero è

$$\mathrm{Lip}(f_n - f) \to 0$$

e a questo punto ci basta □

Proposizione 2.14 (Definizione alternativa della norma Lipschitziana)

Preso un $x_0 \in A$, con A limitato, una definizione alternativa di norma Lipschitziana è

$$||f||_* := |f(x_0)| + \mathrm{Lip}(f)$$

e dunque questa è proprio equivalente alla norma Lipschitziana che abbiamo visto sopra.

Dimostrazione. Una disuguaglianza è chiara, ovvero

$$||f||_* \leq ||f||_{\mathrm{Lip}(A)}$$

mentre l'altro verso segue dal dire che, per definizione di costante di Lipschitz

$$|f(x)| \leq |f(x_0)| + \mathrm{Lip}(f) d(x, x_0)$$

per ogni $x \in A$. Ma allora possiamo rinforzare quella disuguaglianza con

$$||f||_\infty \leq |f(x_0)| + \mathrm{Lip}(f)\mathrm{diam}(A) \leq (1 + \mathrm{diam}(A))\, ||f||_*$$

e dunque abbiamo finito. □

Abbiamo visto che tutti gli spazi normati reali finito dimensionali sono di Banach. Cosa possiamo dire di quelli infinito dimensionali? Abbiamo:

Esempio 2.15 (Uno spazio normato reale non di Banach)

Definiamo su $\mathcal{C}^0([-1,1])$ una norma tale che

$$||f|| := \int_{-1}^{1} |f(t)|\, \mathrm{d}t$$

allora questo spazio non è completo.

Dimostrazione. Consideriamo la successione

$$f_n(x) := \begin{cases} 1 & \text{se } x < 0 \\ 1 - nx & \text{se } x \in [0, 1/n] \\ 0 & \text{se } x > 1/n \end{cases}$$

allora questa è una successione di Cauchy, infatti

$$\int_{-1}^{1} |f_n - f_m|\, \mathrm{d}t \leq \int_0^{\frac{1}{m}} 1 \mathrm{d}t \leq \frac{1}{m}$$

e quindi la distanza tende a 0 per m sufficientemente grandi. Supponiamo allora per assurdo che esista una funzione limite f, allora

$$\int_{-1}^{1} |f_n - f|\, \mathrm{d}t \to 0$$

in particolare dobbiamo avere che

$$\int_{-1}^{0} |1 - f|\, \mathrm{d}t$$

cioè, dato che f è continua dobbiamo avere $|1 - f(x)| = 0$ per $x \in [-1, 0]$. Un ragionamento analogo porta a dire che per ogni n deve valere

$$\int_{1/n}^{1} |f| \, \mathrm{d}t = 0$$

cioè per ogni n dobbiamo avere $f(x) = 0$ per $x \in [1/n, 1]$, ovvero facendo tendere $n \to \infty$ abbiamo che f è proprio la funzione tale che

$$f(x) := \begin{cases} 1 & \text{se } x \in [-1, 0] \\ 0 & \text{se } x \in (0, 1] \end{cases}$$

che non è continua, e quindi la successione non converge in $\mathcal{C}([-1, 1])$. □

§2.2 Operatori su spazi infinito dimensionali

Definizione 2.16 (Limitatezza di operatori)**.** Consideriamo due spazi X e Y normati, e una funzione $T : X \to Y$ lineare. L'operatore T si dice *limitato* se la seguente quantità

$$||T|| := \sup_{||x||_X \leq 1} ||Tx||_Y$$

è finita. Denotiamo con $\mathcal{L}(X, Y)$ lo spazio degli operatori lineari limitati da X a Y.

Quella che abbiamo denotato come norma, è effettivamente una norma. È la norma di un operatore!

Proposizione 2.17 (Norma di operatori)

Dato un operatore lineare $T : X \to Y$ la quantità

$$||T|| := \sup_{||x||_X \leq 1} ||Tx||_Y$$

è una norma.

Osserviamo che per linearità di T e omogeneità della norma abbiamo

$$||Tx||_Y = \left|\left| T\left(\frac{x}{||x||_X}\right) \right|\right|_Y ||x||_X$$

ma d'altra parte quell'oggetto dentro al T ha proprio norma 1, quindi usando la norma

$$\left|\left| T\left(\frac{x}{||x||_X}\right) \right|\right|_Y ||x||_X \leq ||T|| \, ||x||$$

cioè la norma è quella quantità che stima linearmente quanto può diventare grande la norma di Tx, in funzione della norma di x.

Proposizione 2.18 (Caratterizzazione della continuità di operatori lineari)

Sia $T : X \to Y$ un operatore lineare, allora le tre seguenti sono equivalenti:

- T è limitato.
- T è continuo.
- T è continuo in un punto.

Dimostrazione. Per dimostrare che limitato implica continuo consideriamo un $x_0 \in X$, allora per quanto visto sulla norma abbiamo

$$||Tx - Tx_0|| = ||T(x - x_0)|| \leq ||T||\,||x - x_0||$$

cioè T è lipschitziano, in particolare è continuo. Supponiamo ora che T sia continua in un punto, assumiamo WLOG 0, allora esisterà un $\delta > 0$ tale che se $||x|| \leq \delta$ si ha $||Tx|| \leq 1$, dunque la norma di T sarà

$$||T|| = \sup_{||x|| \leq 1} ||Tx|| = \sup \frac{1}{\delta}\,||T(\delta x)|| \leq \frac{1}{\delta}$$

dunque T è limitato, e quindi sarà anche continuo, da cui la tesi. □

Osservazione 2.19 (Dimensione finita)**.** Il risultato sopra in spazi finito dimensionali non è molto interessante, in quanto tutti gli operatori $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^k$ sono evidentemente continui: questo segue dal fatto che ogni componente è semplicemente un'espressione del tipo

$$T_i(x) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j$$

che è evidentemente continua, e quindi per quanto visto sopra sui limiti in $\mathbb{R}^n$ abbiamo che anche T stessa è continua.

Quello che ci interessa qui dunque è parlare di spazi infinitamente generati.

Esempio 2.20 (Un operatore lineare non continuo)

Consideriamo lo spazio c_{00} delle successioni di reali definitivamente 0, equipaggiato con la norma infinita (cioè con $||\cdot||_\infty := \max$). Allora definendo l'operatore $T : c_{00} \to \mathbb{R}$ tale che

$$T(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n x_n$$

abbiamo che questo è illimitato, infatti $||e_n||_\infty = 1$ per ogni n ma d'altra parte

$$||Te_n|| = n$$

e dunque avremo $||T|| = \infty$.

Esempio 2.21 (Funzionali infinito dimensionali)

Se consideriamo lo spazio delle funzioni $\mathcal{C}([a, b])$ equipaggiato con la norma infinita allora l'operatore:

$$Tf := \int_a^b f(t)\mathrm{d}t$$

allora T è lineare e limitato, perché

$$||T(f)|| \leq \int_a^b |f|\,\mathrm{d}t \leq (b - a)\,||f||_\infty$$

e di conseguenza è anche continua. In questo caso in realtà si può dimpostrare qualcosa di più forte (per esercizio) ovvero

$$||T|| = b - a.$$

§2.2.1 Teorema delle contrazioni

Definizione 2.22 (Contrazione)**.** Una funzione tra spazi metrici $T : X \to X$ si dice una *contrazione* se esiste un certo $0 < \lambda < 1$ tale che, per ogni $x, y \in X$ si ha

$$d\left(T(x), T(y)\right) \leq \lambda d\left(x, y\right)$$

equivalentemente una contrazione è una mappa lipschitziana con costante di lipschitz strettamente minore di 1.

In particolare abbiamo che una contrazione è lipschitziana e continua. Il motivo per cui ci interessano le contrazioni è il seguente:

Teorema 2.23 (Banach-Caccioppoli)
Sia X uno spazio metrico completo, e $T : X \to X$ una contrazione su di esso. Allora esiste sempre ed è unico un $x \in X$ tale che

$$Tx = x.$$

Dimostrazione. L'idea è fare esattamente quello che ci verrebbe da fare se fossimo su un calcolatore: prendiamo un x_0 casuale e costruiamo la successione

$$x_n := T^n(x_0)$$

dove T^n rappresenta la composizione n volte. L'idea a questo punto, dato che siamo in uno spazio completo, è mostrare che questa successione è di Cauchy: per ogni $\varepsilon > 0$ dobbiamo dimostrare che $d(x_n, x_{n+k})$ è definitivamente boundata. Ma allora usando la disuguaglianza triangolare abbiamo

$$d(x_{n+k}, x_n) \leq \sum_{i=1}^{k} d\left(x_{n+i}, x_{n+i-1}\right)$$

e dunque stimando quella somma con una serie:

$$\sum_{i=1}^{k} d\left(x_{n+i}, x_{n+i-1}\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} d\left(T^{n+i-1}(T(x_0)), T^{n+i-1}(x_0)\right)$$

ma quindi usando il fatto che T è una contrazione abbiamo

$$\sum_{i=1}^{\infty} d\left(T^{n+i-1}(T(x_0)), T^{n+i-1}(x_0)\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \lambda^{n+i-1} d(T(x_0), x_0) \leq \frac{\lambda^{n-1}}{1-\lambda} d\left(T(x_0), x_0\right) < \varepsilon$$

cioè abbiamo proprio mostrato che definitivamente la distanza con cui eravamo partiti va sotto ε, per ogni $\varepsilon > 0$. Ma allora x_n è di Cauchy, per completezza avrà un limite, allora usando un trick molto famoso (invocando la continuità di T):

$$x = \lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} x_{n+1} = \lim_{n\to\infty} T(x_n) = T \lim_{n\to\infty} x_n = T(x)$$

come volevamo mostrare. L'unicità infine è la parte facile, se $Tx = x$ e $Ty = y$ abbiamo

$$\lambda d(x, y) \geq d\left(Tx, Ty\right) = d(x, y)$$

cioè dato che $0 < \lambda < 1$ abbiamo un assurdo. □

È chiaro che il teorema appena mostrato usa in modo determinante entrambe le ipotesi. Una traslazione (cioè una "contrazione" con $\lambda = 1$) evidentemente non ammette punti fissi, così come in uno spazio non completo la successione che abbiamo trovato (unica in uno spazio completo) potrebbe non convergere. Abbiamo tuttavia un fatto più interessante:

Corollario 2.24 (Teorema delle contrazioni forte)

Se X è uno spazio metrico completo e $T : X \to X$ è un operatore, allora se esiste un n tale che T^n è una contrazione, esisterà un $x \in X$ unico tale che

$$Tx = x.$$

Dimostrazione. Per Banach-Cacioppoli abbiamo che esiste un unico punto $x \in X$ tale che

$$T^n x = x$$

allora

$$d(x, Tx) = d\left(T^n(x), T(T^n(x))\right) = d\left(T^n(x), T^n(Tx)\right)$$

ma usando il fatto che T^n è una contrazione:

$$d(x, Tx) \leq \lambda d\left(x, Tx\right)$$

da cui abbiamo proprio la tesi. Di nuovo l'unicità è la parte facile, in quanto se per assurdo avessimo più di un punto fisso per T, questo sarebbe un punto fisso anche per T^n. □

Esempio 2.25

Prendiamo l'operatore tra gli spazi $T : \mathcal{C}([0,1]) \to \mathcal{C}([0,1])$ equipaggiati con la norma infinita, tale che

$$(Tf)(x) = \int_0^x t f(t) \mathrm{d}t + \frac{x^2}{2}.$$

Allora $Tf \in C^1$ per ogni f, inoltre T è una contrazione.

Dimostrazione. Abbiamo

$$|Tf_1(x) - Tf_2(x)| \leq \int_0^1 t \, ||f_1 - f_2||_\infty \, \mathrm{d}t = \frac{1}{2} \, ||f_1 - f_2||_\infty$$

per ogni x, dunque avremo la disuguaglianza anche per il sup, cioè T è lipschitziana con costante minore di 1, cioè è una contrazione. Per Banach Caccioppoli allora abbiamo ch esisterà una funzione f tale che

$$f(x) = \frac{x^2}{2} + \int_0^x t f(t) \mathrm{d}t$$

ovvero esiste una soluzione al *problema di cauchy*:

$$\begin{cases} f'(x) = x f(x) + x \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

che conosceremo poi. □

§2.2.2 Alcune disuguaglianze notevoli

Vogliamo arrivare alla dimostrazione della disuguaglianza di Minkowski trovata sopra. Per questo dobbiamo passare prima per altre due disuguaglianze:

Proposizione 2.26 (Disuguaglianza di Young)
Sia $p > 1$, allora definiamo il suo *esponente coniugato* come p' tale che

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$$

allora per ogni $x, y \in \mathbb{R}$ si ha

$$|xy| \leq \frac{|x|^p}{p} + \frac{|y|^{p'}}{p'}$$

che notiamo per $p = 2$ si riduce ad AM-GM.

Dimostrazione. Riscrivendo la tesi bisogna mostrare che, se $x, y \in \mathbb{R}^+$ si ha

$$A^{\frac{1}{p}} B^{\frac{1}{p'}} \leq \frac{A}{p} + \frac{B}{p'}$$

ma d'altra parte prendendo il logaritmo di entrambi i lati abbiamo

$$\frac{1}{p} \log A + \frac{1}{p'} \log B \leq \log\left(\frac{A}{p} + \frac{B}{p'}\right)$$

che segue da Jensen. □

Una conseguenza di questa è la seguente:

Proposizione 2.27 (Disuguaglianza di Hölder)
Per ogni $x, y \in \mathbb{R}^n$ si ha

$$\left|\sum_{i=1}^n x_i y_i\right| \leq ||x||_p \, ||y||_{p'}$$

dove p e p' sono esponenti coniugati tra loro. Questa per $p = 2$ diventa Cauchy-Schwarz.

Dimostrazione. Questa disuguaglianza in realtà vale anche se $0 < p < 1$, ma la dimostreremo solo nel caso $p > 1$. Riscriviamo la tesi come

$$\sum_{i=1}^n \frac{|x_i|}{||x||_p} \frac{|y_i|}{||y||_{p'}} \leq 1.$$

D'altra parte per Young abbiamo

$$\sum_{i=1}^n \frac{|x_i|}{||x||_p} \frac{|y_i|}{||y||_{p'}} \leq \sum_{i=1}^n \left(\frac{|x_i|^p}{p \, ||x||_p^p} + \frac{|y_i|^{p'}}{p' \, ||y||_{p'}^{p'}} \right) = \frac{|x|^p}{p \, ||x||_p^p} + \frac{|y|^{p'}}{p' \, ||y||_{p'}^{p'}} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$$

proprio come volevamo mostrare. □

E dunque infine abbiamo

Proposizione 2.28 (Disuguaglianza di Minkowski)

Per ogni $x, y \in \mathbb{R}^n$ abbiamo che, per ogni $p \in [1, \infty]$, vale

$$||x+y||_p \leq ||x||_p + ||y||_p .$$

Dimostrazione. Per $p = 1$ o $p = \infty$ è facile, e lo abbiamo già mostrato. D'altra parte se $p > 1$ abbiamo, per la disuguaglianza triangolare:

$$\sum_{i=1}^{n} |x_i + y_i|^p \leq \sum_{i=1}^{n} |x_i + y_i|^{p-1} (|x_i| + |y_i|)$$

ma d'altra parte per Hölder

$$\sum_{i=1}^{n} |x_i + y_i|^{p-1} (|x_i| + |y_i|) \leq \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i + y_i|^{(p-1)p'}\right)^{1/p'} \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p\right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i + y_i|^{(p-1)p'}\right)^{1/p'} \left(\sum_{i=1}^{n} |y_i|^p\right)^{1/}$$

ovvero scrivendola in modo che stia nella pagina

$$||x+y||_p^p \leq ||x+y||_p^{p-1} \left(||x||_p + ||y||_p\right)$$

che è proprio la tesi che cercavamo. □

§2.3 Compattezza sequenziale equivale a compattezza

Abbiamo lasciato indietro qualcosa quando abbiamo parlato di compattezza in spazi metrici arbitrari. Per $\mathbb{R}^n$ avevamo mostrato che essere compatto era equivalente a essere chiuso e limitato. Questo è falso in generale per spazi di dimensione infinita:

Esempio 2.29 (Uno spazio in cui i chiusi e limitati non sono compatti)

Consideriamo lo spazio ℓ^∞ delle successioni reali limitate con la norma del sup. Consideriamo allora l'insieme delle successioni

$$K = \{a_n \in \ell^\infty : \exists j \text{ t.c. } a_i = \delta_{ij}\}$$

ovvero l'insieme delle successioni 0 ovunque tranne che in un punto, in cui valgono 1. Allora K è chiuso e limitato (esercizio) ma non è compatto, infatti il seguente ricoprimento

$$(B(e_i, 1/3))_{j \in \mathbb{N}}$$

dove le successioni e_i sono quella che soddisfano $(e_i)_j := \delta_{ij}$, è aperto e infinito, ma non ammette un sottoricoprimento finito.

In generale si dimostrerà ai corsi di analisi funzionale che in uno spazio X normato il fatto che $\overline{B(0,1)}$ sia compatta è equivalente al fatto che la dimensione di X sia finita.

Definizione 2.30 (Totalmente limitato)**.** Uno spazio metrico (X, d) si dice *totalmente limitato* se per ogni $r > 0$ esistono un numero finito di punti $x_1, \dots, x_n$ tali che

$$X \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} B(x_i, r)$$

per un qualche $r \in \mathbb{R}$. Insomma, X è contenuto in numero finito di palle.

Osservazione 2.31. É chiaro che totalmente limitato implichi limitato, infatti

$$d(x,y) \leq \max_{1\leq i,j\leq n} d(x_i,x_j) + 2r$$

e dato che il RHS è costituti solo da numeri abbiamo proprio che la distanza tra due punti arbitrari di X è limitata dall'alto, cioè X è limitato.

Il risultato che ci interessa in questa sezione quindi è

Teorema 2.32 (Compatto equivale a sequenzialmente compatto)
Sia (X,d) uno spazio metrico, allora le seguenti quattro sono equivalenti:

1. X è compatto.
2. Ogni sottoinsieme $A \subseteq X$ di cardinalità infinita ha almeno un punto di accumulazione.
3. X è sequenzialmente compatto.
4. X è completo e totalmente limitato.

Dimostrazione. **Partiamo da** $1 \implies 2$**.** Supponiamo per assurdo che esista un sottoinsieme $A \subseteq X$ di cardinalità infinita senza punti di accumulazione. Questo vuol dire che per ogni x esiste un r_x tale che

$$A \cap [B(x,r_x) \setminus \{x\}] = \varnothing$$

ma d'altra parte questo insieme di palle che abbiamo trovato è proprio un ricoprimento aperto di X, dunque possiamo estrarne un sottoricoprimento

$$A \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} B(x_i, r_{x_i})$$

ma allora abbiamo

$$A = A \cap \bigcup_{i=1}^{n} B(x_i,r_{x_i}) \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} \{x_i\}$$

cioè A ha cardinalità finita, assurdo.
Dimostriamo ora che $2 \implies 3$**.** Sia x_n una successione a valori in X, e definiamo $A = \{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq X$. Semplicemente quindi abbiamo che se $|A| < \infty$ allora ci sarà un punto su cui la successione cade frequentemente, e quindi possiamo estrarre una sottosuccessione convergente (costante, in particolare). Se del pari

$$|A| = \infty$$

allora per ipotesi ci sarà un punto x di accumulazione, ovvero esisterà un insieme di indici n_k tali che

$$x_{n_k} \in B(x, 1/k)$$

ci manca solo di dimostrare che n_k è crescente, ma d'altra parte possiamo sempre sceglierla in modo che sia crescente, dato che la successione x_n sta frequentemente dentro la palla $B(x, \frac{1}{k})$ per ogni k. Quindi abbiamo finito.

Dimostriamo che $3 \implies 4$**.** Consideriamo una successione di Cauchy x_n, allora per 3 esisterà una sua sottosuccessione convergente $x_{n_k} \to x$. Ma allora

$$d(x_n, x) \leq d(x_n, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, x)$$

d'altra parte se n_k è sufficientemente grande il secondo termine tende a 0 (dato che quella successione tende a x) mentre se sia n che n_k sono sufficientemente grandi, dato che la successione è di Cauchy, abbiamo che il primo termine va a 0. Dunque $x_n \to x$, cioè X è completo. Ci manca la totale limitatezza, supponiamo allora per assurdo che esista un $r > 0$ sfortunato per cui non possiamo scegliere nessun insieme finito di palle che ricoprano X. Dato $x_1 \in X$ ostruiamo allora una successione

$$x_n := \begin{cases} x_1 & \text{se } n = 1 \\ c\left(X \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} B(x_i, r)\right) & \text{altrimenti} \end{cases}$$

dove c è la funzione di scelta dataci dall'assioma della scelta. Ma allora abbiamo costruito una successione x_n tale che per ogni $n \neq m$ abbiamo

$$d(x_n, x_m) \geq r$$

dunque nessuna sottosuccessione può convergere, assurdo.
Dimostriamo infine che $4 \implies 1$**.** Per questo ci serve il lemma dei compatti, ovvero 1.63. Supponiamo per assurdo che esista una famiglia di aperti $(A_j)_j \in J$ che ricopra X ma non ammetta sottoricoprimenti finiti. Allora dato che X è totalmente limitato abbiamo che esisterà una prima famiglia finita B_n^1 di palle chiuse di raggio 1 che ricoprono X (la definizione di totale limitatezza diceva che le palle devono essere aperte, ma ci basta prendere la chiusura). Allora esisterà una palla $B_{i_1}^1$ che non è ricoperta da un numero finito di A_j. D'altra parte dato che $B_{i_1}^1$ è totalmente limitata[1], dunque esisterà un suo ricoprimento con finite palle chiuse di raggio $\frac{1}{2}$, chiamiamolo $B_{n_2}^2$. Ancora allora esisterà una palla $B_{i_2}^2$ non contenuta in finiti A_j. Per induzione dunque per ogni k possiamo trovare palle chiuse

$$B_{i_k}^k$$

di raggio $1/k$ una contenuta dentro l'altra (dato che ogni volta le palle che sceglievamo erano palle dello spazio $(B_{i_k}^k, d_X)$). Ma allora per il lemma dei compatti, invocando la completezza, abbiamo

$$\bigcap_{k \in \mathbb{N}} B_{i_k}^k = \{x\}$$

cioè la loro intersezione è un punto. Ma questo è assurdo, perché sicuramente $x \in A_j$ per qualche j, e dato che A_j è aperto esisterà un raggio $r > 0$ finito tale che $B(x, r) \subseteq A_j$, ma definitivamente dato che il diametro di $B_{i_k}^k$ tende a 0 dovremo avere che

$$B_{i_k}^k \subseteq B(x, r)$$

e dunque abbiamo un assurdo, perché definitivamente potremmo ricoprire $B_{i_k}^k$ con un solo A_j, da cui finalmente abbiamo la tesi. □

Abbiamo usato il fatto che

[1] Vedere il lemma successivo per una giustificazione di questo fatto.

Lemma 2.33 (Sottoinsiemi di tot limitati sono tot limitati)
Ogni $A \subseteq X$ con X totalmente limitato, è a sua volta totalmente limitato.

Dimostrazione. Consideriamo $r > 0$ tale che

$$X \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} B(x_i, r)$$

allora vorremmo mostrare che

$$A \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} A \cap B(x_i, r)$$

ma allora se $B(x_i, r) \cap A \neq \varnothing$ abbiamo che, scelto un $a_i \in B(x_i, r) \cap A$ si ha

$$B(x_i, r) \cap A \subseteq B(a_i, 2r) \cap A = B_A(a_i, 2r)$$

e allora

$$A \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} B_A(a_i, 2r) \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} B(x_i, r) \cap A$$

da cui la tesi (BHO NON HO CAPITO). □

L'ultima cosa che diciamo sulla compattezza è che

Definizione 2.34 (Separabilità)**.** Uno spazio metrico X si dice *separabile* se esiste un $D \subseteq X$ al più numerabile tale che $\overline{D} = X$.

Proposizione 2.35 (Compatto implica separabile)
Uno spazio metrico X compatto è anche separabile.

Dimostrazione. In realtà è sufficiente il fatto che X sia totalmente limitato, infatti data la successione finita $x_1^k, \dots, x_{n_k}^k$ tale che

$$X \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} B(X_i^k, 1/k)$$

allora il nostro candidato insieme denso è

$$D = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \left\{ x_i^k : i \in \mathbb{N} \right\}$$

e dunque dobbiamo mostrare che per ogni $x \in X$ e $\varepsilon > 0$ si hanno i, k tali che

$$d(x, x_i^k) < \varepsilon.$$

Ma questo è facile, infatti scegliendo $1/k < \varepsilon$ abbiamo che esisterà un punto x_i^k tale che la sua palla di raggio $1/k$ contenga x, e dunque si ha proprio

$$d(x, x_i^k) < \frac{1}{k} < \varepsilon$$

da cui la tesi. □

Esempio 2.36 (Uno spazio non separabile)
Consideriamo ℓ^∞ con la norma del sup. Questo spazio non è sequenzialmente compatto.

Dimostrazione. Consideriamo $D = \{s^1, s^2, \dots, \}$ un insieme numerabile di successioni. Mostriamo che non è denso, ovvero esiste un $a \in \ell^\infty$ tale che

$$\left|\left|a - s^i\right|\right| \geq 1$$

per ogni i. Costruiamo allora a nel seguente modo:

$$a_i := \begin{cases} 1 & \text{se } s_i^i < 0 \\ -1 & \text{se } s_i^i \geq 0 \end{cases}$$

questo è un trucco analogo alla diagonalizzazione di Cantor (quella che si usa per mostrare che $\mathbb{R}$ non è numerabile) e essenzialmente ci permette di mostrare che per ogni i si ha

$$\left|\left|a - s^i\right|\right|_\infty = \sup_{j \in \mathbb{N}} \left|a_j - s_j^i\right| \geq 1$$

e dunque abbiamo proprio la tesi. □

§2.4 Ascoli-Arzelà e applicazioni

Definizione 2.37 (Equilimitatezza ed equicontinuità)**.** Sia X uno spazio metrico, dato l'insieme $C(X)$ delle funzioni $f : X \to \mathbb{R}$ continue, un suo sottoinsieme $K \subseteq C(X)$ si dice *equilimitato* se esiste un $M > 0$ tale che

$$||f||_\infty \leq M$$

ovvero l'insieme K è limitato come sottoinsieme dello spazio metrico $\mathcal{C}(X)$. Allo stesso modo K si dice *equicontinuo* se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un $\delta > 0$ tale che, comunque presi due $x, y \in X$ e $f \in K$ di ha

$$d(x, y) < \delta \implies d\left(f(x), f(y)\right) < \varepsilon$$

cioè in un certo senso sono tutte uniformemente continue, con lo stesso δ per ogni ε.

Il risultato che vogliamo arrivare a mostrare in questa sezione quindi è

Teorema 2.38 (Ascoli-Arzelà)
Sia X uno spazio metrico compatto,per ogni $K \subseteq C(X)$ le seguenti due asserzioni sono equivalenti:

A: K è compatto.

B: K è chiuso, equicontinuo ed equilimitato.

Dimostrazione. **Dimostriamo prima di tutto che** $A \implies B$. Chiaramente se K è compatto sarà chiuso e limitato, e quindi abbiamo gratis il fatto che K è chiuso ed

equilimitato. Per dimostrare l'equicontinuità allora fissiamo un $\varepsilon > 0$, dato che K è compatto sarà anche totalmente limitato, quindi esisterà un insieme finito di f_i tale che

$$K \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} B_{\|\cdot\|_\infty}(f_i, \varepsilon)$$

inoltre dato che X è compatto ognuna di queste f_i sarà uniformemente continua (per Heine-Cantor). Ma allora per ogni i esisterà un δ_i tale che

$$d(x,y) < \delta \implies |f_i(x) - f_i(y)| < \varepsilon$$

ma d'altra parte questi δ_i sono un insieme finito, e quindi prendere il minimo di questo insieme è possibile, e questo δ va bene per tutte le f_i. Chiamiamo δ questo minimo, il nostro claim è che questo vada bene per tutte le $f \in K$, e in effetti se $d(x,y) < \delta$, presa una $f \in K$ contenuta nella palla di raggio ε di f_i abbiamo per la disuguaglianza triangolare

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f_i(x)| + |f_i(x) - f_i(y)| + |f_i(y) - f(y)| < 3\varepsilon$$

dove la stima del primo e dell'ultimo termine segue dal fatto che f è nella palla di f_i. Dunque abbiamo la prima tesi.

Mostriamo ora che $B \implies A$. Dimostriamo che K è sequenzialmente compatto, data una $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq K$ vogliamo costruire una sottosuccessione convergente. La prima idea è usare la separabilità di X (che segue dalla sua compattezza), per costruire una successione $x_1, \dots, x_n, \dots \in X$ densa in questo stesso. Allora per equilimitatezza abbiamo che per ogni i le successioni $f_n(x_i)$ al variare di n è limitata, cioè

$$\sup_{n\in\mathbb{N}} |f_n(x_i)| \leq M$$

ma allora per Bolzano-Weierstrass da ognuna delle successioni $f_n(x_i)$ possiamo estrarre, una dopo l'altra, ognuna estratta da dentro la precedente, delle sottosuccessioni, e a ogni estrazione aggiungeremo la convergenza in un nuovo punto x_i. Dunque abbiamo costruito una sottosuccessione. Abbiamo quindi costruito $\mathbb{N}$ sottosuccessioni tali che

$$f_n^i(x_j) \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} \alpha_j$$

per ogni $j \leq i$ e dati opportuni punti α_j. Abbiamo quindi

$$\begin{matrix} f_1^1 & f_2^1 & \cdots \\ f_1^2 & f_2^2 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{matrix}$$

e ognuna di queste successioni converge ai primi i punti del denso che abbiamo definito. La seconda idea, dovuta a Cantor come sempre, è di considerare la sottosuccessione *diagonale* di questa tabella:

$$f_1^1 \quad f_2^2 \quad f_3^3 \quad \cdots$$

questa convergerà in tutti i punti x_n, perché ogni termine f_i^i sarà un termine della successione f_n^{i-1}, e quindi tenderà a x_i. Ma questo sarà vero per ogni i, e quindi abbiamo proprio che $f_i^i(x_n) \to \alpha_n$ per ogni n. Rinominiamo allora $\bar{f}_n$ questa successione, dimostriamo che è di Cauchy rispetto alla norma infinita (cioè converge uniformemente). Fissiamo $\varepsilon > 0$, per equicontinuità esisterà un $\delta > 0$ tale che per ogni n, vale

$$d(x,y) < \delta \implies \left|\bar{f}_n(x) - \bar{f}_n(y)\right| < \varepsilon$$

consideriamo allora le palle $B(x_i, \delta)$, queste per densità di x_n ricopriranno tutto X, ma dato che questo è compatto avremo

$$X \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} B(x_i, \delta)$$

ma allora dato che per ogni i la successione reale $\bar{f}_n(x_i)$ in funzione di i è di Cauchy (l'abbiamo definita apposta perché faccia ciò), esisterà un $\bar{n}$ tale che, se $m, n \geq \bar{n}$ allora

$$\left|\bar{f}_n(x_i) - \bar{f}_m(x_i)\right| < \varepsilon$$

per ogni $i \leq N$ (semplicemente abbiamo preso l'$\bar{n}$ per ogni i, e abbiamo preso il minimo). Ma allora abbiamo finito, ci basta mettere insieme tutte le informazioni applicando due volte la triangolare, infatti per $x \in X$ esisterà un x_k, con $k \leq N$ tale che $d(x_k, x) < \delta$, allora

$$\left|\bar{f}_n(x) - \bar{f}_m(x)\right| \leq \left|\bar{f}_n(x) - \bar{f}_n(x_k)\right| + \left|\bar{f}_m(x_k) - \bar{f}_n(x_k)\right| + \left|\bar{f}_m(x_k) - \bar{f}_m(x)\right|$$

d'altra parte il primo e il terzo termine sono $< \varepsilon$ per equicontinuità, mentre quello in mezzo è $< \varepsilon$ per il fatto che $\bar{f}_n(x_k)$ è di Cauchy per ogni k, e quindi abbiamo che $\bar{f}_n$ converge uniformemente a qualcosa, quel qualcosa è in K per chiusura di K, e quindi K è sequenzialmente compatto, ovvero la tesi. □

La prima applicazione di questo teorema è

Corollario 2.39 (Estrarre sottosuccessioni uniformemente convergenti)
Sia X uno spazio metrico compatto e $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{C}(X)$ una successione di funzioni equicontinue ed equilimitate, allora esiste una sottosuccessione f_{n_k} che converge uniformemente in $\mathcal{C}(X)$.

Dimostrazione. Essenzialmente per applicare Ascoli-Arzelà basta dimostrare che

$$K = \overline{\{f_n : n \in \mathbb{N}\}}$$

è ancora equicontinuo ed equilimitato (da questo seguirà che è compatto, e quindi dalla compattezza seguirà la tesi). **Per casa**. □

Esercizio 2.40. Consideriamo l'insieme

$$K := \{f \in \mathcal{C}([a,b]) : |f(x_0)| \leq A,\ \mathrm{Lip}(f) \leq B\}$$

con $A, B > 0$ due costanti fissate e $x_0 \in [a,b]$ un certo punto. Allora K è compatto.

Soluzione. Usiamo Ascoli-Arzelà, prima di tutto abbiamo che $X = [a,b]$ è compatto, poi abbiamo:

- K è chiuso: $f_n \in K$ e $f_n \to f$ uniformemente allora

  $$|f(x_0)| = \lim_{n\to\infty} |f_n(x_0)| \leq A$$

  inoltre

  $$\frac{|f(x) - f(y)|}{|x-y|} = \lim_{n\to\infty} \frac{|f_n(x) - f_n(y)|}{|x-y|} \leq B$$

  e dunque la costante di Lipschitz rimane limitata.

- K è equicontinuo, perché banalmente per ogni $\varepsilon > 0$ scegliamo $\delta = \varepsilon/B$.
- K è equilimitato, infatti

$$|f(x)| \leq |f(x) - f(x_0)| + |f(x_0)| \leq B\,|x - x_0| + A \leq B(b-a) + A$$

cioè graficamente ci basta prendere il massimo valore assunto in x_0 e tracciare il cono di Lipschitz in quel punto; dato che tutte le f devono stare al di sotto di quel cono, quando questo incontrerà gli estremi dell'intervallo $[a, b]$ avremo la costante che stiamo cercando.

Dunque per Ascoli-Arzelà abbiamo la tesi. □

Una cosa che abbiamo usato sopra è vera anche in generale, e vale la pena isolarla:

Proposizione 2.41 (Equicontinuo e limitato in un punto implica equilimitato)
Sia $K \subseteq \mathcal{C}([a, b])$ equicontinuo, allora se esiste un x_0 tale che

$$|f(x_0)| \leq M$$

per qualche $M \in \mathbb{R}$ allora K è equilimitato.

Dimostrazione. Supponiamo per semplicità che $\varepsilon = 1$, allora esisterà un $\delta > 0$ tale che $|x - y| \leq \delta \implies |f(x) - f(y)| < 1$ per ogni $f \in K$. Allora abbiamo

$$|f(x) - f(y)| \leq \left\lfloor \frac{x-y}{\delta} \right\rfloor + 1 \leq \left\lfloor \frac{b-a}{\delta} \right\rfloor + 1$$

BHO ANCHE QUESTO NON HO CAPITO □

Come applicazione definiamo la nozione di lunghezza di una curva:

Definizione 2.42 (Lunghezza di una curva)**.** Sia $\gamma : [0, 1] \to \mathbb{R}^n$ una curva, allora definiamo la sua lunghezza $L(\gamma)$ come

$$L(\gamma) := \sup_{t_n \in [0,1]} \sum_{i=1}^{N} |\gamma(t_i) - \gamma(t_{i+1})|$$

con t_i una successione crescente **finita** di punti di $[0, 1]$. Insomma è l'approssimazione sempre più fine della curva con spezzate.

Teorema 2.43 (Esistenza delle geodetiche)
Sia $C \subseteq \mathbb{R}^n$ un chiuso (per esempio una sfera, un cono, un toro,...). Presi due punti $x, y \in C$ tali per cui esista una $\tilde{\gamma} : [0, 1] \to C$ tale che $\gamma(0) = x$ e $\gamma(1) = y$ tale che $L(\tilde{\gamma}) < \infty$, esiste

$$\min \{L(\gamma) : \gamma : [0, 1] \to C,\, \gamma(0) = x,\, \gamma(1) = y\}$$

e tale curva che realizza il minimo si dice *geodetica*.

Dimostrazione. Prendiamo l'insieme sia Γ l'insieme delle curve da x a y in C, e consideriamo

$$I := \inf \{L(\gamma) : \gamma \in \Gamma\}$$

per ipotesi questo è finito, prendiamo allora una successione $\gamma_n \in \Gamma$ minimizzante. Per un fatto che si vedrà a geometria 2 possiamo assumere che ogni γ_n sia parametrizzata a velocità costante, ovvero

$$L\left(\gamma_{|[s,t]}\right) = (t-s)L(\gamma_n)$$

denotiamo inoltre $L(\gamma_n) =: L_n$. Allora abbiamo che:

- γ_n è equicontinua, infatti

  $$|\gamma_n(s) - \gamma_n(t)| \leq L\left(\gamma_{n|[s,t]}\right) = (t-s)L_n \leq C(t-s)$$

  e quindi è addirittura uniformemente lipschitziana.

- γ_n è equilimitata, infatti $|\gamma_n(0)| = |x|$ per tutti gli n, e quindi per l'osservazione fatta sopra abbiamo che

  $$|\gamma_n(0)| \leq |\gamma_n(s) - \gamma_n(0)| + |\gamma_n(0)| \leq C\,|s| + |x|$$

  ovvero abbiamo proprio equilimitatezza.

Allora per il corollario al teorema di Ascoli-Arzelà abbiamo che $\gamma_n \to \gamma$ uniformemente in $[0,1]$, d'altra parte dato che C è chiuso $\gamma \in C$. Rimane solo da mostrare che la lunghezza di questo γ sia proprio quella minima, per definizione di sup abbiamo che esisterà una spezzata t_i tale che

$$L(\gamma) \leq \sum_{i=1}^{N} |\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})| + \varepsilon$$

ma allora

$$\sum_{i=1}^{N} |\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})| + \varepsilon = \liminf_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{N} |\gamma_n(t_i) - \gamma_n(t_{i-1})| + \varepsilon = \liminf_{n\to\infty} L(\gamma_n) + \varepsilon = I + \varepsilon$$

ma dato che questo vale per ε arbitrario abbiamo

$$L(\gamma) \leq I$$

e per definizione di inf questo conclude che $L(\gamma) = I$, come volevamo. □

Parte II
Modulo B