

# Appunti di Teoria della misura

Elio Marconi - SGSS

FILIPPO GARGIULO\*

Settembre - Dicembre 2026

## Indice

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Preambolo: misure in <math>\mathbb{R}^n</math></b> | <b>2</b>  |
| 1.1      | La misura esterna . . . . .                           | 2         |
| 1.2      | Insiemi misurabili e Misura di Lebesgue . . . . .     | 7         |
| <b>2</b> | <b>Motivazioni e introduzione alle misure</b>         | <b>11</b> |
| 2.1      | Le $\sigma$ -Algebre e le misure . . . . .            | 12        |
| <b>3</b> | <b>Integrale di Lebesgue</b>                          | <b>16</b> |
| <b>4</b> | <b>Compattezza e convergenza debole</b>               | <b>17</b> |
| <b>5</b> | <b>Introduzione al Trasporto Ottimo</b>               | <b>18</b> |

---

\*Mail per segnalare errori: [filippo.gargiulo@studenti.unipd.it](mailto:filippo.gargiulo@studenti.unipd.it)

## §1 Preambolo: misure in $\mathbb{R}^n$

Questa sezione è stata scritta leggendo "Real Analysis" di E.M. Stein e R. Shakarchi. L'idea è, prima di attaccare la teoria della misura nella sua piena astrazione, di ottenere un po' di intuizione nello spazio euclideo  $\mathbb{R}^n$  che siamo in grado di visualizzare.

### §1.1 La misura esterna

In  $\mathbb{R}^n$  la prima cosa originale che possiamo definire è

**Definizione 1.1** (Cubi e Rettangoli). In  $\mathbb{R}^n$  dati gli intervalli

$$I_n = [a_n, b_n]$$

definiamo il *rettangolo chiuso* definito da questi intervalli come

$$R := I_1 \times I_2 \times \cdots \times I_n$$

analogamente possiamo definire il *rettangolo aperto* sostituendo agli intervalli chiusi degli intervalli aperti. Il *volume* di  $R$  è definito come

$$|R| := \prod_{i=1}^n (b_i - a_i)$$

un rettangolo tale che  $b_i - a_i = b_j - a_j$  per ogni coppia di indici  $i, j$  si dice un *cubo*.

Per Heine-Borel tutti i rettangoli sono compatti.

**Definizione 1.2** (Quasi disgiunti). Due rettangoli  $A, B$  si dicono *quasi disgiunti* se

$$A \cap B \subseteq \partial A \cup \partial B$$

ovvero se si intersecano solo sul bordo.

Con questo possiamo definire una nozione di misura esterna, che non esiste in spazi arbitrari:

**Definizione 1.3** (Misura esterna). Dato un qualunque  $E \subseteq \mathbb{R}^n$  definiamo la sua *misura esterna*  $m_* : \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \rightarrow [0, \infty]$  come:

$$m_*(E) := \inf \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i|$$

dove l'inf è preso su tutti i possibili ricoprimenti  $Q_i$  di  $E$  con  $Q_i$  cubi chiusi, ovvero abbiamo che

$$E \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i$$

con ciascuno dei  $Q_i$  un **cubo chiuso**.

É importante che questa copertura sia (possibilmente) infinita. Se ci restringessimo solo a coperture finite avremmo in generale una quantità maggiore o uguale della misura esterna. Alcuni esempi di misure esterne di insiemi sono i seguenti:

**Esempio 1.4 (Punti)**

La misura esterna di un punto o dell'insieme vuoto è zero, così come la misura esterna di qualunque insieme numerabile.

*Dimostrazione.* Per l'insieme vuoto non c'è essenzialmente nulla da dimostrare. Per un punto  $P$  ci basta scegliere coperture costituite da un unico punto e arbitrariamente piccole. Dato invece un insieme numerabile

$$S = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\} \subset \mathbb{R}^n$$

per ogni  $\varepsilon > 0$  possiamo scegliere una copertura di  $S$  formata da cubi  $Q_i$  ciascuno centrato in  $x_i$  e tali che

$$|Q_i| = \frac{\varepsilon}{2^i}$$

in questo modo abbiamo, per definizione di inf

$$m_*(S) \leq \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| = \varepsilon \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} = \varepsilon$$

ma visto che  $\varepsilon > 0$  era arbitrario abbiamo  $m_*(S) = 0$ , come richiesto.  $\square$

In particolare abbiamo che  $\mathbb{Q}^k$  ha misura esterna 0 per ogni  $k$ .

**Esempio 1.5 (Rettangoli)**

La misura esterna di un rettangolo chiuso è uguale al suo volume.

*Dimostrazione.* Chiaramente abbiamo

$$m_*(R) \leq |R|$$

in quanto un qualunque rettangolo si può scomporre abbastanza agilmente in infiniti cubi quasi disgiunti, ricorsivamente. Andrebbe dimostrato che un rettangolo ha sempre volume uguale alla somma dei volumi dei cubi costituenti una sua decomposizione quasi disgiunta, ma è estremamente pedante e non lo faremo.

Per l'altro verso abbiamo bisogno, dato un generico ricoprimento  $Q_i$  di cubi chiusi, di dimostrare che

$$|R| \leq \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i|$$

da cui seguirà per definizione di inf la tesi. Per fare ciò usiamo la compattezza: dato il ricoprimento chiuso  $Q_i$ , per ogni  $\varepsilon > 0$  ne costruiamo uno aperto  $S_i$  formato da cubi aperti tali che, per ogni  $i$ :

$$\begin{aligned} Q_i &\subset S_i \\ |Q_i| (1 + \varepsilon) &\leq |S_i| \end{aligned}$$

da questo dunque possiamo estrarre un sottoricoprimento finito  $S_1, \dots, S_N$ . A questo punto ci basta dimostrare che

$$|R| \leq \sum_{i=1}^N |S_i|$$

che è pedante ma fattibile lavorando esplicitamente con tutti i rettangoli coinvolti (dato che sono finiti). Dunque abbiamo

$$|R| \leq \sum_{i=1}^N |S_i| \leq (1 + \varepsilon) \sum_{i=1}^N |Q_i| \leq (1 + \varepsilon) \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i|$$

per ogni  $\varepsilon > 0$ , il che conclude la dimostrazione per quanto detto sopra.  $\square$

**Esempio 1.6 (Cantor)**

L'insieme di Cantor ha misura esterna nulla.

**Esempio 1.7 (Tutto lo spazio)**

$\mathbb{R}^n$  ha misura esterna infinita.

Dimostriamo alcune proprietà di estrema importanza della misura esterna:

**Lemma 1.8 (Monotonia)**

Dati due insiemi  $A \subseteq B \subseteq \mathbb{R}^n$  abbiamo

$$m_*(A) \leq m_*(B).$$

*Dimostrazione.* Comunque dato un ricoprimento  $Q_i$  di  $B$  abbiamo

$$A \subseteq B \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i$$

dunque  $Q_i$  è un ricoprimento anche di  $A$ , il che per le proprietà dell'inf implica proprio la tesi.  $\square$

**Proposizione 1.9 (Subadditività numerabile)**

Dato un  $E \subseteq \mathbb{R}^n$  tale che

$$E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$$

abbiamo che

$$m_*(E) \leq \sum_{i=1}^{\infty} m_*(E_i).$$

*Dimostrazione.* Supponiamo WLOG che  $m_*(E_i) < \infty$  per ogni  $i$ . L'idea è di costruire una copertura di  $E$  a partire da quelle di  $E_i$ : grazie alla definizione operativa di inf per ogni  $\varepsilon > 0$  possiamo trovare una copertura  $Q_{ij}$  di  $E_i$  tale che

$$\sum_{j=1}^{\infty} |Q_{ij}| \leq m_*(E_i) + \frac{\varepsilon}{2^i}$$

da questo allora è facile trovare che, unendo tutte le coperture degli  $E_i$  per trovare una copertura di  $E$ :

$$m_*(E) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} |Q_{ij}| \leq \sum_{i=1}^{\infty} m_*(E_i) + \varepsilon \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} = \sum_{i=1}^{\infty} m_*(E_i) + \varepsilon$$

e dall'arbitrarietà di  $\varepsilon$  abbiamo la tesi.  $\square$

**Proposizione 1.10** (Approssimabilità con aperti I)

Se  $E \subseteq \mathbb{R}^n$  abbiamo che

$$m_*(E) = \inf_{\substack{\mathcal{O} \supseteq E \\ \mathcal{O} \text{ aperto}}} m_*(\mathcal{O}).$$

*Dimostrazione.* Per monotonia abbiamo immediatamente

$$m_*(E) \leq m_*(\mathcal{O})$$

per ogni aperto  $\mathcal{O}$  contenente  $E$ . Dobbiamo quindi dimostrare che per ogni  $\varepsilon > 0$  esiste un aperto  $\mathcal{O} \supseteq E$  tale che

$$m_*(\mathcal{O}) \leq \varepsilon + m_*(E)$$

prima di tutto quindi grazie alla definizione operativa di inf abbiamo che esiste un ricoprimento  $Q_i$  tale che

$$\sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| \leq \frac{\varepsilon}{2} + m_*(E)$$

da questo possiamo costruirne un altro costituito da insiemi aperti  $Q_i^0$  tale che

$$\begin{aligned} Q_i^0 &\supseteq Q_i \\ |Q_i^0| &\leq |Q_i| + \frac{\varepsilon}{2^{i+1}} \end{aligned}$$

da cui otteniamo un insieme aperto

$$\mathcal{O} := \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i^0$$

tale che  $\mathcal{O} \supseteq E$  e inoltre, per subadditività e monotonia

$$m_*(\mathcal{O}) \leq \sum_{i=1}^{\infty} m_*(Q_i^0) = \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i^0| \leq \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| + \varepsilon \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^{i+1}} \leq \frac{\varepsilon}{2} + m_*(E) + \frac{\varepsilon}{2} = m_*(E) + \varepsilon$$

che era la tesi.  $\square$

Un modo più evocativo per scrivere il risultato sopra è il seguente:

**Corollario 1.11** (Approssimabilità con aperti II)

Per ogni insieme  $E \subseteq \mathbb{R}^n$  dato un  $\varepsilon > 0$  possiamo trovare un  $\mathcal{O} \supseteq E$  aperto tale che

$$0 \leq m_*(\mathcal{O}) - m_*(E) \leq \varepsilon.$$

La nostra intuizione riguardo alla misura è che dia una certa nozione di "dimensione" agli insiemi, e quindi ci aspetteremmo che unendo due insiemi disgiunti si ottenga sempre un insieme la cui misura sia la somma dei due. Purtroppo questo non è possibile in generale, e anzi è il motivo per cui ci interesserà definire il concetto di insieme "misurabile". Esiste tuttavia una condizione sufficiente più forte:

**Proposizione 1.12** (Condizione sufficiente per l'additività)

Siano  $A$  e  $B$  due sottoinsiemi di  $\mathbb{R}^n$  tali che

$$d(A, B) > 0$$

allora abbiamo che

$$m_*(A \cup B) = m_*(A) + m_*(B).$$

*Dimostrazione.* Per subadditività abbiamo chiaramente

$$m_*(A \cup B) \leq m_*(A) + m_*(B)$$

dobbiamo quindi dimostrare la disuguaglianza inversa. Per fare questo sfruttiamo la distanza scegliendo un  $\delta$  tale che

$$d(A, B) > \delta > 0$$

e come prima dato un certo  $\varepsilon > 0$  un ricoprimento  $Q_i$  tale che

$$\sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| \leq m_*(A \cup B) + \varepsilon$$

a questo punto possiamo dividendo ricorsivamente ciascuno  $Q_i$  in  $2^n$  cubi possiamo assumere senza perdita di generalità che il diametro di ciascun  $Q_i$  sia minore di  $\delta$ . Così facendo possiamo identificare due sottoinsiemi **disgiunti** di  $\{Q_i\}$ :

$$S_A = \{Q_i : Q_i \cap A \neq \emptyset\}$$

$$S_B = \{Q_i : Q_i \cap B \neq \emptyset\}$$

siano  $J_A$  e  $J_B$  gli insiemi degli indici di questi due insiemi. Allora dato che  $Q_i$  era un ricoprimento di  $A \cup B$  abbiamo

$$m_*(A) \leq \sum_{i \in J_A} |Q_i|$$

$$m_*(B) \leq \sum_{i \in J_B} |Q_i|$$

da cui sommando membro a membro abbiamo

$$m_*(A) + m_*(B) \leq \sum_{i \in J_A} |Q_i| + \sum_{i \in J_B} |Q_i| \leq \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| \leq m_*(A \cup B) + \varepsilon$$

che implica la tesi per arbitrarietà di  $\varepsilon$ . □

Si vede che questa non è necessaria dal seguente lemma:

**Lemma 1.13** (Unione quasi disgiunta di cubi)

Un insieme  $E \subseteq \mathbb{R}^n$  tale che

$$E = \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i$$

dove  $Q_i$  è una successione di cubi chiusi a due a due quasi disgiunti, soddisfa sempre

$$m_*(E) = \sum_{i=1}^{\infty} m_*(Q_i) = \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i|$$

*Dimostrazione.* Scegliamo un  $\varepsilon > 0$ , allora per ogni  $Q_i$  possiamo costruire un cubo aperto  $\mathcal{Q}_i \subset Q_i$  tale che

$$|Q_i| \geq |\mathcal{Q}_i| + \frac{\varepsilon}{2^i}$$

abbiamo quindi per ogni  $N \in \mathbb{N}$  che

$$E \supseteq \bigcup_{i=1}^N \mathcal{Q}_i$$

cioè per monotonia, e applicando la proposizione 1.12, dato che ciascuno dei cubi  $\mathcal{Q}_i$  è disgiunto dagli altri e a distanza positiva  $d(\mathcal{Q}_i, \mathcal{Q}_j) > 0$  per ogni  $i \neq j$  abbiamo:

$$m_*(E) \geq m_*\left(\bigcup_{i=1}^N \mathcal{Q}_i\right) = \sum_{i=1}^N m_*(\mathcal{Q}_i) \geq \sum_{i=1}^N \left(|Q_i| - \frac{\varepsilon}{2^i}\right)$$

prendendo il limite  $N \rightarrow \infty$  quindi abbiamo proprio

$$m_*(E) \geq \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| - \varepsilon$$

che per arbitrarietà di  $\varepsilon$  implica

$$m_*(E) \geq \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i|$$

che combinato con la subadditività ci dà proprio la tesi.  $\square$

**§1.2 Insiemi misurabili e Misura di Lebesgue**

Come abbiamo anticipato, il nostro obiettivo è costruire una nozione di misura che sia sempre  $\sigma$ -additiva, su unioni disgiunte di insiemi, ovvero vogliamo identificare una certa collezione di insiemi tale che, se

$$E = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} E_i$$

(dove  $\sqcup$  indica l'unione disgiunta) implica

$$m_*(E) = \sum_{i=1}^{\infty} m_*(E_i).$$

In  $\mathbb{R}^n$  tuttavia abbiamo già una collezione di insiemi che soddisfano questa proprietà, ovvero **gli aperti**, per dimostrare ciò abbiamo bisogno del seguente risultato:

**Lemma 1.14** (Scomponibilità degli aperti)

Ogni aperto  $\mathcal{O} \subseteq \mathbb{R}^n$  può essere scomposto come unione numerabile di cubi chiusi quasi disgiunti.

*Dimostrazione.* La dimostrazione essenzialmente consiste in un algoritmo che costruisca esplicitamente la scomposizione richiesta, che procede per approssimazione dell'insieme dividendo il piano in griglie sempre più sottili.

Procediamo con il seguente algoritmo, che prende in input un aperto  $\mathcal{O}$  e ne restituisce una scomposizione in cubi quasi disgiunti:

**function** PARTIZIONA( $\mathcal{O}$ )

$R \leftarrow \{\}$

▷ L'insieme di cubi che costruiremo

**for**  $i = 0$  **to**  $\infty$  **do**

Dividiamo il piano in una griglia  $G_i$  di cubi di lato  $\frac{1}{2^i}$

**for all**  $Q \in G_i$  **do**

**if**  $Q \subseteq Q' \in R$  **then**

**Continue**

**end if**

**if**  $Q \subseteq \mathcal{O}$  **then**

$R \leftarrow R \cup \{Q\}$

**end if**

**end for**

**end for**

**return**  $R$

**end function**

La correttezza di questo algoritmo segue dal fatto che, per ogni  $x \in \mathcal{O}$  esiste un  $r > 0$  tale che

$$B_r(x) \subseteq \mathcal{O}$$

dato che  $\mathcal{O}$  è aperto, e dunque definitivamente esisterà un cubo chiuso tale che

$$Q \subseteq B_r(x)$$

che verrà scelto dall'algoritmo. Questo dimostra che ogni punto è coperto dalla scomposizione che abbiamo costruito. Ma dato che questa è formata per definizione da cubi quasi disgiunti, abbiamo finito.  $\square$

Dunque presa una successione di aperti disgiunti  $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2, \dots$  abbiamo che possiamo scomporre ciascuno di questi in un insieme numerabile di cubi chiusi quasi disgiunti  $R_i$ , denotato con  $R_{ij}$  il cubo  $j$ -esimo nella scomposizione dell'aperto  $i$  abbiamo quindi, per 1.13:

$$\sum_{i=1}^{\infty} m_*(\mathcal{O}_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} |R_{ij}|$$

d'altra parte l'unione  $\bigsqcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{O}_i$  può essere scomposta utilizzando le scomposizioni disgiunte di cubi quasi disgiunti  $R_i$ , e quindi

$$m_*\left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{O}_i\right) = \sum_{i,j} |R_{ij}|$$

ovvero sono proprio uguali, come volevamo trovare. Se allora vogliamo definire gli insiemi misurabili come quegli insiemi per cui la misura sia  $\sigma$ -additiva, non è sorprendente che in  $\mathbb{R}^n$  ci venga da imporre che questi insiemi siano "quasi aperti", ovvero

**Definizione 1.15 (Lebesgue Misurabile).** Un sottoinsieme  $E \subseteq \mathbb{R}^n$  si dice *Lebesgue Misurabile* se per ogni  $\varepsilon > 0$  esiste un aperto  $\mathcal{O} \subseteq E$  tale che

$$m_*(\mathcal{O} - E) \leq \varepsilon.$$

Dunque possiamo ridefinire la nozione di misura restringendoci agli insiemi che hanno questa proprietà:

**Definizione 1.16 (Misura di Lebesgue).** Definiamo la *misura di Lebesgue* come una restrizione della misura esterna agli insiemi Lebesgue misurabili, ovvero definiamo la funzione  $m : \mathcal{L}(\mathbb{R}^n) \rightarrow [0, \infty]$  tale che

$$m(E) := m_*(E)$$

per ogni  $E$  Lebesgue misurabile.

Quello che rimane da capire adesso è quali siano precisamente gli insiemi misurabili tra tutti i sottoinsiemi di  $\mathbb{R}^n$ . Prima di tutto abbiamo sicuramente

**Proposizione 1.17 (Misura nulla)**

Tutti gli insiemi di misura esterna nulla sono misurabili, ovvero se  $m_*(E) = 0$  allora  $E$  è misurabile. In particolare se  $F$  è un sottoinsieme di un insieme di misura nulla è sempre misurabile.

*Dimostrazione.* Grazie al 1.11 dato  $\varepsilon > 0$  possiamo sempre trovare un  $\mathcal{O} \supseteq E$  aperto tale che

$$m_*(\mathcal{O}) - m_*(E) \leq \varepsilon$$

ma d'altra parte per monotonia e usando il fatto che  $m_*(E) = 0$  abbiamo

$$m_*(\mathcal{O} - E) \leq m_*(\mathcal{O}) = m_*(\mathcal{O}) - m_*(E) \leq \varepsilon$$

che quindi implica la tesi. □

Studiamo adesso come si comportano gli insiemi misurabili rispetto alle operazioni insiemistiche, abbiamo:

**Proposizione 1.18 (Unioni numerabili di insiemi misurabili)**

Dati  $E_1, E_2, \dots \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$  abbiamo che

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i = E \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n).$$

*Dimostrazione.* Scelto un  $\varepsilon > 0$ , per ogni  $E_i$  possiamo trovare un  $\mathcal{O}_i \supseteq E_i$  aperto tale che

$$m_*(\mathcal{O}_i - E_i) \leq \frac{\varepsilon}{2^i}.$$

Il nostro candidato insieme aperto approssimante allora è

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{O}_i =: \mathcal{O}$$

che dimostriamo per monotonia e subadditività facilmente essere quello giusto

$$m_*(\mathcal{O} - E) \leq m_*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} (\mathcal{O}_i - E_i)\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} m_*(\mathcal{O}_i - E_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^i} = \varepsilon$$

da cui la misurabilità di  $E$ . □

Passiamo ora ai complementari. Per dimostrare il prossimo risultato abbiamo bisogno dei due seguenti lemmi:

**Lemma 1.19 (Distanza compatto-chiuso)**

Dati un insieme compatto  $K$  e un chiuso  $F$  disgiunti, si ha sempre

$$d(F, K) > 0.$$

*Dimostrazione.* Dato che  $K$  ed  $F$  sono disgiunti abbiamo che  $K \subseteq F^c$ , ovvero  $K$  è contenuto in un aperto, questo vuol dire che per ogni  $x \in K$  esisterà un  $\delta_x > 0$  tale che

$$d(x, F) > 3\delta_x.$$

Per usare la compattezza di  $K$  a questo punto consideriamo il ricoprimento

$$K \subseteq \bigcup_{x \in K} B_{2\delta_x}(x) \subseteq F^c$$

da cui possiamo estrarre un sottoricoprimento finito

$$K \subseteq \bigcup_{i=1}^N B_{2\delta_{x_i}}(x_i) \subseteq \bigcup_{x \in K} B_{2\delta_x}(x) \subseteq F^c$$

grazie a questa possiamo considerare il nostro  $\delta$  candidato per boundare la distanza dal basso, ovvero vogliamo dimostrare che

$$d(F, K) > \delta := \min_{1 \leq i \leq N} \delta_{x_i} > 0$$

cioè vogliamo dire che per ogni  $x \in K$  e  $y \in F$  si ha  $|x - y| \geq \delta$ , d'altra parte per definizione di ricoprimento di  $K$  dovrà esistere un  $x_i$  tale che

$$|x - x_i| \leq 2\delta_{x_i}$$

e quindi per la disuguaglianza triangolare abbiamo

$$|x - y| \geq |y - x_i| - |x_i - x| \geq 3\delta_{x_i} - 2\delta_{x_i} = \delta_{x_i} \geq \delta$$

che conclude. □

**Lemma 1.20 (Tutti i chiusi sono misurabili)**

Tutti i sottoinsiemi di  $\mathbb{R}^n$  chiusi sono misurabili.

*Dimostrazione.* Se  $B_k$  è la palla chiusa di raggio  $k$  centrata in 0 abbiamo □

## §2 Motivazioni e introduzione alle misure

Il problema principale che ha fatto nascere la teoria della misura è l'integrale di Riemann, che aveva alcuni problemi. Lo studio delle funzioni  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  è quello che ha fatto scaturire ciò, e quindi di solito questa branca della matematica si chiama **Analisi reale**. Lebesgue nel suo *Leçons sur l'intégration* scriveva che una buona definizione di integrale deve soddisfare la proprietà che, se  $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  è una successione di funzioni definite su un compatto tale che esista un  $M > 0$  che soddisfi

$$|f_n(x)| \leq M$$

per ogni  $n \in \mathbb{N}$ , e tali che

$$f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

allora se questa funzione converge punto a punto ad una  $f$  dobbiamo poter scambiare limite e integrale

$$\int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx.$$

Questa proprietà per l'integrale di Riemann non è necessariamente vera, perchè successioni di funzioni Riemann integrabili possono convergere puntualmente a funzioni non Riemann integrabili. Un esempio semplice è quando

$$f(x) = \mathbb{1}_{\mathbb{Q}}$$

e la successione che cerchiamo è

$$f_n(x) = \mathbb{1}_{\mathbb{Q}_n}$$

tale che  $\mathbb{Q}_n = \{q_1, q_2, \dots, q_n\}$  è l'insieme dei primi  $n$  razionali in una certa enumerazione di  $\mathbb{Q}$ . Perché vorremmo tanto questa proprietà vera? Perché il problema è che se  $f_n \rightarrow f$  allora il seguente limite esiste sempre

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx$$

tantopiù quando notiamo che si riesce a dimostrare che per ogni coppia di successioni  $f_n^1 \rightarrow f$  e  $f_n^2 \rightarrow f$  vale

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n^1(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n^2(x) dx$$

e quindi viene spontaneo pensare che ci sia una nozione di integrale che si può assegnare alla funzione  $f$  ma che l'integrale di Riemann non riesce a catturare. Insomma vogliamo ridefinire la nozione di integrabilità in modo che l'insieme delle funzioni integrabili sia **chiuso rispetto ai limiti**, ovvero che sia completo, è in un certo senso un caso specifico di completamento di spazio metrico.

Un altro problema dell'integrale di Riemann consiste nel teorema fondamentale del calcolo integrale, una versione del teorema fondamentale è che

### Teorema 2.1 (Fondamentale del calcolo integrale)

Se  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  è derivabile e  $f'$  è Riemann integrabile allora

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a).$$

Il problema è proprio nell'ipotesi che  $f'$  sia Riemann integrabile, e Volterra riuscì a costruire una  $f$  tale che sia derivabile in ogni punto, ma per cui  $f'$  non sia Riemann Integrabile. Anche qui ci viene da dire che la funzione  $f'$  abbia una nozione di integrale, ma la definizione di Riemann non riesce davvero a catturarla.

## §2.1 Le $\sigma$ -Algebre e le misure

Vogliamo definire una nozione di "grandezza" di un insieme, ovvero vogliamo definire una funzione  $\mu : \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \rightarrow [0, \infty]$  che abbia le seguenti proprietà:

- Se non prendiamo niente, l'insieme ha misura nulla, ovvero  $\mu(\emptyset) = 0$ .
- Se due insiemi sono *congruenti*  $A \cong B$ , cioè si può ruotare e traslare uno dei due nell'altro, allora  $\mu(A) = \mu(B)$ .
- La misura di un intervallo unitario sia sempre unitaria:  $\mu([0, 1]^n) = 1$ .
- Se  $A_k \subseteq \mathbb{R}^n$  è una successione di insiemi a due a due disgiunti allora

$$\mu\left(\bigsqcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k)$$

cioè la misura è " $\sigma$ -additiva".

La cattiva notizia purtroppo è che queste proprietà sono incompatibili tra loro. In un famoso lavoro, Vitali dimostrò che esiste un insieme che non si presta ad essere misurato, ovvero:

**Esempio 2.2 (Vitali)**

Consideriamo l'intervallo  $[0, 1]$  equipaggiato con la seguente relazione di equivalenza

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}.$$

**L'insieme di Vitali**  $V$  è un insieme che contiene uno e un solo elemento per ogni classe di equivalenza di  $[0, 1]$  (per fare ciò abbiamo bisogno dell'assioma della scelta), insomma è una scelta di rappresentanti di  $[0, 1]_{\sim}$ .

Consideriamo ora gli insiemi traslati ciclicamente di un razionale  $q \in \mathbb{Q} \cap [0, 1)$ , ovvero

$$V_q := \{q + v : v \in V\}$$

a questo punto notiamo che, per come abbiamo definito l'insieme di Vitali, abbiamo che se  $q_1 \neq q_2$  allora  $V_{q_1} \cap V_{q_2} = \emptyset$ , perchè se si intersecassero avremmo scelto due elementi nella stessa classe di equivalenza. Inoltre abbiamo che

$$\bigcup_{q \in \mathbb{Q} \cap [0, 1)} V_q = [0, 1)$$

in quanto ogni elemento di  $[0, 1)$  può essere scelto come somma tra un rappresentante della classe e un razionale. L'assurdo a questo punto scaturirà dal dimostrare che

**Claim 2.3 —**

$$\mu(V_q) = \mu(V)$$

*Proof.* d'altra parte possiamo spezzare  $V$  in

$$\mu(V) = \mu(\{v \in V : v + q < 1\}) + \mu(\{v \in V : v + q \geq 1\})$$

per additività. D'altra parte visto che  $\mu$  è invariante per traslazioni dobbiamo avere

$$\dots = \mu(\{v + q \in V : v + q < 1\}) + \mu(\{v + q - 1 \in V : v + q \geq 1\})$$

ma questa, di nuovo per additività, è proprio la misura di  $V_q$ , quindi abbiamo dimostrato il nostro claim. ■

Allora abbiamo la seguente catena di uguaglianze

$$1 = \mu([0, 1)) = \mu\left(\bigcup_{q \in \mathbb{Q} \cap [0, 1)} V_q\right) = \sum_{q \in \mathbb{Q} \cap [0, 1)} \mu(V_q) = \sum_{q \in \mathbb{Q} \cap [0, 1)} \mu(V)$$

e questo è assurdo perché se  $\mu(V)$  è positivo quella somma risulta infinita, e se è nullo la somma risulta nulla, in entrambi i casi diverso da 1.

Abbiamo due strade allora, o indeboliamo un po' le proprietà che vogliamo dalla nostra misura (per esempio assumendo che l'additività valga solo per unioni finite, ma in questo caso finiamo nel paradosso di Banach-Tarski), oppure ci possiamo restringere ad una certa sottofamiglia di insiemi di  $\mathbb{R}^n$ , che chiameremo *misurabili*.

Per fare ciò definiamo allora

**Definizione 2.4 ( $\sigma$ -algebra).** Sia  $X \neq \emptyset$  un insieme, diciamo che  $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$  è una  $\sigma$ -algebra se soddisfa le seguenti proprietà:

1.  $\emptyset, X \in \mathcal{A}$ .
2. Per ogni successione  $A_i$  di elementi di  $\mathcal{A}$ , si ha che

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}.$$

3. Per ogni  $A \in \mathcal{A}$  si ha che  $A^c \in \mathcal{A}$ .

In questo caso  $(X, \mathcal{A})$  si dice *spazio misurabile*, e gli elementi della  $\sigma$ -algebra si dicono *misurabili*.

Osserviamo che da queste proprietà segue immediatamente

**Proposizione 2.5** (Intersezioni numerabili)

Se  $\mathcal{A}$  è una  $\sigma$ -algebra allora per ogni  $A_i$  a valori in  $\mathcal{A}$  si ha

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}.$$

*Dimostrazione.* Segue facilmente notando che

$$\left[ \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n^c \right]^c = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$$

e il LHS sta nella  $\sigma$ -algebra per definizione.  $\square$

La stessa struttura equipaggiata con unioni **finite** si dice *algebra*. Vediamo alcuni esempi di  $\sigma$ -algebre

**Esempio 2.6** ( $\sigma$ -algebra banale)

$\{\emptyset, X\}$  è una  $\sigma$ -algebra per ogni insieme  $X$ , così come  $\mathcal{P}(X)$  è una  $\sigma$ -algebra per ogni  $X$ .

**Esempio 2.7** (Numerabili)

Usando la cardinalità possiamo definire

$$\mathcal{A}_{\text{num}} := \{A : |A| \leq \aleph_0\} \cup \{A : |A^c| \leq \aleph_0\}$$

che è facilmente una  $\sigma$ -algebra perché  $\aleph_0 \times \aleph_0 = \aleph_0$ .

Il primo risultato che dimostriamo è

**Lemma 2.8** (Intersezioni di  $\sigma$ -algebre)

Data  $\{\mathcal{A}_i\}_{i \in I}$  una successione di  $\sigma$ -algebre su  $X$ , con  $I$  non necessariamente numerabile, si ha che

$$\bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$$

è a sua volta una  $\sigma$ -algebra di  $X$ .

*Dimostrazione.* É una banale verifica degli assiomi di  $\sigma$ -algebra.  $\square$

E ora un ingrediente importante che usa questo risultato è il seguente:

**Definizione 2.9** ( $\sigma$ -algebra generata da un insieme). Data una famiglia  $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(X)$  possiamo definire la  $\sigma$ -algebra *generata da*  $\mathcal{E}$  come

$$\sigma(\mathcal{E}) := \bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$$

dove gli  $\mathcal{A}_i$  sono tutte le possibili  $\sigma$ -algebre di  $X$  contenenti  $\mathcal{E}$ .

**Esempio 2.10** (Boreliani)

Se  $\mathcal{E} \subseteq \mathbb{R}^n$  è l'insieme di tutti gli aperti di  $\mathbb{R}^n$  la  $\sigma$ -algebra  $\sigma(\mathcal{E})$  è detta  $\sigma$ -algebra dei *Boreliani*.

## §3 Integrale di Lebesgue

## **§4 Compattezza e convergenza debole**

## **§5** Introduzione al Trasporto Ottimo