Appunti di Geometria 2

Orsola Tommasi (Modulo A) - UNIPD
Nicola Mazzari (Modulo B) - UNIPD

Filippo Gargiulo*

Settembre 2026 - Giugno 2027

Indice

I Modulo A **3**

1 Forme bilineari e quadratiche **3**
1.1 Simmetria e asimmetria . . . 4
1.1.1 ★ Bonus: La traccia . . . 8
1.2 Ortogonalità . . . 9
1.3 Matrici associate . . . 11
1.3.1 Cambio di base e congruenza . . . 14
1.4 Definitezza e degenerazione . . . 17

2 Forme simmetriche e alternanti **21**
2.1 Forme simmetriche . . . 21
2.1.1 Diagonalizzazione di forme bilineari . . . 23
2.1.2 Teorema di Sylvester e segnatura . . . 25
2.1.3 Criteri per determinare la segnatura . . . 28
2.2 Forme alternanti . . . 30

3 Isometrie di spazi arbitrari **33**
3.1 Aggiunzione rispetto a matrici arbitrarie . . . 35
3.2 Riflessioni, Witt e Cartàn-Dieudonnè . . . 36
3.3 Teorema spettrale . . . 41

4 Forme quadratiche e quadriche **44**
4.1 Quadriche proiettive e spazi tangenti . . . 46
4.2 Classificazione delle quadriche . . . 49
4.3 Fasci di quadriche . . . 52
4.4 Polarità . . . 52
4.4.1 Quadrica duale . . . 54

5 Quadriche affini ed euclidee **56**
5.1 Forma canonica di quadriche affini . . . 58

*Mail per segnalare errori: filippo.gargiulo@studenti.unipd.it

5.2 Parametrizzazione di coniche 59
5.3 Quadriche euclidee 60

II Modulo B **63**

Parte I
Modulo A

§1 Forme bilineari e quadratiche

Usiamo $\mathbb{F}$ o $\mathbb{K}$ per riferirci ad un campo generico.

Definizione 1.1 (Applicazione multilineare)**.** Dati $n \in \mathbb{N}$ e spazi vettoriali $V_1, V_2, \dots, V_n, W$ su $\mathbb{K}$, allora un'applicazione

$$F : V_1 \times V_2 \times \cdots \times V_n \to W$$

è detta *multilineare di grado* n o semplicemente n*-lineare* se è lineare in ciascuna entrata, ovvero se, fissati $n-1$ argomenti, la funzione

$$\begin{aligned} F(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, -, v_{i+1}, \dots, v_n) : V_i &\to W \\ v &\mapsto F(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, v, v_{i+1}, \dots, v_n) \end{aligned}$$

è lineare per ogni i.

Esempio 1.2 (Prodotto scalare)

Il primo esempio di tale funzione che conosciamo già è proprio il prodotto scalare standard:

$$\begin{aligned} \cdot : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n &\to \mathbb{R} \\ (v, w) &\mapsto v \cdot w = v^\intercal w = x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n. \end{aligned}$$

Esempio 1.3 (Determinante)

Il determinante di una matrice A può essere vista come una funzione multilineare delle colonne della matrice, che va da

$$\det : \underbrace{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n}_{n \text{ volte}} \to \mathbb{R}.$$

Esempio 1.4 (Dualità canonica)

La dualità canonica è naturalmente una funzione bilineare

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V^* \times V \to \mathbb{K}.$$

Esempio 1.5 (Funzione nulla)

La funzione nulla su qualunque prodotto di spazi lineari è sempre multilineare.

Quello che tuttavia ci interessa studiare adesso sono le forme *bilineari*:

Definizione 1.6 (Forma bilineare)**.** Una *forma bilineare* è una funzione bilineare $B : V \times V \to \mathbb{K}$, dove V e W sono spazi $\mathbb{K}$-lineari.

Definizione 1.7 (Forma quadratica)**.** Ad ogni forma bilineare $B : V \times V \to \mathbb{K}$ è associata una certa *forma quadratica* $q : V \to \mathbb{K}$, ovvero la funzione $q(v) := B(v, v)$.

Definizione 1.8 (Simmetria e antisimmetria)**.** Una forma bilineare $B(v, w)$ si dice *simmetrica* se, per ogni $v, w \in V$

$$B(v, w) = B(w, v)$$

e *antisimmetrica* se per ogni $v, w \in V$:

$$B(v, w) = -B(w, v)$$

infine si dice *alternante* se per ogni $v \in V$ si ha

$$B(v, v) = 0$$

com'è noto dal caso del determinante.

La forma bilineare nasce come generalizzazione naturale della nozione di prodotto scalare, e quindi è chiaro che il prodotto scalare standard sia una forma bilineare simmetrica. Un esempio più elaborato di forma bilineare è

Esempio 1.9 (Prodotto in metriche non euclidee)
Sia $A \in M_n(\mathbb{K})$ una matrice fissata con coefficienti a_{ij}, allora la funzione

$$\begin{aligned} g_A : \mathbb{K}^n \times \mathbb{K}^n &\to \mathbb{K} \\ (u, v) &\mapsto u \cdot Av = u^\intercal Av = \sum_{1 \le i,j \le n} a_{ij} x_i y_j \end{aligned}$$

è sempre una forma bilineare, che soddisfa

$$a_{ij} = g_A(e_i, e_j).$$

Esempio 1.10 (Prodotto in un campo)
Il prodotto in qualunque campo $\mathbb{K}$ è una forma bilineare simmetrica e non alternante. Se inoltre il campo ha caratteristica 2, questa forma è anche antisimmetrica, in quanto $1 = -1$.

Esempio 1.11 (Determinante)
La funzione

$$\begin{aligned} B : \mathbb{K}^2 \times \mathbb{K}^2 &\to \mathbb{K} \\ \begin{pmatrix} x_1 \\ y_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} &\mapsto \det \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

è bilineare alterna, ma cosa succede se identifichiamo $\mathbb{K}$ con $\mathbb{R}$ e $\mathbb{K}^2$ con $\mathbb{C}$?

§1.1 Simmetria e asimmetria

Vogliamo ora capire almeno un minimo come si classifichino le forme bilineari, il primo risultato che dimostriamo è

Proposizione 1.12 (Relazione tra simmetria, antisimmetria e alternanza)

Abbiamo le seguenti proposizioni:

- Su ogni campo $\mathbb{K}$, ogni forma alternante è antisimmetrica.
- Sui campi a caratteristica diversa da 2, una forma bilineare è alternante se e solo se è antisimmetrica.
- Sui campi a caratteristica 2, una forma bilineare è simmetrica se e solo se è antisimmetrica.

Dimostrazione. Dimostriamo una cosa alla volta:

- Per alternanza abbiamo
$$B(v+w, v+w) = 0$$
d'altra parte espandendo per bilinearità e cancellando $B(v,v)$ e $B(w,w)$ per alternanza:
$$B(v,w) + B(w,v) = 0$$
da cui la tesi.
- Per antisimmetria abbiamo
$$B(v,v) = -B(v,v)$$
cioè
$$2B(v,v) = 0$$
da cui, dato che la caratteristica è diversa da 2, abbiamo la tesi.
- Semplicemente segue dal fatto che $1 = -1$.

Abbiamo dimostrato tutti i punti, quindi abbiamo finito. □

Teorema 1.13 (di decomposizione)

Se $\mathrm{car}(\mathbb{K}) \neq 2$ allora ogni forma bilineare B definita su $\mathbb{K}$ si scrive in modo unico come somma di una forma simmetrica e di una alternante.

Dimostrazione. Per l'esistenza, possiamo pensare euristicamente di star cercando due forme B_S e B_A tali che
$$\begin{cases} B(v,w) = B_S(v,w) + B_A(v,w) \\ B(w,v) = B_S(v,w) - B_A(v,w) \end{cases}$$
da cui possiamo ricavare direttamente delle formule per le due forme cercate
$$B_S(v,w) = \frac{B(v,w) + B(w,v)}{2}$$
$$B_A(v,w) = \frac{B(v,w) - B(w,v)}{2}$$
e visto che abbiamo trovato una formula esplicita, questo ci dice anche che la decomposizione è unica. □

Possiamo dunque definire i seguenti spazi di funzioni:

Definizione 1.14 (Spazi bilineari)**.** Definiamo i seguenti spazi

$$\begin{aligned}\mathrm{Bil}_{\mathbb{K}}(V) &:= \{\text{forme bilineari su } V\}\\ \mathrm{Alt}_{\mathbb{K}}(V) &:= \{B \in \mathrm{Bil}_{\mathbb{K}}(V) : B \text{ è alternante}\}\\ \mathrm{Antisimm}_{\mathbb{K}}(V) &:= \{B \in \mathrm{Bil}_{\mathbb{K}}(V) : B \text{ è antisimmetrica}\}\\ \mathrm{Simm}_{\mathbb{K}}(V) &:= \{B \in \mathrm{Bil}_{\mathbb{K}}(V) : B \text{ è simmetrica}\}\end{aligned}$$

che si dimostra agilmente essere tutti spazi vettoriali.

Possiamo quindi riformulare quanto visto finora in termini di sottospazi vettoriali

Corollario 1.15 (di Decomposizione)
Per campi $\mathbb{K}$ con caratteristica diversa da 2 abbiamo

$$\mathrm{Simm}_{\mathbb{K}}(V) \oplus \mathrm{Alt}_{\mathbb{K}}(V) = \mathrm{Bil}_{\mathbb{K}}(V)$$

mentre se la caratteristica è esattamente 2:

$$\mathrm{Alt}_{\mathbb{K}}(V) \subset \mathrm{Antisimm}_{\mathbb{K}}(V) = \mathrm{Simm}_{\mathbb{K}}(V)$$

Tiriamo in ballo le basi con il seguente risultato:

Teorema 1.16 (Informazione sufficiente per determinare forme simmetriche)
Se $\mathbb{K}$ è un campo a caratteristica diversa da 2 allora una forma bilineare simmetrica B su V è determinata in modo univoco dal suo valore per le coppie (v, v) con $v \in V$.

Dimostrazione. Semplicemente dall'identità, valida solo per le forme simmetriche:

$$B(v+w, v+w) = B(v,v) + 2B(v,w) + B(w,w)$$

otteniamo che

$$B(v,w) = \frac{B(v+w, v+w) - B(v,v) - B(w,w)}{2}$$

per cui appunto ci basta conoscere solo termini della forma $B(u,u)$, con $u \in V$. Con questa formula possiamo calcolare qualunque valore di B, e quindi abbiamo finito. □

Purtroppo questo teorema ci richiede di conoscere **tutti** i prodotti $B(v,v)$, e non solo quelli su una base, come mostra il seguente esempio:

Esempio 1.17 (Una forma non caratterizzata dalla forma quadratica sulla base)
La forma

$$B : \mathbb{K}^2 \times \mathbb{K}^2 \to \mathbb{K}$$

tale che

$$B\left(\begin{pmatrix}x_1\\y_1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}x_2\\y_2\end{pmatrix}\right) = x_1y_2 + x_2y_1$$

per cui abbiamo che $B(e_1, e_1) = B(e_2, e_2) = 0$, che chiaramente non basta per identificare tutti i prodotti $B(v,w)$.

Facciamo qualche altro esempio di forma bilineare:

Esempio 1.18 (Prodotto scalare negativo)
Definiamo il prodotto scalare

$$B\left(\begin{pmatrix}x_1\\y_1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}x_2\\y_2\end{pmatrix}\right)=x_1x_2-y_1y_2$$

Esempio 1.19 (Prodotto misto)
Sia $u\in\mathbb{K}^3$, definiamo allora

$$\begin{aligned}B_u:\mathbb{K}^3\times\mathbb{K}^3&\to\mathbb{K}\\(v,w)&\mapsto\det\left(\begin{array}{c|c|c}v & w & u\end{array}\right)=(v\times w)\cdot u\end{aligned}$$

Questo è il cosiddetto prodotto misto, ed è sia antisimmetrico che alternante.

In effetti possiamo dimostrare il seguente risultato più forte:

Proposizione 1.20 (Rappresentazione delle forme alternanti su $\mathbb{K}^3$)
Tutte le forme bilineari alternati su $\mathbb{K}^3$ sono della forma

$$B(v,w)=(v\times w)\cdot u$$

per qualche $u\in V$ unico.

Dimostrazione. L'idea è di procedere in modo simile al teorema di Riesz. □

Esempio 1.21 (Duale)
Un altro esempio di forma bilineare è il seguente:

$$\begin{aligned}B:(V\oplus V^*)\times(V\oplus V^*)&\to\mathbb{K}\\((\varphi,v),(\psi,w))&\mapsto\psi(v)-\varphi(w)\end{aligned}$$

e questa è chiaramente alternante. La notazione $V\oplus V^*$ è semplicemente un modo alternativo per scrivere $V\times V^*$, solo che al posto di considerare le coppie (v,w) consideriamo le "somme formali" $v+w$ tra elementi di V e W.

Esempio 1.22 (Funzionali bilineari in analisi)
Se consideriamo lo spazio vettoriale $V=C^0([0,1])$ delle funzioni continue su $[0,1]$, allora possiamo definire una forma bilineare come

$$B(f,g)=\int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x$$

per ogni $f,g\in V$.

Esempio 1.23 (Forma Hermitiana)

Prendiamo lo spazio $V = \mathbb{C}^n$ e definiamo la forma

$$H\left(\begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}\right) = \sum_{i=1}^{n} z_i \overline{w}_i$$

e qui il campo su cui definiamo V è importante! Su $\mathbb{R}$ infatti H risulta bilineare, ma su $\mathbb{C}$ abbiamo che

$$H(v, \lambda w) = \overline{\lambda} H(v, w)$$

e questa è proprio la proprietà che vedremo avrà una forma hermitiana, in particolare questa è la cosiddetta forma hermitiana standard.

§1.1.1 ★ Bonus: La traccia

Introduciamo ora una funzione estremamente importante

Definizione 1.24 (Traccia)**.** Data una matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ di coefficienti a_{ij} definiamo la sua *traccia* come

$$\operatorname{tr}(A) := \sum_{i=1}^{n} a_{ii}$$

cioè la somma degli elementi sulla diagonale.

Esempio 1.25 (Traccia)

Possiamo definire una forma bilineare simmetrica usando la traccia:

$$\begin{aligned} B : M_n(\mathbb{K}) \times M_n(\mathbb{K}) &\to \mathbb{K} \\ (A, A') &\mapsto \operatorname{tr}(AA') \,. \end{aligned}$$

La simmetria della forma descritta sopra deriva dal seguente risultato:

Lemma 1.26 (Ciclicità della traccia)

Per ogni $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ abbiamo che

$$\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA) \,.$$

Dimostrazione. Se denotiamo con a_{ij} i coefficienti di a e con b_{ij} i coefficienti di B abbiamo che

$$\operatorname{tr}(AB) = \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} a_{jk} b_{kj}$$

$$\operatorname{tr}(AB) = \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} b_{jk} a_{kj}$$

d'altra parte queste due espressioni sono uguali a meno di una rindicizzazione delle somme, e quindi abbiamo proprio la tesi. □

In effetti possiamo dire qualcosa di più sulla traccia, per esempio il fatto che sia un funzionale completamente lineare:

Lemma 1.27 (La traccia è completamente lineare)
Per ogni $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ e $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}$ abbiamo che

$$\mathrm{tr}(\lambda_1 A + \lambda_2 B) = \lambda_1 \mathrm{tr}(A) + \lambda_2 \mathrm{tr}(B)\,.$$

Dimostrazione. Semplicemente segue dal fatto che le somme sono lineari. □

§1.2 Ortogonalità

Per il prodotto scalare una grande parte della teoria consisteva nella nozione di ortogonalità, riprendiamola qui dunque come:

Definizione 1.28 (Ortogonalità)**.** Se B è una forma bilineare su V allora diciamo che $v \in V$ è *ortogonale* a w se $B(v, w) = 0$, e in questo caso scriviamo

$$v \perp_B w$$

oppure quando la forma di cui stiamo parlando è chiara, $v \perp w$.

La prima cosa strana che notiamo è che per forme arbitrarie l'ortogonalità può non essere simmetrica, ovvero

Esempio 1.29 (Una nozione di ortogonalità non simmetrica)
Se consideriamo la forma su $\mathbb{R}^2$ definita come

$$B(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1 y_1 + x_2 y_1 + x_2 y_2$$

abbiamo che $e_1 \perp_B e_2$ e $e_2 \perp_B e_1$.

Per caratterizzare quando la perpendicolarità sia simmetrica allora abbiamo bisogno di questo lemma:

Lemma 1.30 (Condizione necessaria per la simmetria della perpendicolarità)
Se $\perp_B$ è una relazione simmetrica allora per ogni $u, v, w \in V$ si ha

$$B(w, u)B(u, v) = B(v, u)B(u, w).$$

Dimostrazione. Il sottospazio generato da v, w contiene il vettore

$$z = B(w, u)v - B(v, u)w$$

che è sempre ortogonale a u, infatti con un calcolo diretto si verifica che $B(z, u) = 0$, quindi visto che abbiamo assunto che l'ortogonalità è simmetrica abbiamo

$$B(u, z) = 0$$

che espansa è proprio la tesi. □

Teorema 1.31 (Caratterizzazione della simmetria dell'ortogonalità)
Se B è una forma bilineare su V allora $\perp_B$ è una relazione simmetrica se e solo se B è simmetrica o alternante.

Dimostrazione. Un verso è chiaro. Per dimostrare l'altro verso usiamo il lemma sopra con $u = w$, e abbiamo

$$B(u,u)B(u,v) = B(v,u)B(u,u)$$

cioè

$$[B(u,v) - B(v,u)]\, B(u,u) = 0$$

che vuol dire che per ogni coppia di vettori B si comporta o come se fosse alternante o come se fosse simmetrica. Rimane da dimostrare quindi che se B è simmetrica su alcuni vettori, allora lo è su tutti, e se è alternante su alcuni vettori allora lo è su tutti.
Supponiamo allora di avere una B che non è simmetrica e che soddisfa l'identità trovata sopra, vogliamo mostrare che B è alternante. Dato che B non è simmetrica esisteranno $v_0, w_0 \in V$ tali che

$$B(v_0, w_0) \neq B(w_0, v_0)$$

che ovviamente invece soddisferanno $B(v_0, v_0) = B(u_0, u_0) = 0$ per l'identità sopra. A questo punto se $B(v_0, w) \neq B(w, v_0)$ per un generico vettore $w \in V$ abbiamo necessariamente $B(w, w) = 0$, da cui deduciamo che ci basta dimostrare la tesi per i vettori che "commutano" sia con v_0 che u_0, ovvero per tutti i w tali che

$$B(v_0, w) = B(w, v_0)$$
$$B(u_0, w) = B(w, u_0)$$

a questo punto applicando il lemma 1.30 sostituendo $u \to u_0$, $v \to v_0$ e $w \to w$ abbiamo

$$B(w, u_0)B(u_0, v_0) = B(v_0, u_0)B(u_0, w)$$

da cui, usando il fatto che w commuta con w_0 abbiamo

$$B(w, u_0)\, [B(u_0, v_0) - B(v_0, u_0)] = 0$$

ma visto che v_0, u_0 non commutano per ipotesi abbiamo che $B(w, u_0) = 0$ necessariamente. Da questo possiamo dedurre che

$$B(w + v_0, u_0) = B(w, u_0) + B(v_0, u_0) = B(v_0, u_0)$$
$$B(u_0, w + v_0) = B(u_0, w) + B(u_0, v_0) = B(u_0, v_0)$$

cioè questi due vettori non commutano, ma questo per l'identità trovata sopra implica proprio che

$$B(w + v_0, w + v_0) = 0$$

da cui espandendo per bilinearità si ha immediatamente la tesi. □

E quindi possiamo definire:

Definizione 1.32 (Sottospazio ortogonale)**.** Dato un $S \subseteq V$ possiamo definire il suo *sottospazio ortogonale* $S^{\perp_B}$ come lo spazio dei vettori ortogonali a ciascun elemento di S. Si dimostra facilmente che questo è un sottospazio, e se per un W spazio vettoriale abbiamo anche che

$$W \oplus W^{\perp_B} = V$$

questo sottospazio si dice *complemento ortogonale* di W.

Definizione 1.33 (Somma diretta e restrizioni)**.** Sia B una forma bilineare su V. Allora per ogni sottospazio $W \leq V$ possiamo definire una forma bilineare ristretta

$$B_{|W} : W \times W \to \mathbb{K}$$

che definiremo *forma bilineare indotta*. Allo stesso modo, dati due sottospazi di V_1 e V_2 tali che

$$V = V_1 \oplus V_2$$

e due forme bilineari B_1 e B_2 definite rispettivamente su V_1 e V_2 possiamo definire una forma *somma diretta* delle due, come:

$$\begin{aligned} B_1 \oplus B_2 : V \times V &\to \mathbb{K} \\ (v_1 + v_2, v_1' + v_2') &\mapsto B_1(v_1, v_1') + B_2(v_2, v_2') \end{aligned}$$

Questa costruzione, lo spazio $(V_1 \oplus V_2, B_1 \oplus B_2)$, viene detta la *somma diretta ortogonale* di V_1 e V_2 e si indica come $V_1 \perp V_2 := V$.

Un esempio estremamente naturale di ciò è il seguente:

Esempio 1.34 (Prodotto scalare)

Se consideriamo $V_1 = V_2 = (\mathbb{R}, \cdot)$ possiamo effettuare la loro somma diretta ortogonale $\mathbb{R} \perp \mathbb{R}$, ottenendo esattamente uno spazio $(\mathbb{R}^2, B)$, dove B è definita come

$$B(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1 y_1 + x_2 y_2$$

che è proprio il prodotto scalare standard!

Proposizione 1.35 (Caratterizzazione della somma diretta ortogonale)

Se $V = V_1 \oplus V_2$ e B_1, B_2 sono forme bilineari rispettivamente su V_1 e V_2 allora $B_1 \oplus B_2$ è l'unica forma bilineare su V tale che:

- Le restrizioni sono le forme di partenza, ovvero $B_{|V_1} = B_1$ e $B_{|V_2} = B_2$.
- Per ogni $v_1 \in V_1$ e $v_2 \in V_2$ si ha $B(v_1, v_2) = 0$.

Dimostrazione. contenuto... □

§1.3 Matrici associate

Abbiamo visto l'anno scorso che data una funzione lineare $\varphi : V \to W$ possiamo costruire la sua applicazione trasposta, che scambia tutte le frecce nel modo seguente: e dunque

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\varphi} & W \\ & \searrow^{\varphi^\intercal(f) := f \circ \varphi} & \downarrow f \\ & & \mathbb{K} \end{array}$$

l'applicazione trasposta $\varphi^\intercal : W^* \to V^*$ manda funzionali di W in funzionali di V. Questo ci dà un omomorfismo tra $\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W)$ e $\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(W^*, V^*)$.

Esempio 1.36 (Uno spazio in cui il biduale non è isomorfo allo spazio di partenza)
Consideriamo lo spazio delle successioni a valori in $\mathbb{K}$. Consideriamo per ogni $k \in \mathbb{N}$ la successione

$$e_k := \{(a_n : n \in \mathbb{N}) : a_i = \delta_{ik}\}$$

allora vogliamo considerare lo spazio

$$V = \bigoplus_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{K} := \langle e_k : k \in \mathbb{N}\rangle$$

ovvero lo spazio delle successioni definitivamente nulle (in un certo senso quindi $\mathbb{K}^\star$, la stella di Kleene). A questo punto possiamo dimostrare che V^* non ha una base numerabile. Da questo possiamo quindi dimostrare che

$$V^* \cong \bigtimes_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{K}$$

che era lo spazio da cui eravamo partiti. Facendo nuovamente il duale la dimensione della base non può davvero scendere, e quindi abbiamo V^{**} ha base non numerabile, mentre V ha base numerabile, da cui abbiamo che chiaramente non sono isomorfi.

Ci chiediamo quindi se sia possibile adattare questa costruzione al caso della trasposizione. Ma questa è una domanda a cui non daremo una risposta.

Definizione 1.37 (Forme indotte da applicazioni tra spazi)**.** Prendiamo una $B : V \times W \to \mathbb{K}$ con V e W di dimensione finita. Allora B definisce due applicazioni lineari:

$$\begin{aligned} B_1 : V &\to W^* \\ v &\mapsto B(v, -) \end{aligned}$$

ovvero ad ogni vettore in V viene associato il funzionale $B(v, -)$, che prende in input vettori di W e restituisce scalari $\mathbb{K}$, e anlogamente possiamo fare definendo B_2. Allo stesso modo data una funzione $f : V \to W^*$ possiamo associare una forma bilineare $B : V \times W \to \mathbb{K}$.

Gli isomorfismi trovati sopra sono canonici. Cosa succede se prendiamo la trasposizione di una delle due funzioni che abbiamo generato a partire dalla forma bilineare? Ovvero che cos'è la funzione $B_1^\intercal$? Incredibilmente troviamo che, usando l'isomorfismo canonico $V \cong V^{**}$

$$B_2^\intercal = B_1$$

e

$$B_1^\intercal = B_2.$$

Tutta questa discussione ci serve essenzialmente per dire che abbiamo un isomorfismo canonico tra

$$\mathrm{Bil}_{\mathbb{K}}(V) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(V, V^*)$$

e quindi esattamente come facevamo per le applicazioni lineari da V a V^* possiamo associare ad ogni forma bilineare una matrice:

Definizione 1.38 (Matrice associata ad una forma bilineare)**.** Data una forma bilineare $B : V \times V \to \mathbb{K}$ allora data una base $v_1, \dots, v_n$ di V possiamo usarla per scrivere qualunque coppia di vettori

$$B(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = B\left(a_1v_1 + \cdots + a_nv_n, b_1v_1 + \cdots + b_nv_n\right) = \sum_{1\le i,j\le n} a_ib_jB(v_i, v_j)$$

dunque possiamo introdurre la *matrice associata alla forma* B nella base v_i come

$$\mathbf{B} := \begin{pmatrix} B(v_1,v_1) & B(v_1,v_2) & \dots & B(v_1,v_n) \\ B(v_2,v_1) & B(v_2,v_2) & \dots & B(v_2,v_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ B(v_n,v_1) & B(v_n,v_2) & \dots & B(v_n,v_n) \end{pmatrix}$$

questa è anche nota come *matrice di Gram*, e ci permette di scrivere in modo molto compatto la valutazione di una forma bilineare

$$B(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \mathbf{x}^\intercal \mathbf{B}\mathbf{y}.$$

Analogamente se $\alpha_{\mathcal{V}} : V \to \mathbb{K}^n$ è un isomorfimo che scrive il vettore $v \in V$ nelle coordinate della base $\mathcal{V}$ nello spazio $\mathbb{K}^n$ allora possiamo vedere la matrice di Gram di B come quell'unica matrice tale che

$$B(v,v') = \alpha_{\mathcal{V}}(v)^\intercal A \alpha_{\mathcal{V}}(v).$$

Per esempio abbiamo:

Esempio 1.39 (Prodotto scalare)

La matrice di Gram del prodotto scalare in qualunque base ortonormale è semplicemente I.

Esempio 1.40 (Forma simplettica)

La forma $B : \mathbb{K}^2 \times \mathbb{K}^2 \to \mathbb{K}$ definita come

$$B\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) = x_1 y_2 - x_2 y_1$$

ha matrice di Gram nella base canonica uguale a $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

Questa cosa dimostra proprio che ogni forma bilineare su $\mathbb{K}^n$ (su spazi finitamente generati dunque) può essere scritta come il prodotto a sinistra e a destra di una certa matrice.

Proposizione 1.41 (Matrici associate alla forma e alla funzione indotta)

Dato un V spazio vettoriale con base finita $\mathcal{V}$ e una forma bilineare B su di esso, abbiamo che

$$M_{\mathcal{V}}(B) = M_{\mathcal{V}}^{\mathcal{V}^*}(B_2)$$

ovvero la matrice di gram della forma bilineare è uguale alla matrice associata all'applicazione lineare $B_2 : V \to V^*$.

Dimostrazione. Sia $A = (a_{ij}) = M_{\mathcal{V}}(B)$ allora vogliamo mostrare che

$$B_2(v_j) = a_{1j} v_1^* + \dots + a_{nj} v_n^*$$

d'altra parte per definizione di B_2 abbiamo proprio che

$$B_2(v_j) v_i = B(v_i, v_j) = a_{ij}$$

che è esattamente l'espressione che troviamo valutando il funzionale sopra in v_i:

$$(a_{1j}v_1^* + \cdots + a_{nj}v_n^*)\, v_i = a_{ij}$$

dunque abbiamo proprio finito. □

E come corollario abbiamo

Corollario 1.42 (Matrice delle applicazioni indotte da forme)
Per ogni forma bilineare B su spazi con base finita $\mathcal{V}$ abbiamo che

$$M_{\mathcal{V}}^{\mathcal{V}^*}(B_1) = M_{\mathcal{V}}(B)^\intercal$$

La prima applicazione di ciò è

Proposizione 1.43 (Classificazione di Gram delle forme bilineari)
Per ogni forma bilineare B su spazi finitamente generati abbiamo che:

- La forma B è simmetrica se e solo se in ogni sua base la matrice di Gram A è simmetrica, ovvero $A = A^\intercal$.
- La forma B è antisimmetrica se e solo se in ogni sua base la matrice di Gram A è antisimmetrica, ovvero $A = -A^\intercal$.
- La forma B è alternante se e solo se in ogni sua base la matrice di Gram è antisimmetrica e $a_{ii} = 0$ per ogni i.

§1.3.1 Cambio di base e congruenza

Ricordiamo che per le matrici il diagramma commutativo che avevamo per il cambio di base di un'applicazione lineare $L : V \to W$ era da cui possiamo dedurre che, visto che

$$\begin{array}{ccc}
\mathbb{K}^n & \xrightarrow{M_{\mathcal{V}'}^{\mathcal{W}'}} & \mathbb{K}^m \\
{\scriptstyle \alpha_{\mathcal{V}'}}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \alpha_{\mathcal{W}'}} \\
V & \xrightarrow{L} & W \\
{\scriptstyle \alpha_{\mathcal{V}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \alpha_{\mathcal{W}}} \\
\mathbb{K}^n & \xrightarrow{M_{\mathcal{V}}^{\mathcal{W}}} & \mathbb{K}^m
\end{array}$$

vogliamo che la L sia sempre la stessa e

$$M_{\mathcal{V}}^{\mathcal{W}} = \alpha_{\mathcal{W}} \circ L \circ \alpha_{\mathcal{V}}^{-1}$$
$$M_{\mathcal{V}'}^{\mathcal{W}'} = \alpha_{\mathcal{W}'} \circ L \circ \alpha_{\mathcal{V}'}^{-1}$$

giungiamo agilmente alle formule di cambio di base. Analogamente possiamo

Proposizione 1.44 (Cambio di base di forme bilineari)

Sia V uno spazio vettoriale di dimensione $n < \infty$ e B una forma bilineare su di esso con matrice A su una certa base $\mathcal{V}$, allora la matrice $\tilde{A}$ nella base $\mathcal{V}'$ è

$$\tilde{A} = P^\intercal A P$$

dove P è la matrice di cambio di base da $\mathcal{V}$ a $\mathcal{V}'$.

Dimostrazione. Per ogni $v, v' \in V$ abbiamo, per definizione di matrice associata alla forma bilineare:

$$B(v, v') = \alpha_{\mathcal{V}}(v)^\intercal A \alpha_{\mathcal{V}}(v')$$

ovvero usando P abbiamo

$$\cdots = \left(P\alpha_{\tilde{\mathcal{V}}}\right)^\intercal A \left(P\alpha_{\tilde{\mathcal{V}}}\right)$$

e quindi svolgendo le trasposizioni

$$\cdots = \alpha_{\tilde{\mathcal{V}}}^\intercal P^\intercal A P \alpha_{\tilde{\mathcal{V}}}$$

da cui la tesi. □

Definizione 1.45 (Equivalenza tra forme bilineari)**.** Due forme B e B' sugli spazi V e V' si dicono *equivalenti* se esiste un isomorfismo $\varphi : V \to V'$ tale che

$$B'\left(\varphi(v_1), \varphi(v_2)\right) = B(v_1, v_2)$$

per ogni $v_1, v_2 \in V$.

All'equivalenza di forme bilineari corrisponde la congruenza di matrici:

Definizione 1.46 (Congruenza di matrici)**.** Due matrici quadrate $A, A' \in M_n(\mathbb{K})$ si dicono *congruenti* se definiscono forme bilineare equivalenti su $\mathbb{K}^n$, cioè se

$$A' = P^\intercal A P.$$

Esempio 1.47 (Dimostrazione di congruenza)
Consideriamo le due matrici

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

queste inducono entrambe delle forme simmetriche, e quindi sono univocamente determinate dalla forma quadratica a loro associata, ovvero

$$B(v,v) = x_1^2 - x_2^2$$
$$B'(v,v) = x_1 x_2$$

ma notiamo che con il cambio di coordinate

$$y_1 = x_1 + x_2$$
$$y_2 = x_1 - x_2$$

abbiamo che la forma quadratica associata a B' diventa uguale a quella associata a B, quindi abbiamo proprio che queste sono equivalenti (in quanto la trasformazione che abbiamo fatto è lineare). In particolare avremo che

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

e quindi la matrice P cercata per il cambio di base è proprio

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Esempio 1.48 (Congruenza in $\mathbb{R}^2$)
Tutte le matrici in $\mathbb{R}^2$ della forma

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \alpha \end{pmatrix}$$

con $\alpha > 0$, sono congruenti.

Dimostrazione. Semplicemente notiamo che

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{\alpha} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{\alpha} \end{pmatrix}$$

e dunque tutte le matrici di quella forma sono congruenti a I, e visto che la congruenza è una relazione di equivalenza abbiamo la tesi. □

Osservazione 1.49 (Conseguenze sul determinante)**.** Se A e $\tilde{A}$ sono congruenti tali che

$$\tilde{A} = P^\intercal A P$$

allora
$$\det \tilde{A} = (\det P)^2 \det A.$$
E in particolare quindi hanno lo stesso rango.

§1.4 Definitezza e degenerazione

Definizione 1.50 (Definitezza delle forme bilineari reali)**.** In uno spazio vettoriale V reale una forma bilineare B su V si dice:

- *Definita positiva* se $B(v,v) > 0$ per ogni $v \in V, v \neq \vec{0}$.
- *Semidefinita positiva* se $B(v,v) \geq 0$ per ogni $v \in V, v \neq \vec{0}$.
- *Definita negativa* se $B(v,v) < 0$ per ogni $v \in V, v \neq \vec{0}$.
- *Semidefinita negativa* se $B(v,v) \leq 0$ per ogni $v \in V, v \neq \vec{0}$.

nel caso non soddisfi nessuna delle definizioni sopra si dice *indefinita*.

Proposizione 1.51 (Caratterizzazione della degenerazione)

Le seguenti proprietà sono equivalenti per una forma bilineare B su uno spazio vettoriale V fissato, dove V ha dimensione finita:

- La matrice associata a B rispetto a una qualche base $\mathcal{V}$ di V è invertibile.
- B è *non degenere a sinistra*, cioè la funzione $B_1 : V \to V^*$ associata ha nucleo banale.
- B è *non degenere a destra*, cioè la funzione $B_2 : V^* \to V$ associata ha nucleo banale.
- Per ogni $v \in V$ diverso da $\vec{0}$ esiste un $v' \in V$ tale che $B(v,v') \neq 0$.
- Per ogni $v \in V$ diverso da $\vec{0}$ esiste un $v'' \in V$ tale che $B(v'',v) \neq 0$.

Dimostrazione. Segue essenzialmente dalla relazione tra matrice di Gram e matrice associata a B_1 e B_2. □

Definizione 1.52 (Nuclei e degenerazione)**.** Data una forma bilineare B il nucleo della forma $B_1 : V \to V^*$ si dice *nucleo sinistro*, o *radicale sinistro*. Allo stesso modo si definisce il nucleo destro o il radicale destra. Una forma con entrambi i nuclei banali si dice *non degenere* (e altrimenti si dice *degenere*).

Esempio 1.53 (Restrizione di forme non degeneri può essere degenere)

Il prodtto interno standard è non degenere, così come la forma associata allo spazio di minkowski

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

che è un caso specifico di $(\mathbb{R}^p, \langle\cdot,\cdot\rangle) \perp (\mathbb{R}^q, -\langle\cdot,\cdot\rangle)$. Un tale spazio si denota di solito con $\mathbb{R}^{p,q}$.
Una forma analoga è quella con matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

che è non degenere, tuttavia ristretta al sottospazio $W = \langle (1,0,1), (0,1,0)\rangle$ è degenere, infatti

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

e allo stesso modo

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

cioè tutti i vettori in W sono ortogonali a $(1,0,1)$ (compreso $(1,0,1)$ stesso!).

Questo è un comportamento decisamente controintuitivo, che vorremmo riuscire in qualche modo a caratterizzare o descrivere. Per questo abbiamo la seguente proposizione:

Proposizione 1.54 (Caratterizzazione della non degenerazione delle restrizioni)

Sia V uno spazio vettoriale di dimensione finita su $\mathbb{K}$ con una forma bilineare simmetrica o alternante (cioè tale che la relazione di ortogonalità sia simmetrica). Allora le seguenti condizioni sono equivalenti per un sottospazio $W \leq V$:

1. $B_{|W}$ è non degenere su W.
2. $W \cap W^\perp = \left\{\vec{0}\right\}$.
3. $V = W \oplus W^\perp$.

Dimostrazione. Per dimostrare che 1 implica 2 supponiamo che $B_{|W}$ sia non degenere allora

$$w \in W \cap W^\perp$$


implica che, per ogni $w' \in W$ si abbia

$$B_{|W}(w, w') = 0$$

ma dato che questa è non degenere si ha necessariamente che $w' = \vec{0}$, come richiesto. Per dimostrare che 2 implica 3 supponiamo che $W \cap W^\perp = \left\{\vec{0}\right\}$, allora vogliamo mostrare che

$$W^\perp + W = V$$

consideriamo allora la composizione di $B_{1|W} : W \to V^*$ con l'applicazione $r : V^* \to W^*$ che restringe il funzione $\varphi \in V^*$ al funzionale $\varphi_{|W} \in W^*$, che chiameremo $L : W \to W^*$:



$$L := r \circ B_{1|W}.$$

allora ha senso chiedersi quale sia il suo nucleo, d'altra parte questo è proprio

$$\mathrm{Ker}\,(L) = \left\{w \in W : B(w, w') = 0,\ \forall w' \in W\right\} = W \cap W^\perp = \left\{\vec{0}\right\}$$

dunque essendo che W ha dimensione finita abbiamo che L è un isomorfismo, dunque ha senso, preso un $v \in V$, la scrittura

$$w := L^{-1}\left(B_{1|W}(v)\right) \iff L(w) = B_{1|W}(v)$$

osserviamo allora che questo soddisfa per ogni $w' \in W$:

$$B(v, w') = B(w, w') \implies B(v - w, w') = 0$$

cioè $v - w \in W^\perp$, ma allora possiamo effettivamente scomporre

$$v = w + (v - w)$$

in una parte in W ed in una in $W^\perp$, come volevamo.
Infine per dimostrare che 3 implica 1, semplicemente abbiamo che se $w' \in W$ è tale che

$$B(w, w') = 0$$

per ogni $w \in W$ allora $w' \in W \cap W^\perp = \left\{\vec{0}\right\}$ cioè $w' = \vec{0}$, da cui la tesi. □

Proposizione 1.55 (Proprietà degli ortogonali per forme non degeneri)

Sia B una forma bilineare simmetrica o alternante e non degenere su uno spazio V di dimensione finita, allora

1. Abbiamo che
$$\dim W + \dim W^\perp = \dim V$$
e in particolare abbiamo che $B_{|W}$ è non degenere se e solo se $B_{|W^\perp}$ è non degenere. Inoltre si ha che $\left(W^\perp\right)^\perp = W$.

2. Per ogni coppia di sottospazi U_1 e U_2 si ha
$$(U_1 + U_2)^\perp = U_1^\perp \cap U^\perp$$
$$(U_1 \cap U_2)^\perp = U_1^\perp + U_2^\perp.$$

$$V \longrightarrow V^* \longrightarrow W^*$$

$$v \longmapsto B_1(v) \longmapsto B_1(v)_{|W}$$

Dimostrazione. Sappiamo che la composizione in figura è suriettiva (per Riesz) e ha per definizione nucleo $W^\perp$. Da ciò per il primo teorema d'omomorfismo segue che

$$V/_{W^\perp} \cong W^*$$

cioè usando la dimensione finita di tutti gli spazi coinvolti e la formula per la dimensione del quoziente abbiamo

$$\dim V - \dim W^\perp = \dim W$$

da cui la tesi. Sostituendo $W \mapsto W^\perp$ nell'uguaglianza appena trovata abbiamo

$$\dim W^\perp + \dim \left(W^\perp\right)^\perp = \dim V$$

ovvero sottraendo membro a membro con l'uguaglianza originale abbiamo $\dim W = \dim \left(W^\perp\right)^\perp$. D'altra parte dato che B è non degenere e l'ortogonalità è simmetrica abbiamo che $W \subseteq \left(W^\perp\right)^\perp$ (ovvero, se $v \in W$ allora questo è sicuramente ortogonale a tutti i vettori di $\left(W^\perp\right)^\perp$) ma per l'uguaglianza delle dimensioni abbiamo la tesi.
Il secondo punto segue dal fatto che $U \leq W$ implica $W^\perp \leq U^\perp$, infatti per ogni $u \in U$ abbiamo che $u \in W$ e quindi dato che

$$W^\perp = \{v \in V : v \perp u, \forall u \in W\}$$

abbiamo sicuramente che se $w \in W^\perp$ allora $w \in U^\perp$, cioè proprio $W^\perp \leq U^\perp$. A questo punto semplicemente la tesi segue dalla caratterizzazione reticolare di $+$ e $\cap$ (ovvero sono rispettivamente il più piccolo e il più grande sottospazio contenenti o contenuti in U_1 e U_2). □

§2 Forme simmetriche e alternanti

Abbiamo visto che tutte le forme bilineari possono essere decomposte in una parte alternante ed una parte simmetrica. Iniziamo quindi a studiare individualmente la parte simmetrica, poi studieremo la parte alternante.

§2.1 Forme simmetriche

La parte simmetrica di una forma bilineare è quella che conferisce le proprietà "metriche" allo spazio, dato che queste dipendono dalla forma quadratica associata a B, e per una forma alternante abbiamo $q(v) \equiv 0$.

Proposizione 2.1 (Proprietà delle forme simmetriche)
Per ogni forma B simmetrica, su spazi finitamente generati V, vale:

1. Abbiamo per ogni $v \in V$ che
$$v^\perp := \{v\}^\perp = \langle v \rangle^\perp.$$
2. Abbiamo che $V^\perp = \left\{\vec{0}\right\}$ se e solo se B è non degenere.
3. Per ogni $S \subseteq V$ si ha $\langle S \rangle \subseteq \left(S^\perp\right)^\perp$ per ogni $S \subseteq V$ e se B è non degenere vale l'uguaglianza.

Per una forma simmetrica ha senso definire il concetto:

Definizione 2.2 (Vettori isotropi)**.** Un vettore $v \in V$ è detto *isotropo* per B se $B(v, v) = 0$, cioè se $v \in v^\perp$.

Che chiaramente per una forma alternante non è molto interessante. E per i sottospazi invece abbiamo:

Definizione 2.3 (Sottospazi isotropi)**.** Un sottospazio $W \subseteq V$ rispetto ad una forma bilineare B si dice:

- *Anisotropo* se $B_{|W}$ è non degenere, cioè se $W \cap W^\perp = \left\{\vec{0}\right\}$
- *Isotropo* se $B_{|W}$ è degenere.
- *Totalmente isotropo* se $W \subseteq W^\perp$ cioè se $B_{|W} = 0$ è la forma identicamente nulla.

Definizione 2.4 (Cono isotropo)**.** Se $v \in V$ è isotropo allora tutti i tv con $t \in \mathbb{K}$ sono isotropi, quindi
$$I_B(V) = \{v \in V : B(v, v) = 0\}$$
è un cono, chiamato *cono isotropo*. Un *cono*, è un sottoinsieme di uno spazio vettoriale V con la proprietà che se $v \in V$ allora $tv \in V$ per ogni $t \in \mathbb{K}$.

Il cono isotropo è l'insieme dei vettori a distanza 0 dall'origine nella metrica della forma B, ed è il primo importante fattore che ci permette di capire come sia fatta la geometria dello spazio che stiamo studiando. Alcuni esempi di coni isotropi sono

Esempio 2.5 (Spazio di Minkowski)

Per la forma di matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$


il cono d'isotropia è

$$x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 = 0$$


che è letteralmente e geometricamente un cono. In fisica questo è noto come *cono di luce*, una rappresentazione si può vedere nella figura sotto (vibe-coded con ClaudeAI).

Osservazione 2.6. Presa una forma B definita su V si ha che $V^\perp \subseteq I_B(V)$ (l'ortogonale di tutto lo spazio è sempre contenuto nel cono d'isotropia) in particolare $I_B(V) = \{\vec{0}\}$ implica che B è non degenere.

Notiamo che il contrario non è necessariamente vero, ovvero esistono forme B con cono d'isotropia non vuoto che non sono degeneri, si pensi banalmente a $\mathbb{R}^{2,1}$, che ha cono d'isotropia non vuoto, ma chiaramente è non degenere.



Sullo spazio W la forma B è degenere, in quanto interseca il cono di isotropia in almeno un punto.



Sullo spazio U invece la forma B è non degenere, e il suo ortogonale $U^{\perp}$ non coincide con l'ortogonale nella metrica euclidea $U^{\perp_E}$. Salterà fuori che gli spazi di questo tipo sono di fondamentale importanza nello studio delle forme simmetriche, quindi ne riportiamo la definizione (che era già stata più o meno data in esempi precedenti):

Definizione 2.7 (Spazio Pseudoeuclideo)**.** Uno spazio V su un campo $\mathbb{K}$ equipaggiato con una forma bilineare simmetrica e non degenere si dice *spazio pseudoeuclideo*.

In generale denoteremo con $\mathbb{R}^{p,q}$ la somma diretta ortogonale

$$(\mathbb{R}^p, \langle\cdot,\cdot\rangle) \perp (\mathbb{R}^q, \langle\cdot,\cdot\rangle) =: \mathbb{R}^{p,q}$$

e questo sarà il nostro spazio pseudoeuclideo canonico.

§2.1.1 Diagonalizzazione di forme bilineari

Abbiamo trovato un modo di rappresentare una forma bilineare B come una matrice. Vogliamo ora provare a diagonalizzare questa matrice, nell'ottica del classificare le forme bilineari:

Definizione 2.8 (Base ortogonale)**.** Una base $\{v_1, \dots, v_n\}$ di V si dice *ortogonale rispetto a* B (o B-ortogonale) se $B(v_i, v_j) = 0$ se $i \neq j$.

Abbiamo dimostrato a Geometria 1 che tutte le matrici simmetriche sono diagonalizzabili. Questo si generalizza con il seguente teorema:

Teorema 2.9 (Spettrale reale)
Se $\mathbb{K}$ è un campo a caratteristica diversa da 2 allora ogni forma bilineare simmetrica B su uno spazio V di dimensione finita su $\mathbb{K}$ ammette una base B-ortogonale.

Dimostrazione. La tesi è chiaramente vera se $B = 0$, quindi assumiamo che B sia non nulla. Procediamo allora per induzione, il caso base $\dim V = 1$ è chiaro. Supponiamo ora che la tesi valga per tutti gli spazi con dimensione minore di un certo $n \geq 2$. Prendiamo

ora uno spazio di dimensione n, allora dato che B non è nulla non sarà alternante. Dunque esiterà un v tale che $B(v,v) \neq 0$. Visto allora che $B_{|\langle v\rangle}$ è non degenere e B è simmetrica abbiamo

$$\langle v\rangle \perp \langle v\rangle^{\perp} = V$$

ma d'altra parte $\langle v\rangle^{\perp}$ è di dimensione $n-1$, quindi sappiamo diagonalizzare B su di esso per ipotesi induttiva. Questo conclude per induzione. □

La realizzazione algoritmica della dimostrazione del teorema spettrale prende il nome di *metodo di Lagrange*:

Algoritmo 2.10 (Metodo di Lagrange) — Consideriamo uno spazio V, su un campo $\mathbb{K}$ con caratteristica diversa da 2, e una forma B non degenere su di esso. Se $\mathcal{V}$ è una base di V possiamo costruire a partire da essa una base ortogonale per B nel seguente modo:

- Prendiamo un vettore $v \in \mathcal{V}$ **non isotropo** (che esiste sempre se assumiamo che B non sia alternante, ma anche se fosse $B(v_i, v_i) = 0$ per ogni i dobbiamo necessariamente avere $B(v_i + v_j, v_i + v_j) \neq 0$ per qualche i, j, e quindi ci basta scegliere $v := v_i + v_j$).
- Data la base $\mathcal{V} = \{v_1', v_2, \dots, v_n\}$ con v_1' non isotropo, calcoliamo la base $\mathcal{V}'$ come
$$v_i' := v_i - \pi^{\langle v_1'\rangle}_{\langle v_1'\rangle^{\perp}}(v_i)$$
questi sono $n-1$ vettori linearmente indipendenti in $\langle v\rangle^{\perp}$ e quindi formano una base.
- Ripetiamo tutto quanto fatto finora usando $B_{|\langle v\rangle^{\perp}}$, finché la forma che stiamo considerando non risulta avere come kernel tutto lo spazio.

La correttezza di questo algoritmo appunto segue dal teorema spettrale dimostrato sopra, e dal seguente lemma:

Lemma 2.11 (Coefficienti di Fourier)
Dato un $v \in V$ non isotropo rispetto a B allora per ogni $w \in W$ la proiezione ortogonale di w su $\langle v\rangle$ è

$$\pi^{\langle v\rangle^{\perp}}_{\langle v\rangle}(w) = \alpha_v(w)v = \frac{B(v,w)}{B(v,v)}v$$

mentre la proiezione ortogonale sul suo complemento ortogonale è

$$\pi^{\langle v\rangle}_{\langle v\rangle^{\perp}}(w) = w - \alpha_v(w)v = w - \frac{B(v,w)}{B(v,v)}v$$

in particolare il coefficiente $\alpha_v(w)$ si chiama *coefficiente di Fourier*.

Dimostrazione. La tesi segue semplicemente osservando che

$$B\left(w - \frac{B(v,w)}{B(v,v)}v, v\right) = 0$$

e quindi per unicità del complementare abbiamo la tesi. □

Abbiamo usato in modo determinante che la caratteristica del campo fosse diversa da 0. Un esempio problematico è il seguente:

Esempio 2.12 (Una forma bilineare simmetrica non diagonalizzabile)

La forma bilineare definita su un campo $\mathbb{K}$ a caratteristica 2 tale che la sua matrice di gram sia

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

non ammette una base diagonalizzante.

Osserviamo infine che il metodo di Lagrange procede per cambi di base che hanno la forma

$$P_{ij} = \begin{cases} -\alpha_{v_i}(v'_j) & \text{se } i < j \\ 1 & \text{se } i = j \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

che sono tutte matrici triangolari superiori con solo 1 sulla diagonale principale, dunque il determinante della matrice rimane invariato, prima e dopo il cambio di base.

§2.1.2 Teorema di Sylvester e segnatura

Abbiamo visto la sezione precedente che ogni forma bilineare simmetrica è diagonalizzabile. Questo vuol dire che per ogni matrice A simmetrica esiste una matrice Q con determinante 1 tale che

$$A = Q^{\intercal} \left(\begin{array}{ccc|c} \alpha_1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & \alpha_r & 0 \\ \hline 0 & \dots & 0 & 0 \end{array}\right) Q$$

In realtà vorremmo fare un po' più di questo, ovvero vorremmo una base non solo ortogonale, ma ortonormale. Questo non sempre è possibile, ma sicuramente lo è nel caso in cui $\mathbb{K} = \mathbb{C}$:

Corollario 2.13 (Sylvester complesso)

Per uno spazio (V, B) definito su $\mathbb{C}$ il rango è un *invariante completo*, ovvero prese due forme B_1 e B_2 con lo stesso rango queste sono equivalenti se e solo se hanno lo stesso rango, inteso come il rango della matrice associata ad una qualsiasi base. In particolare sono entrambe equivalenti alla forma di matrice:

$$\left(\begin{array}{c|c} I_r & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array}\right)$$

dove r è il rango.

Dimostrazione. Se due forme bilineari sono equivalenti hanno evidentemente lo stesso rango. D'altra parte se consideriamo B_1 e B_2 con lo stesso rango, grazie al metodo di Lagrange possiamo trovare due basi $\mathcal{V}$ e $\mathcal{W}$ di V tali che le loro matrici in queste basi

sono rispettivamente

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \alpha_1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & \alpha_r & 0 \\ \hline 0 & \dots & 0 & 0 \end{array}\right), \left(\begin{array}{ccc|c} \beta_1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & \beta_r & 0 \\ \hline 0 & \dots & 0 & 0 \end{array}\right)$$

con $\alpha_i, \beta_i \in \mathbb{C}$. D'altra parte dato che siamo in $\mathbb{C}$ per ogni z esisterà un valore $\sqrt{z} \in \mathbb{C}$ tale che $\sqrt{z}^2 = z$ (questo valore non è unico, quindi non parliamo di funzione radice quadrata, ma si capisce cosa si intende). Dunque se consideriamo il cambio di base

$$v_i' = v_i \frac{1}{\sqrt{\alpha_i}}$$
$$w_i' = w_i \frac{1}{\sqrt{\beta_i}}$$

le matrici in questa base saranno proprio

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1/\sqrt{\alpha_1} & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 1/\sqrt{\alpha_r} & 0 \\ \hline 0 & \dots & 0 & 0 \end{array}\right) \left(\begin{array}{ccc|c} \alpha_1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & \alpha_r & 0 \\ \hline 0 & \dots & 0 & 0 \end{array}\right) \left(\begin{array}{ccc|c} 1/\sqrt{\alpha_1} & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 1/\sqrt{\alpha_r} & 0 \\ \hline 0 & \dots & 0 & 0 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & 0 \\ \hline 0 & \dots & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1/\sqrt{\beta_1} & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 1/\sqrt{\beta_r} & 0 \\ \hline 0 & \dots & 0 & 0 \end{array}\right) \left(\begin{array}{ccc|c} \beta_1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & \beta_r & 0 \\ \hline 0 & \dots & 0 & 0 \end{array}\right) \left(\begin{array}{ccc|c} 1/\sqrt{\beta_1} & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 1/\sqrt{\beta_r} & 0 \\ \hline 0 & \dots & 0 & 0 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & 0 \\ \hline 0 & \dots & 0 & 0 \end{array}\right)$$

e dunque le due forme sono proprio equivalenti, in quanto sono associate alla stessa matrice. □

L'equivalente nel linguaggio delle sole matrici di questo teorema è che due matrici complesse sono congruenti se e solo se hanno lo stesso rango (il che è molto simile a quello che avevamo visto sull'equivalenza di matrici). Purtroppo su $\mathbb{R}$ le radici non esistono sempre, e quindi abbiamo bisogno di un'altra condizione per caratterizzare la congruenza tra matrici. L'idea non è particolarmente più elaborata di quella appena usata, e consiste nel tenere conto di quali numeri abbiano o non abbiano una radice in $\mathbb{R}$ (ovvero di tenere conto di quanti valori positivi e di quanti valori negativi appaiano nella matrice diagonale della forma).

Teorema 2.14 (Sylvester reale)

Sia V uno spazio vettoriale reale e B una forma bilineare simmetrica su di esso di rango r, allora esistono unici $p, q \in \mathbb{N}$ tali che $p + q = r$ e una base $\mathcal{V}$ di V per cui la forma B nella base $\mathcal{V}$ si scrive come

$$\left(\begin{array}{c|c|c} +I_p & & \\ \hline & -I_q & \\ \hline & & 0_{n-r} \end{array}\right).$$

Dimostrazione. L'esistenza segue come prima rinormalizzando tutti i vettori della base trovata con il metodo di Lagrange per il loro modulo, ovvero

$$v_i' := v_i \frac{1}{\sqrt{|B(v_i, v_i)|}}$$

e dunque i coefficienti positivi rimangono positivi, mentre i coefficienti negativi rimangono negativi, dando la matrice della tesi. Supponiamo allora per assurdo che ci siano due basi $\mathcal{W}$ e $\mathcal{U}$ di V tali che B in queste abbia la forma della tesi, ma con p diversi, ovvero siano

$$\mathcal{W} = \{v_1, \dots, v_p, \dots, v_n\}$$
$$\mathcal{U} = \{w_1, \dots, w_{p'}, \dots, w_n\}$$

con $p \neq p'$ tali che

$$B(v_i, v_i) = 1 \qquad 1 \leq i \leq p$$
$$B(w_i, w_i) = 1 \qquad 1 \leq i \leq p'.$$

assumiamo WLOG che $p' < p$ allora

$$W_+ := \langle v_1, \dots, v_p \rangle$$
$$U_- := \langle w_{p'+1}, \dots, w_n \rangle$$

allora abbiamo che

$$\dim U_- + \dim W_+ = n - p' + p > n$$

dunque per la formula di Grassman questi due spazi hanno intersezioni non vuota. Questo è contraddittorio, perché se così fosse esisterebbe un $0 \neq v \in U_- \cap W_+$ tale che si possa scrivere come

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_p v_p = v = \beta_{p'+1} w_{p'+1} + \dots + \beta_n w_n$$

ma allora calcolando $B(v, v)$ in una rappresentazione e nell'altra otteniamo

$$B(v, v) = \sum_{i=1}^{p} \alpha_i^2 > 0$$
$$B(v, v) = -\sum_{i=p'+1}^{r} \beta_i^2 < 0$$

il che è assurdo, e quindi abbiamo finito. □

Il teorema di sylvester ci dà quindi un nuovo invariante completo:

Definizione 2.15 (Segnatura)**.** Uno spazio V finitamente generato equipaggiato con una forma bilineare simmetrica B si dice avere *segnatura* (p, q) se

$$(V, B) \cong \mathbb{R}^{p,q} \perp (\mathbb{R}^{n-q-p}, 0)$$

e per il teorema di Sylvester la segnatura esiste sempre ed è unica. p viene detto *indice di positività*, q viene detto *indice di negatività* e $p - q$ viene detto *indice d'inerzia*. Analogamente si definisce la segnatura di una matrice $n \times n$, come la segnatura di una forma bilineare su $\mathbb{R}^n$ avente quella matrice di Gram.

Un corollario che otteniamo subito è

Corollario 2.16 (Caratterizzazione della definitezza)

Una forma bilineare B su uno spazio V di dimensione n è:

- Definita positiva se e solo se ha segnatura $(n, 0)$, ovvero se esiste una base in cui la matrice di B si scrive come $P^\intercal P$ per qualche $P \in \mathrm{M}_n(\mathbb{R})$.
- Definita negativa se e solo se ha segnatura $(0, n)$, ovvero se esiste una base in cui la matrice di B si scrive come $-P^\intercal P$ per qualche $P \in \mathrm{M}_n(\mathbb{R})$.
- Indefinita se ha indice di positività e di negatività entrambi non nulli.
- Semidefinita (postiva o negativa, sulla base di quale indice non è nullo) se $p + q < n$, ovvero se non ha rango massimo.

§2.1.3 Criteri per determinare la segnatura

Come si calcola dunque la segnatura di una matrice (o di una forma bilineare, che dir si voglia)? Sicuramente un modo (a cui non vogliamo davvero ricorrere a mano, ma su un calcolatore di sicuro è il più rapido) è l'eliminazione di Gauss simmetrica: ovvero un'eliminazione di Gauss in cui si applicando contemporaneamente su righe e colonne le stesse operazioni. Un modo più umano è il cosiddetto criterio di Sylvester, che si basa sui minori principali di una matrice:

Definizione 2.17 (Minori principali)**.** Data una matrice A il minore costituito dalle prime i righe e dalle prime i colonne è chiamato l'i-esimo *minore principale*, e verrà denotato con $A^{(i)}$.

La prima osservazione che facciamo è che se una matrice è diagonale con autovalori λ_i allora

$$A^{(i)} = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_i$$

questo ci suggerisce un'idea, se riuscissimo in qualche modo a ricondurci da una matrice A generica alla matrice in forma di Sylvester senza variare i minori ci basterebbe calcolare tutti i minori principali per capire la segnatura della matrice, infatti se $\lambda_{i+1} < 0$ abbiamo che $A^{(i+1)}$ cambia segno rispetto a $A^{(i)}$, e dunque l'indice di negatività della matrice è proprio uguale al numero di cambi di segno nella successione dei minori principali. Per arrivare a questo fatto abbiamo prima bisogno di

Lemma 2.18 (Invarianza dei minori principali)

Siano A e P matrici $n \times n$. Se A è simmetrica e P è *unitriangolare superiore*, cioè si scrive come

$$P = \begin{pmatrix} 1 & * & \dots & * \\ 0 & 1 & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

allora i minori principali di A sono uguali ai minori principali di $P^\intercal A P$.

Dimostrazione. Siano $v_1, v_2, \dots, v_n$ le colonne di A. Allora abbiamo che le colonne v_i' di AP sono

$$v_i' = v_i + \sum_{j=1}^{i-1} v_j P_{ji}$$

ma allora abbiamo proprio che tutti i minori di AP sono uguali a tutti i minori di A, perché le colonne di AP si ottengono da quelle di A attraverso operazioni elementari che non alterano il determinante. Con questo abbiamo finito, perché usando la simmetria di A e il fatto che i minori principali della trasposta sono uguali ai minori originali si ha, per ogni i:

$$(P^\intercal AP)^{(i)} = (P^\intercal A)^{(i)} = [(P^\intercal A)^\intercal]^{(i)} = (A^\intercal P)^{(i)} = (AP)^{(i)} = A^{(i)}$$

che era proprio la tesi. □

Da questo risultato dunque seguono due criteri per determinare la segnatura:

Corollario 2.19 (Criterio di Sylvester)

Per una matrice A simmetrica reale, con tutti i minori principali diversi da 0, la segnatura è uguale al numero di cambi di segno nella successione

$$1,\ A^{(1)},\ A^{(2)}, \dots,\ A^{(n)}.$$

Dimostrazione. Segue dal fatto che le trasformazioni che esegue il metodo di Lagrange sono tutte congruenza per unitriangolari superiori, e che prodotto di unitriangolari superiori è ancora unitriangolare superiore. □

O analogamente:

Corollario 2.20 (Criterio di Jacobi)

Per una matrice A simmetrica e con tutti i minori principali non nulli si ha che A è congruente alla matrice diagonale

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \alpha_n \end{pmatrix}$$

con

$$\alpha_i := \frac{A^{(i)}}{A^{(i-1)}}$$

e ponendo $A^{(0)} = 1$.

Dimostrazione. Di nuovo segue dal fatto che il metodo di Lagrange ci fornisce due matrici P e T tali che P è unitriangolare, D è diagonale e

$$P^\intercal AP = D$$

e per il lemma dimostrato sopra abbiamo che i minori principali di D sono uguali ai minori principali di A. □

§2.2 Forme alternanti

Come per le forme bilineari eravamo interessati agli spazi pseudoeuclidei, per le forme alternanti siamo interessati agli spazi simplettici:

Definizione 2.21 (Spazio simplettico)**.** Uno *spazio vettoriale simplettico* è uno spazio V equipaggiato con una forma B alternante e non degenere. Una tale forma si dice *forma simplettica*.

Per le forme bilineari simplettiche non ha alcun senso parlare di diagonalizzazione, perché chiaramente avremmo che tutti i termini sulla diagonale dovrebbero essere 0! (contraddicendo il fatto che B è non degenere). L'esempio standard di forma simplettica è quella definita su $V := U \times U^*$ tale che

$$B((u, \varphi), (v, \psi)) = \psi(u) - \varphi(v)$$

che, come suggerisce il termine simplettico (che deriva dal greco e sta per "intrecciato") è una combinazione intrecciata di funzionali e vettori. Questa sembra un esempio molto specifico di spazio simplettico, ma vedremo che in realtà è spaventosamente generale:

Proposizione 2.22 (Dimensione di spazi simplettici)
Se (V, B) è uno spazio simplettico di dimensione finita, allora $\dim V = 2m$ per qualche $m \in \mathbb{N}$:

Dimostrazione semplice. Sia $\dim V = n$, e $A = M_{\mathcal{V}}(B)$ una matrice di B in una qualunque base $\mathcal{V}$. Allora abbiamo già visto che

$$A = -A^{\intercal}$$

d'altra parte prendendo i determinanti da entrambi i lati abbiamo

$$\det A = \det(-A^{\intercal}) = \det(-A) = (-1)^n \det A$$

ma dato che B è non degenere abbiamo che $\det A \neq 0$, e dunque $(-1)^n = 1$, da cui n pari. □

Questa dimostrazione è semplice, ma purtroppo funziona solo in caratteristica diversa da 2. Per generalizzare il ragionamento dobbiamo procedere per induzione:

Dimostrazione generale. Procediamo per induzione su n la dimensione di V. Per $\dim V = 0$ chiaramente non c'è nulla da verificare, e per $\dim V = 1$ l'unica forma alternante è quella identicamente nulla, che è degenere e quindi non è simplettica. Supponiamo allora che $\dim V = n \geq 2$, allora prendiamo un vettore non nullo $u \in V$, dato che B è non degenere l'applicazione B_1 sarà un isomorfismo. Ma questo vuol dire che

$$B(u, -) = B_1(u) \neq 0 \in V^*$$

ovvero il funzionale associato ad u non è la funzione nulla. Dunque avremo che esiste un $v \in V$ tale che

$$B(u, v) \neq 0$$

ma d'altra parte questo per l'alternanza di B implica che u e v sono linearmente indipendenti. Questo vuol dire che la matrice di $B_{|\langle u,v\rangle}$ è proprio

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

ma questa è una matrice invertibile, quindi $B_{|\langle u,v\rangle}$ è non degenere, cioè

$$\langle u, v\rangle \oplus \langle u, v\rangle^{\perp} = V.$$

Abbiamo finito, infatti per ipotesi induttiva, dato che $B_{|\langle u,v\rangle^{\perp}}$ è sia alternante che non degenere abbiamo che $\langle u, v\rangle^{\perp}$ deve avere dimensione pari, e dato che $\langle u, v\rangle$ ha dimensione pari per quanto visto prima, abbiamo proprio che V ha dimensione pari, e fine. □

Il motivo per cui questa dimostrazione è particolarmente interessante non è tanto perché abbiamo esteso l'enunciato ai campi di caratteristica 2 (di cui ci interessa fino a un certo punto), ma più che altro perché l'idea che abbiamo usato ci permette di costruire esplicitamente la matrice di una forma simplettica in una certa forma canonica.

Corollario 2.23 (Esistenza di basi simplettiche)

Per una forma simplettica B possiamo sempre trovare una base della forma $\mathcal{V} = \{u_1, u_2, \dots, u_m, v_1, \dots, v_m\}$, con $m = \frac{1}{2}\dim V$ tale che la matrice di B in questa base sia

$$M_{\mathcal{V}}(B) = \left(\begin{array}{c|c} 0 & I_m \\ \hline -I_m & 0 \end{array}\right)$$

che denoteremo con J_m.

Questa matrice è così importante che la rinforziamo con un'ulteriore definizione:

Definizione 2.24 (Base simplettica)**.** Sia (V, B) uno spazio vettoriale simplettico di dimensione finita $2m$. Una base $\mathcal{W} = \{w_1, \dots, w_{2m}\}$ di V tale che

$$M_{\mathcal{W}}(B) = J_m$$

si dice *base simplettica* di (V, B).

Da quanto appena visto segue che

Corollario 2.25 (Ricondursi allo spazio simplettico standard)

Per ogni spazio vettoriale simplettico (V, B) esiste un isomorfismo

$$\begin{aligned} V &\to \mathbb{K}^m \times (\mathbb{K}^m)^* \\ u_i &\mapsto (e_i, 0) \\ v_j &\mapsto \left(0, e_j^*\right) \end{aligned}$$

dove u_i, v_j è una base simplettica di V.

Osservazione 2.26 (Ricondursi a spazi simplettici)**.** In generale data una forma alternante B possiamo considerare il suo nucleo W (dato che è antisimmetrica nucleo sinistro e nucleo

destro sono uguali), e scomporre lo spazio

$$V = W \oplus W^{\perp}$$

in questo modo $B_{|W^{\perp}}$ è non degenere, e quindi possiamo trovare una base in cui B ha matrice

$$\left(\begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ \hline 0 & J_{r/2} \end{array}\right)$$

dove r è il rango di B.

E dunque abbiamo classificato tutte le forme simplettiche.

§3 Isometrie di spazi arbitrari

Lo scorso anno abbiamo studiato le isometrie di spazi euclidei e affini. Estendiamo il nostro studio a spazi arbitrari con una certa struttura B (una forma bilineare). Il programma di quanto faremo è il seguente:

- Vogliamo poter disporre di un insieme di **modelli canonici** di spazi con certe strutture.
- Comunque dato uno spazio V vogliamo poter dire a quale modello canonico questo è isomorfo, attraverso delle grandezze chiamate *invarianti*. Se un certo insieme di invarianti caratterizza completamente il modello canonico di quello spazio allora questi si dicono *invarianti completi*.
- Vogliamo studiare come si comportano gli automorfismi per i modelli canonici che troveremo.

Questa è una cosa che abbiamo già fatto l'anno scorso: per esempio con

Esempio	Modello	Invariante	Automorfismi
V spazio vett. finitamente generato su $\mathbb{K}$	$\mathbb{K}^n$	$n = \dim_{\mathbb{K}} V$	$\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$
$\mathbb{A}$ affine su $\mathbb{K}$	$\mathbb{A}^n_{\mathbb{K}}$	$n = \dim_{\mathbb{K}} \mathbb{A}$	$\mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) \rtimes \mathbb{K}^n$

Un altro esempio di spazio per cui sappiamo già qual è il modello canonico è lo spazio euclideo:

Definizione 3.1 (Spazio Euclideo)**.** Uno *spazio vettoriale Euclideo* è uno spazio V equipaggiato con una forma B definita positiva e simmetrica. Una tale forma si dice un *prodotto scalare*.

Gli spazi euclidei in generale non sono solo $\mathbb{R}^n$, ma possono avere metriche più strane. In generale uno spazio è euclideo se è isomorfo a $\mathbb{R}^n$, ovvero se e solo se la sua palla unitaria è un ellissoide (cioè a meno di una trasformazione lineare è una sfera). Sugli spazi euclidei valgono tutte le cose che abbiamo dimostrato in generale su $\mathbb{R}^n$ (Cauchy-Schwarz, Gram-Schmidt...), ed è proprio questo il motivo per cui ci interessa trovare un modello canonico per **tutti** gli spazi, non solo per quelli euclidei. Altri esempi allora sono

Esempio	Modello	Invariante	Automorfismi
(V, B) spazio vett. euclideo	$(\mathbb{R}^\cdot)$	$n = \dim_{\mathbb{K}} V$	$O_n(\mathbb{K})$
$(\mathbb{E}, V, B)$ affine euclideo	$(\mathbb{A}^n_{\mathbb{R}}, \mathbb{R}^n, \cdot)$	$n = \dim_{\mathbb{K}} \mathbb{E}$	$O_n(\mathbb{R}) \rtimes \mathbb{R}^n$
(V, B) vett. pseudoeuclideo	$(\mathbb{R}^n, \langle\cdot,\cdot\rangle_{p,q})$	$n = \dim_{\mathbb{K}} V$ e (p, q)	?
(V, B) simplettico	$(U \times U^*, h)$ con $U = \mathbb{K}^n$	$m = \frac{1}{2}\dim V$	?

dunque quello che ci manca è proprio capire quali sono gli automorfismi di spazi simplettici e pseudoeuclidei.

Definizione 3.2 (Automorfismo di uno spazio)**.** Dato un qualunque spazio (V, B) un suo *automorfismo* è un'applicazione $\varphi : V \to V$ lineare e biettiva tale che

$$B(\varphi(v), \varphi(w)) = B(v, w)$$

per ogni $v, w \in V$.

Definizione 3.3 (Trasformazione pseudoeuclidea)**.** Una $\varphi : V \to V$ lineare sullo spazio pseudoeuclideo V si dice una *trasformazione pseudoeuclidea* se

$$B(\varphi(v), \varphi(w)) = B(v, w)$$

per ogni $v, w \in V$.

Osservazione 3.4 (Caratterizzazione degli automorfismi pseudoeuclidei)**.** Sia (V, B) uno spazio equipaggiato con una forma bilineare simmetrica, allora gli automorfismi di (V, B) sono quelli la cui matrice H in una certa base $\mathcal{V}$ soddisfa

$$A = H^\intercal A H$$

dove A è la matrice di B nella base $\mathcal{V}$.

Questi erano un po' di casi specifici, vediamo ora in generale

Definizione 3.5 (Trasformazione ortogonale)**.** Per uno spazio vettoriale V munito di una forma bilineare B non degenere un endomorfismo f di V si dice *ortogonale rispetto a* B (oppure B-ortogonale) se soddisfa la condizione

$$B\left(f(v), f(w)\right) = B(v, w)$$

per ogni $v, w \in V$.

La prima cosa che possiamo dire di una trasformazione ortogonale è la seguente:

Lemma 3.6 (Ortogonale implica invertibile)
S4 $f : V \to V$ è ortogonale allora è anche invertibile.

Dimostrazione. Se $v \in \operatorname{Ker}(f)$ abbiamo che

$$0 = B(0, f(w)) = B(v, w)$$

per ogni w, cioè v è un vettore degenere per B, ma questo contraddice l'ipotesi che B sia non degenere. Dunque f è iniettiva, ma d'altra parte dato che V ha dimensione finita abbiamo che f è invertibile. □

Come facevamo per le matrici ortogonali abbiamo

Definizione 3.7 (Gruppo B-ortogonale)**.** Per ogni spazio (V, B) l'insieme delle trasformazioni B-ortogonali formano un gruppo rispetto alla composizione, detto il *gruppo B-ortogonale*, denotato con $O(V, B)$.

E analogamente a prima

Osservazione 3.8 (Caratterizzazione matriciale delle trasformazioni ortogonali)**.** Data una forma bilineare g_A di matrice di gram A abbiamo che le trasformazioni ortogonali sono quelle di matrice H tali che

$$A = H^\intercal A H$$

e in particolare se $A = I_n$, ovvero abbiamo lo spazio euclideo standard, ritroviamo la

definizione di matrice ortogonale

$$H^\intercal H = I_n.$$

Definizione 3.9 (Gruppo simplettico e gruppo pseudoeuclideo)**.** Il gruppo ortogonale di uno spazio simplettico viene detto *gruppo simplettico*, mentre il gruppo ortogonale di uno spazio pseudoeuclideo con segnatura p, q viene detto *gruppo pseudoeuclideo*. Questi si denotano rispettivamente con $\mathrm{Sp}_{2n}(\mathbb{K})$ e $\mathrm{O}_{p,q}(\mathbb{K})$.

Osservazione 3.10. Il gruppo simplettico contiene una copia isomorfa di GL_n, infatti

$$M \mapsto \left(\begin{array}{c|c} M & 0 \\ \hline 0 & (M^{-1})^\intercal \end{array}\right)$$

è un morfismo di gruppi, ed è iniettivo. Questo corrisponde al fatto che ogni $\varphi : V \to V$ induce una trasformazione simplettica

$$\begin{aligned} V \times V^* &\to V \times V^* \\ (v, f) &\mapsto \left(\varphi(v), (\varphi(v)^{-1})^\intercal f\right). \end{aligned}$$

§3.1 Aggiunzione rispetto a matrici arbitrarie

Per i prodotti interni standard ed hermitiani avevamo definito il concetto di aggiunzione come

$$\langle Av, w\rangle = \langle v, A^* w\rangle$$

e avevamo detto che A^* e A sono una l'aggiunta dell'altra. Allo stesso modo possiamo definire:

Definizione 3.11 (Aggiunzione)**.** Siano V e W due spazi vett di dimensione finita, e siano B e B' forme bilineari non degeneri su V e W. Data una mappa lineare $L : V \to W$ possiamo costruire il seguente diagramma commutativo:

$$\begin{array}{ccccc} V & \xrightarrow{B_1} & V^* & \xleftarrow{B_2} & V \\ {\scriptstyle L}\downarrow & & {\scriptstyle L^\intercal}\uparrow & & \vdots{\scriptstyle T(L)} \\ W & \xrightarrow[B_2']{} & W^* & \xleftarrow[B_1']{} & W \end{array}$$

allora definiamo l'*aggiunta destra* (analogamente definiamo l'*aggiunta sinistra*, scambiando B_1 con B_2 e B_1' con B_2') di L rispetto alle forme B e B' come l'unica funzione $T(L) : W \to V$ che fa commutare quel diagramma, ovvero

$$B_2 \circ T(L) = L^\intercal \circ B_1'$$

cioè

$$T(L) = B_2^{-1} \circ L^\intercal \circ B_1'$$

o analogamente

$$B(w, L(v)) = B'(T(L)(w), v)$$

che notiamo nel caso in cui entrambi gli spazi siano notati della metrica euclidea standard (o hermitiana), ritorna ad essere esattamente $L^\intercal$, dato che B_2 e B_1 sono isomorfismi canonici che corrispondono all'identità tra vettori riga e vettori colonna.

Questo cosa vuol dire in termini di matrici? Se le due forme hanno matrici A e A' abbiamo che la matrice $T(H)$ associata alla trasposta di H è

$$T(H) = A^{-1}L^{\intercal}\left(A'\right)^{\intercal}$$

per l'aggiunta destra, e invece per quella sinistra

$$T'(H) = \left(A^{\intercal}\right)^{-1}L^{\intercal}A'.$$

Nel caso in cui L sia un endomorfismo tuttavia possiamo avere $T(L) = L$, e quindi:

Definizione 3.12 (Endomorfismo autoaggiunto)**.** Su uno spazio (V, B) di dimensione finita, con forma simmetrica e non degenere, per un endomorfismo L essere *autoaggiunto* vuol dire

$$B(L(v), v') = B(v, L(v'))$$

per ogni $v, v' \in V$, ovvero L è l'aggiunto di se stesso.

Di nuovo per le matrici possiamo riformulare questa cosa in modo molto più chiaro.

Proposizione 3.13 (Autoaggiunzione con le matrici)
Se $L : V \to V$ è un endomorfismo di V tale che

$$L(x) := Mx$$
$$B(x, y) := x^{\intercal}Ay$$

abbiamo che M è autoaggiunto rispetto a B se e solo se

$$M = A^{-1}M^{\intercal}A.$$

§3.2 Riflessioni, Witt e Cartàn-Dieudonnè

Vogliamo trovare un modo per costruire e classificare le trasformazioni ortogonali di uno spazio (V, B). Dimostriamo allora

Definizione 3.14 (Simmetria)**.** Dato uno spazio (V, B) consideriamo un $W \subseteq V$ anisotropo, allora abbiamo

$$W \oplus W^{\perp} = V$$

e dunque se car$\mathbb{K} \neq 2$ definiamo la *simmetria di asse* W come

$$\rho_W(w + w') = w - w'$$

con $w \in W$ e $w' \in W^{\perp}$. O analogamente come l'endomorfismo di V tale che su W sia l'identità e su $W^{\perp}$ sia $\rho_(W)(w') = -w'$.

Lemma 3.15 (Le simmetrie sono ortogonali)
Per ogni W anisotropo abbiamo che ρ_W è ortogonale.

Dimostrazione. È un calcolo diretto, infatti

$$B\left(\rho_W(w+u), \rho_W(w'+u')\right) = B\left(w-u, w'-u'\right)$$

che espandendo e usando il fatto che $w, w' \perp u, u'$ dà la tesi. □

Nel caso specifico della riflessione rispetto ad un iperpiano $\langle w \rangle^\perp$ possiamo usare i coefficienti di Fourier per avere una formula esplicita della riflessione

$$\rho_W(v) = v - 2\frac{B(w,v)}{B(w,w)}w$$

dove $B(w,w) \neq 0$ perché l'ortogonale $\langle w \rangle^\perp$ è anisotropo, e quindi anche lo spazio originale sarà tale (ovvero w non è isotropo).

Teorema 3.16 (di estensione di Witt)

Sia (V, B) è uno spazio pseudoeuclideo di dimensione finita su un campo $\mathbb{K}$ con caratteristica diversa da 2 e $W \subseteq V$ un sottospazio di V. Se $g : W \to V$ è una funzione ortogonale, allora esiste un endomorfismo f di V tale che:

- f estende g, cioè $f_{|W} = g$.
- f è composizione di un numero finito di riflessioni rispetto a iperpiani, in particolare è B-ortogonale.

Dimostrazione. La dimostrazione si articola in due passi:

Claim 3.17 — Per le ipotesi del teorema esiste un $W \leq U \leq V$ anisotropo, cioè tale che $U \cap U^\perp = \{0\}$, e inoltre esiste una $f : U \to V$ che sia un'estensione di g, e che sia lineare e B-ortogonale.

Sottodimostrazione. Lavoriamo per induzione sulla dimensione di $W \cap W^\perp$. Se la dimensione è 0 ci basta prendere $f = g$. Supponiamo che $W \cap W^\perp$ sia non nulla, e quindi abbia dimensione m, per il metodo di Lagrange siamo in grado di costruire una base B-ortogonale di W, chiamiamola $\{w_1, \dots, w_m\}$ e supponiamola ordinata in modo che gli ultimi vettori siano quelli isotropi, ovvero abbiamo necessariamente che

$$B(w_m, w_m) = 0$$

consideriamo allora la funzione

$$\begin{aligned} \alpha : V &\to \mathbb{K}^n \\ v &\mapsto \begin{pmatrix} B(w_1, v) \\ B(w_2, v) \\ \vdots \\ B(w_m, v) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

e questa dovrà necessariamente essere suriettiva, dato che B è non degenere su V (PERCHÉ???). Questo vuol dire che esisterà un $w_{m+1} \in V$ tale che

$$B(w_1, w_{m+1}) = \cdots = B(w_{m-1}, w_{m+1}) = 0$$

ma

$$B(w_m, w_{m+1}) = 1$$

cioè abbiamo che e_n appartiene all'immagine della funzione che stiamo considerando. Allora abbiamo, usando la bilinearità

$$B(w_{m+1}+\lambda w_m, w_{m+1}+\lambda w_m) = \lambda^2 B(w_m, w_m)+B(w_{m+1}, w_{m+1})+2\lambda = 2\lambda+B(w_{m+1}, w_{m+1})$$

ma allora questo vuol dire che per un'opportuna scelta di λ possiamo ottenere un vettore isotropo, cioè sostituendo w_{m+1} con

$$w_{m+1} \mapsto w_{m+1} - \frac{1}{2}B(w_{m+1}, w_{m+1})w_m$$

avremo ancora che

$$B(w_1, w_{m+1}) = \cdots = B(w_{m-1}, w_{m+1}) = 0$$
$$B(w_m, w_{m+1}) = 1$$

ma per ipotesi abbiamo che g rispetta B, quindi $\{g(w_1), \dots, g(w_m)\}$ sarà una base B-ortogonale di $g(W)$, quindi possiamo ripetere il ragionamento fatto sopra per trovare un $v_{m+1} \in V \setminus g(W)$[1] tale che la sua immagine nella funzione definita sopra sia e_n, consideriamo dunque

$$U := \langle w_1, \dots, w_m, w_{m+1}\rangle$$

e estendiamo g con f tale che

$$\begin{aligned} f : U &\to V \\ w_1 &\mapsto g(w_1) \\ w_2 &\mapsto g(w_2) \\ &\vdots \\ w_{m+1} &\mapsto v_{m+1} \end{aligned}$$

e quindi ci basta mostrare che

$$\dim U \cap U^\perp < \dim W \cap W^\perp$$

per dimostrare il claim, grazie all'ipotesi induttiva. D'altra parte notiamo che

$$U \cap U^\perp \subseteq W$$

infatti se

$$u = \alpha_1 w_1 + \cdots + \alpha_m w_m + \alpha_{m+1} w_{m+1}$$

sta in $U \cap U^\perp$ allora

$$B(u, w_m) = \alpha_{m+1} B(w_m, w_{m+1}) = \alpha_{m+1}$$

ma d'altra parte essendo u ortogonale a tutti i vettori di U, ed essendo $w_m \in U$ dobbiamo necessariamente avere $\alpha_{m+1} = 0$, da cui abbiamo proprio che $u \in W$ (in quanto si

[1] Questo è possibile perché abbiamo assunto w_m, isotropo, infatti qualunque $w \in W$ è tale che $\alpha(w)$ ha ultima coordinata 0.

scrive come combinazione lineare di elementi di W). Inoltre dal fatto che $W \subseteq U$ segue $W^\perp \subseteq U^\perp$, e quindi abbiamo proprio

$$U \cap U^\perp \subseteq W \cap W^\perp$$

d'altra parte per avere la tesi ci servirebbe in realtà avere che l'inclusione è stretta, ma questo si vede facilmente dal fatto che $w_m \notin U \cap U^\perp$ (perché ci sono elementi di U che non sono ortogonali a w_m, tipo w_{m+1}) ma d'altra parte $w_m \in W \cap W^\perp$ (perché per definizione lo avevamo preso isotropo). ■

Claim 3.18 — Supponiamo in aggiunta alle ipotesi del teorema di Witt di avere che W sia anisotropo, allora esiste un endomorfismo $f : V \to V$ che estende g e che è composizione di al più $2 \dim W$ riflessioni rispetto a iperpiani.

Proof. Sia $m = \dim W$ e sia $\{w_1, \dots, w_m\}$ una base $B_{|W}$ ortogonale. Dato che W è anisotropo possiamo assumere che $B(w_i, w_i) \neq 0$ per ogni i. Consideriamo allora

$$v_i := g(w_i)$$

per i che va da 1 a m. Dimostriamo allora per induzione su k che va da 0 a m che esiste un

$$f = f_k \in O(V, B)$$

che sia composizione di al più $2k$ riflessioni rispetto a iperpiani e tale che

$$f(w_i) = v_i$$

per i da 0 a k.
Il caso base è $k = 0$, che è banale. Supponiamo allora di avere un endomorfismo h di V, composizione di al più $2(k-1)$ riflessioni di iperpiani, tale che

$$h(w_i) = v_i$$

per ogni $1 \leq i \leq k-1$. Supponiamo allora che $h(w_k) = v_k$, allora per ortogonalità di h abbiamo

$$B(u_k, u_k) = B(w_k, w_k) \neq 0$$

e l'ultima relazione segue dal fatto che w_k è anisotropo. Inoltre

$$B(v_i, u_k) = B(w_i, w_k) = 0$$

per $i \leq k-1$. Consideriamo allora la forma quadratica $Q : V \to \mathbb{K}$ associata a B che soddisfa per bilinearità la relazione

$$Q(u_k + v_k) + Q(u_k - v_k) = 2\left[Q(u_k) + Q(v_k)\right]$$

ma visto che, per ortogonalità di g abbiamo $Q(v_k) = Q(w_k) = Q(u_k)$ dobbiamo avere che il RHS è diverso da 0, cioè al lato sinistro almeno uno dei due addendi deve essere diverso da 0, dividiamo in due casi:

- Se $Q(u_k - v_k) \neq 0$ abbiamo che vale la seguente cosa

$$\rho_{\langle u_k - v_k \rangle^\perp}(v_i) = v_i$$

per ogni $i \leq k-1$. Ma allora abbiamo che

$$\rho_{\langle u_k - v_k\rangle^\perp}(u_k) = u_k - 2\frac{B(u_k, u_k - v_k)}{B(u_k - v_k, u_k - v_k)}(u_k - v_k) = v_k$$

dunque la f che stiamo cercando in questo caso è proprio $f = \rho_{\langle u_k - v_k\rangle^\perp} \circ h$, e per ipotesi induttiva abbiamo finito.

- Se invece si ha che $Q(u_k + w_k) \neq 0$ allora

$$\rho_{\langle v_k\rangle^\perp} \circ \rho_{\langle u_k + v_k\rangle^\perp}(v_i)) = v_i$$

per ogni $i \leq k-1$. E come prima abbiamo

$$\rho_{\langle v_k\rangle^\perp} \circ \rho_{\langle u_k + v_k\rangle^\perp}(u_k)) = v_k$$

e dunque la funzione cercata è

$$f = \rho_{\langle v_k\rangle^\perp} \circ \rho_{\langle u_k + v_k\rangle^\perp} \circ h.$$

E dunque abbiamo finito anche qui per ipotesi induttiva.

In ogni caso siamo arrivati alla tesi, e quindi abbiamo finito. ■

Mettendo insieme questi due claim otteniamo immediatamente il teorema di Witt, in quanto abbiamo trovato una forma esplicita per f (e quindi possiamo estenderla facilmente a tutto V) che soddisfa la seconda tesi. □

Un risultato analogo è Cartàn-Dieudonnè, già mostrato a geometria 1B, che si presta ad essere naturalmente generalizzato:

Corollario 3.19 (Cartàn-Dieudonnè generalizzato)

Sia (V, B) uno spazio pseudoeuclideo su un campo $\mathbb{K}$ a caratteristica non 2. Allora ogni applicazione $f : V \to V$ lineare e B-ortogonale si può scrivere scrivere come composizione di al massimo $n = \dim V$ riflessioni di asse un iperpiano.

Dimostrazione. Analoga al teorema di Witt. □

Corollario 3.20

Se U e W sono sottospazi *totalmente isotropi* di (V, B) uno spazio pseudoeuclideo. Se $\dim U \leq \dim W$ allora esiste una $f \in O(V, B)$ tale che $f(U) \subseteq f(W)$.

Dimostrazione. Sia $g : U \to W$ una qualsiasi applicazione lineare iniettiva. Dato che $B_{|U} = B_{|W} = 0$ abbiamo che g è ortogonale, e quindi applicando Witt esisterà una f estensione di g che soddisfa le ipotesi (dato che $f(W) = f(f(U))$). □

§3.3 Teorema spettrale

Finora abbiamo parlato solo di prodotti bilineari, ovvero la generalizzazione naturale dei prodotti scalari reali. Quello che vogliamo fare ora è generalizzare il concetto di prodotto hermitiano, attraverso la definizione di forma Hermitiana:

Definizione 3.21 (Forma Sesquilineare ed Hermitiana)**.** Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{C}$. Una forma $\sigma : V \times V \to \mathbb{C}$ si dice *sesquilineare* se, per ogni $v, v', w, w' \in V$ e $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ si ha:

1. É lineare nel secondo argomento, cioè
$$\sigma\left(\lambda v + \mu v', w\right) = \lambda\sigma\left(v, w\right) + \mu\sigma\left(v', w\right).$$
2. Nel primo argomento è lineare a meno del coniugio, cioè
$$\sigma\left(v, \lambda w + \mu w'\right) = \overline{\lambda}\sigma(v, w') + \overline{\mu}\sigma\left(v, w'\right).$$

Inoltre se una forma sesquilineare soddisfa la condizione

$$\sigma(v, w) = \overline{\sigma(w, v)}$$

allora questa si dice *Hermitiana*.

Esattamente come fatto per le forme bilineari possiamo associare a σ una matrice di Gram, in una certa base ordinata $\mathcal{V} := \{v_1, \dots, v_n\}$ come

$$A_{ij} := \sigma\left(v_i, v_j\right)$$

e data la funzione $\alpha_{\mathcal{V}} : V \to \mathbb{C}^n$ che rappresenta il vettore v nella base $\mathcal{V}$ abbiamo che

$$B(v, w) := \overline{\alpha_{\mathcal{V}}(v)}^{\mathsf{T}} A \alpha_{\mathcal{V}}(v)$$

cioè in componenti

$$\sigma(v, w) = \sum_{1 \leq i,j \leq n} a_{ij}\overline{v}_i w_j.$$

Come non ci sorprende quindi. Ricordiamo la definizione di aggiunta Hermitiana:

Definizione 3.22 (Aggiunta hermitiana)**.** Data una matrice A la sua *aggiunta hermitiana* è la matrice $A^H := \overline{A}^{\mathsf{T}}$.

> **Osservazione 3.23** (Caratterizzazione delle forme hermitiane)**.** Per ogni matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ abbiamo una forma sesquilineare associata
>
> $$h_A(x, y) := \overline{x}^{\mathsf{T}} A y$$
>
> per ogni $x, y \in \mathbb{C}^n$. D'altra parte è chiaro che una forma sesquilineare è hermitiana se e solo se la sua matrice di Gram A è uguale alla sua aggiunta hermitiana, ovvero se e solo se $A = A^*$ è *hermitiana*.

Un corollario di ciò è che per ogni forma hermitiana h abbiamo che

$$h(v, v) = \overline{h(v, v)} \in \mathbb{R}$$

e quindi possiamo usare la segnatura nuovamente per classificare le forme hermitiane, e quindi avremo ancora forme hermitiane definite positive/negative e semidefinite positive/negative (o indefinite). Esattamente come fatto per gli spazi euclidei quindi

Definizione 3.24 (Spazio vettoriale Hermitiano)**.** Uno *spazio vettoriale hermitiano* è uno spazio vettoriale V su $\mathbb{C}$ munito di una forma hermitiana definita positiva.

Non ci ripeteremo ancora una volta sulla definizione di ortogonalità e di base ortogonale e ortonormale. Abbiamo la seguente variante del teorema di Sylvester:

Teorema 3.25 (Sylvester Hermitiano)

Se h è una forma hermitiana su uno spazio V su $\mathbb{C}$ allora esiste una e una sola coppia (p, q) tale che $p + q = r$ e per cui la matrice di gram di h si scrive come

$$M_{\mathcal{V}}(h) = \left(\begin{array}{c|c|c} +I_p & 0 & 0 \\ \hline 0 & -I_q & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

Dimostrazione. È essenzialmente identica alla dimostrazione del teorema di Sylvester reale. □

Da questo quindi abbiamo che per ogni spazio vettoriale hermitiano abbiamo un isomorfismo $(V, h) \to (\mathbb{C}^n, \cdot)$ e quindi recuperiamo tutti i risultati di geometria 1B.

Definizione 3.26 (Trasformazione unitaria)**.** Una trasformazione $f : (V, h) \to (W, h')$ con B una forma hermitiana su uno spazio vettoriale V su $\mathbb{C}$ si dice *unitaria* se e solo se preserva le forme hermitiane. Analogamente si possono definire i gruppi unitario e unitario speciale.

Allo stesso modo la teoria delle aggiunte si adatta bene ai prodotti hermitiani.

Definizione 3.27 (Morfismo normale)**.** Un endomorfismo L di (V, h) si dice *normale* se e solo se

$$L \circ T(L) = T(L) \circ L$$


questo equivale a chiedere che la sua matrice associata rispetto ad una base h-ortonormale è normale.

e quindi finalmente:

Teorema 3.28 (Teorema spettrale)

La matrice associata ad un endomorfismo $L : V \to V$, con h una forma hermitiana, è h-unitariamente diagonalizzabile se e solo se L è normale.

Forme hermitiane e forme bilineari reali sono collegate dal seguente diagramma



e dato che il coniugato scambia il segno della parte immaginaria, la forma ottenuta seguendo il percorso che va verso l'alto sarà antisimmetrica (alternante, in quanto $\mathbb{C}$ ha

caratteristica diversa da 2), mentre quella che segue il percorso che va verso il basso sarà simmetrica. Definire H allora è equivalente a definire s ed a:

$$h(z,w) = s(z,w) + ia(z,w)$$

tuttavia non ci basta prendere una forma alternante e una forma simmetrica a caso e combinarle, infatti queste devono soddisfare anche

$$\begin{cases} s(iv,w) = -s(v,iw) = a(v,w) = a(iv,iw) \\ s(v,w) = s(iv,w) = a(v,iw) = s(iv,iw) \end{cases}$$

in questo modo abbiamo costruito una corrispondenza biunivoca.

Lemma 3.29 (Da simmetriche a Hermitiane)

Se V è uno spazio vettoriale complesso e $s : V \times V \to \mathbb{R}$ è una forma $\mathbb{R}$-bilineare simmetrica tale che $s(v,w) = s(iv,iw)$ allora

$$h(v,w) = s(v,w) + is(iv,w)$$

è una forma hermitiana.

Lemma 3.30 (Da alternanti a Hermitiane)

Se V è uno spazio vettoriale complesso e $a : V \times V \to \mathbb{R}$ è una forma $\mathbb{R}$-bilineare alternante tale che $a(v,w) = a(iv,iw)$ abbiamo che

$$h(v,w) = a(v,iw) + ia(v,w)$$

è una forma hermitiana.

§4 Forme quadratiche e quadriche

Se B è una forma bilineare simmetrica B su V su un campo $\mathbb{K}$ a caratteristica diversa da 2 allora B è univocamente determinata dalla sua forma quadratica associata (lo abbiamo già mostrato prima), ovvero

$$\begin{aligned} Q_B : V &\to \mathbb{K} \\ v &\mapsto B(v,v) \end{aligned}$$

come per le forme bilineari ad una forma quadratica $Q_B : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}$ associata alla forma B possiamo associare la matrice di Gram di A, ovvero

$$B(x,y) = x^\intercal A y$$

da cui abbiamo

$$Q(x) = x^\intercal A x = \sum_{i=1}^{n} a_{ii} x_i^2 + \sum_{i \neq j} a_{ij} x_i x_j.$$

In generale possiamo definire

Definizione 4.1 (Forma quadratica)**.** Una funzione $Q : V \to \mathbb{K}$ dallo spazio V definito sul campo $\mathbb{K}$ si dice una *forma quadratica* se per ogni $\lambda \in \mathbb{K}$ si ha

$$\lambda^2 Q(v) = Q(\lambda v)$$

e per ogni $v, w \in V$ si ha che la funzione

$$B(v,w) := \frac{Q(v+w) - Q(v) - Q(w)}{2}$$

è una forma bilineare su V (in caratteristica 2 basta chiedere che quell'espressione senza i $1/2$ si una forma bilineare). La forma bilineare così ottenuta si chiama la *forma polare* associata a Q, e quella formula si dice *formula di polarizzazione*. Lo spazio delle forme quadratiche su V di solito si denota con $\mathrm{Quad}_{\mathbb{K}}(V)$.

La formula di polarizzazione ha diverse qualità, la prima è che ci permette di trovare un isomorfismo

$$\mathrm{Bil}_{\mathbb{K}}(V) \longrightarrow \mathrm{Quad}_{\mathbb{K}}(V)$$

e la seconda è che ci permette di dimostrare

Lemma 4.2 (Formula di Polarizzazione generalizzata)

Per ogni $Q : V \to \mathbb{K}$ forma quadratica e per ogni $v_i \in V$ lista finita di n vettori si ha

$$Q\left(\sum_{i=1}^{n} v_i\right) = \sum_{i=1}^{n} Q(v_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} B(v_i, v_j)$$

dove B è la forma polare di Q.

In pratica quindi tutte le forme quadratiche sono polinomi omogenei di grado 2 rispetto ad un certo insieme di variabili x_i, ovvero le coordinate rispetto ad una certa base fissata.

Esempio 4.3 (Norma L^2)
Su V lo spazio delle funzioni continue su $[0,1]$ definiamo la forma quadratica

$$Q(f) := \int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x.$$

Esempio 4.4 (Traccia)
Su $M_n(\mathbb{K})$ definiamo la forma quadratica

$$Q(A) := \mathrm{tr}\left(A^2\right).$$

Esempio 4.5 (Polinomi)
Prendiamo su $\mathbb{R}^2$ la forma quadratica

$$Q(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 3x_1x_2 + 4x_2^2$$

vogliamo capire chi è la sua forma polare B, d'altra parte applicando direttamente la formula di polarizzazione abbiamo che la matrice A associata a B è

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3/2 \\ 3/2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Riguardo al cambiamento di base, come per le forme bilineari abbiamo che se A_Q è la matrice associata ad una forma quadratica Q, cioè

$$Q(v) := v^\intercal A_q v$$

abbiamo di nuovo che cambiando la base con una matrice H la matrice A cambia come

$$A' = H^\intercal A H$$

esattamente come per le forme bilineari. Dato allora che per cambi di base il determinante della matrice A cambia come

$$\det A' = (\det H)^2 \det A$$

questo motiva la seguente definizione:

Definizione 4.6 (Discriminante)**.** Data una forma quadratica Q il suo *discriminante* è la classe di equivalenza del determinante della matrice associata $M_{\mathcal{V}}(Q)$ in una qualunque base $\mathcal{V}$ nell'insieme $\mathbb{K}/\sim$ quozientato con la relazione di equivalenza

$$a \sim b \iff a = \lambda^2 b$$

per qualche $\lambda \in \mathbb{K}$.

Esempio 4.7 (Diagonalizzazione)
Se Q è una forma quadratica su V di dimensione finita allora esiste sempre una base diagonalizzante $(v_1, \dots, v_n)$ di V e rispetto a tale base si ha

$$Q(x_1v_1 + \cdots + x_nv_n) = \sum_{i=1}^{n} a_i x_i^2$$

e quindi il discriminante è semplicemente la classe di equivalenza del prodotto di tutti gli a_i.

§4.1 Quadriche proiettive e spazi tangenti

Per le forme bilineari avevamo visto che possiamo interpretare geometricamente il loro significato attraverso il loro cono d'isotropia. Per una forma quadratica invece possiamo definire

Definizione 4.8 (Quadrica)**.** Sia V uno spazio vettoriale di dimensione finita. Una *quadrica proiettiva* in $\mathbb{P}(V)$ è una classe di proporzionalità di una forma quadratica su V. Un particolare rappresentante di questa classe di equivalenza è detta *equazione della quadrica*. Il *supporto* di una quadrica $[Q]$ è il sottoinsieme di $\mathbb{P}(V)$ tale che

$$\operatorname{supp}[Q] = \{[v] \in \mathbb{P}(V) : Q(v) = 0\}$$

che chiaramente non dipende dalla scelta di $Q(v)$. Insomma il supporto non è altro che la proiettivizzazione del cono isotropo della forma polare di Q.

Come avevamo fatto nel caso vettoriale, nel caso proiettivo le quadriche sono in biezione con i polinomi omogenei nelle variabili $x_0, \dots, x_n$, ovvero le coordinate omogenee di $\mathbb{P}^n$. Dunque data una quadrica

$$F(v) := \sum_{i=0}^{n} a_{ii} x_i^2 + \sum a_{ij} x_i x_j$$

il suo supporto è l'insieme dei $v \in \mathbb{P}(V)$ tali che

$$0 = \sum_{i=0}^{n} a_{ii} x_i^2 + \sum a_{ij} x_i x_j.$$

Osservazione 4.9. Le quadriche in $\mathbb{P}(V)$ sono esattamente gli elementi

$$\mathbb{P}(\operatorname{Symm}_{\mathbb{K}}(V)).$$

Molte proprietà che avevamo definito e studiato sulle forme bilineari restano invariate quando si parla di quadriche. Per esempio la degenerazione o il rango. Quello che tuttavia cambia è il concetto di segnatura, che non è ben definita infatti $\langle \cdot, \cdot \rangle_{p,q}$ e $\langle \cdot, \cdot \rangle_{q,p}$ hanno la stessa quadrica. Per questo definiamo

Definizione 4.10 (Indice)**.** Data una quadrica $[Q]$ il suo *indice* è il valore

$$\operatorname{ind}[Q] := \{\min\{p, q\} : (p, q) \text{ è la segnatura di una } P \in [Q]\}.$$

Perché distinguere una quadrica dal suo supporto allora se quello che ci interessa è il suo significato geometrico? Perché in effetti ci sono quadriche non banali a supporto vuoto, per esempio

$$B(x,y) = x_0^2 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$$

che ha supporto proiettivo vuoto. Questo è un problema che si risolve lavorando su campi algebricamente chiusi, come $\mathbb{C}$.

Esempio 4.11 (Quadriche in $\mathbb{P}^1$)

Per ogni campo $\mathbb{K}$ una generica quadrica di $\mathbb{P}^1_{\mathbb{K}} := \mathbb{P}(\mathbb{K}^2)$ ha equazione

$$Q\left(\begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x_0 & x_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \end{pmatrix}$$

dividiamo in casi allora in base al rango della matrice A di Q:

Rango 1: Se il rango di A è 1 abbiamo che

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

oppure

$$A = \begin{pmatrix} 1 & t \\ t & t^2 \end{pmatrix}$$

ricordandoci che A ha coefficienti in $\mathbb{P}^1_{\mathbb{K}}$. Nel primo caso abbiamo che l'equazione è semplicemente

$$x_1^2 = 0$$

e quindi l'unico punto della quadrica è $[1:0]$. Nel secondo caso abbiamo che l'equazione è

$$x_0^2 + 2tx_0 + t^2x_1^2 = 0$$

cioè

$$(x_0 + tx_1)^2 = 0$$

e anche qui abbiamo che l'unico punto del supporto è $[-t:1]$.

Rango 2: Se la matrice ha rango 2 abbiamo

$$b^2 - ac \neq 0$$

e il supporto ha equazione

$$ax_0^2 + 2bx_0x_1 + cx_1^2 = 0$$

ma dividendo da entrambi i lati per x_0^2 abbiamo che questa ha discriminante

$$\frac{\Delta}{4} = b^2 - ac = -\det A \neq 0$$

se esiste un $t \in \mathbb{K}$ tale che $t^2 = \Delta$ l'equazione ha due soluzioni per x_0/x_1, e quindi abbiamo che il supporto è costituito esattamente da due punti. In caso contrario, se Δ non è un quadrato abbiamo che il supporto è vuoto.

E come abbiamo detto questo mostra che il supporto può essere vuoto. Un'altra cosa che mostra questo è esempio è il fatto che l'intersezione tra un a retta e il supporto di una quadrica può avere 0, 1 o 2 punti, oppure può essere l'intera retta.

Osservazione 4.12. Data una quadrica Q di forma polare B, presa una retta $\ell = \mathbb{P}(W)$ tale che

$$\text{supp}Q \cap \ell = \ell$$

allora abbiamo che W è totalmente isotropo per la forma polare B.

Questo ci porta ad una classificazione della posizione di una retta rispetto ad una certa quadrica:

Definizione 4.13 (Retta tangente ad una quadrica)**.** Data una quadrica $\mathcal{Q} = [Q]$ in $\mathbb{P}(V)$ di forma polare B e una retta $\ell = \mathbb{P}(W)$ diremo che La retta ℓ è *tangente* a Q se l'intersezione

$$\text{supp}Q \cap \ell$$

consta di un solo punto, o se è l'intera retta ℓ.

Definizione 4.14 (Intersezione tra una quadrica e un sottospazio)**.** Se $Q = [Q]$ è una quadrica in $\mathbb{P}(V)$ allora per ogni sottospazio $W \leq V$ che non sia totalmente isotropo per la forma polare B definiamo l'*intersezione* tra la quadrica Q e $\mathbb{P}(W)$ come la quadrica di equazione $Q_{|W}$ (che non è tutto lo spazio dato che W non è totalmente isotropo).

Osservazione 4.15. Il supporto dell'intersezione tra Q e $\mathbb{P}(W)$ è semplicemente

$$\text{supp}(Q_{|W}) = \text{supp}(Q) \cap \mathbb{P}(W).$$

Definizione 4.16 (Tangenza tra spazio e quadrica)**.** Il sottospazio proiettivo $\Lambda := \mathbb{P}(W)$ si dice *tangente* alla quadrica $Q = [Q]$ su $\mathbb{P}(W)$ se $Q_{|W}$ è una forma quadratica degenere su W. In tal caso diremo che Λ è tangente a Q in tutti i punti $p \in \text{supp}[Q] \cap \mathbb{P}(W)$.

METTI DIAGRAMMA CON ELLISSE IN $\mathbb{P}^2$ E RETTA TANGENTE.

Esempio 4.17 (Quadriche in $\mathbb{P}^3$)

In $\mathbb{P}^3_{\mathbb{R}}$ consideriamo la forma di equazione

$$Q = x_0^2 - x_1^2 - x_2^2 - x_3^2$$

consideriamo allora sulla carta affine $\mathcal{U}_0 = \{x_0 \neq 0\}$ abbiamo che il supporto di Q è costituito dai punti tali che

$$0 = Q([1, t_1, t_2, t_3]) = 1 - t_1^2 - t_2^2 - t_3^2$$

cioè è una sfera! In questo caso per ogni punto, l'unione delle rette tangenti a Q in quel punto forma proprio **un piano**.

Definizione 4.18 (Spazio tangente ad una quadrica e punti singolari)**.** Se $\mathcal{Q} = [Q]$ è una quadrica in $\mathbb{P}(V)$ di dimensione n, dato un $p = [v] \in \text{supp}\mathcal{Q}$ allora definiamo il *sottospazio proiettivo tangente* a Q in p come

$$\mathbb{T}_p\mathcal{Q} := \mathbb{P}(v^\perp) \subseteq \mathbb{P}(V)$$

questo se $v \notin \operatorname{Ker}(Q)$ è uno spazio proiettivo di dimensione $n-1$, e quindi è l'*iperpiano tangente* a $\mathcal{Q}$ in p, in questo caso diremo che p è un *punto regolare*. Questo succede se tutti i punti di $\mathcal{Q}$ non appartengono anche al kernel di $\mathcal{Q}$, ovvero se Q è non degenere. D'altra parte se abbiamo $v \in \operatorname{Ker}(Q)$ abbiamo che tutti i punti di $\mathbb{P}(V)$ appartengono allo spazio tangente, e quindi diremo che p è un *punto singolare*.

§4.2 Classificazione delle quadriche

Come fatto finora quindi il nostro obbiettivo sarà classificare le quadriche, in modo da avere un insieme finito di modelli di quadriche, a cui ricondurci in ogni caso. La prima cosa che ci chiediamo è cosa succeda ad una quadrica sotto proiettività. Data una $\varphi : V \to V'$ un isomorfismo di spazi vettoriali, allora φ definisce canonicamente una trasformazione proiettiva

$$F = F(\varphi) : \mathbb{P}(V) \to \mathbb{P}(V')$$

data quindi una quadrica $\mathcal{Q}$ la sua immagine rispetto alla proiettività F è la quadrica $F(\mathcal{Q})$, di equazione

$$F(Q) := (Q \circ \varphi^{-1})(v) = 0$$

infatti questa è la quadrica che soddisfa

$$F(Q)\left(\varphi(v)\right) = 0 \iff Q(v) = 0$$

cioè è la quadrica che contiene i punti del supporto di $\mathcal{Q}$ mandati tramite φ a V'. Scriviamolo bene:

Definizione 4.19 (Quadrica immagine)**.** Data una quadrica $\mathcal{Q}$ su $\mathbb{P}(V)$ e un isomorfismo $\varphi : V \to V'$ definiamo la *quadrica immagine* di $\mathcal{Q}$ rispetto a φ come

$$F(\mathcal{Q}) := [Q \circ \varphi^{-1}]$$

due quadriche tali che esista un isomorfismo proiettivo che mandi una nell'altra si dicono isomorfe.

Osservazione 4.20. Per come abbiamo definito quindi la quadrica immagine abbiamo

$$\operatorname{supp}\left(F\left(\mathcal{Q}\right)\right) = F\left(\operatorname{supp}(\mathcal{Q})\right).$$

Definizione 4.21 (Ipersuperficie)**.** Data una quadrica non degenere $\mathcal{Q}$ in $\mathbb{P}^n$ gli elementi del suo supporto sono un esempio di *ipersuperficie (proiettiva)*. In generale qualunque insieme di punti caratterizzato da una sola equazione verrà detto ipersuperficie.

Consideriamo allora una proiettività indotta da una mappa lineare $\varphi : \mathbb{K}^{n+1} \to \mathbb{K}^{n+1}$. Se $\mathcal{Q}$ è una quadrica di matrice A vogliamo capire come cambia la matrice di A quando applichiamo la proiettività indotta da φ. D'altra parte se φ ha matrice H abbiamo che la trasformazione è

$$X \mapsto HY$$

e quindi i punti del supporto diventano nell'immagine

$$0 = X^\intercal A X = \left(H^{-1}Y\right)^\intercal A\left(HY\right) = Y^\intercal \left[\left(H^{-1}\right)^\intercal A H^{-1}\right] Y$$

che conferma quello che sapevamo già dalle forme bilineari. Questo vuol dire che essenzialmente la trasformazione che stiamo facendo è una congruenza, e quindi possiamo evocare il teorema di sylvester per mostrare che

Teorema 4.22 (Teorema di classificazione delle quadriche complesse)

Due quadriche complesse $\mathcal{Q}$ e $\mathcal{Q}'$ di $\mathbb{P}^n$ sono isomorfe se e solo se hanno lo stesso rango. In particolare quindi ogni quadrica di $\mathbb{P}^n$ è isomorfa alla quadrica diagonalizzata di equazione

$$x_0^2 + x_1^2 + \cdots + x_{r-1}^2 = 0$$

dove r è il rango della quadrica considerata. Dunque in $\mathbb{P}^n_{\mathbb{C}}$ ci sono $n+1$ tipi di quadriche non isomorfe.

Dimostrazione. Due quadriche di matrici A e A' in $\mathbb{P}^n$ sono isomorfe se e solo se esiste un $\lambda \in \mathbb{K}$, con $\lambda \neq 0$ tale che A è congruente a $\lambda A'$. Dato che su $\mathbb{C}$ tutti i numeri sono quadrati abbiamo che λ è sicuramente scrivibile come

$$\lambda = \alpha^2$$

per qualche $\alpha \in \mathbb{C}$, allora abbiamo che

$$\lambda A' = (\alpha I)^\intercal A' (\alpha I)$$

e dunque ci basta mostrare che A e A' sono congruenti, e questo segue da Sylvester. □

Abbiamo già visto che in $\mathbb{P}^1$ le quadriche complesse possibili erano quella vuota, quella con un solo punto e quella con due punti. D'altra parte in dimensione 3 abbiamo già 3 casi: una retta singola, due rette che si intersecano o una circonferenza. In dimensione 4 abbiamo ancora più possibilità. Su $\mathbb{R}$ abbiamo lo stesso identico risultato che avevamo per sylvester:

Teorema 4.23 (Teorema di classificazione delle quadriche reali)

Su $\mathbb{R}$ due quadriche in $\mathbb{P}^n$ sono isomorfe se e solo se hanno segnatura uguale a meno dell'ordine (dunque se hanno stesso rango e stesso indice).

Dimostrazione. Esattamente come sylvester. □

Questo implica che il numero di quadriche in $\mathbb{P}^n_{\mathbb{R}}$ a meno di isomorfismo sono

$$\left\lfloor \frac{n(n+1)}{2} \right\rfloor + 1$$

e sono tante quindi. In dimensione 2 le quadriche sono solitamente note come *coniche*.
METTI DISEGNO CON QUADRICHE REALI E COMPLESSE IN DIMENSIONE 2 E 3
Si può dimostrare che due quadriche reali con abbastanza punti (quindi per esempio, che non sono vuote o costituite solo da un punto) con lo stesso supporto devono necessariamente coincidere. In $\mathbb{C}$ invece questo è vero indipendentemente da tutto: due quadriche complesse con lo stesso supporto sono sempre uguali.

Proposizione 4.24 (Caratterizzazione dei punti singolari)

Sia $\mathcal{Q}$ una quadrica di equazione $Q \in \mathrm{Quad}_{\mathbb{K}}(V)$. Allora i punti singolari di $\mathcal{Q}$, data la sua forma polare B, e una base $\mathcal{V}$, sono esattamente i punti dell'insieme

$$\mathrm{Ker}\,(B) = \left\{x \in \mathbb{K}^{n+1} : \nabla Q(x) = 0\right\}$$

dove Q è da intendersi come l'equazione $Q(x_1, \dots, x_n)$ rispetto alla base $\mathcal{V}$.

Dimostrazione. Sia A la matrice di B nella base $\mathcal{V}$. L'equazione di $\mathcal{Q}$ in questa base è

$$Q(x_0 v_0 + \cdots + x_n v_n) = \sum_{i,j} a_{ij} x_i x_j$$

quindi derivando e imponendo il gradiente nullo otteniamo

$$\begin{cases} 2\sum_{j=1}^{n} a_{1j} x_j = 0 \\ 2\sum_{j=1}^{n} a_{2j} x_j = 0 \\ \vdots \\ 2\sum_{j=1}^{n} a_{nj} x_j = 0 \end{cases}$$

cioè proprio $2Ax = 0$, che è l'insieme che volevamo. □

Decomponiamo allora

$$V = \mathrm{Ker}\,(B) \oplus W$$

con W un certo complementare di B.

Definizione 4.25 (Cono Proiettivo)**.** Dati due spazi W e U il *cono proiettivo* di base U e vertice W è l'insieme delle rette $P \vee P'$, con $P \in \mathbb{P}(U)$ e $P' \in \mathbb{P}(W)$.

Proposizione 4.26 (Ricondursi a quadriche non degeneri)

Consideriamo una quadrica degenere $\mathcal{Q}$, la cui forma polare B ha kernel L. Sia W un complementare di L, ovvero uno spazio tale che

$$L \oplus W = V$$

Allora il supporto di $\mathcal{Q}$ è il cono di vertice L e base il supporto di $Q_{|W}$.

Dimostrazione. Sia $p = [v]$ con $v \in V$ e $v \neq 0$ allora chiaramente possiamo scrivere

$$v = u + w$$

con $u \in L$ e $w \in W$. Allora abbiamo

$$Q(v) = Q(u + w) = Q(u) + Q(w) + 2B(u, w) = Q(w)$$

quindi $p = [v]$ sta nel supporto di $\mathcal{Q}$ se e solo se w sta nel supporto di $Q_{|W}$, il che era la tesi. □

Questo spiega un fenomeno interessante che si poteva notare elencando le quadriche in dimensioni 1, 2 e 3, ovvero che se la quadrica era degenere potevamo sempre trovare uno spazio W tale che, se intersecavamo la quadrica con essa trovavamo una quadrica non degenere in dimensione minore! Insomma le quadriche non degeneri in qualche senso sono le quadriche irriducibili, la cui forma non abbiamo ancora incontrato in dimensioni inferiori.

Esempio 4.27 (Quadriche degeneri tangenti ad una quadrica non degenere)
Prendiamo una quadrica non degenere $\mathcal{Q}$. Preso un punto regolare p su di essa, se definiamo

$$H := \mathbb{T}_p\mathcal{Q}$$

allora $H \cap \mathcal{Q}$ è una quadrica degenere in H (per definizione) e il suo luogo singolare è

$$\operatorname{Ker}(B)_{|H} = H \cap H^{\perp} = \langle v \rangle.$$

Insomma il punto singolare è precisamente il punto di tangenza!

§4.3 Fasci di quadriche

Siamo ora interessati a studiare la struttura di spazio vettoriale delle quadriche. Ricordando che lo spazio proiettivo delle quadriche ha dimensione

$$\frac{(n+1)(n+2)}{2} - 1 = \frac{n^2+3n}{2}.$$

Lemma 4.28 (Fascio di quadriche generato da un punto)
Preso un $p = [v] \in \mathbb{P}(V)$, il seguente insieme

$$H(p) = \{q \in \mathbb{P}(\operatorname{Quad}_{\mathbb{K}}(V)) : p \in \operatorname{supp} q\}$$

è un iperpiano nello spazio delle quadriche.

Dimostrazione. Dimostriamo prima di tutto che questo □

§4.4 Polarità

Abbiamo visto che ad ogni forma quadratica potevamo associare una forma bilineare simmetrica, detta la *forma polare* della quadratica di formula

$$B(v,w) := \frac{Q(v+w) - Q(v) - Q(w)}{2}$$

abbiamo anche già visto che ogni forma bilineare non degenere si può vedere come un isomorfismo da V a V^* tramite l'applicazione B_1. Cosa significa questa trasformazione geometricamente?
Ricordando che $\mathbb{P}(V^*)$ è lo spazio proiettivo duale, formato dagli iperpiani di $\mathbb{P}(V)$, ovvero se $[\varphi] \in \mathbb{P}(V^*)$ abbiamo che

$$H_\varphi := \{v \in V : \varphi(v) = 0\}$$

è un iperpiano di V, e in particolare $\mathbb{P}(H_\varphi)$ è un iperpiano proiettivo.

Definizione 4.29 (Polarità associata a una quadrica)**.** Prendiamo un campo $\text{char } \mathbb{K} \neq 2$ e una quadrica $q \in \mathbb{P}(V)$ con V su $\mathbb{K}$ di dimensione $n+1$. Allora q avrà un'equazione Q una certa forma quadratica su V. Per ogni $p = [v]$ e $\mathbb{P}(V)$ l'iperpiano

$$p^{\perp} := [B_1(v)] \in \mathbb{P}(V^*)$$

è detto *l'iperpiano polare di p rispetto alla quadrica.*

Questa è una generalizzazione naturale del concetto di spazio tangente, infatti nel caso che $p \in \text{supp}q$ abbiamo che $p^{\perp} \in \mathbb{P}(V^*)$ è associato allo spazio tangente a q in $\mathbb{P}(V)$ (che è un iperpiano di $\mathbb{P}(V)$ appunto, e quindi è associato al punto $p^{\perp}$ di $\mathbb{P}(V^*)$).

Definizione 4.30 (Coniugazione rispetto ad una quadrica)**.** Siano p e p' punti di $\mathbb{P}(V)$ e q una forma quadratica in $\mathbb{P}(V)$. Allora diciamo che p e p' sono *coniugati* rispetto a q e scriviamo $p \perp_q p'$ se

$$B(v, w) = 0$$

dove $[v] = p$, $[w] = p'$ e B è la forma polare di un'equazione di q.

Dato che la relazione di coniugio rispetto ad una quadrica è essenzialmente un caso particolare dell'ortogonalità ne eredita tutte le proprietà (simmetria, inversione del reticolo...). Analogamente possiamo definire per un arbitrario $S \subseteq \mathbb{P}(V)$ il suo coniugato $S^{\perp_q}$ rispetto ad una quadrica q, nel modo chiaro. Questo operatore ha le stesse identiche proprietà di quello di perpendicolarità.


Definizione 4.31 (Sottospazio polare e Polo)**.** Per ogni $\Lambda \leq \mathbb{P}(V)$ e quadrica q su $\mathbb{P}(V)$ l'insieme $\Lambda^{\perp}$ è detto il *sottospazio polare* di Λ. Come per i punti diremo che Λ e il suo polare sono *coniugati*. Se $\Lambda^{\perp}$ è un singolo punto allora questo verrà chiamato il *polo* di Λ.

Esempio 4.32 (Forma quadratica standard)
Su $V = \mathbb{R}^{n+1}$ possiamo considerare la quadrica standard

$$q = \left[x_0^2 + \cdots + x_n^2\right]$$

allora la polarità rispetto a q è esattamente l'ortogonalità rispetto al prodotto scalare standard.

Il fatto che $\perp$ inverta i reticoli ci permette di capire geometricamente cosa vuol dire prendere la polare. Sappiamo che se p appartiene al supporto di q la sua polare è semplicemente lo spazio tangente, per esempio in dimensione 2 abbiamo



E in generale prendendo un po' di tangenti siamo in grado di trovare la polare di qualunque punto rispetto a qualunque conica. Allo stesso modo possiamo calcolare i poli di qualunque retta rispetto a qualunque conica. In dimensione 1 per calcolare i poli dobbiamo ricorrere a un po' di birapporti:

Fatto 4.33. Lo spazio polare $A^\perp$ a qualunque sottospazio $A \leq B \leq \mathbb{P}(V)$ rispetto a q, ristretto a B ovvero

$$A^\perp \cap B$$

è il polare di A rispetto a q ristretta a B, ovvero $q_{|B}$.

§4.4.1 Quadrica duale

Un'applicazione della dualità è la costruzione della cosiddetta quadrica duale. Consideriamo $\perp$ la polarità rispetto ad una certa quadrica q, allora la seguente trasformazione

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{P}(V) &\to \mathbb{P}(V^*) \\ p &\mapsto p^\perp \end{aligned}$$

dall'insieme dei punti all'insieme dei "piani" è una trasformazione proiettiva in quanto in coordinate semplicemente manda

$$X \mapsto AX$$

dove A è la matrice di B_1. Cosa succede se restringiamo questa applicazione al supporto di q? Dato che p appartiene al supporto di q se e solo se $p = [X]$ in coordinate soddisfa

$$X^\intercal AX = 0$$

per qualche scelta della matrice A di q. Ma dato che $\varphi(p)$ in coordinate è semplicemente

$$Y = AX$$

sostituendo $X = A^{-1}Y$ nella condizione per X troviamo la condizione per X:

$$(A^{-1}Y)^\intercal Y = 0$$

cioè

$$Y^\intercal A^{-1} Y = 0$$

e quindi l'immagine è di nuovo una quadrica, ma è associata questa volta all'inversa della matrice di q! Se denotiamo con Q^* allora la quadrica con supporto $\varphi(\text{supp}(Q))$ abbiamo appena scoperto che

$$M_{\mathcal{V}}(Q) = A \implies M_{\mathcal{V}^*}(Q^*) = A^{-1}$$

dove $\mathcal{V}^*$ è la base duale a $\mathcal{V}$. Questa costruzione può essere estesa anche al caso in cui A non sia invertibile (ovvero quando q è degenere) usando la matrice dei cofattori al posto della matrice inversa (che esiste quasi sempre, tranne quando tutti i cofattori sono 0)[2].

Definizione 4.34 (Quadrica inviluppo)**.** Le quadriche nello spazio duale $\mathbb{P}(V^*)$ sono dette *quadriche inviluppo*. Per una quadrica non degenere q in $\mathbb{P}(V)$ la quadrica $q^* = [Q^*]$ definita sopra è detta *quadrica duale* di Q.

Il problema che dobbiamo risolvere in realtà è che $\mathbb{P}(V)$ e $\mathbb{P}(V^*)$ non sono nello stesso spazio. D'altra parte fissando una forma bilineare non degenere B abbiamo un isomorfismo B_1 da V a V^*, e quindi

$$\mathbb{P}(V) \longrightarrow \mathbb{P}(V^*) \xrightarrow{B_1^{-1}} \mathbb{P}(V)$$

$$q \longmapsto q^* \longmapsto q'$$

$$A \longmapsto A^{-1} \longmapsto \tilde{A}A^{-1}\tilde{A}.$$

[2]Non ho davvero capito questa cosa, se riesci a rivederla bene, altrimenti mi sembra abbastanza opzionale.

§5 Quadriche affini ed euclidee

Le quadriche proiettive sono semplici, quelle affini ed euclidee sono molto più brutte:

Definizione 5.1 (Quadrica affine)**.** Una *quadrica affine* in $\mathbb{A}^n_{\mathbb{K}}$ è la classe di proporzionalità di un polinomio di grado 2 nelle coordinate $x_1, \dots, x_n$ di $\mathbb{A}^n_{\mathbb{K}}$.
Se $q = [Q]$ è una quadrica affine allora Q è detta *equazione* di q e il suo *supporto* è costituito dal sottoinsieme di $\mathbb{A}^n_{\mathbb{K}}$ definito dall'annullamento di Q.

Esempio 5.2
In $\mathbb{A}^2$ possiamo definire la quadrica

$$Q\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1^2 + x_2^2 - 1$$

e se $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ abbiamo che il suo supporto è la circonferenza di raggio 1.

Esempio 5.3 (Sfera unitaria)
Sullo spazio affine euclideo $\mathbb{E}$ la *sfera di centro P e raggio r* è il seguente insieme

$$S(P, r) = \left\{ X \in A : ||X - P|| = r^2 \right\}$$

e questo è il supporto di una quadrica euclidea.

Consideriamo ora $\mathbb{P}^n$ e una quadrica proiettiva q al suo interno. Dato che sappiamo che $\mathbb{P}^n$ è ricoperto da carte affini in particolare se consideriamo l'iperpiano di equazione

$$H_\infty := \{x_0 = 0\}$$

ovvero idealmente l'iperpiano all'infinito dello spazio proiettivo $\mathbb{P}^n$, abbiamo la carta

$$\begin{aligned} U_0 : \mathbb{P}^n &\to \mathbb{A}^n \\ (x_0 : x_1 : \cdots : x_n) &\mapsto (1, x_1, \dots, x_n) \end{aligned}$$

come non ci stupisce. La parte originale arriva considerando l'equazione Q di q, e vedendo cosa succede se la intersechiamo con U_0, ovvero se gli rimuoviamo i punti all'infinito. Essenzialmente i punti del supporto di q prima erano quelli che soddisfacevano

$$0 = Q = \sum_{0 \le i,j \le n} Q_{ij} X_i X_j$$

ma allora **deomogeneizzando** (ovvero sostituendo il vincolo $x_0 = 1$) troviamo l'equazione di una quadrica affine, infatti la quadrica proiettiva era un polinomio **omogeneo** di grado n, mentre la quadrica deomogeneizzata sarà un polinomio completo di grado n.

Definizione 5.4 (Quadrica immagine e isomorfismo tra quadriche)**.** Se $f : \mathbb{A} \to \mathbb{A}'$ è un isomorfismo affine allora la *quadrica immagine* di una quadrica affine Q è la quadrica di supporto

$$Q^* = Q \circ f^{-1}.$$

Due quadriche affini quindi si dicono *isomorfe* se un isomorfismo affine manda il supporto di una nel supporto dell'altra.

Il nostro obbiettivo come sempre sarà classificare le quadriche, ovvero trovare un ristretto insieme di quadriche per cui tutte le altre quadriche siano isomorfe ad almeno un elemento di questo insieme. Cominciamo scomponendo l'equazione della nostra quadrica affine in 3 pezzi

$$Q(\mathbf{x}) = Q_2(\mathbf{x}) + Q_1(\mathbf{x}) + Q_0$$

dove Q_2 è un polinomio omogeneo di grado 2, Q_1 è un polinomio omogeneo di grado 1 e Q_0 un polinomio omogeneo di grado 0. Di nuovo nell'ottica della deomogeneizzazione di prima, se $[Q]$ è la deomogeneizzata di una quadrica proiettiva q di matrice A, nella carta affine U_0 avremo che l'equazione Q di $[Q]$ si scrive come

$$Q = \left(\begin{array}{c|c} 1 & \mathbf{x}^\intercal \end{array}\right) A \begin{pmatrix} 1 \\ \hline \mathbf{x} \end{pmatrix}$$

e notiamo che (ricordando che A è simmetrica) se scriviamo A come

$$A = \left(\begin{array}{c|c} a_{00} & v^\intercal \\ \hline v & B \end{array}\right)$$

abbiamo che

$$\begin{aligned} Q_2 &= \mathbf{x}^\intercal B \mathbf{x} \\ Q_1 &= \mathbf{x}^\intercal v + v^\intercal \mathbf{x} = 2\mathbf{x}^\intercal v \\ Q_0 &= a_{00} \end{aligned}$$

questa discussione motiva:

Proposizione 5.5 (Da quadriche proiettive ad affini e viceversa)
Esiste una biezione tra le quadriche affini su $\mathbb{A}^n$ e le quadriche proiettive su $\mathbb{P}^n$ definita dalla mappa di omogeneizzazione e deomogeneizzazione.

Definizione 5.6 (Rango di una quadrica affine)**.** Data una quadrica affine $[Q]$ definiamo il suo *rango* come il rango della quadrica proiettiva omogeneizzata di $[Q]$. Diremo che $[Q]$ è *degenere* se è degenere la sua omogeneizzata.

Ricordando che abbiamo il ricoprimento affine di $\mathbb{P}^n$ come

$$\mathbb{P}^n = \mathbb{A}^n \cup \mathbb{A}^{n-1} \cup \cdots \cup \mathbb{A}^0$$

abbiamo che

$$\mathbb{P}^n = \mathbb{A}^n \cup \mathbb{P}^{n-1}$$

dove i $\mathbb{P}^{n-1}$ sono i punti all'infinito, come sappiamo bene. Allora con questo concetto alle spalle possiamo definire:

Definizione 5.7 (Quadrica all'infinito)**.** Data una quadrica affine Q in $\mathbb{A}^n$ e un iperpiano $H_\infty \leq \mathbb{P}^n$ se $\tilde{Q}$ è la quadrica proiettiva omogeneizzata di Q definiamo la *quadrica all'infinito* come la deomogeneizzazione della quadrica proiettiva

$$\tilde{Q} \cap H_\infty.$$

Questi sono i "punti all'infinito" della nostra quadrica affine.

Se in una base di $\mathbb{P}^n$ in cui gli ultimi n vettori appartengono ad H_∞ la matrice A della quadrica affine si scrive come

$$A = \left(\begin{array}{c|c} a_{00} & v^\intercal \\ \hline v & B \end{array}\right)$$

B è la matrice della quadrica all'infinito. Gli invarianti su cui lavoreremo allora sono 2, il rango della matrice A (quindi il rango della quadrica affine) e il rango della matrice B (il rango della quadrica all'infinito).

§5.1 Forma canonica di quadriche affini

Prendiamo una quadrica affine $[Q]$ di matrice A e quadrica all'infinito di matrice B. Vogliamo scegliere un sistema di riferimento in cui la quadrica Q assuma una forma particolarmente semplice, e per fare ciò cominciamo scegliendo n vettori in $\mathbb{R}^n$ tali che siano una base B-ortogonale. In questo modo la matrice A diventa

$$A = \left(\begin{array}{c|cccc} k & \multicolumn{4}{c}{v^\intercal} \\ \hline & b_1 & 0 & \dots & 0 \\ & 0 & b_2 & \dots & 0 \\ v & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ & 0 & 0 & \dots & b_n \end{array}\right)$$

in questo modo l'equazione di $[Q]$ diventa

$$Q = k + 2v^\intercal \mathbf{x} + \sum_{i=1}^{n} b_i x_i^2.$$

Rimane da decidere l'origine, la scelta evidentemente più conveniente è quella che annulla tutti i termini lineari ovvero l'origine dopo la traslazione

$$x_i \mapsto x_i - \frac{2a_i}{b_i^2}$$

questo presuppone che $b_i \neq 0$ in realtà, quindi quello che faremo sarà cancellare i termini lineari solo per i termini con $b_i \neq 0$. Questo ci porta alla classificazione di tutte le quadriche affini:

1. Se possiamo cancellare tutti i termini lineari e $k = 0$ abbiamo

   $$Q = \sum_{i=1}^{r} a_i x_i^2$$

   dove r è il rango di B.

2. Se possiamo cancellare tutti i termini lineari e $k \neq 0$ abbiamo

   $$Q = 1 + \sum_{i=1}^{r} a_i x_i^2$$

   dove ancora r è il rango di B.

3. Se non riusciamo a cancellare tutti i termini lineari e $r < n$ possiamo compattare tutti i termini lineari (tramite un'opportuna trasformazione) nell'ultima coordinata, ottenendo

   $$Q = \sum_{i=1}^{r} a_i x_i^2 + 2x_n.$$

Se assumiamo anche che il campo su cui lavoriamo sia algebricamente chiuso (ovvero nello specifico $\mathbb{K} = \mathbb{C}$) possiamo anche ignorare tutti gli a_i e assumere che siano 1 (sempre per Sylvester).

Proposizione 5.8 (Classificazione reale delle quadriche affini)

Se $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ogni quadrica affine è isomorfa tramite affinità a una delle quadriche seguenti:

1. Nel primo caso, con una matrice B di segnatura (p, q) abbiamo
$$Q = \sum_{i=1}^{p} x_i^2 - \sum_{i=p+1}^{r} x_i^2$$
dove di nuovo r è il rango.
2. Nel secondo caso, con una matrice B di segnatura (p, q) abbiamo
$$Q = \sum_{i=1}^{p} x_i^2 - \sum_{i=p+1}^{r} x_i^2 + 1.$$
3. Nel terzo caso, con una matrice B di segnatura (p, q) abbiamo
$$Q = \sum_{i=1}^{p} x_i^2 - \sum_{i=p+1}^{r} x_i^2 + 2x_n$$
dove quest'ultimo caso si verifica se e solo se $r < n$ ovvero $p + q < n$.

§5.2 Parametrizzazione di coniche

Prendiamo una *conica* q definita su $\mathbb{P}^2$, con supporto non vuoto, e un p appartenente a tale supporto. Consideriamo allora una retta l che non passi per p, e prendiamo la proiezione
$$\pi_l^p : \mathbb{P}^2 \setminus \{p\} \to l \cong \mathbb{P}^1$$
questa sappiamo geometricamente come agisce, ovvero ogni $p' \in \text{supp}(q)$ viene mandato nell'intersezione tra la retta $p \vee p'$ e la retta l:
$$p' \mapsto (p \vee p') \wedge l.$$
Normalmente non potremmo davvero scegliere un'immagine per p', tuttavia se consideriamo la proiezione π (sopprimiamo indici e pedici, dando per scontato che sia chiaro che sia la proiezione su l lungo p) e la restringiamo al supporto della conica $\text{supp}(q)$, c'è un punto che ci verrebbe da associare naturalmente a p, ovvero l'intersezione
$$p \mapsto p^\perp \wedge l$$
dove $p^\perp$ è la polare di p.
Facciamo un conto esplicito per convincerci che ciò sia possibile, prendiamo una conica proiettiva in $\mathbb{C}$ non degenere, allora questa sarà WLOG isomorfa a
$$Q = x_0 x_1 - x_2^2$$

allo stesso modo WLOG possiamo assumere che $p = [1 : 0 : 0]$ e che

$$l : x_0 = 0$$

allora la polare di p è

$$\mathbb{T}_p q : x_1 = 0$$

e quindi l'intersezione tra l e questa polare è

$$\mathbb{T}_p q \wedge l = [0 : 0 : 1].$$

D'altra parte la mappa $\pi : \text{supp}(q) \to \mathbb{P}^1$ è

$$[x_0 : x_1 : x_2] \mapsto \begin{cases} [x_1 : x_2] & \text{se } (x_1, x_2) \neq (0,0) \\ [x_2 : x_0] & \text{se } (x_2, x_0) \neq (0,0) \end{cases}$$

restringiamo allora questa mappa al supporto. I punti del supporto hanno la forma

$$[x_0 : x_1 : x_2] = [x_0 x_1 : x_1^2 : x_2 x_1] = [x_2^2 : x_1^2 : x_1 x_2]$$

e quindi la mappa che abbiamo definito manda

$$[x_2^2 : x_1^2 : x_1 x_2] \mapsto \begin{cases} [x_1^2 : x_1 x_2] & \text{se } (x_1^2, x_1 x_2) \neq (0,0) \\ [x_1 x_2 : x_2^2] & \text{se } (x_1 x_2, x_2^2) \neq (0,0) \end{cases}$$

che è evidentemente biettiva, e la verifica è lasciata al lettore (METTI UN DISEGNO CON TUTTE LE FORME DI QUADRICHE AFFINI).

§5.3 Quadriche euclidee

Le quadriche euclidee non hanno davvero niente di diverso da quelle affini, eccetto che **il concetto di isomorfismo non è definito tramite affinità, ma tramite rigidità**. Si può mostrare che una quadrica non degenere euclidea è sempre scrivibile in una delle seguenti forme:

$$Q = \sum_{i=1}^{p} a_i x_i^2 - \sum_{i=p+1}^{n} a_i x_i^2 + 1$$

oppure

$$Q = \sum_{i=1}^{p} a_i x_i^2 - \sum_{i=p+1}^{n-1} a_i x_i^2 + 2x_n.$$

Definizione 5.9 (Quadrica a centro)**.** Se q è una quadrica euclidea con matrice associata A tale che la quadrica all'infinito ha rango massimo, allora diremo che q è una *quadrica a centro*. Se il rango di A è n diremo che q è semplicemente degenere, mentre se il rango è $n-1$ diremo che è doppiamente degenere.

Definizione 5.10 (Punti impropri)**.** I punti del supporto della quadrica all'infinito si dicono i *punti impropri* della quadrica affine ad essa associata.

Proposizione 5.11 (Centri di simmetria di quadriche)

Una quadrica q in $\mathbb{A}^n$ ha uno e un solo centro di simmetria se e solo se è una quadrica a centro. In particolare il *centro* della quadrica (ovvero il centro di simmetria) risulta essere il punto che soddisfa l'equazione

$$B\mathbf{x} + \mathbf{v} = 0$$

dove B è la matrice della quadrica all'infinito e $\mathbf{v}$ è il vettore dei coefficienti $a_{01}, a_{02}, \dots, a_{0n}$.

Dimostrazione. La matrice di una simmetria centrale di centro x è semplicemente

$$S = \left(\begin{array}{c|c} 1 & 0 \\ \hline 2x & -I \end{array}\right)$$

vogliamo quindi mostrare che, data un'equazione di q del tipo

$$Q = \left(\begin{array}{c|c} k & v^\intercal \\ \hline v & B \end{array}\right)$$

vogliamo mostrare che la quadrica dopo la trasformazione è sempre la stessa, ovvero

$$S^\intercal Q S = \alpha Q$$

d'altra parte facendo un calcolo diretto abbiamo che

$$S^\intercal Q S = \left(\begin{array}{c|c} k + 2v^\intercal x + 2x^\intercal v + 2x^\intercal B x & -v^\intercal - 2x^\intercal B \\ \hline -v - Bx & B \end{array}\right)$$

uguagliando termine a termine con A allora troviamo che

$$\begin{aligned} B &= \alpha B \\ -2Bx - v &= -\alpha v \\ -v^\intercal - 2x^\intercal B &= -\alpha v^\intercal \\ k + 2v^\intercal x + 2x^\intercal v + 2x^\intercal B x &= \alpha k \end{aligned}$$

dalla prima equazione otteniamo che $\alpha = 1$ (a meno che B non sia la matrice identicamente nulla, caso non molto interessante), la seconda e la terza equazione sono quindi equivalenti a

$$Bx + v = 0$$

che è evidentemente equivalente all'ultima sostituendo $Bx \mapsto -v$ nella quarta equazione e notando che l'equazione diventa $0 = 0$. Dunque dato che l'equazione $Bx + v = 0$ ha un'unica soluzione se e solo se B ha rango massimo, abbiamo finito. □

Teorema 5.12 (Classificazione delle coniche euclidee)

Ogni conica euclidea in $\mathbb{E}^2$ è congruente a esattamente una delle seguenti coniche, al variare di $a, b, p \in \mathbb{R}_{>0}$:

$$C_1 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0 \qquad \text{con } a \geq b > 0$$

$$C_2 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + 1 = 0 \qquad \text{con } a \geq b$$

$$C_3 : \frac{x^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} + 1 = 0$$

$$C_4 : y^2 - 2px = 0$$

$$C_5 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0 \qquad \text{con } a \geq b$$

$$C_6 : \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0 \qquad \text{con } a \geq b$$

$$C_7 : y^2 - a^2 = 0$$

$$C_8 : y^2 + a^2 = 0$$

$$C_9 : y^2 = 0$$

Parte II
Modulo B