

# 数学笔记

BeBop

May 15, 2025



# Contents

I	知识整理	5
1	定向极限的对偶和对偶的逆向极限	7



# Part I

## 知识整理



# Chapter 1

## 定向极限的对偶和对偶的逆向极限

**定义 1.0.1** (定向极限). 设  $I$  是一个定向集,  $\{V_i\}_{i \in I}$  是一族以  $I$  为指标集的域  $\mathbb{F}$  上的线性空间, 满足对任意  $i \leq j$  都有线性映射  $\varphi_j^i: V_i \rightarrow V_j$ . 基于此, 我们定义定向极限

$$\varinjlim_{i \in I} V_i := \left( \bigoplus_{i \in I} V_i \right) / \sim$$

其中等价关系  $\sim$  定义为:

$$v_i \sim v_j \iff \exists k \geq i, j, \text{ s.t. } \varphi_k^i(v_i) = \varphi_k^j(v_j).$$

**定义 1.0.2** (逆向极限). 条件同上, 对于对偶空间  $V_i^* := \text{Hom}(V_i, \mathbb{F})$  当  $i \leq j$  时, 存在  $(\varphi_j^i)^*: V_j^* \rightarrow V_i^*$ . 基于此我们定义逆向极限

$$\varprojlim_{i \in I} V_i^* := \left\{ \{f_i\}_{i \in I} \in \prod_{i \in I} V_i^* \mid f_i = f_j \circ \varphi_j^i, \text{ for } \forall i \leq j \right\}$$

从定义能看出对偶的关系, 定向极限是直和对象的商对象, 逆向极限是直积对象的子对象. 事实上它们确实存在自然的同构关系:

**定理 1.0.3** (定向极限的对偶是对偶的逆向极限).

$$\text{Hom} \left( \varinjlim_{i \in I} V_i, \mathbb{F} \right) \cong \varprojlim_{i \in I} \text{Hom}(V_i, \mathbb{F}).$$

也即

$$\left( \varinjlim_{i \in I} V_i \right)^* \cong \varprojlim_{i \in I} V_i^*.$$

**证明.** 我们分别定义

$$\begin{aligned}\Phi : (\varinjlim V_i)^* &\rightarrow \varprojlim V_i^*, \\ \Psi : \varprojlim V_i^* &\rightarrow (\varinjlim V_i)^*.\end{aligned}$$

并说明它们互为对方的逆映射.

1° 定义  $\Phi$ : 对任意  $f : \varinjlim V_i \rightarrow \mathbb{F}$ , 对每一个  $i \in I$ , 令

$$f_i := f \circ \pi_i : V_i \rightarrow \varinjlim V_i \rightarrow \mathbb{F}$$

则当  $j \leq k$  时, 有如下交换图

$$\begin{array}{ccc} V_j & \xrightarrow{\pi_j} & \varinjlim V_i \\ \varphi_k^j \downarrow & \nearrow \pi_k & \\ V_k & & \end{array}$$

因此

$$f_j = f \circ \pi_j = f \circ \pi_k \circ \varphi_k^j = f_k \circ \varphi_k^j$$

这说明  $\{f_i\}_{i \in I}$  定义了  $\varprojlim V_i^*$  中的一个元素. 令

$$\Phi(f) := \{f_i\}_{i \in I} = \{f \circ \pi_i\}_{i \in I}.$$

2° 定义  $\Psi$ : 对任意  $\{g_i\}_{i \in I} \in \varprojlim V_i^*$ , 定义

$$\Psi(\{g_i\})([v_j]) := g_j(v_j), \quad \forall [v_j] \in \varinjlim V_i.$$

为了验证其良定义性, 注意到逆向极限保证了对于任意  $j \leq k$ , 都有

$$g_j = g_k \circ \varphi_k^j.$$

因此当  $[v_j] = [v_k]$  时, 由定向极限的定义知存在  $l \geq j, k$  使得

$$\varphi_l^j(v_j) = \varphi_l^k(v_k)$$

因此

$$g_j(v_j) = g_l(\varphi_l^j(v_j)) = g_l(\varphi_l^k(v_k)) = g_k(v_k).$$

这说明我们的定义是良好的.

从定义不难看出对任意  $\{g_i\}_{i \in I} \in \varprojlim V_i^*$ ,

$$\Psi(\{g_i\}) \circ \pi_j = g_j, \quad \forall j \in I.$$

因此  $\Phi \circ \Psi = \text{id}$ . 另一方面对任意  $f : \varinjlim V_i \rightarrow \mathbb{F}$ ,

$$\Psi(\{f_i\})([v_j]) = f \circ \pi_j(v_j) = f([v_j]).$$

因此  $\Psi \circ \Phi = \text{id}$ . □



# Bibliography

- [1] 梅加强. 流形与几何初步. 科学出版社, 2013.