

目 录

1. 基本语法	1
1.1. 图片	1
1.2. box	1
1.3. grid	1
1.4. block	1
1.5. 文献及引用	1
参考文献	1
2. packages 推荐	1
2.1. showybox	1
2.2. codly	2
2.3. tablem	2
2.4. drafting	2
3. 其他一些有用的东西	2

1. 基本语法

1.1. 图片

1.2. box

1.3. grid

1.4. block

1.5. 文献及引用

文献¹ 做了 XXX，文献 2. Yin, S. *et al.* Atomistic simulations of dislocation mobility in refractory high-entropy alloys and the effect of chemical short-range order. *Nature Communications* **12**, 4873–4874 (2021) 得到了 XXX。

参考文献

1. Pei, Z. *et al.* Theory-guided design of high-entropy alloys with enhanced strength-ductility synergy. *Nature Communications* **14**, 2519–2520 (2023)
2. Yin, S. *et al.* Atomistic simulations of dislocation mobility in refractory high-entropy alloys and the effect of chemical short-range order. *Nature Communications* **12**, 4873–4874 (2021)

• 脚本

A is a letter. B is a letter. C is a letter.

(3, 5, 9, 17)

2. packages 推荐

2.1. showybox

自定义盒子。

Hello world!

This is an important message!

Stokes' theorem


Let Σ be a smooth oriented surface in \mathbb{R}^3 with boundary $\partial\Sigma \equiv \Gamma$. If a vector field $\mathbf{F}(x, y, z) = (F_x(x, y, z), F_y(x, y, z), F_z(x, y, z))$ is defined and has continuous first order partial derivatives in a region containing Σ , then

$$\iint_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \boldsymbol{\Sigma} = \oint_{\partial\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\Gamma}$$

2.2. codly


Python 源代码:

```
1 def fibonacci(n):
2     if n <= 1:
3         return n
4     else:
5         return(fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2))
```

 Python

Rust 源代码:

```
1 pub fn main() {
2     println!("Hello, world!");
3 }
```

 Rust

2.3. tablem

三线表:

Name	Location	Height	Score
John	Second St.	180 cm	5
Wally	Third Av.	160 cm	10

2.4. drafting

3. 其他一些有用的东西

这是一个 note

这是一个 warn

这是一个 info

这是一个 prof

这是一个 answer