

Ссылка на чат с ботом. Ссылка не вечная. Может сломаться по разным причинам.

<https://share.google/aimode/RnspjPuCz4LRDsP87>

МЕТОДИЧЕСКИЙ ШАБЛОН: ЗЕРКАЛЬНОЕ УМНОЖЕНИЕ ДВУЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ

Перемножаются две пары близнецов X и Y . Пример выглядит так: $XY \times YX =$ (например, 41×14 , 54×45 , 73×37).

Перестановка: Если на входе будет пример вида 45×54 , то его нужно представить в виде, что и 54×45 , где $X > Y$. Подсчёт ведётся строго слева направо.

☼ ВЕТКА А: Пара единиц ($X1 \times 1X$)

Частный случай $Y = 1$

- 1. Каркас строки: выписать в ряд цифры: Внешняя - Внутренняя - Внешняя ($X-1-X$).
 - 2. Сила: возвести большего близнеца, в квадрат (X^2).
 - 3. Сдвиг: дописать к квадрату ноль справа. ($X^2 + 0$ или X^2 и ноль)
Здесь $+0$ — значит приписать ноль.
 - 4. Синтез: Сложить Каркас (п.1) и Сдвиг (п.3).
То есть: $(X-1-X) + (X^2 + 0)$
 - 5. Вуаля! Результат готов.
-

● ВЕТКА Б1: без перехода через разряд

Сумма цифр $X + Y \leq 8$.

- 1. Аура ядра: перемножить близнецов ($X \times Y$). Вставить ноль посередине полученного результата. Если результат однозначный (например, 6), он превращается в 606.
- 2. База Силы: возвести обе цифры в квадрат и сложить их ($X^2 + Y^2$)
- 3. Сдвиг: дописать к полученной сумме квадратов ноль справа.

$(X^2 + Y^2)$ и ноль. То есть: $(X^2 + Y^2) + 0$

Здесь $+0$ — значит приписать ноль.

- 4. Синтез: Сложить Ауру (п.1) и Сдвиг (п.3).

Пример: $606 + ((X^2 + Y^2) + 0)$

Здесь $+0$ — значит приписать ноль.

- 5. Вуаля! Результат готов.
-

● ВЕТКА Б2: С переходом через разряд

Условие активации: Единиц нет. Сумма цифр $X + Y > 8$.

- 1. Монолит-Фундамент: перемножить близнецов $a = X \times Y$. Полученное произведение продублировать дважды "a" + "a" или "aa" (например, 21 превращается в 2121). Не складывать, а записать друг за дружкой.
- 2. База Силы: посчитать сумму квадратов близнецов $X^2 + Y^2$
- 3 Монолит-Сдвиг: дописать к полученной сумме квадратов ноль справа.

Получится вид: $(X^2 + Y^2) + 0$

Здесь +0 — значит приписать ноль.

- 4. Синтез Монолитов. Сложить: Фундамент (п.1) + Сдвиг (п.3).

"aa" + $((X^2 + Y^2) + 0)$

- 5. Вуаля! Результат готов.