

## Matematyka dyskretna L, Lista 6 - Tomasz Woszczyński

### Zadanie 1 (-)

Stosując metodę podstawiania, należy rozwiązać dwie zależności rekurencyjne:

$$1. \quad t_n = t_{n-1} + 3^n \text{ dla } n > 1, t_1 = 3$$

$$2. \quad h_n = h_{n-1} + (-1)^{n+1}n \text{ dla } n > 1, h_1 = 1$$

$$\begin{aligned} t_n &= t_{n-1} + 3^n = t_{n-2} + 3^{n-1} + 3^n = t_{n-3} + 3^{n-2} + 3^{n-1} + 3^n = \dots = \\ &= t_1 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^{n-2} + 3^{n-1} + 3^n = \\ &= 3^1 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^{n-2} + 3^{n-1} + 3^n = \sum_{i=1}^n 3^i = \begin{cases} 3 & \text{dla } n = 1 \\ 3 \cdot \frac{1-3^n}{1-3} & \text{dla } n \geq 2 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h_n &= h_{n-1} + (-1)^{n+1}n = h_{n-2} + (-1)^n(n-1) + (-1)^{n+1}n = \\ &= h_{n-3} + (-1)^{n-1}(n-2) + (-1)^n(n-1) + (-1)^{n+1}n = \dots = \\ &= 1 + \underbrace{(-1)^3 \cdot 2}_{h_2 = -1} + \dots + (-1)^n(n-1) + (-1)^{n+1}n = \dots \end{aligned}$$

W pierwszym przykładzie nie trzeba udowadniać poprawności otrzymanego wzoru, gdyż zamiana sumy na wzór jawny jest prosta, tzn. jest to suma pierwszych  $n$  wyrazów ciągu geometrycznego i jest powszechnie znana.

W drugim przypadku, takim podejściem jak wyżej może być ciężko wywnioskować wzór, dlatego można policzyć kilka pierwszych wyrazów:

$$h_1 = 1, h_2 = (-1)^3 \cdot 2 = -1, h_3 = -1 + (-1)^4 \cdot 3 = 2, h_4 = 2 + (-1)^5 \cdot 4 = -2, \dots$$

A następnie na ich podstawie "zgadnąć" wzór na  $h_n$  i go udowodnić. Zauważmy, że

$$h_n = \begin{cases} -\frac{n}{2} & \text{dla } n \text{ parzystych} \\ \frac{n+1}{2} & \text{dla } n \text{ nieparzystych} \end{cases}$$

Udowodnię ten wzór indukcyjnie po  $n$ :

1. Podstawa indukcyjna:  $n = 1$ , wtedy  $h_1 = \frac{1+1}{2} = 2$ , więc się zgadza. ✓
2. Krok indukcyjny: założmy, że dla  $n$  powyższy wzór działa, pokażę że dla  $n+1$  jest również prawdziwy, a więc że  $h_{n+1} = h_n + (-1)^{n+2}(n+1)$  sprowadza się do zależności

$$h_{n+1} = \begin{cases} -\frac{(n+1)}{2} & \text{dla } n+1 \text{ parzystych} \\ \frac{(n+1)+1}{2} = \frac{n+2}{2} = \frac{n}{2} + 1 & \text{dla } n+1 \text{ nieparzystych} \end{cases}$$

Należy rozpatrzeć dwa przypadki:

(a)  $n$  parzyste, więc  $h_{n+1}$  nieparzyste:

$$h_{n+1} = -\frac{n}{2} + \underbrace{(-1)^{n+2}(n+1)}_{n+2 \text{ parzyste, więc } 1} = -\frac{n}{2} + (n+1) = \frac{n}{2} + 1, \checkmark$$

(b)  $n$  nieparzyste, więc  $h_{n+1}$  parzyste:

$$\begin{aligned} h_{n+1} &= \frac{n+1}{2} + \underbrace{(-1)^{n+2}}_{n+2 \text{ nieparzyste, więc } -1}(n+1) = \frac{n+1}{2} - (n+1) = \\ &= \frac{n+1-2n-2}{2} = \frac{-n-1}{2} = \frac{-(n+1)}{2}, \checkmark \end{aligned}$$

Udowodniliśmy więc, że wzór na  $h_n$  jest poprawny dla wszystkich  $n \in \mathbb{N}_+$ .

## Zadanie 2

Należy rozwiązać podane zależności rekurencyjne:

1.  $a_{n+1} = \left| \sqrt{a_n^2 + a_{n-1}^2} \right|$  dla  $a_0 = a_1 = 1$ ,
2.  $b_{n+1} = \left| \sqrt{b_n^2 + 3} \right|$  dla  $b_0 = 8$ ,
3.  $c_{n+1} = (n+1) \cdot c_n + (n^2 + n) \cdot c_{n-1}$  dla  $c_0 = 0, c_1 = 1$ .

**Przykład 1:** Podnieśmy całe wyrażenie do kwadratu, dzięki czemu uzyskamy jakiej postaci są kolejne wyrazy ciągu  $\langle a_n \rangle$ :

$$\begin{aligned} a_{i+1}^2 &= \left| \sqrt{a_i^2 + a_{i-1}^2} \right|^2 \\ a_{i+1}^2 &= a_i^2 + a_{i-1}^2 \\ \text{więc } a_i^2 &= a_{i-1}^2 + a_{i-2}^2 \end{aligned}$$

Teraz można rozpisać rozwinięcie rekurencyjne wyrazu  $a_{n+1}$ :

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \left| \sqrt{a_n^2 + a_{n-1}^2} \right| = \left| \sqrt{a_{n-1}^2 + a_{n-2}^2 + a_{n-1}^2} \right| = \left| \sqrt{2a_{n-1}^2 + a_{n-2}^2} \right| = \\ &= \left| \sqrt{2 \left| \sqrt{a_{n-2}^2 + a_{n-3}^2} \right|^2 + a_{n-2}^2} \right| = \left| \sqrt{2a_{n-2}^2 + 2a_{n-3}^2 + a_{n-2}^2} \right| = \left| \sqrt{3a_{n-2}^2 + 2a_{n-3}^2} \right| = \\ &= \left| \sqrt{3 \left| \sqrt{a_{n-3}^2 + a_{n-4}^2} \right|^2 + 2a_{n-3}^2} \right| = \left| \sqrt{5a_{n-3}^2 + 3a_{n-4}^2} \right| = \dots = \\ &= \left| \sqrt{8a_{n-4}^2 + 5a_{n-5}^2} \right| = \left| \sqrt{13a_{n-5}^2 + 8a_{n-6}^2} \right| = \dots = \\ &= \left| \sqrt{F_n + F_{n-1}} \right| = \left| \sqrt{F_{n+1}} \right| \end{aligned}$$

Obliczenie wyrazu  $a_{n+1}$  sprowadza się więc do obliczenia pierwiastka z  $F_{n+1}$ , jako że wszystkie wyrazy ciągu Fibonacciego są dodatnie.

**Przykład 2:** Podstawmy kilka kolejnych wyrazów ciągu  $\langle b_n \rangle$ :

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \left| \sqrt{b_n^2 + 3} \right| = \left| \sqrt{\left| \sqrt{b_{n-1}^2 + 3} \right|^2 + 3} \right| = \left| \sqrt{b_{n-1}^2 + 3 + 3} \right| = \left| \sqrt{\left| \sqrt{b_{n-2}^2 + 3} \right|^2 + 3 + 3} \right| = \\ &= \left| \sqrt{b_{n-2}^2 + 3 + 3 + 3} \right| = \left| \sqrt{b_{n-3}^2 + 3 + 3 + 3 + 3} \right| = \left| \sqrt{b_{n-4}^2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3} \right| = \\ &= \left| \sqrt{b_0^2 + 3n} \right| = \left| \sqrt{64 + 3n} \right| \end{aligned}$$

**Przykład 3:** Obliczmy kilka pierwszych wyrazów  $\langle c_n \rangle$  wiedząc, że  $c_0 = 0, c_1 = 1$ . Kolejne wyrazy ciągu wyrażają się wzorem rekurencyjnym:

$$c_{n+1} = (n+1) \cdot c_n + (n^2 + n) \cdot c_{n-1}$$

Mamy więc:

$$\begin{aligned} c_0 &= 0 & &= 0! \cdot 0 \\ c_1 &= 1 & &= 1! \cdot 1 \\ c_2 &= 2 \cdot 1 + (1^2 + 1) \cdot 0 = 2 + 0 = 2 & &= 2! \cdot 1 \\ c_3 &= 3 \cdot 2 + (2^2 + 2) \cdot 1 = 6 + 6 = 12 & &= 3! \cdot 2 \\ c_4 &= 4 \cdot 12 + (3^2 + 3) \cdot 2 = 48 + 24 = 72 & &= 4! \cdot 3 \\ c_5 &= 5 \cdot 72 + (4^2 + 4) \cdot 12 = 360 + 240 = 600 & &= 5! \cdot 5 \\ c_6 &= 6 \cdot 600 + (5^2 + 5) \cdot 72 = 3600 + 2160 = 5760 & &= 6! \cdot 8 \\ &\vdots \\ c_n &= n! \cdot F_n \end{aligned}$$

Powyższy wzór należy udowodnić indukcyjnie po  $n$ :

1. Podstawa indukcyjna:  $n = 0$ , wtedy  $c_n = 0! \cdot 0 = 0$ , więc się zgadza. ✓
2. Krok indukcyjny: założmy, że dla  $n$  zachodzi  $c_n = n! \cdot F_n$ , pokażę, że dla  $n+1$  zachodzi  $c_{n+1} = (n+1)! \cdot F_{n+1}$ :

$$\begin{aligned} c_{n+1} &= (n+1)! \cdot F_{n+1} \\ &= (n+1)! \cdot (F_n + F_{n-1}) = \\ &= (n+1) \cdot n! \cdot (F_n + F_{n-1}) = \\ &= (n+1) \cdot n! \cdot F_n + (n+1) \cdot n! \cdot F_{n-1} = \\ &= (n+1) \cdot c_n + (n+1) \cdot n \cdot (n-1)! \cdot F_{n-1} = \\ &= (n+1) \cdot c_n + (n+1) \cdot n \cdot c_{n-1} = \\ &= (n+1) \cdot c_n + (n^2 + n) \cdot c_{n-1}, \text{ więc się zgadza. } \checkmark \end{aligned}$$

Więc dla dowolnego  $n$  zachodzi  $c_n = n! \cdot F_n$ , co kończy dowód.

#### Zadanie 4

Należy wykazać, że iloczyn kolejnych  $k$  liczb naturalnych jest podzielny przez  $k!$ .

Rozwiązanie zadania sprowadza się do pokazania, że

$$\frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k!} \in \mathbb{N}$$

Pomnóżmy więc to wyrażenie przez  $1 = \frac{(n-k)!}{(n-k)!}$ :

$$\frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k!} \cdot \frac{(n-k)!}{(n-k)!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k} \in \mathbb{N}$$

### Zadanie 6

Należy rozwiązać zależność rekurencyjną  $a_n^2 = 2a_{n-1}^2 + 1$  z warunkiem początkowym  $a_0 = 2$  i założeniem, że dla wszystkich  $n$  jest  $a_n > 0$ .

Podstawmy  $b_n = a_n^2$ , wtedy uproszczona zależność będzie wyrażona wzorem:

$$b_n = 2b_{n-1} + 1$$

i rozwiążemy ją metodą anihilatorów. Przekształćmy równanie, a następnie znajdziemy anihilatory poszczególnych wyrazów:

$$\begin{aligned} b_n = 2b_{n-1} + 1 &\implies b_{n+1} = 2b_n + 1 \implies b_{n+1} - 2b_n - 1 = 0 \\ b_{n+1} - 2b_n &\longrightarrow (\mathbf{E} - 2) \\ -1 &\longrightarrow (\mathbf{E} - 1) \end{aligned}$$

Mamy więc  $(\mathbf{E} - 2)(\mathbf{E} - 1) \langle a_n \rangle = 0$ , a ogólną postacią równania jest:

$$b_n = \alpha \cdot 2^n + \beta$$

Obliczmy więc pierwsze wyrazy ciągu  $\langle b_n \rangle$  a następnie znajdziemy wartości  $\alpha, \beta$ :

$$\begin{cases} b_0 = a_0^2 & = 4 = \alpha + \beta \\ b_1 = 2 \cdot 4 + 1 & = 9 = 2\alpha + \beta \end{cases} \Rightarrow \dots \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 5 \\ \beta = -1 \end{cases}$$

Czyli ogólną postacią jest:

$$b_n = 5 \cdot 2^n - 1 \implies a_n = \sqrt{5 \cdot 2^n - 1}$$

### Zadanie 7

Ile jest wyrazów złożonych z  $n$  liter należących do 25-literowego alfabetu łacińskiego, zawierających parzystą liczbę liter  $a$ ?

Zwykle alfabet łaciński ma 26 liter, dlatego rozwiązanie uogólnię dla  $r$ -literowego alfabetu zawierającego  $a$ . Wyraz złożony z 0 liter zawiera 0 liter  $a$ , a więc parzystą ilość, czyli  $a_0 = 1$ . Dla wyrazów złożonych z 1 litery mamy  $r - 1$  takie wyrazy, gdyż zawierają jedną z  $r - 1$  liter w nieparzystej ilości oraz 0 liter  $a$ , tzn.  $a_1 = r - 1$ . Liczba  $n$ -literowych wyrazów z parzystą liczbą liter  $a$  wyraża się rekurencją:

$$a_n = \underbrace{(r-1) \cdot a_{n-1}}_{\substack{a \text{ nie na końcu, więc} \\ \text{rozpatrujemy ciągi} \\ \text{długości } n-1 \text{ o parzystej} \\ \text{liczbie wystąpień } a}} + \underbrace{1 \cdot [r^{n-1} - a_{n-1}]}_{\substack{a \text{ na końcu, więc rozpatrujemy} \\ \text{ciągi długości } n-1 \text{ o} \\ \text{nieparzystej liczbie wystąpień } a}} = r^{n-1} + (r-2) \cdot a_{n-1}$$

Przekształćmy najpierw zależność rekurencyjną:

$$a_n = (r-2) \cdot a_{n-1} + r^{n-1} \implies a_{n+1} = (r-2) \cdot a_n + r^n \implies a_{n+1} - (r-2) \cdot a_n - r^n = 0$$

A następnie rozwiążmy tę rekurencję wykorzystując metodę anihilatorów:

$$\begin{aligned} a_{n+1} - (r-2) \cdot a_n &\longrightarrow (\mathbf{E} - (r-2)) \\ -r^n &\longrightarrow (\mathbf{E} - r) \end{aligned}$$

Wtedy mamy

$$(\mathbf{E} - (r - 2))(\mathbf{E} - r) \langle a_n \rangle = 0 \implies a_n = \alpha \cdot (r - 2)^n + \beta \cdot r^n$$

Pozostało nam więc rozwiązać układ równań podstawiając  $a_0$  i  $a_1$ :

$$\begin{cases} a_0 = 1 = \alpha + \beta \\ a_1 = (r - 1) = \alpha \cdot (r - 2) + r \cdot \beta \end{cases} \implies \dots \implies \begin{cases} \alpha = \frac{1}{2} \\ \beta = \frac{1}{2} \end{cases} \quad \text{czyli } a_n = \frac{1}{2} \cdot (r - 2)^n + \frac{1}{2} \cdot r^n$$

Więc dla alfabetu 25-literowego mamy  $a_n = \frac{1}{2} \cdot 23^n + \frac{1}{2} \cdot 25^n$  takich ułożeń.

### Zadanie 8

Należy znaleźć ogólną postać rozwiązań równań rekurencyjnych za pomocą anihilatorów i jedno z nich rozwiązać:

$$1. \quad a_{n+2} = 2a_{n+1} - a_n + 3^n - 1 \text{ dla } a_0 = a_1 = 0$$

$$2. \quad a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n + n2^{n+1} \text{ dla } a_0 = a_1 = 1$$

$$3. \quad a_{n+2} = \frac{1}{2^{n+1}} - 2a_{n+1} - a_n \text{ dla } a_0 = a_1 = 1$$

**Przykład 1:** Przekształćmy równanie, aby z jednej strony otrzymać 0, a następnie znajdziemy anihilatory dla wszystkich wyrażeń:

$$a_{n+2} = 2a_{n+1} - a_n + 3^n - 1 \implies a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n - 3^n + 1 = 0$$

Anihilatorami odpowiednich wyrażeń są wtedy:

$$\begin{aligned} a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n &\longrightarrow (\mathbf{E}^2 - 2\mathbf{E} + 1) = (\mathbf{E} - 1)^2 \\ -3^n &\longrightarrow (\mathbf{E} - 3) \\ 1 &\longrightarrow (\mathbf{E} - 1) \end{aligned}$$

Mamy więc  $(\mathbf{E}^2 - 2\mathbf{E} + 1)(\mathbf{E} - 3)(\mathbf{E} - 1) \langle a_n \rangle = (\mathbf{E} - 1)^3(\mathbf{E} - 3) \langle a_n \rangle = 0$ , a ogólną postacią równania jest

$$a_n = \alpha \cdot 1^n + \beta \cdot n \cdot 1^n + \gamma \cdot n^2 \cdot 1^n + \delta \cdot 3^n$$

**Przykład 2:** Przekształcenie równania i anihilatory:

$$\begin{aligned} a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n + n2^{n+1} &\implies a_{n+2} - 4a_{n+1} + 4a_n - n2^{n+1} = 0 \\ a_{n+2} - 4a_{n+1} + 4a_n &\longrightarrow (\mathbf{E}^2 - 4\mathbf{E} + 4) = (\mathbf{E} - 2)^2 \\ -n2^{n+1} &\longrightarrow (\mathbf{E} - 2)^2 \end{aligned}$$

Mamy więc  $(\mathbf{E} - 2)^4 \langle a_n \rangle = 0$ , a ogólną postacią jest

$$a_n = \alpha \cdot 2^n + \beta \cdot n \cdot 2^n + \gamma \cdot n^2 \cdot 2^n + \delta \cdot n^3 \cdot 2^n$$

**Przykład 3:** Przekształcenie równania i anihilatory:

$$\begin{aligned} a_{n+2} = \frac{1}{2^{n+1}} - 2a_{n+1} - a_n &\implies a_{n+2} - \frac{1}{2^{n+1}} + 2a_{n+1} + a_n = 0 \\ a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n &\longrightarrow (\mathbf{E}^2 - 2\mathbf{E} + 1) = (\mathbf{E} - 1)^2 \\ -\frac{1}{2^{n+1}} &\longrightarrow \left(\mathbf{E} - \frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

Mamy więc  $(\mathbf{E} + 1)^2 \left( \mathbf{E} - \frac{1}{2} \right) \langle a_n \rangle = 0$ , a ogólną postacią równania jest

$$a_n = \alpha \cdot (-1)^n + \beta \cdot (-1)^n \cdot n + \gamma \cdot \left( \frac{1}{2} \right)^n$$

Obliczmy  $a_2 = \frac{1}{2} - 2 - 1 = -\frac{5}{2}$  i rozwiążmy układ równań:

$$\begin{cases} a_0 = 1 & = \alpha + \gamma \\ a_1 = 1 & = -\alpha - \beta + \frac{1}{2}\gamma \\ a_2 = -\frac{5}{2} & = \alpha + 2\beta + \frac{1}{4}\gamma \end{cases} \Rightarrow \dots \Rightarrow \begin{cases} \alpha = \frac{7}{9} \\ \beta = -\frac{5}{3} \\ \gamma = \frac{2}{9} \end{cases}$$

Ostatecznym wynikiem jest  $a_n = \frac{7}{9} \cdot (-1)^n - \frac{5}{3} \cdot (-1)^n \cdot n + \frac{2}{9} \cdot \left( \frac{1}{2} \right)^n$ .