## Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

## Lista zadań nr 9. Tydzień rozpoczynający się 23. kwietnia

## Zadania

- 1. Niech zmienne  $X_1, X_2, \ldots, X_n$  będą niezależne i niech mają ten sam rozkład  $\operatorname{Exp}(\lambda)$ . Niech  $Y_i = X_1 + \ldots + X_i$ , dla  $i = 1, \ldots, n$ . Wykazać, że dla gęstości zmiennej  $(Y_1, \ldots, Y_n)$  zachodzi wzór  $f_{Y_1, \ldots, Y_n}(y_1, \ldots, y_n) = \lambda^n \exp(-\lambda y_n)$ , gdzie  $0 < y_1 < y_2 < \ldots < y_n$ .
- 2. Dla gęstości  $f_{Y_1,\dots,Y_n}(y_1,\dots,y_n)$  z poprzedniego zadania wykazać, że gęstość brzegowa  $f_n(y_n)$  względem zmiennej  $Y_n$  wyraża się wzorem  $f_{Y_n}(y_n) = \lambda^n \frac{y_n^{n-1}}{(n-1)!} \exp{(-\lambda y_n)},$  gdzie  $0 < y_n$ .
- 3. Metodą MLE znaleźć estymator parametru  $\theta$  rozkładu jednostajnego na przedziale  $[\theta-a;\theta+a]$ , przy założeniu, że znana jest wartość parametru a.
- 4. Metodą MLE znaleźć estymator parametru  $\theta$  rozkładu jednostajnego na przedziale  $[\theta-a;\theta+a]$ , przy założeniu, że nie jest znana wartość parametru a.
- 5. Niezależne zmienne  $X_1, \ldots, X_5$  mają ten sam, ciągły, rozkład. Oznaczmy przez p prawdopodobieństwo  $P(X_1 < X_2 > X_3 < X_4 > X_5)$ . Wykazać, że p nie zależy od gęstości rozkładu f(x) zmiennych  $X_k$ . Obliczyć wartość p.
- 6. X, Y, Z są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładzie jednostajnym U[0, 1]. Obliczyc  $P(X \ge YZ)$ .
- 7.  $X_1, X_2, X_3$  są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładzie  $\text{Exp}(\lambda)$ . Znaleźć rozkład (3-wymiarowy) zmiennej  $(Y_1, Y_2, Y_3) = (X_1 + X_2, X_1 + X_3, X_2 + X_3)$ .
- 8. (2p.) Niech  $X_1, \ldots, X_n$  będą niezależnymi zmiennymi o tym samym, ciągłym rozkładzie. Mówimy, że w chwili j notujemy rekord  $(j \le n)$ , jeśli  $Xj \ge Xi$  dla  $1 \le i \le j$ . Niech zmienna losowa Z będzie liczbą rekordów w ciągu  $\{X_k\}$ . Wykazać, że  $\mathrm{E}(Z) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{j}$ .

[Do zadań 9–10] Zmienna losowa (X,Y) ma rozkład o gęstości:

$$f(x,y) = 1, \quad 0 \leqslant x, y \leqslant 1.$$

- 9. Znaleźć gęstość zmiennej Z = X/Y.
- 10. Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że pierwszą cyfrą znaczącą Z jest 1.

Witold Karczewski