




1.1] class diagram





1.2] SEQUENCE





STATE STATI





USARE IL PATTERN DECORATOR
 POICHÉ CI PERMETTE
 DI AGGIUNGERE
 FUNZIONALITÀ AD
 UN OGGETTO
 DINAMICAMENTE
 SENZA CREARE
 UNA SOTTOCLASSE PER
 OGNI COMBINAZIONE
 POSSIBILE DELLE
 INFO AGGIUNTIVE.


component abstract class Piazzola { ... }
 base

concrete component
 class PiazzolaNormale extends Piazzola { ... }
 class PiazzolaPremium extends Piazzola { ... }

decorator abstract
 abstract class AccessorioDecorator extends Piazzola { ... }

decoratori concreti
 class Musica extends AccessorioDecorator { ... }

o/w



2] TESTING

COSTO $[0, +\infty[\text{ V }$
 $] -\infty, 0[\text{ II }$

area $] -\infty, 0[\text{ II }$
 $[0, 15[\text{ V }$
 $[15, 40[\text{ VV }$
 $[40, 100] \text{ VV }$
 $[101, +\infty[\text{ II }$

quota fissa $[0, +\infty[\text{ V }$
 $] -\infty, 0[\text{ II }$

TEST INVALIDI

$$T(-1, 10, 5) = \text{ERRORE}$$

$$T(10, -1, 5) = \text{ERRORE}$$

$$T(20, 101, 5) = \text{ERRORE}^*$$

$$T(10, 15, -1) = \text{ERRORE}$$

TEST VAUDI

$$T(20, 15, 5)$$

"

$$15 \times 20 + 5$$

$$305.0$$

TB AREA

$$T_b(10, 14, 5) = 5$$

$$T_b(10, 15, 5) = 155$$

$$T_b(10, 39, 5) = 395$$

$$T_b(10, 40, 5) = 405$$

$$T_b(10, 100, 10) = 1490$$

$$T_b(10, 101, 10) = \text{ERRORE}^*$$

perché non
hai meno 0,1?

Di sicuro si multa
anche il valore
nel minus dell'
intervallo.