C Communication effects and model comparison

Pathway	ID	Ligand–receptor	Sender = receiver group	LMM	OLS	Nonzero-slice fraction	Patient ICC	Sing.
CD45	I01	PTPRC-MRC1	pDCs	1.15 •	1.15 •			
CD86	I02	CD86-CTLA4	Tregs	1.26 •	1.26 •			
	I03	COL1A1-CD44	Prolif. T-cells	1.48 •	1.51 •			
	I04	COL1A1-CD44	Prolif. AT2	1.30 •	1.26 •			
	I05	COL1A1-(ITGA3+ITGB1)	Prolif. AT2	1.36 •	1.36 •			
	I06	COL1A1-(ITGA3+ITGB1)	Myofibroblasts	1.08 •	1.09 •			
COLLAGEN	I07	COL1A2-CD44	Prolif. T-cells	1.20 •	1.24 •			
	I08	COL1A2-(ITGA3+ITGB1)	Myofibroblasts	0.99 •	0.97			
	I09	COL1A2-CD44	IFN-activated Mph	1.11 •	1.10 •			
	I10	COL1A2-(ITGA3+ITGB1)	KRT5-/KRT17+	1.49 •	1.49 •			
	I11	COL4A3-CD44	cDCs	0.92 •	0.92			
CSPG4	I12	CSPG4-(ITGA3+ITGB1)	KRT5-/KRT17+	1.37 •	1.37 •			
	I13	CSPG4-(ITGA3+ITGB1)	Transitional AT2	1.22 •	1.22 •			
	I14	FN1-(ITGAV+ITGB6)	Myofibroblasts	1.08 •	1.08 •			
	I15	FN1-(ITGAV+ITGB1)	Subpleural FBs	1.37 •	1.38 •			
FN1	I16	FN1-(ITGAV+ITGB1)	KRT5-/KRT17+	1.28 •	1.28 •			
	I17	FN1-(ITGAV+ITGB6)	KRT5-/KRT17+	1.16 •	1.16 •			
	I18	FN1-(ITGA3+ITGB1)	KRT5-/KRT17+	1.01 •	1.01 •			
	I19	HLA-DRA-CD4	pDCs	1.66 •	1.68 •			
	I20	HLA-DRA-CD4	Prolif. T-cells	1.65 •	1.66 •			
MHC-II	I21	HLA-DQA1-CD4	pDCs	1.56 •	1.56 •			
	I22	HLA-DQB1-CD4	pDCs	1.40 •	1.44 •			
	I23	HLA-DQA1-CD4	Prolif. T-cells	1.45 •	1.46 •			
PECAM1	I24	PECAM1-PECAM1	KRT5-/KRT17+	1.58 •	1.58 •			
	I25	SPP1-CD44	KRT5-/KRT17+	1.19 •	1.19 •			
SPP1	I26	SPP1-(ITGAV+ITGB1)	Alveolar Mph	-1.44 •	-1.46 •			
	I27	SPP1-(ITGAV+ITGB1)	KRT5-/KRT17+	1.12 •	1.11 •			
UGRP1	I28	SCGB3A2-MARCO	Transitional AT2	1.30 •	1.24 •			

Effect / SD

−1 0 1

• q < 0.05; bars: 0–1; nonzero / 45 slices