MATERIAL EDUCATIVO PARA DONANTES

¡DEBE LEER ESTO ANTES DE DONAR!

- **Sus respuestas precisas y honestas son críticas para la seguridad de los pacientes que reciben transfusiones de sangre.**
- Cada pregunta es necesaria para evaluar completamente la seguridad de su donación.
- Según lo requieren las regulaciones, le pedimos que no done sangre si tiene un factor de riesgo.
- Si no entiende una pregunta, pida ayuda al personal del centro de sangre.
- SUS RESPUESTAS SON CONFIDENCIALES.

Para determinar si usted es elegible para donar, nosotros:

- Preguntaremos sobre su salud y los medicamentos que está tomando o ha tomado.
- Preguntaremos si ha viajado o vivido en otros países.
- Preguntaremos sobre su riesgo de infecciones que pueden transmitirse por la sangre – especialmente el VIH (que es el virus que causa el SIDA) y la hepatitis viral.
- Tomaremos su presión sanguínea, temperatura y pulso.
- Tomaremos una muestra de sangre para asegurarnos de que su conteo sanguíneo es aceptable antes de que usted done.

Si usted es elegible para donar, nosotros:

- Limpiaremos su brazo con un antiséptico (Díganos si tiene alguna alergia de la piel).
- Usaremos una aguja y un set de tubos estériles para colectar su sangre.

NUNCA reusamos una aguja o set de tubos.

QUÉ SUCEDE DESPUÉS DE SU DONACIÓN

Para proteger a los pacientes, su sangre será analizada para detectar hepatitis B y C, VIH, sífilis y otras infecciones. Si su sangre resulta positiva, no se le dará a ningún paciente. Se le notificará sobre cualquier resultado positivo que pueda afectar cuando usted es elegible para donar en el futuro. Hay ocasiones en las que no se analiza su sangre. Si esto ocurre, puede que no reciba ninguna notificación. El centro de sangre no divulgará los resultados de sus pruebas sin su permiso por escrito a menos que sea requerido por ley (por ejemplo, al Departamento de Salud).

ELEGIBILIDAD DEL DONANTE – INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Ciertas enfermedades infecciosas, como el VIH y la hepatitis, se pueden transmitir a través de:

- Contacto sexual
- Otras actividades que aumentan el riesgo
- Transfusión de sangre

Le haremos preguntas específicas sobre contacto sexual y otras actividades que pueden aumentar el riesgo de contraer estas infecciones.

¿Qué queremos decir con "contacto sexual"?

Las palabras “ha tenido contacto sexual con” y “sexo” se utilizan en algunas de las preguntas que le haremos. Estas preguntas aplican a todas las actividades descritas a continuación, se hayan usado o no medicamentos, condones u otra protección para prevenir infecciones o embarazos:

- Sexo vaginal (contacto entre el pene y la vagina)
- Sexo oral (boca o lengua en la vagina, el pene o el ano de una persona)
- Sexo anal (contacto entre el pene y el ano)

Una “pareja sexual nueva” incluye los siguientes ejemplos:

- Tener sexo con alguien por primera vez
- Haber tenido sexo con alguien en una relación que terminó en el pasado, y haber tenido sexo nuevamente con esa persona en los últimos 3 meses.

Factores de riesgo de VIH/Hepatitis

El VIH y la hepatitis se transmiten mayormente por contacto sexual con una persona infectada O por compartir agujas o jeringuillas usadas por una persona infectada para inyectarse drogas.

NO DONE si usted:

- **ALGUNA VEZ ha tomado algún medicamento para tratar la infección con el VIH.**
- **Está tomando algún medicamento para prevenir la infección con el VIH. Estos medicamentos se pueden llamar: PrEP, PEP, TRUVADA, DESCOVY, APRETUDE o muchos otros nombres.**

Los medicamentos antirretrovirales aprobados por el FDA son seguros y eficaces para prevenir la transmisión sexual del VIH. Sin embargo, estos medicamentos antirretrovirales no eliminan el virus del cuerpo completamente, y la sangre donada tiene el potencial de transmitir la infección con el VIH a quien recibe una transfusión.

NO DEJE DE TOMAR NINGÚN MEDICAMENTO RECETADO PARA PODER DONAR SANGRE, INCLUYENDO LOS MEDICAMENTOS DE PrEP y PEP.

NO DONE si usted:

- **ALGUNA VEZ** ha tenido una prueba positiva para la infección con el VIH.
- **En los últimos 3 meses:**
  - Ha tenido contacto sexual con una pareja nueva **y** ha tenido sexo anal.
  - Ha tenido contacto sexual con más de una pareja **y** ha tenido sexo anal.
  - Ha tenido contacto sexual con alguien que alguna vez haya tenido una prueba positiva para la infección con el VIH.
  - Ha recibido dinero, drogas u otro pago por sexo.
  - Ha usado agujas para inyectarse drogas, esteroides o algo no recetado por su médico.
  - Ha tenido contacto sexual con alguien que haya recibido dinero, drogas u otro pago por sexo, **o** que haya usado agujas para inyectarse drogas, esteroides o algo no recetado por su médico.
  - Ha tenido sífilis o gonorrea o ha recibido tratamiento para sífilis o gonorrea.
- **En los últimos 12 meses:**
  - Ha estado en un centro de detención juvenil, detención, cárcel o prisión por 72 horas o más consecutivas.
- **ALGUNA VEZ** ha tenido una infección o enfermedad por el virus del Ébola.

NO DONE si usted tiene estos síntomas que pueden estar presentes antes de dar positivo en la prueba del VIH:

- Fiebre
- Ganglios linfáticos agrandados
- Dolor de garganta
- Salpullido

Su sangre puede transmitir infecciones, incluyendo el VIH, aunque usted se sienta bien y todas sus pruebas sean normales. Incluso las mejores pruebas no pueden detectar el virus durante un período de tiempo después de que se haya infectado.

NO DONE:

- Si cree que puede estar en riesgo de contraer el VIH u otras infecciones.
- Si su propósito para donar es obtener resultados para las pruebas de VIH u otras infecciones. Pregúntenos dónde se puede hacer las pruebas del VIH y otras infecciones.
- Si su donación puede causarle daño al paciente que reciba su sangre.

¡GRACIAS POR DONAR SANGRE HOY!

Blood Assurance – 705 E 4th St. – Chattanooga, TN 37403
800-962-0628
www.bloodassurance.org

Blank copy 13944710 printed by Alixe Taylor on 4/09/2026 15:47 (EDT). Page 1 of 2

ATENCIÓN: LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE DONAR SANGRE

¿Qué sucede durante el proceso de donación?

Nuestros especialistas en atención a donantes:

- Le pedirán su identificación
- Medirán su presión sanguínea, pulso y temperatura y tomarán una muestra de sangre de su dedo para asegurarse de que usted puede donar
- Le harán preguntas en un ambiente confidencial sobre su historial de salud, viajes y actividad sexual
- Insertarán una aguja en su brazo para recolectar la sangre

¿Cuáles son los distintos métodos de donación de sangre?

Puede donar sangre entera o, mediante un método denominado aféresis o puede donar componentes de la sangre como plaquetas, plasma y glóbulos rojos simples o dobles. En la donación de sangre entera, la sangre se extrae directamente en una bolsa. En la aféresis, la sangre se extrae en una máquina que separa la sangre en sus componentes. La máquina retendrá algunas de las partes de la sangre y el resto se le devolverá. La sangre se mezcla con una solución anticoagulante para evitar la coagulación. Parte de la solución anticoagulante y/o de la solución salina se le devolverá con la sangre.

¿Cuáles son las posibles complicaciones de la donación de sangre entera y aféresis?

La donación de sangre suele ser una experiencia segura. Pocas personas experimentan efectos secundarios relacionados con la donación. Los efectos secundarios más comunes incluyen dolor, moretones, enrojecimiento o infección en el lugar de la donación. Los donantes también pueden experimentar mareos, náuseas, vómitos, mareos, hiperventilación y desmayos. Los desmayos pueden provocar una caída en la que el donante puede lesionarse. Otras complicaciones poco frecuentes y potencialmente graves de la donación incluyen convulsiones, daños en nervios, músculos o vasos sanguíneos, shock, embolia de aire, síndrome compartimental (compresión de nervios, vasos sanguíneos y músculos dentro de un espacio cerrado), coagulación de la sangre, reacción alérgica grave, destrucción de glóbulos rojos, latidos irregulares del corazón y muerte. Los donantes mediante aféresis pueden experimentar hormigueo, bajo nivel de calcio y contracciones o espasmos musculares relacionados con la solución anticoagulante. Los donantes regulares por aféresis pueden experimentar una reducción en el recuento de linfocitos (un tipo de glóbulos blancos). Se desconocen los efectos a largo plazo de esto. Durante el proceso de donación se pueden utilizar materiales que contienen látex, por lo que los donantes con alergia a este material deben informar al personal de Blood Assurance para evitar posibles reacciones graves.

¿Cómo puedo reemplazar el hierro donado?

La donación de sangre puede eliminar la mayor parte de las reservas de hierro del cuerpo en las mujeres jóvenes o en edad reproductiva, o en los donantes frecuentes de ambos sexos. El impacto en la salud de la pérdida de hierro es variable. Los síntomas pueden incluir fatiga, disminución de la capacidad de ejercicio y pica (un deseo de masticar cosas como hielo o tiza). Debido a que las personas están limitadas en cuanto a la cantidad de hierro que absorben diariamente (por ejemplo, de 2 a 4 mg/día), el objetivo es reemplazar los 200 a 250 mg de hierro en la sangre donada en un periodo de 1 a 3 meses. Una sola dosis grande de hierro o una sola comida rica en hierro no reemplazará el hierro perdido en la donación de sangre. Su médico o farmacéutico puede ayudarle a decidir qué dosis, tipo y duración del suplemento de hierro elegir, ya que la suplementación de hierro no es adecuada para todos. Se ha demostrado que un multivitamínico típico con 18 mg de hierro aumenta las reservas de hierro cuando se toma durante 60 días después de la donación. El consumo de zumo de cítricos o alimentos ricos en vitamina C junto con un suplemento de hierro o alimentos ricos en hierro puede ayudar a su cuerpo a absorber el hierro de forma más eficaz. Entre los alimentos ricos en hierro se incluyen la carne, los huevos, los frijoles secos, los guisantes, los cereales fortificados con hierro, las verduras de hoja verde oscura, las frutas secas y las nueces y semillas.3

¿Qué sucede con la sangre y la información del donante después de la donación?

La sangre donada se utiliza para en transfusiones a otros pacientes. Toda la sangre o muestras de sangre que queden después de satisfacer las necesidades de los pacientes pueden utilizarse para investigación o uso comercial con el fin de aprender más sobre la transfusión de sangre, desarrollar nuevos tratamientos y pruebas de laboratorio, y para avanzar en la ciencia y en la atención al paciente en general. La información sobre los donantes también puede utilizarse para la investigación científica. No se proporciona a los investigadores ninguna información sobre los donantes que les permita identificar a un donante en particular. La sangre y la información del donante pueden conservarse indefinidamente. La participación de los donantes es voluntaria y sin beneficio económico para usted. Usted puede cambiar de opinión en cualquier momento sin afectar su relación con Blood Assurance. Si usted experimenta un problema médico después de su donación o tiene más preguntas, por favor llame a nuestra línea principal al 1-800-962-0628.

¡GRACIAS POR DONAR SANGRE HOY!

Blood Assurance – 705 E 4th St. – Chattanooga, TN 37403 – 800.962.0628 – www.bloodassurance.org