

习题 11.2

1. 用比较判别法或比较判别法的极限形式判别下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+1)};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi}{2^n};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n^2+1)}};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\arctan n}{n};$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot \sqrt[n]{n}};$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \ln^2 \left(1 + \frac{1}{n \cdot \sqrt[n]{n}} \right),$$

$$(7) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{1+a^{2n}} \quad (a > 0).$$

$$(8) \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{n} - 1).$$

2. 用比值法或根值法判别下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{3^n};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{n!};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n+1}}{(n+1)!};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot \tan \frac{\pi}{2^{n+1}};$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{\ln(n+1)} \quad (a > 0);$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln^n(n+1)};$$

$$(7) \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{3} - 1)^n;$$

$$(8) \sum_{n=1}^{\infty} 3^n \cdot \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2};$$

$$(9) \sum_{n=1}^{\infty} \left(2n \arcsin \frac{1}{n} \right)^{\frac{n}{2}};$$

$$(10) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n}{b} \right)^n, \text{ 其中 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a (a, b > 0) \text{ 且 } a \neq b.$$

3. 用积分判别法判别下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} n e^{-n^2};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\arctan n}{n^2 + 1};$$

$$(4) \sum_{n=3}^{\infty} \frac{\ln(\ln n)}{n \ln n}.$$

4. 利用级数收敛的必要条件, 证明下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0.$$

5. 用适当的方法判别下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + 2^n}{1 + 3^n};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin \frac{\pi}{3^n};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(n+1)n^2};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n\sqrt{n}};$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{\left(n + \frac{1}{n}\right)^n};$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} \left(1 - \cos \frac{\pi}{n} \right);$$

$$(7) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{\sqrt{n}}};$$

$$(8) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{an}{n+1} \right)^n (a > 0).$$

6. 证明:

(1) 若 $a_n \geq 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 也收敛;

(2) 若 $a_n \geq 0$, 且数列 $\{na_n\}$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛;

(3) 若 $a_n \geq 0, b_n \geq 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)^2$ 收敛;

(4) 若 $a_n \geq 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 也收敛;

(5) 若数列 $\{na_n\}$ 收敛, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n-1})$ 收敛 ($a_0 = 0$), 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛;

7. 利用不等式 $\frac{1}{2\sqrt{n}} < \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)}{(2n)!!}$ 发散而级数

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-3)!!}{(2n)!!}$ 收敛.