

# 习题 11.6 答案与提示

1.

$$(1) \frac{1}{2} - \frac{\pi}{4} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n(1+\pi)-1}{n\pi} \sin nx = \begin{cases} 1, & -\pi < x < 0, \\ -x, & 0 \leq x < \pi, \\ \frac{1}{2}, & x = 0, \\ \frac{1-\pi}{2}, & x = \pm\pi. \end{cases}$$

$$(2) \frac{2}{3}\pi^2 + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} \cos nx = \pi^2 - x^2 \quad (-\pi \leq x \leq \pi);$$

$$(3) \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2nx}{4n^2 - 1} = |\sin x| \quad (-\pi \leq x \leq \pi).$$

2.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 2nx}{2n} = \begin{cases} \frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}, & 0 < x < \pi, \\ 0, & x = 0, \pi. \end{cases}$$

$$(2) \frac{h}{\pi} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nh}{n} \cos nx = \begin{cases} 1, & 0 \leq x < h, \\ 0, & h \leq x \leq \pi, \\ \frac{1}{2}, & x = h. \end{cases}$$

$$3. \frac{8}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2k-1)x}{(2k-1)^3} = x(\pi - x).$$

4.

$$(1) \frac{l}{2} - \frac{4l}{n^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos \frac{(2n-1)\pi}{l} x = |x| \quad (-l \leq x \leq l).$$

$$(2) \frac{h}{2} + \frac{2h}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \sin \frac{(2n-1)\pi}{2} x = \begin{cases} 0, & -2 < x \leq 0, \\ h, & 0 < x \leq 2, \\ \frac{h}{2}, & x = 0, \pm 2. \end{cases}$$