

第五章 数值微积分

第一节 数值积分公式

数值积分引言



计算定积分

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx$$

□ 微积分基本公式: $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$

□ 但是在许多实际计算问题中

(1) $f(x)$ 表达式较复杂, **原函数难求!** 甚至有时不能用初等函数表示。如 $f(x) = \frac{1}{1+x^4}, \frac{\sin x}{x}, e^{-x^2}$

(2) $f(x)$ **表达式未知**, 只有通过测量或实验得来的数据表示。

此时理论的牛顿-莱布尼茨公式无效, 需要利用数值方法来近似计算定积分。

1. 机械求积

□：记

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx$$

则 I 为泛函——即将函数 F 映射为一个数。

□ 由定积分中值定理， $f(x)$ 当在 $[a, b]$ 上连续时，存在 $\xi \in [a, b]$ ，使得：

$$I(f) = (b - a)f(\xi)$$

则积分问题转化为对 $f(\xi)$ 进行估计的问题。

几个简单求积公式

□ 定积分中值定理: $\int_a^b f(x)dx = (b-a)f(\xi), \quad \xi \in (a,b)$

$f(\xi)$ 可看做区间 $[a, b]$ 上的平均高度（需要估计）。

✓ 分别用 $f(a)$, $f(b)$ 和 $f((a+b)/2)$ 近似 $f(\xi)$ 可得

$$\int_a^b f(x)dx \approx (b-a)f(a) \longrightarrow \text{左矩形公式 } G_a(f)$$

$$\int_a^b f(x)dx \approx (b-a)f(b) \longrightarrow \text{右矩形公式 } G_b(f)$$

$$\int_a^b f(x)dx \approx (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) \longrightarrow \text{中矩形公式 } G_c(f)$$

✓ 若用 $f(a)$ 和 $f(b)$ 的算术平均值近似 $f(\xi)$, 则可得

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{(b-a)}{2} \left[\frac{f(a)+f(b)}{2} \right] \longrightarrow \text{梯形公式 } T(f)$$

机械求积公式

□ 更一般地，可以用 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一些离散点

$$a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$$

求积节点
(结点)

上的值加权平均作为 $f(\xi)$ 的近似值，从而构造出

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$$

求积系数
(权)

□ 记 $Q(f) = \sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$

$Q(f)$ 为机械求积公式。

牛顿-科茨 (Newton-Cotes) 公式

利用被积函数的插值函数进行积分导出数值求积分公式

□ 设 $f(x)$ 在节点 $a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$ 上的函数值为 $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$, 作 n 次拉格朗日插值多项式

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n l_i(x) f(x_i)$$

于是有

$$\int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b L_n(x) dx = \sum_{i=0}^n f(x_i) \int_a^b l_i(x) dx \equiv \sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$$

其中

$$A_i = \int_a^b l_i(x) dx = \int_a^b \prod_{j \neq i}^{j=0, \dots, n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j} dx$$

插值型求积公式

牛顿-科茨 (Newton-Cotes) 公式

□ 插值型求积公式

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) \text{ 其中 } A_i = \int_a^b l_i(x)dx$$

□ 等分节点的插值型求积公式称为**牛顿-科茨公式**:

取等分节点: $x_i = a + i h$, $h = \frac{b-a}{n}$, $i = 0, 1, \dots, n$

令 $x = a + t h$ **得:**

$$\begin{aligned} A_i &= \int_a^b l_i(x)dx = \int_a^b \prod_{j \neq i}^{j=0, \dots, n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j} dx = \int_0^n \prod_{j \neq i}^{j=0, \dots, n} \frac{t - j}{i - j} \cdot h dt \\ &= \frac{(b-a)(-1)^{n-i}}{n \cdot i! \cdot (n-i)!} \int_0^n \prod_{j \neq i}^{j=0, \dots, n} (t - j) dt \end{aligned}$$

牛顿-科茨公式（续）

$$A_i = \frac{(b-a)(-1)^{n-i}}{n i!(n-i)!} \int_0^n \prod_{j \neq i}^{j=0, \dots, n} (t-j) dt$$

科茨(Cotes)系数 $C_i^{(n)}$

注： Cotes 系数（常数） $C_i^{(n)} = A_i / (b-a)$ 仅取决于 n 和 i ，与被积函数 $f(x)$ 及积分区间 $[a, b]$ 均无关。

□ 牛顿-科茨系列公式：

$$\int_a^b f(x) dx \approx (b-a) \sum_{i=0}^n C_i^{(n)} f(x_i)$$

几个常见公式

$$n = 1: C_0^{(1)} = \frac{1}{2}, C_1^{(1)} = \frac{1}{2}$$

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)] = T$$

梯形求积公式

$$n = 2: C_0^{(2)} = \frac{1}{6}, C_1^{(2)} = \frac{2}{3}, C_2^{(2)} = \frac{1}{6}$$

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{6}[f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b)] = S$$

抛物线求积公式

辛甫森(Simpson)
求积公式

$n = 4:$ 科茨(Cotes)求积公式

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{90}[7f(x_0) + 32f(x_1) + 12f(x_2) + 32f(x_3) + 7f(x_4)] = C$$

$$x_i = a + i \cdot h, \quad h = (b-a)/4$$

科茨系数表

n	$C_i^{(n)}$									
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$								
2	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$							
3	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$						
4	$\frac{7}{90}$	$\frac{16}{45}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{16}{45}$	$\frac{7}{90}$					
5	$\frac{19}{288}$	$\frac{25}{96}$	$\frac{25}{144}$	$\frac{25}{144}$	$\frac{25}{96}$	$\frac{19}{288}$				
6	$\frac{41}{840}$	$\frac{9}{35}$	$\frac{9}{280}$	$\frac{34}{105}$	$\frac{9}{280}$	$\frac{9}{35}$	$\frac{41}{840}$			
7	$\frac{751}{17280}$	$\frac{3577}{17280}$	$\frac{1323}{17280}$	$\frac{2989}{17280}$	$\frac{2989}{17280}$	$\frac{1323}{17280}$	$\frac{3577}{17280}$	$\frac{751}{17280}$		
8	$\frac{989}{28350}$	$\frac{5888}{28350}$	$\frac{-928}{28350}$	$\frac{10496}{28350}$	$\frac{-4540}{28350}$	$\frac{10496}{28350}$	$\frac{-928}{28350}$	$\frac{5888}{28350}$	$\frac{989}{28350}$	

系数特点和稳定性

□科茨具有以下特点：

$$(1) \sum_{i=0}^n C_i^{(n)} = 1$$

$$(2) C_i^{(n)} = C_{n-i}^{(n)}$$

(3) 当 $n \geq 8$ 时，出现负数，稳定性得不到保证。而且当 n 较大时，由于Runge现象，收敛性也无法保证。

故一般不采用高阶的牛顿-科茨求积公式。

□ 当 $n \leq 7$ 时，牛顿-科茨公式是稳定的。

代数精度

定义5.1 如果对于一切次数不超过 m 的多项式 $f(x)$ ，公式 $I(f) = \int_a^b f(x)dx \approx Q(f)$ ， $Q(f)$ ——线性泛函准确成立，但对 $m+1$ 多项式不准确，则称该求积公式有 m 次代数精度。

当泛函 $F(f)$ 对任意函数 f, g , 实数 k, l 满足

$$F(kf + lg) = kF(f) + lF(g)$$

时，称 $F(f)$ 为线性泛函。显然机械求积公式左 $I(f)$ 右 $Q(f)$ 均为线性泛函。

例5.4

将 $f(x) \equiv \alpha$ 分别代入矩阵公式 (5.2) 及梯形公式

(5.5) 得:

$$I(f) = \int_a^b \alpha dx = (b-a)\alpha$$

0次

1次

$$G_a(f) = (b-a)\alpha; \quad \checkmark T(f) = \frac{(b-a)}{2}(\alpha + \alpha) = (b-a)\alpha \quad \checkmark$$

而将 $f(x) = \alpha x + \beta$ 分别代入矩阵公式 (5.2) 及

梯形公式 (5.5) 得 $I(f) \neq G_a(f), I(f) = T(f)$

而将 $f(x) = x^2$ 代入梯形公式 (5.5) 得 $I(f) \neq T(f)$

利用定义验证代数精度非常不便, 而利用线性泛函的特性可简化代数精度的验证过程。

性质5.1: 公式

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx \approx Q(f)$$

有 m 次代数精度的充要条件为该式对 $1, x, x^2, \dots, x^m$ 精确成立, 但对 $f(x) = x^{m+1}$ 不精确成立.

□ 要验证一个求积公式具有 m 次代数精度, 只需验证对 $f(x) = 1, x, x^2, \dots, x^m$ 精确成立, 但对 $f(x) = x^{m+1}$ 不精确成立即可, 即:

$$\begin{cases} \sum_{i=0}^n A_i x_i^m = \int_a^b x^m dx = \frac{b^{m+1} - a^{m+1}}{m+1} \\ \sum_{i=0}^n A_i x_i^{m+1} \neq \int_a^b x^{m+1} dx = \frac{b^{m+2} - a^{m+2}}{m+2} \end{cases}$$

矩形和梯形公式的代数精度

□ 容易验证:

- ✓ 左矩形公式 和 右矩形公式 具有 0次 代数精度。
- ✓ 中矩形公式 和 梯形公式 具有 1次 代数精度。
- ✓ 辛普森公式 (5.6) 具有 3次 代数精度。

可以证明:

当 n 为奇数时, 牛顿-科茨公式至少有 n 次代数精度。

当 n 为偶数时, 牛顿-科茨公式至少有 $n+1$ 次代数精度。

举例（一）

□ 例：分别用梯形公式($n=1$)和simpson($n=2$)公式

计算积分 $\int_0^1 e^{-x} dx$

解： $a = 0, b = 1, f(x) = e^{-x}$,

由梯形公式可得

$$T = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] = \frac{1}{2} [e^0 + e^{-1}] = 0.6839$$

由 simpson 公式可得

$$S = \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right] = \frac{1}{6} [e^0 + 4e^{-0.5} + e^{-1}] = 0.6323$$

与精确值 0.6321... 相比得误差分别为 0.0518 和 0.0002。

举例（二）

□ 例：试确定系数 A_i ，使得下面的求积公式具有尽可能高的代数精度，并求出此求积公式的代数精度。

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx A_0 f(-1) + A_1 f(0) + A_2 f(1)$$

解：将 $f(x) = 1, x, x^2$ 代入求积公式，使其精确成立得

$$\begin{cases} A_0 + A_1 + A_2 = \int_{-1}^1 1dx = (1^1 - (-1)^1) / 1 = 2 \\ -A_0 + A_2 = \int_{-1}^1 xdx = (1^2 - (-1)^2) / 2 = 0 \\ A_0 + A_2 = \int_{-1}^1 x^2dx = (1^3 - (-1)^3) / 3 = 2/3 \end{cases}$$

奇函数在对称区间的积分为0

解得 $A_0 = 1/3, A_1 = 4/3, A_2 = 1/3$ ，所以求积公式为：

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx [f(-1) + 4f(0) + f(1)]/3$$

代数精度为2次吗？

易验证该公式对 $f(x) = x^3$ 也精确成立，但对 $f(x) = x^4$ 不精确成立，所以此求积公式具有 3 次代数精度。

第五章

数值微积分

第四节 数值微分法

5.4 数值微分

问题：已知 $f(x)$ 在节点 x_0, \dots, x_n 上的函数值，
如何计算在这些节点处导数的近似值？

方法1：差商法

导数是差商的极限, 因此可用差商近似导数.

方法2：插值型求导

先构造出 $f(x)$ 的插值多项式 $p_n(x)$, 然后用 $p_n(x)$ 的导数来近似 $f(x)$ 的导数。

5.4 数值微分法

由导数定义可得到一些简单的数值微分公式：

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

■ 1 差商法

■ 向前差商公式

$$f'(a) \approx \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$


■ 向后差商公式

$$f'(a) \approx \frac{f(a) - f(a - h)}{h}$$

■ 中心差商公式

$$f'(a) \approx \frac{f(a + h) - f(a - h)}{2h}$$

差商公式比较



中心差商精度比较高

插值型求导

——余项公式


多项式插值余项

$$f(x) - L_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} \prod_{j=0}^n (x - x_j)$$

两边求导得

$$\begin{aligned} f'(x) - L_n'(x) &= \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} \left(\prod_{j=0}^n (x - x_j) \right)' \\ &\quad + \frac{1}{(n+1)!} \prod_{j=0}^n (x - x_j) \left(f^{(n+1)}(\xi_x) \right)' \end{aligned}$$

当 x 为某节点时


$$f'(x) - L_n'(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} \omega'(x) \approx 0, \quad (\omega(x) = \prod_{j=0}^n (x - x_j))$$

两点公式

□ 两点公式（等距）：

$n = 1$ ，节点 x_0, x_1 ，步长 $h = x_1 - x_0$

$$\begin{aligned} L_1(x) &= \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} f(x_1) \\ &= \frac{-(x - x_1)f(x_0) + (x - x_0)f(x_1)}{h} \end{aligned}$$

→ $L_1'(x) = \frac{1}{h} (f(x_1) - f(x_0))$

两点公式

所以

向前差商： $f'(x_0) = \frac{1}{h} (f(x_0 + h) - f(x_0)) - \frac{h}{2} f''(\xi_0)$

向后差商： $f'(x_1) = \frac{1}{h} (f(x_1) - f(x_1 - h)) + \frac{h}{2} f''(\xi_1)$

三点公式（等距）

□ 三点公式(等距):

$n = 2$, 步长 h , 节点 $x_i = x_0 + ih$, $i = 0, 1, 2$

$$L_2(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} f(x_0) + \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} f(x_1) + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} f(x_2)$$

令 $x = x_0 + th$, 得

$$L_2(x_0 + th) = \frac{1}{2}(t-1)(t-2)f(x_0) - t(t-2)f(x_1) + \frac{1}{2}t(t-1)f(x_2)$$

对t求导



$$L_2'(x) = \frac{1}{2h}[(2t-3)f(x_0) - 4(t-1)f(x_1) + (2t-1)f(x_2)]$$

三点公式（等距）

分别令 $t = 0, 1, 2$, 得

$$L_2'(x_0) = \frac{1}{2h}[-3f(x_0) + 4f(x_1) - f(x_2)]$$

$$L_2'(x_1) = \frac{1}{2h}[-f(x_0) + f(x_2)]$$

$$L_2'(x_2) = \frac{1}{2h}[f(x_0) - 4f(x_1) + 3f(x_2)]$$

三点公式

所以

$$f'(x_0) = \frac{1}{2h}[-3f(x_0) + 4f(x_1) - f(x_2)]$$

$$f'(x_1) = \frac{1}{2h}[-f(x_0) + f(x_2)]$$

$$f'(x_2) = \frac{1}{2h}[f(x_0) - 4f(x_1) + 3f(x_2)]$$

$$\begin{aligned} & + \frac{h^2}{3} f^{(3)}(\xi_0) \\ & - \frac{h^2}{6} f^{(3)}(\xi_1) \\ & + \frac{h^2}{3} f^{(3)}(\xi_2) \end{aligned}$$

中心差商:

举例

□ 例：已知函数 $y = e^x$ 的函数值表

x_i	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9
y_i	12.1825	13.4637	14.8797	16.4446	18.1741

试用两点和三点公式计算 $x = 2.7$ 处的一阶导数。

解：两点公式：

精确值 $y'(2.7) = y(2.7) = 14.8797...$

取 $x_0 = 2.6$, $x_1 = 2.7$, 得：

向后差商： $f'(2.7) \approx \frac{1}{0.1} (f(2.7) - f(2.6)) = 14.1600$

若取 $x_0 = 2.7$, $x_1 = 2.8$, 则

向前差商： $f'(2.7) \approx \frac{1}{0.1} (f(2.8) - f(2.7)) = 15.6490$

举例

精确值 $y'(2.7)=y(2.7)=14.8797\dots$

若取 $x_0=2.5$, $x_1=2.7$, 则

向后差商: $f'(2.7) \approx \frac{1}{0.2} (f(2.7) - f(2.5)) = 13.4860$

若取 $x_0=2.7$, $x_1=2.9$, 则

向前差商: $f'(2.7) \approx \frac{1}{0.2} (f(2.9) - f(2.7)) = 16.4720$

通常步长越小, 误差也越小。

三点公式: 取 $x_0=2.6$, $x_1=2.7$, $x_2=2.8$, 得

中心差商: $f'(2.7) \approx \frac{1}{2 \times 0.1} (f(2.8) - f(2.6)) = 14.9045$

问题：是不是步长越小，误差一定越小？

例子：用中心差商 $G(h) = \frac{\sqrt{2+h} - \sqrt{2-h}}{2h}$ 计算 $f(x) = \sqrt{x}$

在 $x = 2$ 处的一阶导数。取4位有效数字计算。

h	$G(h)$
1	0.3660
0.5	0.3564
0.1	0.3535
0.05	0.3530
0.01	0.3500

h	$G(h)$
0.005	0.3500
0.001	0.3500
0.0001	0.3000
0.00001	0.0000
.....

准确值 $f'(2) =$
0.353553...

有舍入误差的影响，步长 h 不能太小！

5.5 Matlab 程序代码及应用（掌握）