



Tarea 4

Teoría del Riesgo

Profesor: Alarcón González Edgar Gerardo

Adjuntos: González Alvarado Héctor

Martínez Loria Johan

Padilla Martínez Miriam Janeth

Integrantes: (21) Cuéllar Chávez Eduardo de Jesús

(32) García Tapia Jesús Eduardo

(60) Reyes López Arath Alejandro

(67) Saldaña Morales Ricardo

Grupo: 9106

Ejercicio 3 (2 puntos)

Considera el siguiente riesgo de una compañía:

$$S = \sum_{i=1}^N Y_i \sim \text{BinComp}(n=3, p=0.8, F_Y)$$

Donde la severidad, Y , tiene la siguiente función de masa de probabilidad:

k	1	2	3	4
$\mathbb{P}[Y = k]$	$\frac{7}{16}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{16}$

Sea P la prima que se cobrará por asumir este riesgo, **calculada por el principio de utilidad cero**. Se sabe que la función de utilidad es exponencial con $\alpha = 0.5$ y que la compañía tiene un capital inicial $u \geq 0$.

Calcula:

- (a) $M_S(\alpha)$
- (b) P .

Solución

Ejercicio 4 (2 puntos)

Considere el siguiente riesgo de una compañía:

$$S = \sum_{i=1}^4 Y_i$$

Donde la severidad, Y , tiene la siguiente función de masa de probabilidad:

k	1	2	3	4
$\mathbb{P}[Y = k]$	$\frac{4}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$

Sea P la prima que se cobrará por asumir este riesgo, **calculada por el principio de utilidad cero**. Se sabe que la función de utilidad es cuadrática con $\alpha = \frac{1}{24}$ y que la compañía tiene un capital inicial $u = 10$.

Calcula:

- (a) P
- (b) Comprueba que $\mathbb{E}[S] \leq P$
- (c) Comprueba que $P \leq M = \max\{sop(S)\}$
- (d) Comprueba que $v(u) = \mathbb{E}[v(u + p - S)]$

Solución

Ejercicio 5 (3 puntos)

Para un riesgo S a asumir, se sabe que N^* , su modelo de frecuencia, es de clase (a,b,1), con distribución $\text{Bin}(n=4, p=\frac{1}{3})$ con $P_0^M = 0.7$ y Y el modelo de severidad tiene la f.m.p. siguiente:

k	0	1	2	3	4
$\mathbb{P}[Y = k]$	0.4	0.2	0.1	0.15	0.15

Bajo el **principio de utilidad cero**, asumiendo una función de utilidad exponencial con $\alpha = 0.21$ y un capital inicial $u = 10$

- (a) Calcula la prima (p) a cobrar por asumir el riesgo (S)

- (b) Comprueba que $\mathbb{E}[S] \leq p$
- (c) Comprueba que $p \leq M = \max\{sop(S)\}$
- (d) Comprueba que $v(u) = \mathbb{E}[v(u + p - S)]$

Todas las comprobaciones anteriores verifícalas de forma numérica, **mostrando el resultado obtenida y cómo se obtuvo**. Todos los cálculos deben estar dados de manera teórica (exacta).

Hints:

- (a) Obtén la función generadora de momentos de N^* en términos de la de N para cualquier t .
- (b) Si no quieres hacer lo anterior, debes calcular todas las probabilidades de N^* y obtener la generadora de momentos por definición.
- (c) Para calcular $\mathbb{E}[v(u + p - S)]$ usa estadística inconsciente. Recuerda que $v(u + p - S)$ es una v.a. que depende de S .

Solución

Dadas las instrucciones notemos que:

$$\mathbb{P}(N^* = 0) = 0.7$$

Y como $N \sim \text{Bin}(3, \frac{1}{3})$

Por practicidad denotemos:

$$P_k := \mathbb{P}(N = k) \quad \forall k \in \{0, 1, 2, 3\} \wedge P_k^* := \mathbb{P}(N^* = k) \quad \forall k \in \text{Sop}(N^*)$$

Observemos que N^* pertenece a la clase $(a, b, 1)$ dado “preserva” la estructura de N , y por la información dada, estamos considerando el caso *cero-modificado*, es decir,

$$P_k^* = \left(\frac{1 - P_0^*}{1 - P_0} \right) P_k \quad \forall k \in \{1, 2, 3\}$$

Para N^* tenemos que:

$$\begin{aligned} P_0^* = \mathbb{P}(N^* = 0) = 0.7; P_k^* = \mathbb{P}(N^* = k) &= \frac{0.3}{1 - (\frac{2}{3})^3} \binom{3}{k} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{2}{3}\right)^{3-k} \\ &= \frac{81}{190} \binom{3}{k} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{2}{3}\right)^{3-k} \\ \therefore P_0^* = \mathbb{P}(N^* = 0) &= 0.7 \end{aligned}$$

$$P_k^* = \left(\frac{81}{190} \right) \binom{3}{k} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{2}{3}\right)^{3-k} \quad \forall k \in \{1, 2, 3\}$$

Para obtener $\mathbb{E}(S)$ es necesario obtener $\mathbb{E}(N^*)$ y $\mathbb{E}(Y) \Rightarrow$

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(N^*) &= \sum_{k=0}^3 kP_k^* = \sum_{k=1}^3 kP_k^* = \sum_{k=1}^3 k \frac{1-P_0^*}{1-P_0} P_k \\
 &= \frac{1-P_0^*}{1-P_0} \sum_{k=1}^3 kP_k = \frac{81}{190} \mathbb{E}(N) \\
 &= \frac{81}{190} (3) \left(\frac{1}{3} \right) = \frac{81}{190} \\
 \therefore \mathbb{E}(N^*) &= \frac{81}{190} \\
 \mathbb{E}(Y_i) &= 0(0.4) + 1(0.2) + 2(0.1) + [3+4](0.15) \\
 &= 0.2 + 0.2 + 7(0.15) = 1.45 \\
 \therefore \mathbb{E}(Y_i) &= 1.45 \quad \forall i \in \{1, 2, 3\} \\
 \Rightarrow \mathbb{E}(S) &= \mathbb{E}(N^*)\mathbb{E}(Y_i) = \frac{81}{190}(1.45) \\
 &\approx 0.618157895 \\
 \therefore \mathbb{E}(S) &\approx 0.618157895
 \end{aligned}$$

Obtengamos las probabilidades de S por medio del siguiente código usando Panjer para *cero-modificado*

```

"
TAREA-EXAMEN 4; Ejercicio 5:

* En este código de R encontrarás todo lo necesario para la resolución
del ejercicio 5 de la tarea examen 4. Para ello utilizamos la fórmula de Panjer
para el caso (a,b,1) con cero-modificado desarrollado en la tarea pasada (Tarea 3),
a su vez, utilizamos la fórmula desarrollada en clase para el cálculo de la prima
P bajo un riesgo S con función de utilidad, dado una alpha, v(x):= 1-exp(-alpha*x)
y es P = ln(M_S(alpha)) / alpha.
"

```

```
## [1] "\nTAREA-EXAMEN 4; Ejercicio 5:\n\n* En este código de R encontrarás todo lo necesario para la r
```

```

# Función Panjer Cero Modificado
PanjerConCeroModificado <- function(r,a,b,f,p0,p1,p0m,g0,todo=F){

  "
  PARAMETROS:
  -----
  * r:= Valor de la probabilidad deseada a calcular
  * g0 := P[S=0]
  * (a,b) := Parametros de la familia (a,b,0)
  * f := vector de probabilidades de Y (ordenadas desde 0)
  * p0, p1 := Probilidad en 0 y 1, respectivamente de la
  variable de la familia (a,b,0)
  * p0m := Probabilidad en 0 de la variable N*
  * todo := Booleano que indica si mostramos todas las
  probabilidades calculadas o sólo la deseada (r)
  "

  #Creamos un vector auxiliar para las probas de S.
  g<-0:r

```



```

b<- ((n+1)*p)/(1-p)
p0<- dbinom(x=0, size=n, prob=p) # Sabiendo que N~Binom(3, 1/3)
p1<- dbinom(x=1, size=n, prob=p)
p0m<- 0.7
g0<- 1 - (1-p0m)/(1-p0)*(1-Gn(t = f[1], n=n, p=p))

fS<-PanjerConCeroModificado(r=12,a=a,b=b,f=f,p0=p0,p1=p1,p0m=p0m,g0=g0,todo=T)
print("Las probabilidades est?n dadas por:")

## [1] "Las probabilidades est?n dadas por:"

print(fS)

##          P[S=0]          P[S=1]          P[S=2]          P[S=3]          P[S=4]          P[S=5]
## 7.919579e-01 5.456842e-02 3.183158e-02 4.560000e-02 4.907368e-02 1.061053e-02
##          P[S=6]          P[S=7]          P[S=8]          P[S=9]          P[S=10]         P[S=11]
## 6.552632e-03 5.684211e-03 3.161842e-03 4.796053e-04 2.664474e-04 1.598684e-04
##          P[S=12]
## 5.328947e-05

```

Notemos que el soporte de S está dado por $\{0, 1, \dots, 12\}$, y además veamos que suma 1 y tiene la misma esperanza:

```

# Suma 1
sprintf("Veamos que en efecto, suman 1: %f", sum(fS))

```

```
## [1] "Veamos que en efecto, suman 1: 1.000000"
```

```

prob<- unname(fS)
# Media

media = 0
for(i in 0:12){
  media = media + i*prob[i+1]
}

sprintf("Mostremos la media: %f", media)

```

```
## [1] "Mostremos la media: 0.618158"
```

```
sprintf("Valor teórico: %f", 1.45*(81/190))
```

```
## [1] "Valor teórico: 0.618158"
```

Y observamos que para encontrar P (prima), y por lo visto en clase:

$$P = \frac{1}{\alpha} \ln(M_S(\alpha)) = \frac{1}{0.21} \ln \left[\sum_{k=0}^{12} e^{k(0.21)} \mathbb{P}(S = k) \right]$$

Y lo hacemos con el siguiente código de R:

```

# Obtener la prima por medio de la fórmula con v(x) = 1-exp(-x*\alpha)
mgf = 0
for(k in 0:12){
  mgf = mgf + exp(0.21*k)*prob[k+1]
}

# Inciso a)

```

```
P = log(mgf)/0.21
sprintf("Prima: %f", P)
```

```
## [1] "Prima: 0.906725"
```

Notemos que el valor de la prima es:

a)

$$P = 0.906725$$

b) Dado que $E(S) = 0.6181$ y comprobamos con el siguiente código:

```
# Inciso b)
(media<=P)
```

```
## [1] TRUE
```

c) Notemos que: $M = \max\{Sop(S)\} = 12$ y $P = .906725$, donde claramente $P \leq M$, y comprobamos con el siguiente código:

```
# Inciso c)
(P <= length(fS)-1) # P <= 12?
```

```
## [1] TRUE
```

d) Dado que, $v(x) = 1 - e^{-0.21x}$ y $u = 10$, finalmente tenemos el siguiente código:

```
# Inciso d)

# Ev_u_P_S= 0
# for(k in 0:12){
#   Ev_u_P_S = Ev_u_P_S + (1-exp(-0.21*(10+P-k)))*prob[k+1]
# }

Ev_u_P_S= 0
for(s in 0:12){
  Ev_u_P_S = Ev_u_P_S + v(u+P-s)*prob[s+1]
}

sprintf("E[v(u+P-S)] = E[1-exp(-0.21*(u+P-S))]: %f", Ev_u_P_S)

## [1] "E[v(u+P-S)] = E[1-exp(-0.21*(u+P-S))]: 0.877544"
sprintf("v(u) = 1-exp(-0.21*10): %f", v(u))

## [1] "v(u) = 1-exp(-0.21*10): 0.877544"
(v(u) == Ev_u_P_S)
```

```
## [1] TRUE
```



Ejercicio 6 (3 puntos)

La empresa “Pear” se dedica a fabricar productos electrónicos de diferentes precios. Se sabe que en cada periodo de producción, la fabricación se detendrá cuando salga el quinto producto defectuoso, con la finalidad de dar mantenimiento al equipo de producción. En promedio, se fabrican 100 productos funcionales antes de

que salga el quinto defectuoso. La mercancía se fabrica de manera aleatoria e independientemente de si es defectuosa o no, los gastos por creación de un producto (Y_j) medida en dolares americanos están dados por la f.m.p siguiente:

k	\$120	\$150	\$200
$\mathbb{P}[Y_j = k]$	0.1	0.7	0.2

Ya que, de cada 100 productos que se fabrican aleatoriamente, en promedio se producen 10 “*pearpods*”, 70 “*pearphones*” y 20 “*pearpads*”. “*Pear*” teme producir demasiado y no poder hacer frente a los gastos que tiene que hacer. Por lo tanto, se decide dividir el 25% de todos los gastos con la empres “*Risk*”, para la cual usted trabaja en el área de riesgo, a cambio de una prima. Considerando un factor de recargo $\theta = 20\%$, calcule:

- (a) La prima a cobrar por periodo de producción bajo el principio de la esperanza.
- (b) La prima a cobrar por periodo de producción bajo el principio de la desviación estándar

Hints:

- (a) ¿Cuál es el riesgo (S) que está asociado a la prima?
- (b) Nota que al menos se fabrican 5 productos, los 5 defectuosos. En cuyo caso, habría 0 funcionales, pero aún así, el gasto por los 5 defectuosos, se tiene que hacer

Solución