

Tarea 2 Propiedades de los modelos ARMA

Cuéllar, Eduardo, García Jesús, Miranda Areli, Ramirez José, Saldaña Ricardo

10/26/2021

1.- Considere el proceso $MA(2)$:

$$X_t = Z_t - 0.4Z_{t-1} - 1.2Z_{t-2}$$

donde Z_t es un ruido blanco Gaussiano.

- Calcule σ_X^2 suponiendo que $\sigma_Z^2 = 1$.
- Encuentre la expresión general para la función de autocorrelación ρ_k .
- Grafique ρ_k (correlograma ACF), para $k = 0, 1, 2, \dots, 10$.
- Encuentre la expresión general para la función de autocorrelación parcial ϕ_{kk} .
- Grafique ϕ_{kk} (correlograma PACF), para $k = 0, 1, 2, \dots, 10$.
- En R simule el proceso X_t para un tamaño de muestra n , grafique la serie de tiempo y los correlogramas ACF y PACF. Compare los correlogramas simulados con los del proceso original.

#Cargamos librerías

```
library(ggplot2);library(itsmr);library(forecast);library(TSA);library(lmtest)
library(timeSeries);library(timeSeries);library(astsa);
library(tseries);library(forecast);library(nortest)
```

Respuesta:

$$a) \text{Var}(X_t) = \text{Var}(Z_t - 0.4Z_{t-1} - 1.2Z_{t-2}) \dots (1)$$

Como $Z_k \perp Z_j \forall k \neq j$, podemos expresar a (1) de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} &= \text{Var}(Z_t) + \text{Var}(-0.4Z_{t-1}) + \text{Var}(-1.2Z_{t-2}) \\ &= \text{Var}(Z_t) + (-0.4)^2 \text{Var}(Z_{t-1}) + (-1.2)^2 \text{Var}(Z_{t-2}) \dots (2) \end{aligned}$$

Como Z_t son *v.a.i.i.d.*, con $\mathbb{E}[Z_t] = 0$ y $\text{Var}(Z_t) = 1$

$$\begin{aligned} (2) &= 1 + (.16)(1) + (1.44)(1) \\ &= 1 + .16 + 1.44 \\ &= 2.6 \text{Cov}(Z_t - 1.4Z_{t-1} - 1.2Z_{t-2}, Z_{t+k} - 0.4Z_{t-1+k} - Z_{t-2+k}) \end{aligned}$$

b) Veamos la autocovarianza:

$$\begin{aligned} \gamma(k) &= \text{Cov}(X_t, X_{t+k}) \\ &= \text{Cov}(Z_t - 0.4Z_{t-1} - 1.2Z_{t-2}, Z_{t+k} - 0.4Z_{t-1+k} - 1.2Z_{t-2+k}) \\ &= \text{Cov}(Z_t, Z_{t+k}) - 0.4\text{Cov}(Z_t, Z_{t+k-1}) - 1.2\text{Cov}(Z_t, Z_{t+k-2}) \\ &\quad - 0.4\text{Cov}(Z_{t-1}, Z_{t+k}) + .16\text{Cov}(Z_{t-1}, Z_{t+k-1}) + .48\text{Cov}(Z_{t-1}, Z_{t+k-2}) \\ &\quad - 1.2\text{Cov}(Z_{t-2}, Z_{t+k}) + .48\text{Cov}(Z_{t-2}, Z_{t+k-1}) + 1.44\text{Cov}(Z_{t-2}, Z_{t+k-2}) \end{aligned}$$

Si $k = 0$, entonces:

$$\begin{aligned}
\gamma(0) &= Cov(Z_t, Z_t) + .16Cov(Z_{t-1}, Z_{t+k-1}) + 1.44Cov(Z_{t-2}, Z_{t+k-2}) \\
&= Var(Z_t) + .16Var(Z_t) + 1.44Var(Z_t) \\
&= 2.6 \\
&= Var(X_t).
\end{aligned}$$

Y 0 en los demás, ya que $Z_j \forall k \neq j$

Si $k = 1$

$$\begin{aligned}
\gamma(1) &= -0.4Cov(Z_t, Z_{t+1-1}) + .48Cov(Z_{t-1}, Z_{t+1-2}) \\
&= -0.4Cov(Z_t, Z_t) + .48Cov(Z_{t-1}, Z_{t-1}) \\
&= -0.4Var(Z_t) + .48Var(Z_t) \\
&= -0.4 + .48 \\
&= .08
\end{aligned}$$

Si $k = -1$

$$\begin{aligned}
\gamma(-1) &= -0.4Cov(Z_{t-1}, Z_{t-1}) + .48Cov(Z_{t-2}, Z_{t-1-1}) \\
&= -0.4Cov(Z_{t-1}, Z_{t-1}) + .48Cov(Z_{t-2}, Z_{t-2}) \\
&= -0.4Var(Z_t) + .48Var(Z_t) \\
&= -0.4 + .48 \\
&= .08
\end{aligned}$$

Si $k = 2$

$$\begin{aligned}
\gamma(2) &= -1.2Cov(Z_t, Z_{t+2-2}) \\
&= -1.2Cov(Z_t, Z_t) \\
&= -1.2Var(Z_t) \\
&= -1.2
\end{aligned}$$

Si $k = -2$

$$\begin{aligned}
\gamma(-2) &= -1.2Cov(Z_{t-2}, Z_{t-2}) \\
&= -1.2Cov(Z_{t-2}, Z_{t-2}) \\
&= -1.2Var(Z_t) \\
&= -1.2
\end{aligned}$$

Son los únicos k para los cuales hay un término tal que, en $Cov(Z_j, Z_i)$ tenemos $i = j$, y como $Z_j \perp Z_i \forall j \neq i \implies Cov(Z_j, Z_i) = 0$

$$\therefore \gamma(k) = \begin{cases} 2.6 & k = 6 \\ 0.08 & |k| = 1 \\ -1.2 & |k| = 2 \\ 0 & e.o.c \end{cases}$$

Entonces, tenemos que:

Para $k = 1$:

$$\rho_k = 1$$

Para $|k| = 1$:

$$\rho_k = \frac{0.08}{2.6} = \frac{2}{65}$$

Para $|k| = 2$:

$$\rho_k = \frac{-1.2}{2.6} = \frac{-6}{13}$$

Para $|k| > 2$:


$$\rho_k = 0$$

Gráfica:

```
acf_coefs_ej1=c(1,2/65,-6/13)
#llenemos de 0 los faltantes
for (i in (length(acf_coefs_ej1)+1):11){
  acf_coefs_ej1[i]=0
}
ACF_1<-data.frame('ACF'=acf_coefs_ej1,lag=0:10)
ACF_1
```

```
##          ACF lag
## 1  1.00000000  0
## 2  0.03076923  1
## 3 -0.46153846  2
## 4  0.00000000  3
## 5  0.00000000  4
## 6  0.00000000  5
## 7  0.00000000  6
## 8  0.00000000  7
## 9  0.00000000  8
## 10 0.00000000  9
## 11 0.00000000 10
```

```
ggplot(ACF_1,aes(x=lag,y=ACF))+geom_point()+geom_abline(intercept = 0,slope=0,color='red')
```



Automatizaremos la obtención de los coeficientes del PACF para el ejercicio 1:

#x será el vector con los coeficientes de autocorrelación

```
coefs_pacf<-function(p,k){
  if(k==0){
    return(1)
  }
  if(length(p)<k+1){
    for(i in length(p):k){
      p[i+1]=0
    }
  }
  A<-matrix(nrow=k,ncol = k)
  for (j in 1:k){
    for (i in 1:k){
      A[i,j]=p[abs(i-j)+1]
    }
  }
  B<-A
  for (i in 1:k){
    B[i,k]=p[i+1]
  }
  return(det(B)/det(A))
}
```

¿Cómo funciona? Bien, en clase, en la página 27 de las notas, podemos observar que ϕ_{kk} , que es el coeficiente de autocorrelación parcial para un lag de k se puede calcular usando Cramer. Observamos el patrón de que en la matriz que ‘va en el denominador’, iba el coeficiente ρ_i donde i era el valor absoluto de la diferencia entre el número de columna y renglón, por ello es que llenamos la matriz como $A[i, j] = p[abs(i - j) + 1]$. En la matriz ‘numerador’, únicamente es cambiar el último renglón por los ρ_j donde j es el número de renglón, siendo ambas matrices de dimensión $k * k$


Ahora solo aplicamos la fórmula:

```
pacf_ej1=c()
for (i in 1:11){
  pacf_ej1[i]<-coefs_pacf(acf_coefs_ej1,i-1)
}
PACF_1=data.frame(PACF=pacf_ej1,lag=c(0:10))
PACF_1
```

```
##          PACF lag
## 1    1.00000000  0
## 2    0.03076923  1
## 3   -0.46292348  2
## 4    0.04461263  3
## 5   -0.27566723  4
## 6    0.05170474  5
## 7   -0.18101857  6
## 8    0.05318550  7
## 9   -0.12591880  8
## 10   0.05090694  9
## 11  -0.09137468 10
```

Graficamos


```
ggplot(PACF_1,aes(x=lag,y=PACF))+geom_point()+geom_abline(intercept = 0,slope=0,color='red')
```



Simulamos

```
par(mfrow=c(1,1))
MA2=arima.sim(list(order=c(0,0,2), ma=c(-0.4,-1.2)),n=500)
plot(MA2, main="Simulación MA(2)", col="purple", ylab="", las=1, xlab="Tiempo")
```

Simulación MA(2)




```
##Vamos a calcular el ACF de manera teorica
(ACFMA=ARMAacf( ma=c(-0.4,-1.2), ar=0,15))
```

```
##          0          1          2          3          4          5
## 1.00000000 0.03076923 -0.46153846 0.00000000 0.00000000 0.00000000
##          6          7          8          9         10         11
## 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
##          12         13         14         15
## 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
```


```
plot(ACFMA[-1],type="h", main="ACF teorico de un MA(2)", lwd=2, ylim=c(-1,1), las=1)
abline(h=0, lwd=2, col="violet")
```

ACF teorico de un MA(2)



```
acf(MA2)
```


Series MA2



###?Que concluimos?

##Vamos a calcular el PACF de manera teorica

```
(PACFMA=ARMAacf( ma=c(-0.4,-1.2), ar=0,15, pacf=T))
```

```
## [1] 0.03076923 -0.46292348 0.04461263 -0.27566723 0.05170474 -0.18101857
```


```
## [7] 0.05318550 -0.12591880 0.05090694 -0.09137468 0.04654881 -0.06857228
```

```
## [13] 0.04131486 -0.05286052 0.03595283
```

```
plot(PACFMA,type="h", main="PACF teorico de un MA(2)", lwd=2, ylim=c(-1,1), las=1)
```


```
abline(h=0, lwd=1, col="violet")
```

PACF teorico de un MA(2)



```
pacf(MA2)
```

Series MA2



##Ejercicio 2

Programamos la función recursiva para los coeficientes de correlación

```
#phi es un vector con los coeficientes del modelo AR(p)
#p es un vector con los acf para lag=1 y 2
coefs_acf<-function(phi,p,k){
  for (i in length(p):k+1){
    p[i]=phi[1]*p[i-1]+phi[2]*p[i-2]
  }
  return(p)
}
```


Aplicamos:

```
acf_coefs_ej2<-c(1,-8/35,-461/700)
phi_ej2<-c(-0.4,-0.75)
acf_coefs_ej2<-coefs_acf(phi_ej2,acf_coefs_ej2,10)
ACF_2=data.frame(ACF=acf_coefs_ej2,lag=c(0:10))
ACF_2
```

```
##          ACF lag
## 1  1.00000000  0
## 2 -0.22857143  1
## 3 -0.65857143  2
## 4  0.43485714  3
## 5  0.31998571  4
## 6 -0.45413714  5
```

```
## 7 -0.05833443 6
## 8 0.36393663 7
## 9 -0.10182383 8
## 10 -0.23222294 9
## 11 0.16925705 10
```

```
ggplot(ACF_2,aes(x=lag,y=ACF))+geom_point()+geom_abline(intercept = 0,slope=0,color='red')
```



Entonces:

```
Var_Xt<-1/(1-sum(phi_ej2*(acf_coefs_ej2[2:3])))
Var_Xt
```

```
## [1] 2.411714
```

Sabemos que en un modelo AR(p), solo los primeros p coeficientes del PACF son distintos de 0, es decir, en este caso los primeros 2, para lag=1 y 2. Aplicamos la función escrita anteriormente:


```
pacf_ej2=c()
for (i in 1:3){
  pacf_ej2[i]<-coefs_pacf(acf_coefs_ej2,i-1)
}
for (i in 4:11){
  pacf_ej2[i]<-0
}
PACF_2=data.frame(PACF=pacf_ej2,lag=c(0:10))
PACF_2
```

```
##          PACF lag
```

```
## 1  1.0000000  0
## 2 -0.2285714  1
## 3 -0.7500000  2
## 4  0.0000000  3
## 5  0.0000000  4
## 6  0.0000000  5
## 7  0.0000000  6
## 8  0.0000000  7
## 9  0.0000000  8
## 10 0.0000000  9
## 11 0.0000000 10
```

Graficamos


```
ggplot(PACF_2,aes(x=lag,y=PACF))+geom_point()+geom_abline(intercept = 0,slope=0,color='red')
```



Simulamos

```
par(mfrow=c(1,1))
AR2=arima.sim(list(order=c(2,0,0), ar=c(-0.4,-0.75)),n=500)
plot(AR2, main="Simulación AR(2)", col="gold", lwd=2, las=1)
```

Simulación AR(2)




```
(ACFAR=ARMAacf(ar=c(-0.4,-0.75), ma=0,15))
```

```
##           0           1           2           3           4           5
##  1.00000000 -0.22857143 -0.65857143  0.43485714  0.31998571 -0.45413714
##           6           7           8           9          10          11
## -0.05833443  0.36393663 -0.10182383 -0.23222294  0.16925705  0.10646439
##           12          13          14          15
## -0.16952854 -0.01203687  0.13196115 -0.04375681
```


```
plot(ACFAR,type="h", main="PACF teorico de un MA(2)", lwd=2, ylim=c(-1,1), las=1)
abline(h=0, lwd=1, col="violet")
```

PACF teorico de un MA(2)



acf (AR2)

Series AR2




#PACF

```
(PACFAR=ARMAacf(ar=c(-0.4,-0.75), ma=0,15, pacf=T))
```

```
## [1] -2.285714e-01 -7.500000e-01 2.677540e-16 2.814762e-16 8.987415e-17
## [6] 1.718906e-17 1.405709e-16 1.673463e-17 2.008155e-17 5.689773e-17
## [11] 4.685696e-17 8.869353e-17 4.351003e-17 6.693851e-17 2.342848e-17
```

```
plot(PACFAR, type="h", lwd=3)
abline(h=0, lwd=1, col="violet")
```

`pacf(AR2)`

Series AR2

