

**Zadanie.** Badano zależność między ceną jednostkową towaru (zł.) (cecha  $X$ ) a podażą na ten towar (w tys. sztuk) (cecha  $Y$ ). Zakładamy model regresji liniowej 1-wymiarowej:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon, \text{ gdzie } \varepsilon \sim N(\mu, \sigma).$$

W próbie 15 elementowej otrzymano wyniki

$x_i$	2	2	3	4	4	4	4	5	7	7	8	9	10	11	10
$y_i$	1	3	2	4	5	6	7	5	8	9	7	9	9	12	10

- Oblicz współczynnik korelacji z tej próby.
- Wyznacz (empiryczną) prostą regresji cechy  $Y$  względem  $X$ .
- Wyznacz przedziały ufności dla współczynników regresji (teoretycznych), na poziomach ufności 0,95.
- Sprawdź hipotezy:  $H_0: \beta_0 = 0$  przeciw  $H_1: \beta_0 \neq 0$ , na poziomie istotności 0,05.
- Sprawdź hipotezy:  $H_0: \beta_1 = 1$  przeciw  $H_1: \beta_1 < 1$ , na poziomie istotności 0,05.

$$a) \quad r = \frac{1}{n-1} \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{s_X s_Y} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

$$\bar{x} = \frac{1}{15} \sum_{i=1}^{15} x_i = \frac{92}{15} = 6,13, \quad \bar{y} = \frac{1}{15} \sum_{i=1}^{15} y_i = \frac{97}{15} = 6,47,$$

$$\sum_{i=1}^{15} (x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^{15} x_i^2 - 15(\bar{x})^2 = 670 - 15 \cdot 37,58 = 670 - 563,7 = 106,3$$

$$\sum_{i=1}^{15} (y_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^{15} y_i^2 - 15(\bar{y})^2 = 765 - 15 \cdot 41,86 = 137,1$$

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i - n\bar{x} \cdot \bar{y} = 705 - 15 \cdot 6,13 \cdot 6,47 = 705 - 594,92 = 110,08$$

$$r = \frac{110,08}{\sqrt{106,3} \cdot \sqrt{137,1}} = \frac{110,08}{120,7} = 0,912.$$

$$b) \quad b_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \frac{110,08}{106,3} = 1,04$$

$$b_0 = \bar{y} - b_1 \cdot \bar{x} = 6,47 - 1,04 \cdot 6,13 = 6,47 - 6,37 = 0,10$$

$$\hat{y} = 0,1 + 1,04x.$$

$x_i$	2	2	3	4	4	4	4	5	7	7	8	9	10	11	10
$y_i$	1	3	2	4	5	6	7	5	8	9	7	9	9	12	10
$\hat{y}_i$	2,09	2,09	3,22	4,26	4,26	4,26	4,26	5,03	7,38	7,38	8,42	9,46	10,5	11,54	10,5
$(y_i - \hat{y}_i)^2$	1,19	0,83	1,49	0,67	0,55	3,03	7,51	0,0009	0,38	2,62	0,34	0,21	0,25	0,21	0,25

$$S^2 = \sum_{i=1}^{15} (y_i - \hat{y}_i)^2 / 13 = \frac{9,53}{13} = 0,73, \quad S = \sqrt{0,73} = 0,85$$

c) Przedział ufności dla współczynnika kierunkowego prostej regresji

$$(b_1 - t_{0,975;13}SE(b_1), b_1 + t_{0,975;13}SE(b_1)),$$

$$SE(b_1) = \frac{s}{\sqrt{\sum_{i=1}^{15}(x_i - \bar{x})^2}} = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^{15}(y_i - \hat{y}_i)^2 / 13}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{15}(x_i - \bar{x})^2}} = \frac{\sqrt{9,53/13}}{\sqrt{106,3}} = \frac{0,85}{10,31} = 0,082$$

$$(1,04 - 2,16 \cdot 0,082; 1,04 + 2,16 \cdot 0,082) = (0,86; 1,22)$$

Przedział ufności dla wyrazu wolnego

$$(b_0 - t_{0,975;13}SE(b_0), b_0 + t_{0,975;13}SE(b_0))$$

$$SE(b_0) = S \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(\bar{x})^2}{\sum_{i=1}^{15}(x_i - \bar{x})^2}} = 0,85 \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(\bar{x})^2}{\sum_{i=1}^{15}(x_i - \bar{x})^2}}$$

$$SE(b_0) = 0,85 \cdot \sqrt{\frac{1}{15} + \frac{6,13^2}{106,3}} = 0,85 \cdot 0,647 = 0,55$$

$$(0,1 - 2,16 \cdot 0,55; 0,1 + 2,16 \cdot 0,55) = (-0,088; 2,188)$$

d)  $H_0: \beta_0 = 0$  przeciw  $H_1: \beta_0 \neq 0$ , na poziomie istotności 0,05,

Wartość statystyki testowej

$$t = \frac{b_0}{SE(b_0)} = \frac{0,1}{0,053} = 1,89, \quad t_{1-\frac{\alpha}{2}; n-2} = t_{0,975;13} = 2,16, \quad C = (-\infty; -2,16) \cup (2,16; +\infty)$$

$$t \notin C$$

e)  $H_0: \beta_1 = 1$  przeciw  $H_1: \beta_1 > 1$ , na poziomie istotności 0,05.

$$t = \frac{b_1 - 1}{SE(b_1)} = \frac{1,04 - 1}{0,082} = 0,49, \quad C = (1,77; +\infty)$$