

## SEMINAR 7

Exerciții recomandate: 7.1 i), 7.2 a), e), 7.3

Rezerve: 7.1 ii), iv), 7.2 b), f), 7.4, 7.5 a), b), f)

S7.1 i) Fie  $g : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  definită de

$$g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 2x_1y_1 + 3x_2y_2 + \frac{28}{5}x_3y_3 - x_1y_2 - 2x_1y_3 - x_2y_1 + 4x_2y_3 - 2x_3y_1 + 4x_3y_2,$$

pentru  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3), \mathbf{y} = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3$ .

- a) Arătați că aplicația  $g$  este o formă biliniară simetrică pe  $\mathbb{R}^3$ .
- b) Găsiți matricea lui  $g$  în raport cu baza canonică a lui  $\mathbb{R}^3$ . Determinați discriminantul lui  $g$  și rang  $g$ .
- c) Determinați  $\text{Ker}(g)$ .
- d) Găsiți matricea lui  $g$  în raport cu baza  $\{(1, 1, 1), (2, -1, 2), (1, 3, -3)\}$ .
- e) Scrieți forma pătratică  $h$  corespunzătoare lui  $g$  și stabiliți o formă normală a lui  $h$ . Determinați signatura lui  $h$  și deduceți forma biliniară corespunzătoare formei normale a lui  $h$ .
- f) Determinați o bază a lui  $\mathbb{R}^3$  în raport cu care  $h$  are forma normală de mai sus. Caracterizați dintr-un punct de vedere geometric nucleul lui  $h$ .

Repetăți acest exercițiu pentru:

- ii)  $g_1(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1y_1 + 5x_2y_2 + x_3y_3 + x_1y_2 + 3x_1y_3 + x_2y_1 + x_2y_3 + 3x_3y_1 + x_3y_2$ ;
- iii)  $g_2(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1y_1 + x_2y_2 + 4x_3y_3 + x_1y_2 + 2x_1y_3 + x_2y_1 + 2x_2y_3 + 2x_3y_1 + 2x_3y_2$ ;
- iv)  $g_3(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 2x_1y_1 + x_2y_2 + 2x_3y_3 - x_1y_2 - x_2y_1 + x_2y_3 + x_3y_2$ ,

unde  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3), \mathbf{y} = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3$ .

S7.2 Stabiliți ce este, dintr-un punct de vedere geometric, nucleul fiecăreia dintre formele pătratice neomogene:

- a)  $h_1(\mathbf{x}) = 4x_1^2 + 6x_1x_2 - 4x_2^2 - 26x_1 + 18x_2 - 39, \mathbf{x} = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ .
- b)  $h_2(\mathbf{x}) = 5x_1^2 + 8x_1x_2 + 5x_2^2 - 18x_1 - 18x_2 + 9, \mathbf{x} = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ .
- c)  $h_3(\mathbf{x}) = x_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_2^2 - 14x_1 - 2x_2 + 3, \mathbf{x} = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ .
- d)  $h_4(\mathbf{x}) = x_1^2 + 2x_2^2 - 3x_3^2 + 12x_1x_2 - 8x_1x_3 - 4x_2x_3 + 14x_1 + 16x_2 - 12x_3 - 33, \mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ .
- e)  $h_5(\mathbf{x}) = 4x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_3 - 4x_2x_3 + 6x_1 + 4x_2 + 8x_3 + 2, \mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ .
- f)  $h_6(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3 + 2x_1 + 2x_2 - 2x_3 - 3, \mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ .
- g)  $h_7(\mathbf{x}) = x_1^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 2x_1 - 4x_2 + 4, \mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ .
- h)  $h_8(\mathbf{x}) = x_1x_2 - x_1x_3 + x_2x_3 - 1, \mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ .

S7.3 Fie  $g : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  forma biliniară definită de

$$g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 3x_1y_1 + 13x_2y_2 + 14x_3y_3 - 3x_1y_2 + 2x_1y_3 - 3x_2y_1 - 12x_2y_3 + 2x_3y_1 - 12x_3y_2,$$

pentru  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3), \mathbf{y} = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3$

- a) Arătați că  $g$  determină pe  $\mathbb{R}^3$  o structură de spațiu prehilbertian, pentru care vectorii  $(1, 0, 0)$  și  $(1, 1, 0)$  sunt ortogonali.
- b) Ortonormalizați sistemul  $\{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$  în raport cu structura de mai sus.

S7.4 Fie  $g : \mathbb{R}^4 \times \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$  forma biliniară definită de

$$g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 5x_1y_1 + x_2y_2 + 4x_3y_3 - x_4y_4 + x_1y_2 - x_1y_3 - 2x_1y_4 + x_2y_1 + 2x_2y_3 - x_2y_4 - x_3y_1 + 2x_3y_2 + x_3y_4 - 2x_4y_1 - x_4y_2 + x_4y_3,$$

pentru  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4), \mathbf{y} = (y_1, y_2, y_3, y_4) \in \mathbb{R}^4$ .

- a) Arătați că  $g$  este simetrică și determinați  $\text{Ker}(g)$ .
- b) Găsiți matricea lui  $g$  în raport cu baza canonică a lui  $\mathbb{R}^4$ . Determinați discriminantul lui  $g$  și rang  $g$ .
- c) Scrieți forma pătratică a lui  $h$  corespunzătoare lui  $g$ . Stabiliți forma normală a lui  $h$  și o bază a lui  $\mathbb{R}^4$  în raport cu care  $h$  are această formă normală.
- d) Determinați signatura lui  $h$ .

S7.5 Stabiliți ce este, dintr-un punct de vedere geometric, nucleul fiecăreia dintre formele pătratice neomogene:

- a)  $h(\mathbf{x}) = 3x_1 - 4x_2 + x_3 - x_4 + 2, \mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4$ .
- b)  $h(\mathbf{x}) = x_1 - x_3, \mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ .
- c)  $h(\mathbf{x}) = 7x_1^2 - 8x_1x_2 + x_2^2 - 6x_1 - 12x_2 - 9, \mathbf{x} = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ .
- d)  $h(\mathbf{x}) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 11x_3^2 - 20x_1x_2 + 4x_1x_3 + 16x_2x_3 - 24x_1 - 6x_2 - 6x_3 - 180, \mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ .
- e)  $h(\mathbf{x}) = 2x_1^2 + 3x_1x_2 + x_2^2 - x_1 - 1, \mathbf{x} = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ .
- f)  $h(\mathbf{x}) = x_2^2 - x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 3, \mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ .

S7.6\* Pe spațiul euclidian  $\mathbb{R}^3$  considerăm două forme pătratice  $h_1$  și  $h_2 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ , definite de:

- (1)  $h_1(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_3;$
- (2)  $h_2(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - \sqrt{2}x_1x_2 + \sqrt{2}x_1x_3,$

pentru  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ . Aduceți cele două forme pătratice la forma canonică printr-o schimbare ortogonală de bază.

#### BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ

- [1] V. T. Borcea, C. I. Davideanu, C. Forăscu, *Algebră liniară*, Ed. "Gh. Asachi", Iași, 2000.
- [2] E. Cioară, *Algebră liniară. Geometrie analitică (culegere de probleme)*, Editura "Fair Partners", București, 2009.
- [3] M. Constantinescu, O. Dogaru, M.-M. Doroftei, *Capitole de algebră liniară și geometrie analitică. Noțiuni teoretice și probleme*, Editura "Fair Partners", București, 2012.
- [4] M. Craioveanu, I. D. Albu, *Geometrie afină și euclidiană. Exerciții*, Ed. Facla, Timișoara, 1982.
- [5] E. Denne, *More Quadratic Surfaces. Visions in Math*, Washington & Lee University, 2016.
- [6] Z. Dvořák, *Bilinear and Quadratic Forms, Lessons on Linear Algebra*, 2015.
- [7] P. Matei, *Algebră liniară și geometrie analitică. Culegere de probleme*, Editura Matrix Rom, București, 2007.
- [8] A. R. Saro, A. R. Moyano - *Algebra y Geometria Quadratica*, Netbiblo, 2007.