

SEMINAR 7

Exerciții recomandate: 8.1 i), 8.3, 8.4, 8.5 a), e)

Rezerve: 8.1 ii), iv), 8.2, 8.5 b), f), 8.6

S8.1 i) Fie $g : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ definită de

$$g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 2x_1y_1 + 3x_2y_2 + \frac{28}{5}x_3y_3 - x_1y_2 - 2x_1y_3 - x_2y_1 + 4x_2y_3 - 2x_3y_1 + 4x_3y_2,$$

pentru $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3), \mathbf{y} = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3$.

- a) Arătați că aplicația g este o formă biliniară simetrică pe \mathbb{R}^3 .
- b) Găsiți matricea lui g în raport cu baza canonică a lui \mathbb{R}^3 . Determinați discriminantul lui g și rang g .
- c) Determinați $\ker g$.
- d) Găsiți matricea lui g în raport cu baza $\{(1, 1, 1), (2, -1, 2), (1, 3, -3)\}$.
- e) Scrieți forma pătratică h corespunzătoare lui g și stabiliți o formă normală a lui h . Determinați signatura lui h și deduceți forma biliniară corespunzătoare formei normale a lui h .
- f) Determinați o bază a lui \mathbb{R}^3 în raport cu care h are forma normală de mai sus. Caracterizați dintr-un punct de vedere geometric nucleul lui h .

Repetăți acest exercițiu pentru:

- ii) $g_1(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1y_1 + 5x_2y_2 + x_3y_3 + x_1y_2 + 3x_1y_3 + x_2y_1 + x_2y_3 + 3x_3y_1 + x_3y_2$;
- iii) $g_2(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1y_1 + x_2y_2 + 4x_3y_3 + x_1y_2 + 2x_1y_3 + x_2y_1 + 2x_2y_3 + 2x_3y_1 + 2x_3y_2$;
- iv) $g_3(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 2x_1y_1 + x_2y_2 + 2x_3y_3 - x_1y_2 - x_2y_1 + x_2y_3 + x_3y_2$,

unde $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3), \mathbf{y} = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3$.

S8.2 Fie $g : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ o formă biliniară pe \mathbb{R}^3 a cărei matrice în raport cu baza canonică este

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix}.$$

- a) Scrieți g sub formă matriceală și calculați $g((-1, 0, 1), (1, -1, 0))$.
- b) Determinați forma simetrică și cea antisimetrică asociate lui g .
- c) Determinați g' și g'' (funcționalele liniare asociate lui g) și găsiți $\ker g'$ and $\ker g''$.
- d) Stabiliți forma normală a lui g_s (forma simetrică asociată lui g) și precizați o bază în \mathbb{R}^3 în raport cu care g_s are această formă normală.

Refaceți acest exercițiu pentru forma biliniară a cărei matrice în raport cu baza canonică este

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

S8.3 Fie $g : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ forma biliniară definită de

$$g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 3x_1y_1 + 13x_2y_2 + 14x_3y_3 - 3x_1y_2 + 2x_1y_3 - 3x_2y_1 - 12x_2y_3 + 2x_3y_1 - 12x_3y_2,$$

pentru $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3), \mathbf{y} = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3$

- a) Arătați că g determină pe \mathbb{R}^3 o structură de spațiu prehilbertian, pentru care vectorii $(1, 0, 0)$ și $(1, 1, 0)$ sunt ortogonali.
- b) Ortonormalizați sistemul $\{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$ în raport cu structura de mai sus.

S8.4 Pe spațiul euclidian \mathbb{R}^3 considerăm două forme pătratice h_1 și $h_2 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, definite de:

- (1) $h_1(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_3$;
- (2) $h_2(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - \sqrt{2}x_1x_2 + \sqrt{2}x_1x_3$,

pentru $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$. Aduceți cele două forme pătratice la forma canonică printr-o schimbare ortogonală de bază.

S8.5 Stabiliți ce este, dintr-un punct de vedere geometric, nucleul fiecăreia dintre formele pătratice neomogene:

- a) $h_1(\mathbf{x}) = 4x_1^2 + 6x_1x_2 - 4x_2^2 - 26x_1 + 18x_2 - 39$, $\mathbf{x} = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$.
- b) $h_2(\mathbf{x}) = 5x_1^2 + 8x_1x_2 + 5x_2^2 - 18x_1 - 18x_2 + 9$, $\mathbf{x} = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$.
- c) $h_3(\mathbf{x}) = x_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_2^2 - 14x_1 - 2x_2 + 3$, $\mathbf{x} = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$.
- d) $h_4(\mathbf{x}) = x_1^2 + 2x_2^2 - 3x_3^2 + 12x_1x_2 - 8x_1x_3 - 4x_2x_3 + 14x_1 + 16x_2 - 12x_3 - 33$, $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$.
- e) $h_5(\mathbf{x}) = 4x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_3 - 4x_2x_3 + 6x_1 + 4x_2 + 8x_3 + 2$, $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$.
- f) $h_6(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3 + 2x_1 + 2x_2 - 2x_3 - 3$, $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$.
- g) $h_7(\mathbf{x}) = x_1^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 2x_1 - 4x_2 + 4$, $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$.
- h) $h_8(\mathbf{x}) = x_1x_2 - x_1x_3 + x_2x_3 - 1$, $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$.

S8.6 Fie $g : \mathbb{R}^4 \times \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$ forma biliniară definită de

$$g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 5x_1y_1 + x_2y_2 + 4x_3y_3 - x_4y_4 + x_1y_2 - x_1y_3 - 2x_1y_4 + x_2y_1 + 2x_2y_3 - x_2y_4 - x_3y_1 + 2x_3y_2 + x_3y_4 - 2x_4y_1 - x_4y_2 + x_4y_3,$$

pentru $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4)$, $\mathbf{y} = (y_1, y_2, y_3, y_4) \in \mathbb{R}^4$.

- a) Determinați g' , g'' și $\text{Ker}(g)$.
- b) Găsiți matricea lui g în raport cu baza canonică a lui \mathbb{R}^4 . Determinați discriminantul lui g și rang g .
- c) Scrieți forma pătratică a lui h corespunzătoare lui g . Stabiliți forma normală a lui h și o bază a lui \mathbb{R}^4 în raport cu care h are această formă normală.
- d) Determinați signatura lui h .

S8.7 Stabiliți ce este, dintr-un punct de vedere geometric, nucleul fiecăreia dintre formele pătratice neomogene:

- a) $h(\mathbf{x}) = 3x_1 - 4x_2 + x_3 - x_4 + 2$, $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4$.
- b) $h(\mathbf{x}) = x_1 - x_3$, $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$.
- c) $h(\mathbf{x}) = 7x_1^2 - 8x_1x_2 + x_2^2 - 6x_1 - 12x_2 - 9$, $\mathbf{x} = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$.
- d) $h(\mathbf{x}) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 11x_3^2 - 20x_1x_2 + 4x_1x_3 + 16x_2x_3 - 24x_1 - 6x_2 - 6x_3 - 180$, $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$.
- e) $h(\mathbf{x}) = 2x_1^2 + 3x_1x_2 + x_2^2 - x_1 - 1$, $\mathbf{x} = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$.
- f) $h(\mathbf{x}) = x_2^2 - x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 3$, $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$.

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ

- [1] V. T. Borcea, C. I. Davideanu, C. Forăscu, *Algebră liniară*, Ed. "Gh. Asachi", Iași, 2000.
- [2] E. Cioară, *Algebră liniară. Geometrie analitică (culegere de probleme)*, Editura "Fair Partners", București, 2009.
- [3] M. Constantinescu, O. Dogaru, M.-M. Doroftei, *Capitole de algebră liniară și geometrie analitică. Noțiuni teoretice și probleme*, Editura "Fair Partners", București, 2012.
- [4] M. Craioveanu, I. D. Albu, *Geometrie afină și euclidiană. Exerciții*, Ed. Facla, Timișoara, 1982.
- [5] E. Denne, *More Quadratic Surfaces. Visions in Math*, Washington & Lee University, 2016.
- [6] Z. Dvořák, *Bilinear and Quadratic Forms, Lessons on Linear Algebra*, 2015.
- [7] P. Matei, *Algebră liniară și geometrie analitică. Culegere de probleme*, Editura Matrix Rom, București, 2007.
- [8] A. R. Saro, A. R. Moyano - *Algebra y Geometria Quadratica*, Netbiblo, 2007.